




ENI









BIBLIOTHECA ZOOLOGICA.

Original-Abhandlungen
aus
dem Gesamtgebiete der Zoologie.

Herausgegeben

von

Dr. Rud. Leuckart
in Leipzig

und

Dr. Carl Chun
in Breslau.

Heft VIII.

Untersuchungen über die Mimikry auf Grundlage eines natürlichen Systems der Papilioniden.
Von **Dr. Erich Haase** in Bangkok.

Erster Theil: Entwurf eines natürlichen Systems der Papilioniden.
Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimikry.
Mit 11 Tafeln.



CASSEL.

Verlag von Theodor Fischer.

1892.

Untersuchungen über die Mimicry

auf Grundlage eines

natürlichen Systems der Papilioniden.

Erster Theil:

Entwurf eines natürlichen Systems der Papilioniden.

Von

Dr. Erich Haase

in Bangkok.

The wings of the butterflies are the tables
on which nature has written the history of the
modification of species.

W. H. Bates, The naturalist R. Amaz.

CASSEL.

Verlag von Theodor Fischer.

1892.

Alle Rechte vorbehalten.

BIBLIOTHECA ZOOLOGICA.

Original-Abhandlungen

aus

dem Gesamtgebiete der Zoologie.

Herausgegeben

von

Dr. Rud. Leuckart
in Leipzig

und

Dr. Carl Chun
in Königsberg.

Heft VIII. 1. Lieferung.

Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen eines natürlichen Systems der Papilioniden
von **Dr. Erich Haase** in Bongkok.



141263

CASSEL.

Verlag von Theodor Fischer.

1891.



Ein Versuch, die natürlichen Verwandtschaftsbeziehungen der einzelnen Gattungen der *Papilioniden* zu einander festzustellen, muss noch damit rechnen, dereinst durch die erst vollständig anzuklärende Kenntniss der früheren Stände der exotischen Formen berichtigt zu werden.

Ueber die Eiform der verschiedenen Gattungen ist uns fast nichts, über die Form der Raupe und Puppe nur sehr wenig bekannt und ausserdem bedürfen die meisten älteren Angaben über beide letzterwähnte Stände in so vielen Fällen der Berichtigung, dass man mit diesen Factoren kaum rechnen darf; auf keinen Fall sind aber unsere Kenntnisse lückenlos genug, um uns einen Vergleich auch nur in den Unterfamilien zu gestatten. So wird wohl schon die Gestalt der erwachsenen Larve uns eine Beurtheilung der nach der Aehnlichkeit der Falter gebildeten Gruppen erleichtern, denn schon der Besitz der ausstülpbaren Nackengabel spricht für die verhältnissmässige Einheitlichkeit der Raupenform in der ganzen Familie.

Noch werthvolleren Aufschluss dürfte uns aber die nur erst an wenigen *Papilio*-Arten durch W. H. Edwards¹⁾ und A. Gruber²⁾ festgestellte Postembryonal-Entwicklung der Raupe geben, da alle bisher bekannten Arten nach dem Verlassen des Eies dieselbe dunkle Färbung besitzen und mit starken langbehaarten Hautwarzen in jederseits hauptsächlich vier Längsreihen besetzt sind, somit eine Körperform zeigen, welche nach W. Müller³⁾ der Grundform der Raupen überhaupt näher steht.

Werden diese mit „primären“ Borsten besetzten Hautwärtchen bei *Papilio Machaon* L., *Ternus* L., *Troilus* L. und Segelfaltern (*P. Ajar* L.) schon im zweiten und dritten Stadium „rudimentär in dem Maasse, als sich die Zeichnung auf dem Leibe der Raupe ausbildet“, so verschwinden bei *P. Philenor* wohl die Borsten, aber die Warzen wachsen zu hornförmigen Gebilden, zu Scheindornen, aus, welche sich an den distalen Körperenden besonders entwickeln und in der Mitte wenigstens noch bis zur vorletzten Häutung erhalten bleiben.

Sicher ist es bedenklich, allein nach der Entwicklung der Raupenform die Verwandtschaft der Imago bestimmen zu wollen, da die früheren Stände der Schmetterlinge nur als secundär in die Ontogenie eingeschobene Anpassungsformen anzusehen sind. Darf man jedoch das Merkmal der Entwicklung ihrer Anhangsgebilde verwerthen, so gelangt man zu dem Schluss, dass *P. Philenor* unter den erwähnten Gruppen von *Papilio* die ursprünglichste Raupenform behalten hat. Aehnliche rothgefärbte Fleischdornen

¹⁾ W. H. Edwards, The Butterflies of North-America, Vol. I—II, 1871—74.

²⁾ A. Gruber, Ueber nordamerikanische Papilioniden- etc. Raupen. (Gena, Zeitschr. für Naturw., XVII, 1884, p. 165—189. Mit 2 Taf.)

³⁾ W. Müller, Südamerikanische Nympthalidenraupen. (Zoolog. Jahrbücher, herausg. von J. W. Sars, 1892, I, Systemat. Abth., 255 pp. Mit 4 Taf.)

besitzen nun auch sämmtliche sicher bekannte Raupen der indischen *Hector*-, *Pompeus*- und *Priamus*- und der südamerikanischen *Aeneas*-Gruppe, ja es erhalten sich bei ihnen sogar noch die mittleren Scheindornen bis in's letzte Stadium. Wie die jüngere Raupe noch rothe Dörnchen, trägt die erwachsene Raupe der *Machaon*-Gruppe, zu welcher unser Schwabenschwanz gehört, an ihrer Stelle je eine subdorsale, supra- und infrastigmale Reihe rother Tüpfel, während bei der nordamerikanischen *Turnus-Troilus*-Gruppe sich schon im dritten Stadium an der Brust secundäre Augenflecke entwickeln, und bei den nordamerikanischen Segelfaltern (*Ajax* L.) endlich eine helle, von schwarzen Ringen unterbrochene Grundfärbung auftritt. Dagegen besitzen die Raupen der Gattung *Thais* noch jederseits vier Reihen rothgefärbter, kürzerer, stark behaarter Fleischwarzen, deren Reste sich noch in den rothen Flecken der kurz behaarten *Parnassier*-Raupen wiederfinden, und die schwarze gelbgefleckte Raupe der Gattung *Luchdorjia* trägt nach Mittheilung von Herrn Dr. Staudinger sogar lange dichte Haare gleich einer „Bärenraupe“.

Auch die Verwandtschaftsbeziehungen der ebenfalls noch wenig bekannten Futterpflanzen der Raupen werden vielleicht einst einigen Aufschluss über die Verwandtschaft der Falter geben. So leben die Raupen der *Ornithopteren*, der indischen *Hector*- und die der südamerikanischen *Philenor*- und *Aeneas*-Gruppe von *Papilio* an Aristolochien, wie die Raupen von *Thais* und von *Doritis*. Während die von *Luchdorjia* sich von dem derselben Pflanzen-Familie angehörigen Asarum nähren, sind dagegen die von *Parnassius* polyphag geworden, so lebt die Raupe von *P. Apollo* L. an Crassulaceen und den verwandten Saxifrageen, die von *P. Mucosque* L. an Fumariaceen (*Corydalis*). Wie die Raupen der Aristolochienfalter, lebt auch die von *Euryades Duponchelii* Luc. nicht auf Algaroben, wie E. Schatz l. c. p. 48 angiebt, sondern nach H. Burmeister¹⁾ auf *Aristolochia fimbriata* und sicher frisst auch die von *Euryces* Aristolochien.

Von ebenfalls einigem Werth für die Erkenntniss der Verwandtschaftsbeziehungen scheint die noch weniger untersuchte Puppenform zu sein, die nur in engeren Grenzen variiert. Bei *Ornithopteren*, der *Hector*- und *Philenor*-Gruppe von *Papilio* zeigt dieselbe eine starke Convexität in der Bauchmitte und am Abdominalrücken stumpfe, an die Hautzapfen der Raupen erinnernde Zacken, welche bei den übrigen Formen von *Papilio* weniger oder garnicht (Segelfalter) hervortreten.

Somit sind wir bei der Untersuchung der Verwandtschaftsbeziehungen der *Papilioniden* hauptsächlich auf die Imagines angewiesen.

Die sonst für die natürliche Gliederung der Insecten meist so schwerwiegende Gestalt und Zusammensetzung der Fühler ist bei der Gattung *Papilio* L. von grosser Einförmigkeit und oft nur für einzelne Vertreter einer offenbar natürlichen Gruppe durch feine, zuerst von Horsfield und Moore hervorgehobene Unterschiede ausgezeichnet, welche jedoch für grössere Gruppenverbände nicht mehr anwendbar bleiben. Eine wenig auffällige Verlängerung der Palpen dürfte sich selbstständig erst innerhalb einer entstandenen Gruppe ausgebildet haben.

Mehr Anhaltspunkte bietet uns die Gestalt der Flügel, ihr Aderverlauf, die Entwicklung sexueller Charactere, die Form und Anordnung der Schuppen und die Zeichnung.

Leider bin ich nicht im Stande, die bisher bei den Lepidopterologen gutgeheissenen Bezeichnungen des Geaders anzunehmen. Vor Allem widersprechen sie dem Grundsatz der Morphologie, nur Homologes gleich zu benennen, schon in der Ordnung selbst und noch weniger lassen sie einen Vergleich mit

¹⁾ Descript. physique de la Rép. Argentine etc. 1878, p. 70.

dem Geäder anderer Insecten zu. So musste denn auch J. Redtenbacher, dem wir den ersten bis in's Einzelne durchgeführten Versuch einer Homologisirung des Flügelgeäders aller Insecten zu verdanken haben¹⁾, die bei den Lepidopterologen üblichen Bezeichnungen mit solchen vertauschen, welche für gleichwerthige Systeme bei den übrigen Ordnungen eingeführt waren.

Es sei mir vorerst gestattet, hier die Bezeichnungen von Redtenbacher denen von E. Schatz²⁾ gegenüberzustellen, welche neuerdings allgemeiner, so auch von zoologischer Seite, angenommen worden sind und allerdings vor der Herrich-Schäffer'schen Nummerirung der Zweige auch den Vorzug verdienen.

So entspricht

- die Costale (C) von Schatz der Subcostale (II) Redtenbacher's;
- „ Subcostale (SC) von Schatz dem Radius (III) Redtenbacher's;
- „ obere Radialis von Schatz einem Radialast Redtenbacher's;
- „ untere Radialis von Schatz der Media (V) Redtenbacher's;
- „ Mediana (M) von Schatz dem Cubitus (VII) Redtenbacher's;
- „ Submediana (SM) von Schatz der ersten Dorsalis (IX) Redtenbacher's;
- der Submedianast (der Vorderflügel, „Papilionaris“) von Schatz der zweiten Dorsalis (XI) Redtenbacher's;
- die Innenrandader (der Hinterflügel) von Schatz der zweiten Dorsalis (XI) Redtenbacher's.


Indessen kann auch diese Redtenbacher'sche Verbesserung der Benennung noch keinen Anspruch auf Beibehaltung erheben, da sie nicht durch die Entwicklung des Geäders bestätigt wird.

Meine Untersuchungen an dem Puppenflügel unseres Schwalbenschwanzes (*P. Machaon* L.) erstreckten sich auf kalt gehaltene Puppen und wurden vom December bis März in Intervallen von je einer Woche ausgeführt.

In den jüngsten Vorderflügeln fand ich nur elastische Tracheenröhren mit zahlreichen feinen, am Ende knäuelartig aufgewickelten kurzen Tracheenreisern (siehe Figur 1). Alle Flügeltracheen gingen von je zwei durch eine Commissur verbundenen Hauptstämmen aus.

¹⁾ J. Redtenbacher, Vergleichende Studien über das Flügelgeäder der Insecten. (Ann. k. k. naturh. Hofmus. Wien 1856, p. 198—209.)

²⁾ E. Schatz, Die Familien und Gattungen der Tagfalter, Fünff. 1885, p. 34—35.



Figur 1.

Junger Puppenflügel von *Papilio Machaon* L.

SC	subcostale	} Tracheenäste.
R	radiale	
M	mediane	
Cb	cubitale	
D	dorsale	

Ein geraumes Stück vom Vorderrande entlang zog sich eine grade fortlaufende, unverästelte Ader, welche ich wegen ihrer später concaven Lage mit Redtenbacher als Subcosta (II) bezeichne; somit tritt die sog. Costa, wie schon Fr. Brauer und J. Redtenbacher¹⁾ an Objecten aus anderen Insectenordnungen erkannten, auch hier nicht als Umwandlungsproduct einer Trachee, als echte „Rippe“, sondern nur als cuticulare Randverstärkung in späteren Stadien auf.

An die subcostale schliesst sich die stark entwickelte Radialtrachee (III) an, die einen sparrigen Verlauf zeigt, wie wir ihn im Flügel der *Hepialiden* antreffen. Sie gabelt sich in zwei Hauptäste, deren vorderer sich in zwei, deren hinterer sich in drei Zweige theilt. Die nächste noch kräftigere Trachee entspricht der Media (V) und endigt in drei Zweige. Darauf folgt ein dem Cubitus (VII) entsprechender Tracheestamm, der sich in der Mitte gabelt und nahe an seiner Basis noch einen dritten Ast aussendet. Endlich folgt der der Dorsalis (IX) entsprechende Tracheestamm, der sich in zwei Äeste theilt, dessen hinterer noch einen seitlichen Ausläufer in das erweiterte Analfeld abgiebt. Somit ist die „XI.“ Rippe ein Ast der „IX.“

Auf den Hinterflügeln verläuft dem Vorderrande zunächst eine der Subcostalis entsprechende Trachee, welche einem verästelten Radialast gleicht, aber aus dem Hauptstamme vor der Radialis abgeht. An ihrem Vorderrande entspringt nahe der Basis ein nach kurzem Verlauf sich leicht nach aussen umbiegender meist noch einmal gegabelter Ast, welcher sich später zu der sog. „Praecostalis“ ausbildet. Im Gegensatz zu dieser Verästelung der Subcostalis entwickelt die kräftige Radialtrachee im Ganzen nur zwei Äeste, die an den Aussenrand verlaufen. (Bei *Hepialus* tragen die Hinterflügel dagegen noch die gleiche Subcosta wie die vorderen und eine fünftheilige Radialis; so ist bei dieser ursprünglichen Form noch dieselbe und zugleich bis zur Dorsalis normale Rippenzahl auf beiden Flügeln erhalten.) Hinter der Radialis liegt ebenfalls die sehr kräftige dreispaltige Mediantrachee (V). An diese schliesst sich wie auf den Vorderflügeln wiederum ein dreispaltiger, dem Cubitus entsprechender Stamm (VII) an, dessen dritter Ast nahe der Basis des Stammes entspringt, und auf ihn folgt eine zweispaltige Dorsaltrachee, deren letzter Ast einen kleinen Ausläufer aussendet. So unterscheiden sich die Trachealanlagen beider Flügel eigentlich nur durch die geringere Zahl der Radialäste auf den Hinterflügeln.

Im weiteren Verlauf der Entwicklung bilden sich nun einzelne feinere Nebenäste aus; so entsteht ein Zweig vom dritten Aste der Radialader der Vorderflügel, um bald mit ihm zu verschmelzen; ebenso entsteht ein dritter aber bleibender Zweig am hintersten Aste der Radialis der Hinterflügel, und oft bilden auch noch die Cubital- und Mediantrachee einen Nebenzweig von ihrem letzten Aste aus, der später mit ihm wieder verschmilzt. Durch die am Rande beginnende Erhärtung des Flügelsackes wird jetzt das Wachsthum der Tracheen gehemmt, und so knicken sich diese am Aussenrande des Flügels um und bilden, indem die Median- und Cubitaläste sich nach vorn, die Radialäste nach hinten umbiegen, eine dem Rande entlang laufende continuirliche Begrenzung. Inzwischen beginnt die Flügelhaut sich in feine dem Aussenrande parallele Falten zu legen; zugleich entstehen auch die Schuppen, wie Semp^{er} dies beschrieben hat. Nun entwickeln sich auch die ersten Anlagen der Rippen, indem diese Falten über den vorspringenden Tracheen auseinander weichen und sich dabei verstärken, bis sie zu breiten Spangen werden, die in ihrer gedrängten Anordnung auf diesen Faltenwülsten etwas an die Spiralstreifung der Tracheen erinnern, die aber vielmal dichter ist. Nur dieser Faltenverdickung verdanken auch die Tracheen

¹⁾ Vergl. Zoolog. Anzeiger XI, 1888, Nr. 286, p. 445

ihre Umbildung zu Rippenzügen. So schwindet der Stamm der Media, über den sich keine oder nur ganz unbedeutende Faltenwülste legen, früher als der ebenfalls wenig hervortretende dritte Cubitalast, welcher später zur „Analfalte“ wird und sich entsprechend der geringeren Verstärkung schon im Puppenflügel von *P. Machaon* früher rückbildet als bei *P. Podalirius* L. und *Philenor* L. Indessen beginnt auch die den Schluss der Mittelzellen hervorrufoende Bildung der sog. Discocellularen dadurch, dass sich der cuticulare Faltenwulst vom vordersten Cubitalast auf beiden Flügeln nach vorn fortsetzt. So entsteht eine quer verlaufende Leiste, die auf den vorderen Flügeln sich bis zum vordersten Hauptast der Radialtrachee, auf den Hinterflügeln bis zum hintersten Radialast erstreckt. Somit entstehen die Discocellularen unabhängig von den grösseren Tracheenstämmen. Später jedoch treten oft Tracheen in sie hinein; so scheint besonders von Seiten der Cubitalis und Radialis je eine Verlängerung in die Discocellularen zu verlaufen, die vielleicht momentan als Stütze dient, und solche Tracheenäste lassen sich oft noch im Flügel der Imago nachweisen.

Zugleich mit der Ausbildung der Rippen erfolgt auch die etwa stattfindende Verwachsung der Tracheen, welche aber auf die Hinterflügel beschränkt ist. Hier verwächst in der Aussenhälfte der Hauptast der Subcostalis mit dem ersten Radialast und so entsteht die „Praecostalzelle“ (Schatz), das sog. „Flügelfeld“ Fickert's, die wir als „Praeradialzelle“ bezeichnen müssen. Weiter verwächst auf den Hinterflügeln zuerst der etwa gebildete Nebenzweig des ersten oder zweiten Cubitalastes mit letzterem, indem sich eine Rippenwulst über beide legt. Während schon früher der hinterste Dorsalast in den Rand des sich verschmälern den Analfeldes übertritt und verschwindet, beginnt die concave Lagerung des dritten Cubitalastes, derzufolge er dann am ausgebildeten Flügel als Analfalte erscheint.

Inzwischen ist die Verkümmernng der Tracheen in der durch die Discocellularen abgeschlossenen Mittelzelle weiter vor sich gegangen, doch ist der Stamm der Media noch lange zu erkennen. Durch das stärkere Wachstum in der Mittelzelle der Vorderflügel entsteht nun noch eine hinten offene, taschenartige Membranduplicatur der Oberseite, welche auch späterhin als concave Längsfalte sichtbar bleibt und als Concavader (IV) angesprochen wurde und sich bei den *Hepialiden* in beiden Flügeln erhält. An Neubildungen ist nur noch die ebenfalls aus einem Faltenwulst hervorgegangene strangartige Verbindung zwischen Cubital- und Dorsalrippe der Vorderflügel zu erwähnen, der sog. „Mediansporn“ von Schatz, den wir als Cubitalsporn bezeichnen werden.

Die weiteren Veränderungen beziehen sich nur auf die Stellung der Rippen gegeneinander; so verkürzt sich auf den Vorderflügeln die Discocellulare zwischen dem dritten Radialast und dem Gabelstiel,





Figure 2.
Weiter entwickelter Puppenflügel von *P. Machaon* mit vollendeter Rippenbildung.
Die schwarzen Linien in den Rippen
deuten die Tracheen an.
F Falten Tasche der Vorderflügelzelle.

und nähern sich diese Rippen. Dagegen treten, durch die Spannung der kräftigen Discocellularen mitgezogen, die zwei hinteren Medianäste in die Verlängerung der Verbindung zwischen erstem und zweitem Cubitalast: so entsteht die für die *Papilioniden* so charakteristische scheinbare „vierästige Mediana“. Auf

Grund dieser entwicklungsgeschichtlichen Thatsachen sind wir gezwungen, die Bezeichnungen der Rippen, wie sie bis heute geführt wurden, fast sämtlich zu verwerfen und schlagen folgende sich an Redtenbacher's Deutung anschliessende Benennung vor¹⁾:



Figur 3.

Schematische Skizze der Rippen und Flügelfelder von *Papilio*.

- VF Vorderrandsfeld.
- VZZ Vorgabelzelle.
- GZ Gabelzelle.
- VR Vorderflügelrandfeld.
- HR Hinterflügelrandfeld.
- S.I Subanalfeld.
- A Analfeld.
- Ch Analfalte.
- I Innenfeld.

Rippen: SC Subcostal-, R Radial-, M Median-, Ch Cubital-, D Dorsalrippe.

Vorderflügel:

- Subcostalis (Sc) Costale Schatz II Redtenbacher;
- Radialis (R) fünfästig (R₁—R₅) Subcostale Schatz III Redtenbacher;
- Mediana (M): Erster Ast (M₁) - obere Radialis Schatz III, 9 Redtenbacher;
- Zweiter Ast (M₂) - untere Radialis Schatz V Redtenbacher;
- Dritter Ast (M₃) - dritter Medianast Schatz VII, 1 Redtenbacher;
- Cubitalis (Cb): Erster Ast (Cb₁) - zweiter Medianast Schatz VII, 3 Redtenbacher;
- Zweiter Ast (Cb₂) - erster Medianast Schatz VII, 5 Redtenbacher;
- Dritter Ast (Cb₃) [Analfalte] - Analfalte Schatz VIII Redtenbacher;
- Dorsalis (D): Erster Ast (D₁) - Submediana Schatz IX Redtenbacher;
- Zweiter Ast (D₂) - Papilionaris Schatz XI Redtenbacher;

Hinterflügel:

- Subcostalast (ein Theil der Subcostalrippe) (Sc₁) Praecostale Schatz I Redtenbacher;
- Subcostiradialis (aus Subcosta und erstem Radialast verschmolzen) (Sc₂ + R₁) Costa Schatz I Redtenbacher;
- Hintere Radialis (R₂) Subcosta Schatz III, 1 Redtenbacher;
- Erster Medianast (M₁) - obere Radialis Schatz III, 3 Redtenbacher;

¹⁾ Vergl. Figur 3.

Zweiter Medianast (M ₂)	untere Radialis	Schatz	V	Redtenbacher:
Dritter Medianast (M ₃)	dritter Medianast	,	VII, 1	„
Erster Cubitalast (Cb ₁)	zweiter Medianast	,	VII, 3	„
Zweiter Cubitalast (Cb ₂)	erster Medianast	,	VII, 5	„
(Dritter Cubitalast) Analfalte (Cb ₃)	Analfalte	,	VIII	„
Erster Dorsalast (D ₁)	Submediana	,	IX	„
Zweiter Dorsalast (D ₂)	zweite Innenrandsader	,	XI	„

Also stimmt von der ganzen durch Schatz eingeführten Terminologie des Geäders nur der dritte Medianast mit meiner Auffassung, wenn auch nicht in der Deutung, doch in der gemeinsamen Bezeichnung überein. Somit ist der Nachweis geführt, dass entgegen Adolph's¹⁾ Hypothese, dass die im Raupenflügel angelegten Tracheen sich später als Concavfalten wiederfinden und von ihnen nur die Subcosta und eventuell die Analfalte sich als Rippe erhalten, die convexen „Adern“ dagegen ursprünglich nur Verdickungen im Inneren der Flügel seien, in welche später allerdings auch secundär Tracheen hineinwachsen könnten, auch von mir an den *Papilioniden*, wie durch J. F. van Bemmelen²⁾ vor Kurzem an den *Nymphaliden*, endgültig widerlegt durch den Nachweis, dass auch die Convexadern aus der Umwachsung von Tracheen hervorgehen. Zugleich ist es mir aber auch gelungen, an früheren als den von ihm untersuchten Stadien eine Phase in der Beobachtungsreihe van Bemmelen's zu ergänzen, in welcher die spätere Analfalte noch als Cubitalast auftritt. Damit ist bewiesen, dass concave und convexe Adern sich sogar aus Aesten eines Stammes durch geringere oder höhere Ausbildung der Faltenwülste entwickeln können, dass sie sich also nur in ihrer definitiven Lagerung unterscheiden. Somit kann ich die über diesen Punkt der Adolph'schen Hypothese von Fr. Brauer und J. Redtenbacher³⁾ geäußerten Bedenken auch für das Geäder der Schmetterlinge bestätigen.

Im Anschluss an Eimer⁴⁾ zählen wir im Gegensatz zu Herrieh-Schäffer wie die Rippen, auch die von ihnen eingeschlossenen Flügelfelder von vorn nach hinten. So bezeichnen wir die bei den *Papilioniden* stets „geschlossene“ Discoidalzelle als „Mittelzelle“ und die nach aussen offenen Felder zwischen den Rippen als Randfelder und nennen mit Eimer das in der Radialgabel gelegene das Gabelfeld, bezeichnen ebenso das direct davor liegende als Vorgabelfeld und die vor letzterem gelegenen als Vorderrandsfelder, und zählen die hinter dem Gabelfelde gelegenen Randfelder von vorn nach hinten, wie alle Randfelder der Hinterflügel. Im achten Randfelde der letzteren unterscheide ich aber noch das zwischen dem zweiten und dritten Cubitalast (Analfalte) gelegene Randfeld als Subanal- von dem zwischen Analfalte und Dorsalis gelegenen Analfelde und das (neunte) Randfeld zwischen Dorsalis und Innenrand bezeichne ich als Innenfeld.

Von grosser Wichtigkeit für die Beurtheilung der verwandtschaftlichen Beziehungen der einzelnen Gattungen der *Papilioniden* zu einander sind selbst unbedeutende Abweichungen im Rippenverlauf. So lässt das Vorkommen oder Fehlen des Cubitalsporus, des cuticularen Verbindungsstranges zwischen dem

¹⁾ G. E. Adolph, Ueber Insectenflügel. (Nova Acta Leop. 1879, p. 230—238.)

²⁾ J. F. van Bemmelen, Ueber die Entwicklung der Farben und Adern auf den Schmetterlingsflügel. (Tijdschrift d. Nederl. Dierkund. Vereenig. 2, Deel II, Abt. 4, 1889, S.-A.)

³⁾ Fr. Brauer und J. Redtenbacher, Ein Beitrag zur Entwicklung des Flügelgeäders bei Insecten. (Zool. Anzeiger XI, 1888, p. 443—447.)

⁴⁾ G. H. Eimer, Die Artbildung und Verwandtschaft bei den Schmetterlingen etc. Jena 1889, p. 35. (Vergl. p. 36.)

Stamme der Cubitalis und der Dorsalrippe, diese Familie in drei anscheinend natürliche Abteilungen zerfallen, die E. Schatz l. c. p. 39 als *Papilio*-, *Thais*- und *Parnassier*-Gruppe bezeichnete.

Um die Gattungen stets in einer Reihenfolge anzuführen, welche von dem Ursprünglicheren zu dem Abgeleiteten führt, so umfasst die *Papilio*-Gruppe mit Cubitalsporn und fünf entwickelten Aesten an der Radialis der Vorderflügel bei Schatz die Gattungen *Druryia* Aurid., *Ornithoptera* Boisd., *Papilio* L., *Teinopalpus* Hope, *Leptocircus* Swains., *Euryades* Feld. und *Eurycus* Boisd., welche wir mit Ausnahme von *Ornithoptera* und *Druryia* in seinem Sinne weiterführen werden. Der von Schatz zu *Ornithoptera* gestellte *P. Zalmoxis* Hew., der ihr einziger afrikanischer Vertreter sein sollte, gehört mit *Druryia*, wie bei Besprechung der afrikanischen *Papilio*-Arten gezeigt werden soll, zu einer Hauptgruppe dieser Gattung, während die indo-australischen Arten von *Ornithoptera*, wie auch Fickert nachwies, in zwei differente Gruppen zerfallen, welche bei den indischen *Papilionen* beurtheilt werden sollen.

Nach unseren Untersuchungen über die Entstehung der Rippen müssen wir denjenigen Arten den ursprünglichsten Rippenverlauf zuerkennen, bei welchen die Radialäste der Vorderflügel nur erst geringere Spuren der Zusammenziehung zeigen. Hierher gehören vor Allem diejenigen Formen, bei welchen der dritte Radialast nicht gemeinsam mit dem Gabelstiel vom Zellende, wie bei der Mehrzahl, sondern vor dem Zellende entspringt: die *Prionus*-Gruppe von *Ornithoptera*, *Papilio Leosthenes* etc., die *Zagreus*-Gruppe und *Euryades*. Dann folgen die Formen, bei welchen Ast und Gabelstiel gemeinsam vom Zellende entspringen: die übrigen *Papilio*-Arten, die *Pompeus*-Gruppe von *Ornithoptera*, *Druryia*, *Eurycus*. Am abgeleitetesten zeigen sich *Teinopalpus*, bei dem der dritte Radialast hinter dem Zellende vom Gabelstiele selbst entspringt, und *Leptocircus*, bei dem er sich sogar erst aus dem vierten Radialast, wie dieser aus dem fünften, abzweigt, was von Schatz¹⁾ nur noch bei den *Lycaniden* beobachtet wurde.

Der *Papilio*-Gruppe schliessen wir die von Schatz zuletzt geführte *Thais*-Gruppe an, welche sich durch das Fehlen des Cubitalsporns der Vorderflügel von der vorigen unterscheidet. Sie steht aber derselben offenbar näher als die *Parnassier*-Gruppe, hat mit ihr die fünfästige Subcostalis gemein und besitzt eine wohlentwickelte „Praecostalzelte“ der Hinterflügel, wie sie allen Gattungen der *Papilio*-Gruppe zukam. In dieser Gruppe geht meist wie bei *Teinopalpus* der dritte Subcostalast erst vom Gabelstiel aus (*Armandia* Blanch., *Luchdorfia* Crüg., *Thais* F.); nur bei *Scirivius* Westw. entspringt er wie bei den meisten *Papilionen* vom Zellende aus zusammen mit dem Gabelstiel.

Die höchste Reduktion des Geäders finden wir in der *Parnassier*-Gruppe, welche wie die *Thais*-Gruppe keinen Cubitalsporn der Vorderflügel, aber auch keine entwickelte Praecostalzelte der Hinterflügel besitzt. Wenn E. Schatz in Uebereinstimmung mit den übrigen Lepidopterologen die Gattungen *Euryades* und *Eurycus* als „Übergänge“ zu den sich eng anschließenden *Parnassiern* ansah, wurde er anscheinend hauptsächlich durch ein biologisches Merkmal, das Copulationszeichen des betrachteten Weibchens, dazu bestimmt, jene bekamite vom Männchen bei der Begattung ausgesonderte chitnöse Masse, welche ausser bei *Eurycus* und *Euryades* auch bei *Parnassias* Latr. beobachtet wurde. Es kommt diese Copulationsmarke aber auch bei *Luchdorfia* Crüg. vor, die zur *Thais*-Gruppe gehört, und sie fehlt anscheinend bei der zur *Apollo*-Gruppe gehörigen *Hypermuestra* Mén.

Während nur *Doritis* F. noch fünf Radialäste der Vorderflügel besitzt, deren letzte drei wie bei *Luchdorfia* mit einem gemeinsamen Stiel vom Zellende entspringen, sind bei *Hypermuestra* Mén. und

¹⁾ E. Schatz, l. c. p. 47.

Parnassius Latr., anscheinend durch Anfallen des dritten, nur vier Radialäste entwickelt und bei letzterwähnter Gattung fehlt sogar die vordere Discocellulare.

Auch die Grösse der Mittelzelle beider Flügel scheint nicht ohne Bedeutung für die Beurtheilung der Gattung zu sein. So kommt die relativ weiteste Mittelzelle der Vorderflügel mit aussen convex gewinkeltm Ausseurande bei *Ornithoptera* Boisid., *Drargia* Auriv. und den meisten Arten von *Papilio* L. vor, während z. B. die *Gyas*-Gruppe der letzterwähnten Gattung, *Teinopalpus* Hope und *Euryades* Feld. einen nach innen vorspringenden Schluss der Vorderflügelzelle aufweisen wie die *Thais*- und *Parnassier*-Gruppe.

Mit Rücksicht auf die Reduction und Concentration der einzelnen besprochenen Rippensysteme ergibt sich folgende aufsteigende Entwicklungsreihe der einzelnen Gattungen:

- Parnassius*.
Hypermuestra;
Doritis;
Thais;
Armanuliu;
Luchdorgia;
Eurycus: *Leptocircus*;
Euryades: *Teinopalpus*;
Papilio s. l. (*Ornithoptera Drargia*);

Papilioniden:

Ziehen wir aus diesen Folgerungen einen Schluss auf die Flügelform, so ergibt es sich mit Sicherheit, dass die Vorläufer der Familie einen stark entwickelten Hinterflügelschwanz besaßen, dass letzterer also auch für die Gattung *Papilio*, wie schon Eimer hervorhob, typisch ist und nur den abgeleiteteren Formen derselben fehlt. Weiter fehlt er in der *Thais*-Gruppe nur einigen Formen dieser Gattung selbst, dagegen in der ganzen *Parnassier*-Gruppe, in der endlich auch die Hinterflügelzacken sich vollkommen abrunden. An dem Puppenflügel von *Pap. Machaon* treten (vgl. Figur 1) auf einem frühen Stadium sogar drei Rippen in den Schwanz ein, während sonst nur bei dem nordchinesischen *P. Elwesi* Leech noch zwei Rippen sich in letzteren fortsetzen.

Von secundär geschlechtlichen für die Systematik verwendbaren Auszeichnungen sind männliche Dufteinrichtungen ausser bei den verschiedenen Gruppen von *Papilio* s. l. nur noch in der indo-malayischen Gattung *Leptocircus* Swains. entwickelt, bei welcher sie durchaus an die bei den Segelfaltern typische Form erinnern. Dagegen sind vom Männchen während der Copulation abgesonderte Begattungszeichen ausser bei *Parnassius* auch bei *Eurycus* und *Euryades* und, was Schatz entgangen zu sein scheint, auch bei *Luchdorgia* lange bekannt; ich glaube aber, dass sie besonders unter den Aristolochienfaltern weit verbreitet, wenn auch meist unbedeutend entwickelt sind.

Recht ungenügend sind die Anhaltspunkte, welche uns die Untersuchung der Schuppen zur Erkenntniss von Verwandtschaftsbeziehungen giebt. Was die Anordnung derselben betrifft, so wird die Regelmässigkeit ihrer Reihen nur bei den schuppenarmen Formen vermischt; bei *Parnassius* fehlen die Unterschuppen schliesslich ganz.

Wir dürfen als typisch wohl die bei den Tagfaltern am weitesten verbreitete, am wenigsten specialisirte Form der grossen, am Ende vielzackigen, jederseits des Stieles in einen basalen Zipfel (Sinus) auslaufenden Deck-Schuppen ansehen, welche wir auch bei den *Castuini* antreffen¹⁾.

Diese scharf ausgeprägte Form fand ich bei fast allen Arten der „Rinnenfalter“²⁾ (*Machaon*-, *Nircus*-, *Pammon*-, *Dissimilis*-, *Erithonius*-, *Erectheus*-, *Ulysses*-, *Protenor*-, *Memoon*-, *Turnus*-, *Andraemon*-Gruppe von *Papilio*). Meist trug das freie Ende drei bis fünf, seltener sechs Zacken, und war der Sinus gut entwickelt. Die einzigen Ausnahmen beobachtete ich bei *P. Troilus* L. und *Palamedes* L., bei welchen nur wenige Schuppen den Sinus besitzen.

Bei den meisten „Aristolochienfaltern“ fand ich meist keine, seltener undeutliche, nur bei der *Priamus*-Gruppe fand ich deutliche Sinus und ausserdem bis neun scharfe Endzacken (Processus). Bei *P. Hector* L. und *Antenor* Dru. sitzen anstatt des Sinus kleine Spitzchen jederseits des Stiels am Hinterrande der wenig gezackten Schuppen.

Auch die „Segelfalter“ besitzen keinen entwickelten Sinus; die Zahl der Zacken geht über fünf meist nicht hinaus (*Codrus* Gr., *Policeus* Cr.); die Schuppen der *Alchion-Glycerion*-Gruppe gleichen denen von *P. Antiphates*.

Die Schuppen von *Euryades* und *Earyeus* erinnern an die vielzackigen der *Hector*-Gruppe, und wie die der *Thais*- und *Parnassier*-Gruppe sind auch die von *Timoalpus* ohne Sinus.

Die bei *Armandia* noch vorhandenen vier bis sechs scharfen Spitzen werden bei *Sericinus* unregelmässig und treten bei *Thais*, *Luehdorfia* und *Doritis* allmählig zurück. Endlich nehmen die Schuppen bei *Parnassias* eine eigenthümliche ganzrandige Nierenform an, welche an die von *Pieriden* (*Aporia*) erinnert.

So entspricht oft die allmähliche Abrundung der Schuppen auch dem Reduktionsgrade des Geäders in den verschiedenen Gattungen.

Die Grundformen der Zeichnung.

Jede Veränderung des Geäders übt auch ihren Einfluss auf die Zeichnung aus. So richtet sich z. B. die Stellung eines hellen Fleckes am Gabelgrunde der Radialis der Vorderflügel nach der Länge des Gabelstiels, welche mit aufsteigender Entwicklung zunimmt, wofür *P. Lydius* Feld. ♀ und *P. Antenor* Dru. als Beispiel dienen mögen. Ebenso bewirkt ein Zurücktreten der Analfalte eine Vereinigung der Randmonde und umgekehrt die secundäre stärkere Ausbildung der Intercoastalfalten eine Spaltung der Binde Reste.

Von besonderer Bedeutung für die Erhaltung der Zeichnung ist natürlich die Flügelform. So bedingt ein Ausschnitt im Analfelde der Hinterflügel die für Segelfalter und Aristolochienfalter typische Unterdrückung des bei den Rinnenfaltern stets entwickelten Randmondes. Zugleich ist die Elasticität bemerkenswerth, mit welcher bei einzelnen Formen die constanten Binde sich jeder Veränderung des Flügelumrisses anpassen, sich mit der Erweiterung der Fläche ausdehnen, mit ihrer Verengerung zusammenziehen. Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür giebt *Papilio Eran* Dbl., dessen Postmarginalbinde sich genau mit der jedesmaligen äusseren Verlängerung des betreffenden Randfeldes ausdehnt. Ebenso bildet bei den

¹⁾ Der Vergleichbarkeit der Resultate wegen wurden stets nur Schuppen aus der Mittelzelle der Unterseite der Vorderflügel untersucht, auf welche allein sich die nachstehenden Bemerkungen beziehen.

²⁾ Diese Eintheilung von *Papilio* ist weiter unten begründet.

echten Segelfaltern die Reihe der Marginalmonde auf den Hinterflügeln eine den Randzacken entsprechende Stufenreihe. Diese Anordnung dehnt sich bei *Armanlia* auf fünf Binden aus, so dass z. B. der Marginalmond eines Randfeldes in einer Linie mit dem Submarginalmond des folgenden Feldes etc. liegt.

Vor Allem ist durch die Verkürzung des Hinterrandes der Vorderflügel ein Zusammentreten der Zeichnungselemente gegen den Innenwinkel bedingt. Weiter kehrt, entsprechend der grösseren Zusammenziehung der Hinterflügel, welche uns die Entwicklungsgeschichte erkennen liess, meist nur ein Theil der auf den Vorderflügeln entwickelten Randzeichnung auf den hinteren wieder. Zugleich tritt oft noch eine stärkere Verschmälerung der Aussenrandfläche hinzu, welche die Zeichnungen nach innen zwängt. Dadurch wird die Continuität der den beiden Flügeln gemeinsamen Bänder oft verwickelt, und häufig setzen sich verschiedene Systeme anscheinend in einander fort. So empfiehlt es sich in schwierigen Fällen, im Interesse einer befriedigenden Deutung der Binden etc. die Zeichnung am Vorderrande der hinteren Flügel auch mit der am selben Rande der vorderen zu vergleichen.

Ueber die Zeichnung einer kleinen Gruppe der Gattung *Papilio*, welche nur die „eigentlichen“ Segelfalter umfasst, gab vor Kurzem E. Eimer eine umfassende Arbeit heraus, stellte darin den nordindischen *P. Alibion* Gray als ursprünglichsten Zeichnungstypus hin, auf den sich die Zeichnung aller *Papilioniden* zurückführen lasse, und bestimmte letztere durch die bei *Glycerion* vorkommenden „Längsstreifen“, deren er elf annahm und vom Aussenrande nach der Basis zu nummerirte.

Es sei mir gestattet, zuerst gegen den Ausdruck der „Längsstreifung“ einzuwenden, dass der Herr Autor in seinen früheren Arbeiten für die entsprechende Bänderung an den Flügeln der Raubvögel¹⁾ und sogar der Schmetterlinge²⁾ immer den Ausdruck *Querstreifung* gebrauchte und dass es sich im Anschluss an den allgemeinen Sprachgebrauch ebenfalls wieder empfehlen dürfte, solche senkrecht gegen die Wachstumsrichtung eines Organs, somit gegen seine Hauptachse gerichteten Zeichnungen als „quere“ zu bezeichnen.

Während Eimer die einzelnen Zeichnungselemente, welche er als „Streifen“ bezeichnet, von der äussersten Flügelspitze bis zur Basis aufsteigend nummerirt, sehe ich mich leider genöthigt, den umgekehrten Weg der Bezeichnung einzuschlagen, und folge damit nicht nur einer allgemeiner gälligen Anschauung, welche besonders für die Betrachtung bilateraler Thiere auch ihre „inneren Gründe“ finden dürfte, sondern sogar Eimer³⁾ selbst. Wenigstens zählte derselbe bei der Mauereidechse die Streifen des Körpers ebenfalls von der Mittelzone des Rückens nach aussen auf.

Um die charakteristische Zeichnung des *P. Alibion*, welche Eimer seinem Bezeichnungsmodus zu Grunde legt, ebenfalls als Schema zu benutzen, kann man auf die elf Streifen zurückgehen, welche derselbe hier annimmt, muss sie aber natürlich, wie erwähnt, umgekehrt signiren. So zähle auch ich wie Eimer in der Mittelzelle der Vorderflügel sieben Zellstreifen, von denen ich jedoch im Anschluss an ihn selbst den sechsten und siebenten besser in einen zusammenfassen zu müssen glaube. Dem die zwischen ihnen gelegene Binde ist nur in wenigen Fällen vorhanden, während die verschmolzenen Streifen einen charakteristischen und zugleich constanten Zeichnungsfactor bilden. Für Eimer's Ausdruck

¹⁾ Prof. Dr. Eimer, Ueber die Zeichnung der Vögel und Säugethiere. (Jahresheft des Vereins für vaterl. Naturg. Württemberg, XXXIX, 1883, p. 61 ff.)

²⁾ Dors., Untersuchungen über das Variiren der Mauereidechse. (Archiv für Naturg. 17. Jahrg. 1851, I, p. 152.)

³⁾ L. c. p. 339.

„Mittelzellrandbinde“ bitte ich dagegen, das kürzere „Terminalband“ einführen zu dürfen. Wie Eimer sehe ich die helle Farbe als der Grundfarbe entsprechend an, auf der sich die dunklere Zeichnung wie ein Gemälde entwickelte, dessen Unterton schon angelegt ist. So nenne ich die Reste der hellen Grundfärbung „Binden“ (vittae)¹⁾.

Die dunklen Zeichnungselemente, welche Eimer als einfache schwarze Streifen (strigae) bezeichnet, scheinen mir zusammengesetztere Bildungen zu sein, da sie in vielen Fällen einen bestimmt gefärbten Kern entwickeln und sich dadurch zu einem hellen, dunkelgesäumten Bande umbilden können, weshalb ich sie auch als Bänder (fasciae) bezeichne. Uebrigens hat Eimer die Umwandlung von Streifen zu hellgefüllten Bändern bei *P. Podalirius* selbst beobachtet. Während der Grad der Verdunkelung, welcher die centrale Binde zurücktreten lässt, starken Schwankungen unterworfen, während selbst die Länge der Bänder sehr veränderlich ist, ist doch ihre Lage mit wenigen Ausnahmen (*P. Policens* Cr.) so constant, dass Eimer sie mit Recht als wichtiges morphologisches Verwandtschaftsmerkmal ansehen durfte, wemgleich die Berufung auf die Vorderrandszeichnung der Vorderflügel allein zu einseitig erscheint, um zu annehmbaren Resultaten führen zu können. Von den Zellbändern der Vorderflügel sind besonders die ersten drei bei den Segelfaltern weit verbreitet, weshalb ich sie als erstes bis drittes Basalband bezeichne, während ich die zwischen ihnen gelegenen Binden „innere und äussere Basalbinde“ nenne.

Ausserhalb der Mittelzelle ist die Grundfarbe der Vorderflügel durch entwickelte oder nur in Resten am Vorderrande erhaltene Bandsysteme durchbrochen, welche ich für das wichtigste Merkmal der Zeichnung zur Erkenntniss von Verwandtschaftsbeziehungen derjenigen Formen ansehe, bei welchen die leicht unterscheidbaren Zellbänder durch allgemeine Verdunkelung unerkennbar geworden sind. Dieser Aussenzellbänder unterscheide ich drei, das Inframarginal-, das Submarginal- und das Postmarginalband. Das zunächst der Zelle gelegene Inframarginalband ist auch von Eimer als morphologisch wichtig anerkannt worden und entspricht seinem Streifen IV. Während dasselbe allerdings bei den Segelfaltern, welche Eimer untersuchte, stark verschmälert ist, tritt es doch bei einigen Rinnenaltern als breites, innen hell gefülltes Band auf. Die durch das Submarginalband zerschnittene breite Flügelbinde, welche fast bei allen Formen innen vom Terminal-, aussen vom Submarginalbande begrenzt wird, zerfällt dadurch in eine innere „Vorbinde“ und eine äussere „Zwischenbinde“, wie umgekehrt durch Ausfallen des Inframarginalbandes und die Vereinigung beider Binden die „Aussenzellbinde“ entsteht. Tritt letztere direct nachweisbar oder doch durch die Morphologie der Zeichnung ableitbar mit Zellbinden in Verbindung, wie dies ja die Regel ist, so bezeichne ich sie als „Mittelbinde“, während die „Innenbinde“ nur aus der Verschmelzung mehrerer Zellbinden besteht.


Hinter der Mittelbinde treten bei fast allen Formen zwei Streifen, III und IV Eimer, so regelmässig aneinander, dass wir sie unbedingt als zu einem Complex, einem Bande gehörig, ansehen müssen, welches meist auch eine bestimmte bläuliche Farbe seines Bindenkerns trägt. Ich bezeichne dies Band als Submarginalband.

An das Submarginalband schliesst sich nach aussen eine fast stets erhaltene Grundfarbenbinde an, die ich mit dem in der Entomologie dafür eingeführten Ausdruck als „Marginalbinde“ bezeichne, und die häufiger in die „Marginalmonde“ zerfällt als sie eine continuirliche Binde darstellt.

¹⁾ Vergl. H. Burmeister, Handbuch der Entomologie, Bd. I, 1832, p. 29—39.

Das zwischen ihr und dem hellen „Saum“ (limbus) gelegene, nur in wenigen Fällen seinen ursprünglichen Bindenkern zu schmalen Mondtöpfeln entwickelnde Band, welches Eimer's Streifen I entspricht, bezeichne ich als Postmarginalband und seine mondformigen Bindenreste als „Postmarginalmonde“.

Die ursprünglichere Form dieser Bänder ist meist auf der Unterseite deutlicher als auf der oberen und ihre Grundform dürfte von breiten dem Aussenrande der Flügel parallel laufenden Grenzstreifen eingefasst gewesen sein und somit dem weit verbreiteten Zackenbände entsprechen haben, welches besonders bei den *Heteroceren* vorherrschen sehen.



Figur 4.

Halbschematische Skizze der Flügelzeichnung von *Papilio Daucus* Bsd. (Mexico), einem Rinnefalter.

Durch allmählich sich über die Längsrippen fortsetzende Verdunkelung der Randstreifen eines Bandes wird die Binde des letzteren in den Randfeldern entsprechende Stücke zerschnitten, die zuerst eine mehr rundliche, später oft halbmondförmige Form haben und bei den drei randläufigen Binden als „Monde“, bei den Zell- und den Aussenzellbinden dagegen, wo sie meist rundlich oder längsgestreckt sind, mit einem der Ornithologie Naumann's entnommenen Ausdruck als Tüpfel (guttæ) bezeichnet werden. Sie stellen somit die Reste ursprünglicher Binden dar.

Verflossen mehrere dieser Tüpfel zu einem grösseren, so nenne ich letzteren, wenn er besonders auffällig ist, mit einem ebenfalls der Ornithologie entlehnten Ausdruck „Spiegel“.

Wie die Binden durch Verdunkelung, d. h. Vermehrung der Zeichnung, werden die Streifen und Bänder durch Aufhellung, durch secundäres Vortreten einer hellen, oft der Grundfarbe entsprechenden Färbung durchbrochen. Dann zerfallen sie, wenn sie einfarbig waren, meist in schwarze Flecke

(maculae), wenn sie einen Bindekern trugen, in Augenflecke, deren „Pupille“ dann von dem Bindekern gebildet wird.

Eine manchmal schwierige Aufgabe, die aber meiner Ansicht nach nicht zu umgehen ist, wenn man der Zeichnung überhaupt morphologische Verwerthbarkeit zugesteht, ist die morphologische Deutung der einzelnen Bandssysteme: hier giebt nur der Vergleich wirklich verwandter, nicht fälschlicher Arten Aufschluss. So kommt man stets nur schrittweise vorwärts, selbst wenn man über grösseres Untersuchungsmaterial verfügt, da man jede Einzelheit stets an der abzuleitenden Reihe nachprüfen muss. Wenn ich nun auch überzeugt sein darf, bei der Aufstellung der hier vertretenen Deutungen redlich nach einem unbefangenen Urtheil gestrebt zu haben, so wird doch das Erreichte in manchen Punkten anfechtbar sein. Auch werden die gewaltige Masse des stets fast gleichzeitig zu beherrschenden Stoffes und die geringen literarischen und musealen Hilfsmittel, die ich bei der Revision meiner Arbeit zur Verfügung hatte, vielleicht kleinere Unrichtigkeiten entschuldigen helfen.

Da sich die Färbung des Puppenflügels in zwei bis drei Tagen ausbildet, verdankt man es bei geringem Material selbst mit Zuhilfenahme der sehr brauchbaren Gewichtsbestimmungen ¹⁾ mehr einem glücklichen Zufall, wenn man einige Entwicklungsstadien der Zeichnung antrifft. So muss auch ich eine Lösung der einschlägigen Einzelheiten weiteren Untersuchungen überlassen und mich mit der Anführung einiger unzusammenhängenden Beobachtungen begnügen.

Die Grundfarbe der Flügel in der jungen Puppe war bei allen untersuchten Arten (*P. phoenor* L., *Asterius* L., *Machoun* L., *Tarnus* L., *Podalirius* L.) zuerst glasklar, dann ein unreines Weiss, das am Tageslicht in wenigen Stunden gelblich nachdunkelte. Wie die Entwicklung des Rippenystems ist auch die der Zeichnung auf den hinteren Flügeln früher vollendet. So zeigte eine Puppe von *P. Podalirius* mit noch gleichmässig blassen Vorderflügeln auf beiden Flügelflächen der Hinterflügel besonders hinten stark und breit gesäumte weisskernige Marginalflecke, deren innerster schon vollkommen ausgebildet war, während der im dritten Randfelde sich erst anlegte, der im zweiten noch fehlte. Dagegen war der sog. „Prachtwinkel“ Eimer's bis zum inneren Rande des siebenten Randfeldes, also weiter als am vollkommenen Thier entwickelt. Wie die Randmonde bildete auch das „Anlage“ einen weissen Kern mit dunkler Fassung. Zugleich erkannte man von dem „Prachtbänder“ ²⁾ nur den ausserhalb der Zelle gelegenen äusseren Grenzstreif, der noch keine fortlaufende Linie bildet, sondern durch die ungefärbten Rippen durchschnitten ist, vom zweiten bis fünften Randfelde besonders der Unterseite.

Wir erhalten damit für die Zeichnung der Flügel eine Bestätigung der auch von A. Weismann für die Entwicklung der Raupenzeichnung festgestellten Regel, dass neue Eigenschaften sich von hinten nach vorn verbreiten, einer Regel, welche Eimer als „antero-posteriore Entwicklungsgesetz“ bezeichnet. In einem weiter vorgeschrittenen Stadium fand ich die Prachtbinde mit ihren Grenzstreifen auch in den Randfeldern, in welchen sie dem Falter fehlt: hieraus erhellt, dass sie bei den Vorläufern der Art gleichmässig entwickelt war. Ihr spätes Auftreten aber scheint dadurch zugleich bedingt zu sein, dass sie sich so bald zurückbildet.

¹⁾ Vergl. E. Urech, Bestimmungen der successiven Gewichtsabnahme der Winterpuppe von *P. brassicae* etc. (Zool. Anzeiger, XI, 1888, p. 205-212.)

²⁾ Der etwas volle Ausdruck „Prachtbänder“ bezieht sich auf das von Eimer „Prachtbinde“ genannte, meist vierfarbige, über die Flügelmitte verlaufende Band der Segelfalter, ein für diese Untergattung sehr charakteristisches Zeichnungselement.

Leider fehlen bisher die ersten Entwicklungsstufen der Zeichnung auf den Vorderflügeln. Auf den mir zur Verfügung stehenden Stadien treten bei *P. Poddalirius* L. schon alle überhaupt vorkommenden dunklen Bänder hervor, so auch regelmässig das fünfte Zell- und das Intramarginalband. Letzteres reicht bei einem jüngeren Stadium über die Zelle hinaus und schliesst sich hinten derart an das Terminalband an, dass ihre Fortsetzung eine gemeinsam gebildete zu sein scheint. Alle Bänder legen sich, wie die Zeichnungen der Hinterflügel, stets intercostal an. Besonders entstehen sie innerhalb der Einsenkungen des Flügels, so in der taschenartigen Zellfalte der Vorderflügel viel früher als auf den exponirten Flügelstellen und wachsen erst allmählig über letztere hinaus.

Eintheilungsprincipien der *Papilioniden*.

Bei der Besprechung der Unterfamilien und einzelnen Gattungen der *Papilioniden* hatte ich mich an die durch das Geäder begründete Stufenreihe und beginne so mit der Gattung *Papilio*, welche über 400 Arten enthält, von denen mir leider fast vierzig vollkommen unbekannt geblieben sind, trotzdem ich die grössten Sammlungen Deutschlands durcharbeitete.

In der Besprechung der Arten von *Papilio* hatte ich mich an die durch die geographische Verbreitung gegebenen Hauptgruppen, welche ich mit Benutzung der ausgezeichneten, auf Merkmale des Geäders etc. gegründeten Monographie von C. und R. Felder¹⁾, die bisher noch unerreicht dasteht und erst neuerdings von Godman und Salvin²⁾ nach Verdienst gewürdigt wurde, nach ihrer Verwandtschaft in drei hiermit zuerst begründete Untergattungen *Pharmacophagus*³⁾, *Cosmodesmus*⁴⁾, *Papilio* s. str. zusammenfasse.

Dieselben characterisiren sich durch wenig auffällige Eigenthümlichkeiten, welche aber bei den meisten Arten mit Ausnahme einzelner mimetischer Formen, sich recht constant erhalten und so auch die Einordnung neuer Formen gestatten. Hoffentlich dürfen wir von der Zukunft eine bessere Eintheilung erwarten.

Die Untergattung der Aristolochienfalter, *Pharmacophagus*, welche ich an die Spitze von *Papilio* stelle, ist ausgezeichnet durch meist undeutlich geringelte, ganz allmählig verdickte Fühler, durch meist rothe Färbung an Kopf, Brust, Hals und Abdomen, die fast nur in der eigenartigen süd-amerikanischen *Philenor*-Gruppe fehlt, durch die Verkürzung des achten Randfeldes der Hinterflügel, in welchem der Marginalmond mit dem Randsaum verschmilzt, durch die deutliche Entwicklung der Analfalte, den Besitz von Dufteinrichtungen in den meist nach oben, selten nach unten (*Priamus*-Gruppe) umgeschlagenen zwei letzten Randfeldern der Hinterflügel der Männchen. Das Analfeld ist wie bei den Segelfaltern flach ausgebreitet und ebenso stark wie das Subanalfeld entwickelt. Die schwarzen, mit rothen Fleischzapfen besetzten Raupen fressen Aristolochien; die Puppen sind dick und plump und tragen auf dem Rücken sattelartige Höcker.

Die Untergattung der Segelfalter, *Cosmodesmus*, ist der vorigen näher als der folgenden verwandt und kennzeichnet sich meist durch die kurze und breite ovale und oft platte Fühlerkoale, die starke Behaarung der Stirn, die concave Discocellulare im dritten Randfelde der Hinterflügel, die oft in

¹⁾ C. et R. Felder, Species Lepidopt. I. Papilionidae. (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX, 1864, p. 289—378.)

²⁾ Godman et Salvin, Biolog. central-americe. Rhopaloc. 1889, p. 189 ff.

³⁾ *γερμαζορ* = Gift, *γερμαρ* = fressen, weil die Raupen Aristolochien fressen.

⁴⁾ *κοσμος* = Schmuck, *δεσμός* = Band, wegen der typischen Entwicklung des „Prachtbandes“ (in d. S. 10) falter s. l. angewandt.

Querbändern ausgeprägte Zeichnung aus. Mit der vorigen Gruppe stimmt sie überein in der Ausbildung des Analfeldes, der Verkürzung des achten Randfeldes und dem Besitz von Dufteinrichtungen in dem nach oben umgeschlagenen achten Randfelde der Hinterflügel. Doch sind letztere meist weniger pelzartig als bei den Aristolochienfaltern, vielmehr bestehen sie meist aus kurzen Duftschuppen und zerstreuten langen Strahlhaaren. Die meist nur theilweise erhaltenen, ausserhalb der Marginalmonde gelegenen Postmarginalmonde sind auf diese Untergattung beschränkt, jedoch bei manchen Arten unterdrückt. Die mimetischen Formen unterscheiden sich von ihren Modellen durch mehrere rothe Tüpfel an der Basis der Unterseite der Flügel. Die Raupen sind am Hinterende verschmälert, oft in zwei Spitzen ausgezogen und mit blassen Streifen besetzt und leben besonders von Annonaceen.

Die Rinneufalter (*Papilio* s. str.) sind durch die Verschmälерung des achten Randfeldes ausgezeichnet. Das Subanalfeld ist stark verengt und bildet eine neben der nach innen concav gekrümmten Dorsalis verlaufende tiefe, ebenfalls gekrümmte Rinne, an deren Grunde die undeutliche Analfalte liegt. So tritt die Zeichnung des achten Randfeldes hauptsächlich im Subanalfelde auf, während sie in den anderen Untergattungen sich bis über das Analfeld fortsetzt und dadurch lassen sich auch die mimetischen Arten der beiden letzten Gruppen unterscheiden. Durch die starke Entwicklung des freien Halses und die geringere Verkürzung des Subanalfeldes, welches stets einen entwickelten Mond der Marginalbinde enthält, stellt sich diese Gruppe als selbstständige Entwicklungsreihe dar.

Im Gegensatz zu Eimer's allerdings bisher von ihm nur an den „eigentlichen“ Segelfaltern geprüfter Auffassung des verwandtschaftlichen Zusammenhanges der einzelnen Arten muss ich betonen, dass ich mit C. und R. Felder neben der Verwandtschaft die geographische Verbreitung als das wichtigste Moment für die Aufstellung natürlicher Artgruppen ansehe, wie ich bei den Segelfaltern genauer auseinandersetzen werde. Ich schliesse mich damit an die längst für die höheren Thiere anerkannte Regel an, dass selbst Repräsentanten einer Gattung nur in seltenen Ausnahmefällen auf verschiedene Continente vertheilt sind, eine Regel, welche für Untergattungen und Artgruppen selbstverständlich noch mehr Geltung beansprucht.

Im Interesse einer weiteren natürlichen Anordnung der Artgruppen habe ich die palaearktische Region der indo-australischen und letztere der afrikanischen vorausgestellt, um so die Verwandtschaft der Faunen hervorheben zu können, und habe die nearktische trotz ihrer Beziehungen zur palaearktischen vor der nur aus ihr zu entwickelnden neotropischen Subregion besprochen. So suche ich damit, die Entwicklung lokal beschränkter Formen theilweise auf die Umwandlung von meist südwärts, seltener nordwärts eindringenden Einwanderern zurückzuführen, deren morphologische Grundformen ich am Schlusse der Zusammenstellung mit einander vergleichen werde.

Bezüglich der Nomenclatur schliesse ich mich im Allgemeinen an F. W. Kirby's verbreiteten Katalog an¹⁾. Nur in der Bezeichnung der dimorphen Arten habe ich stets diejenige Bezeichnung gewählt, welche der meiner Ansicht nach ursprünglichsten Form der Art gegeben wurde, und somit bei polymorphen Formen in allen Fällen, in welchen die Divergenz seitens des Weibchens durch mimetische Anpassung entstanden ist, den Namen des männlichen Geschlechts als Artnamen angenommen.

¹⁾ F. W. Kirby, A synonymic Catalogue of Diurnal Lepidoptera. London-Berlin 1871. Supplement 1877.

Palaearktische Papilionen.

Die Untergattung der Rinnenfalter, *Papilio* s. str., ist in dieser Region nur durch vier endemische Arten vertreten, welche sich auf sie beschränken und von denen drei zu der engeren *Machaon*-Gruppe unserer Schwalbenschwänze gehören. Von diesen ist *P. Machaon* L. selbst über fast ganz Europa, Nordafrika, Nordindien, Sibirien und Japan verbreitet. Als die am leichtesten zugängliche Art darf er als Beispiel für die Erörterung der Zeichnung seiner Gruppe dienen.

Wie die Grundfarbe der Flügel, ist auch die des Körpers bleich schwefelgelb. Doch zieht sich ein breites Band vom Kopf über den Nacken, verläuft je ein schmaler Streif an den Seiten über den Stigmen und je ein schärferer an den Bauchseiten. So ist der Körper deutlich fünffach längsgestreift. Wie die übrigen Mitglieder der Gruppe zeichnet auch *P. Machaon* sich durch lange und spitze Analklappen und schwächere Zackung der Hinterflügel aus. Die Zeichnung der Vorderflügel besteht in der Mittelzelle aus einer die basale Hälfte einnehmenden, oben mehr gleichmässigen, unten nur aussen durch ein stark vortretendes schwarzes Band ausgedrückten Verdunkelung, welche sich oben auch über die Hinterflügel fortsetzt, unten dagegen sich nur in dunklen Streifen auf der Dorsalrippe und dem zweiten Cubitalaste erhält. Die basale Verdunkelung der Vorderflügel entspricht einer Vereinigung der drei Basalbänder mit dem vierten Zellbände und ist auf den Hinterflügeln durch starke Aufhellung besonders unten verwischt. Der weiter in der Mittelzelle der Vorderflügel gelegene schwarze Bandfleck entspricht dem fünften Zellbände der Segelfalter und findet sich wohl in der Verdunkelung am Ende der Hinterflügelzelle¹⁾ wieder; der durch Verkürzung der Mittelzelle nur ausserhalb derselben erhaltene Fleck entspricht dem Terminalbände. Ein weiterer schwarzer vor der Radialgabel im Vorgabelfelde gelegener Fleck entspricht dagegen dem Inframarginalbände, und das breite, ausserhalb des letzteren gelegene, den ganzen Flügel durchziehende Zackenband, das hell bestäubt auch auf der Oberseite vortritt, ist das Submarginalband. Ausserhalb des letzteren liegt die unten noch verbreiterte helle Marginalbinde, welche oben in einer kontinuierlichen Reihe meist halbmondförmiger Flecke, den Randmonden, auftritt. Zwischen der Marginalbinde und dem hellen Randsaum zieht sich das gezackte Postmarginalband hin. Die breite Aufhellung, welche schon durch längs der Rippen verlaufende Verdunkelung zerschnitten wird, ist aus den zwei Zellbinden und zwei ausserhalb der Zelle gelegenen, nur am Vorderrande durch das Inframarginalband getrennten Binden, der Vor- und Zwischenbinde, verschmolzen und muss somit als Mittelbinde bezeichnet werden.

Von diesen Bändern und Binden setzt sich der Randsaum, das Postmarginalband, die Marginalbinde, endlich das Submarginalband und die erweiterte Mittelbinde über die Hinterflügel fort, wobei die den einzelnen Randfeldern angehörigen Elemente scheinbar auseinander gezerrt werden und dabei einen unregelmässig gebrochenen Verlauf zeigen, welcher ungefähr den Verkürzungen der einzelnen Randfelder entspricht, zugleich aber durch die gegenseitige Entwicklung bedingt ist. Im achten Randfelde ist zwar der äussere Marginalstreif erhalten, aber der innere vollkommen erloschen, und so geht hier der ziegelrothe runde Marginalmond in die Submarginalbinde unmerklich über.

Nach dem geringen in meinem Besitz befindlichen Material bemerke ich über die Entwicklung der Zeichnung, dass das Postmarginalband der Vorderflügel ursprünglich breiter und die Marginalmonde

¹⁾ Um eine gewisse Schwerfälligkeit der Ausdrücke möglichst zu vermeiden, bezeichne ich, da Missdeutungen ausgeschlossen sind, die Mittelzelle oft kurzweg als „Zelle“ zur *έξοχ.ε.*

auch aussen convex sind, dass das Submarginalband der Hinterflügel ursprünglich viel dunkler ist und zugleich weniger gebrochen verläuft, dass das Terminalband der Hinterflügel ursprünglich breiter, die Marginalmonde gleichmässiger und ihr vorderster, im zweiten Randfelde gelegener etwas rostbraun ist, und dass im vierten bis sechsten Randfelde in den Falten entwickelte Rostflecke auftreten.

Somit zeigt *P. Machaon* in der Verkürzung des Inframarginalbandes und in der theilweisen Reduction der Hinterflügelzeichnung sich als abgeleitete Form.

Dasselbe gilt für den nahe verwandten *P. Xuthus* L., der auf die palaearktische Hälfte Asiens beschränkt ist. Infolge stärkerer Verdunkelung der Vorderflügel ist hier die Randbinde auch unten theilweise schon in grössere Marginalmonde aufgelöst, die Submarginalbinde oben oft stark verdunkelt, die Mittelbinde auf schmale helle Keile beschränkt; die zwei Zellbinden sind stark reducirt und die Basalhälfte der Mittelzelle ist durch längs der rudimentären Rippen der Radiis und Media verlaufende Verdunkelung anscheinend mit hellen Längsstreifen versehen. Die Hinterflügel sind durch stärkere Verdunkelung des Submarginalbandes und dadurch bemerkenswerth, dass im achten Randfelde das Postmarginalband zu einem pupillenartigen Fleck innerhalb des „Afterauges“ reducirt ist, welches durch das ringförmige Verfliessen der Marginal- mit der Limbalbinde entsteht. Bei der Frühjahrsform *Xuthus* Brem. schwindet sogar die Pupille oben vollständig. Eine bei *P. Machaon* und *P. Xuthus* im fünften bis sechsten Randfelde an der Unterseite der Hinterflügel innerhalb des Submarginalbandes gelegene rostgelbe Bestäubung entspricht dem Rest der Zwischenbinde.

Als modificirte durch locale Einflüsse entwickelte Inselform schliesst sich auch der auf Sardinien und Corsica beschränkte *P. Hospiton* Guen. mit zahnartig verkümmerten Hinterflügelschwänzen enger an *P. Machaon* L. an.

Als Varietät:

Wie die erwähnten Arten ist auch *P. Alexanor* Esp. durch gelbe Basis der Fühlerkeule und das Fehlen des Hinterflügelzackens am vordersten Cubitalast ausgezeichnet, doch zeigt er sich durch die Verlängerung des Radialgabelstiels der Vorderflügel und die ungewöhnliche Verschmälerung am Ende des zweiten Randfeldes der Hinterflügel, welche auch die Zeichnung unterdrückt, als so abgeleitete Form, dass C. und R. Felder für ihn eine besondere Section L. aufstellten. Zugleich erinnert seine Zeichnung an die nearktische *Danaus*-Gruppe, sodass wir in der kleinen, von Spanien und Südfrankreich bis Südpersien verbreiteten Form einen Abkömmling eines gemeinsamen arktischen Stammes erblicken müssen, dessen ursprünglichere Formen sich in Nordamerika erhielten¹⁾. Auf den Vorderflügeln besitzt *P. Alexanor* drei in der Mittelzelle und ein wie bei *P. Danaus* Bsd. (Mexico) an ihrem Rande liegendes Band, welche wir 1) als Complex des ersten und zweiten, 2) als breit entwickeltes, ebenfalls über die Hinterflügel gehendes drittes Basalband, 3) als auch am Ende der Hinterflügelzelle wieder auftretendes fünftes Zellband und 4) als Terminalband ansehen. Das Inframarginalband ist ganz geschwunden, dagegen das Submarginalband und besonders die Marginalbinde breit und regelmässig entwickelt. Auf den Hinterflügeln tritt in weiterer Reduction der Zackung am ersten Cubitalast sogar ein concaver Ausschnitt des Randes auf; im achten Randfelde ist zwar das Submarginalband scharf gegen den orangenen Marginalmond abgesetzt, dieser

¹⁾ Es bietet dies ein neues Beispiel für die interessante Beobachtung Weismann's, welche auch von Eimer bestätigt wird, dass die nordamerikanischen Arten grössere Ursprünglichkeit zeigen als die vicariirenden Europäer.

jedoch mit dem Saume allmählig verschmolzen. Die helle Säumung des langen Schwanzanhanges beschränkt sich auf die Innenseite.

Die Raupe von *P. Xuthus* erinnert besonders an die von *P. Hospiton* Guen. Durch die orangerothen Tüpfelfreihen auf den schwarzen Querbändern gleicht auch die erwachsene Raupe von *P. Alexanor* Esp.¹⁾ mehr als die des ihm so nahe stehenden *P. Hospiton* Guen. der von *P. Machaon*, und lebt auch wie die meisten übrigen, auch nordamerikanischen Arten der Gruppe, von Umbelliferen (Seseli), während die von *P. Hospiton* Guen. auf letzteren (*Ferula vulgaris*) und Rutaceen (*Ruta corsica*) lebt.

So ist *P. Alexanor* wohl als früh abgezweigter Ausläufer der Stammformen der *Machaon*-Gruppe anzusehen. Dass diese aber der nordamerikanischen *Dawson*-Gruppe nahestand, beweist das Jugendkleid der *Machaon*-Raupe, das wie dasjenige von *P. Turnus* L. und *Rutalus* Boisd. auf dunklem Grunde eine weisse Schabracke des Abdominalrückens trägt, wie wir sie auch bei der jungen Raupe des indischen *P. Gigon* Feld. etc. antreffen.

Den in die palaearktische Region, nach Japan, Nordchina, den Amurländern vordringenden *P. Maackii* Mén., dessen Frühjahrsform nach Christoph der *P. Ralderi* Brem. darstellt, werden wir bei Besprechung seiner indischen Verwandten, der *Paris*-Gruppe, behandeln, deren nördlichsten Vorposten er darstellt.

Der einzige Vertreter der palaearktischen Segelfalter ist *P. Podalirius* L., der nach Eimer Podalirius-Gr. l. c. p. 68 in Skandinavien, England, den Niederlanden, dem grössten Theil der Nord- und Ostseeküsten fehlt, südlich dagegen bis Nordafrika, östlich bis Kleinasien, nach Felder l. c. aber noch bis Sibirien und Nordindien (Masurē) geht und zahlreiche Varietäten bildet. Da diese Form von Eimer genau untersucht wurde, müssen wir sie im Anschluss an die Schilderung dieses Autors ausführlicher besprechen.

Die kurzen schwarzen Fühler zeigen die für die Untergattung charakteristische Keule deutlich ausgebildet; der Körper trägt noch die mittlere breite dorsale Verdunkelung und auf dem Nacken zwei typische Längsbinden, die aussen von einem schwarzen Streif begrenzt sind. Weiter ist ähnlich wie bei *P. Machaon* L. auf der hellen Flanken- und der Bauchseite des Abdomens jederseits je ein schwarzer Längsstreif entwickelt, von denen bei der südlichen var. *Latteri* Const. der stigmale ausfällt. Auf der schwefelgelben Grundfarbe der Flügel treten auf den vorderen meist das erste bis dritte Basalband, das vierte Zellband und das sechste, aus dem sechsten und siebenten Streifen Eimer's bestehende Terminalband, seltener (var. *undecimstriatus* Eimer) noch das fünfte Zellband auf. Oft ist das vierte und sechste hell gekernt. Ausserhalb der Zelle liegt das dunkle Inframarginalband (IX. Eimer's) und weiter das stets gelbgefüllte Submarginalband. An letzteres schliesst sich die auf der Unterseite breitere Marginalbinde und das unten schmälere Postmarginalband an; die Saumbinde ist äusserst schmal. Von diesen Bändern setzt sich das erste bis dritte Basalband über die Hinterflügel fort, das Terminalband dagegen ist unten weiter als oben vor dem Hinterrande abgekürzt. Somit entspricht der in seiner ungefähren Verlängerung liegende, unten stets deutlicher als oben erhaltene Streif nicht der Verlängerung des Terminalbandes, wie Eimer es annimmt, sondern, wie ein Vergleich mit der *Alecion-Glycerion*-Gruppe beweist, dem inneren Submarginalbandstreifen. Auch setzt sich das dritte Basalband nur in den innersten Streif des sog. Prachtbandes fort, welches über das Ende der Hinterflügelzelle geht, wie man leicht bei richtiger Flügelstellung erkennt; somit entspricht letzteres nicht dem dritten Basalbande allein, sondern einem Bändercomplex.

¹⁾ Vergl. E. Hofmann, Die Raupen der Schmetterlinge Europas, 1890, Tafel I, 2a und Tafel VI, Fig. 1—2.

Darauf deutet auch die Zusammensetzung der Doppelbinde, deren innerer Theil weiss, der äussere gelb ist, und ihr äusserer Grenzstreif hin. Obwohl die Verbindung hinter der Mitte unterbrochen ist, gehört doch der hinten schwarz gesäumte orangerothe „Prachtwinkel“ im siebenten bis achten Randfelde der Prachtbinde an. Dagegen entspricht der unter ihr gelegene blauschwarze Augenfleck nicht den übrigen blaugekernten Hinterrandflecken, sondern, wie die morphologische Vergleichung der *Thais*-Gruppe ergibt, dem Submarginalbände. Weiter sind die vom vierten bis siebenten Randfelde reichenden blaugekernten Mondflecke aus einer aussen beginnenden Blaufärbung der ursprünglich gelben Marginalmonde hervorgegangen, was man an bleicheren Varietäten leicht verfolgen kann. Weist somit die Zeichnung von *P. Podalirius* auf eine indische Abstammung hin, welche E. Hofmann¹⁾ dazu bewog, sie als aus Mittelasien eingewandert anzusehen, so müssen wir sie doch andererseits als peripherische Form des Stammes auffassen, wie dies das nahe Zusammentreten der zwei hintersten Medianäste der Hinterflügel an die Cubitalis beweist. Eine nähere auch von C. und R. Felder durch ihre Gruppierung der Art erkannte verwandtschaftliche Beziehung zu dem australischen *P. Leosthenes* Dbld. spricht ebenfalls für den vertretenen Ursprung unseres Segelfalters in heisseren Strichen. Auch lässt sich dafür seine geringe nördliche Verbreitung anführen. Die Futterpflanze der Raupe gehört den Amygdalen und Pomaceen an und bildet in dem Schlehstrauche ihren nördlichsten Ausläufer; allerdings soll A. Costa (nach Eimer l. c. p. 69) die Raupe auch auf Disteln und Nesseln angetroffen haben. Nach E. Hofmann frisst die Raupe im Süden Europas ausser den Blättern von Mandel- und Pfirsichbäumen auch die von *Aronia rotundifolia*, ebenfalls einer Pomacee. Nach Boisduval lebt sie auch an *Berberis*, einer den Annonaceen etwas verwandten Gattung.

Die Puppe zeigt noch grosse Aehnlichkeit mit der des nearktischen *P. Ajax*, mit welcher sie die in der scharfen Nackenspitze zusammentreffenden infrastigmalen und dorsalen feinen Kiele, die suprastigmalen, segmental unterbrochenen schrägen hellen Zeichnungen und die feinen dunklen Flecke über dem Stigma und an der Innenseite der hellen Schrägbinden theilt, nur ist die Puppe von *P. Ajax* plumper und bauchiger. Ich hebe diese Aehnlichkeit der Puppenform deshalb besonders hervor, weil die letzten Stadien der Raupen so grundverschieden sind, indem bei *P. Ajax* im dritten Stadium auf hellem Grunde in jedem Segment vier schwarze Ringbänder erscheinen, während die Färbung der *Podalirius*-Raupe grün mit gelben Rücken- und Seitenlinien, über die Segmente ziehenden feinen Schrägbinden und je sechs segmentalen Flecken geziert ist, somit an die Zeichnung beider Puppenformen erinnert.

Während *P. Podalirius* ganz isolirt steht, können wir für die palaearktischen Rinnenfalter folgende Entwicklungsreihe aufstellen:

Hospiton Guenée.

Machaon L. *Xuthus* L.

Alexanor Esp.

Danaus-ähnliche Formen.

¹⁾ E. Hofmann, Die Isoporien der europ. Tagfalter. (Inaug.-Diss.) Stuttgart 1873.

Indo-australische Papilionen.

Schon Th. Horsfield und F. Moore¹⁾ machten den Versuch, die *Papilio*-Arten dieses Gebietes in natürliche Gruppen zu theilen, deren sie ebenfalls drei ungefähr den von mir angenommenen entsprechende unterschieden.

In die erste Gruppe, welche nur Rinnenfalter enthält, stellten sie die Arten „mit an der Basis fadenförmigen, in ihrer ganzen Länge mit vorstehenden kantigen Ringen besetzten und mit cylindrischer, an beiden Enden zugespitzter Keule endigenden Antennen, deren glatte und am vierten bis fünften Segment angeschwollene Larven sich nach vorn schnell, nach hinten allmählig verschmälern“. Dahin rechneten sie *P. Memnon*, *Polymnestor*, *Helonus*, *Pammon*, *Demolion*, *Arjuna*, *Erithonius*, *Xathus*, *Machaon*.

Die zweite Gruppe, welche mit Ausschluss des von mir zu den Rinnenfaltern gerechneten *P. dissimilis* meinen Aristolochienfaltern entspricht, besitzt undeutlich geringelte Antennen und eine an beiden Enden sehr schwach verjüngte Larve, die ziemlich dick und fleischig, oben glatt und mit kurzen Fleischzapfen besetzt ist. (Hierher gehört *P. Darsius*, *Pompeus*, *Hector*, *Diphilus*.)

Die dritte Gruppe endlich entspricht meinen Segelfaltern und zeichnet sich durch ovale verbreiterte und zusammengedrückte, eng geringelte Fühlerkeule und durch platte, schwach verschmälerte, in der Mitte etwas gewölbte, mit regelmässigen Querbändern gezeichnete Larvenform aus, deren Hinterleib in zwei Spitzen endigt. (Hierher gehört *P. Sarpedon*, *Agamemnon*, *Antiphates*.)

Die nächste natürliche Eintheilung entwarf A. R. Wallace²⁾ in seiner berühmten Arbeit über die malayischen *Papilioniden*

Von den drei Abtheilungen Horsfield und Moore's behielt er nur die der Segelfalter bei, welcher er durch die kurzen, stumpfen Antennen, die schmalen, behaarten Genitalklappen des Männchens, das nach oben umgeschlagene, innen wollige oder haarige Analfeld der Männchen, den starken Körper und schnellen Flug der Falter, die verlängerte, hinten zugespitzte und oft zweispaltige grüne, schief und hell gestreifte Raupe charakterisirte und in die *Macaveus*-, *Antiphates*-, *Euryppylus*-Gruppe unterschied.

Dagegen trennte Wallace die von mir als Rinnenfalter zusammengefassten Gruppen mit schwachem Körper, welche auch er durch das flache, aber nicht zurückgeschlagene Analfeld der Männchen kennzeichnet, in zwei Hauptabtheilungen (B und C). Die erste derselben umfasst die Gruppen mit langen Fühlern, stark verbreiterten, oft geschwänzten Flügeln, mit stark gekrümmter Puppe und am dritten Segment geschwollener, quer oder schräg gebänderter Larve, die *Ulysses*-, *Peranthus*-, *Protenor*-, *Memnon*-, *Helonus*-, *Erectheus*-, *Pammon*- und *Demolion*-Gruppe.

Dieser Abtheilung B. stellte er als gleichwerthig eine aus der *Erithonius*-, *Paradora*-, *Dissimilis*-Gruppe gebildete weitere gegenüber, welche er durch kurze Antennen mit dicker gekrümmter Keule, ganzrandige Flügel und eine subcylindrische, verschieden gefärbte Raupe kennzeichnete. Jedoch bemerkte Wallace selbst, dass die Larven und Puppen der *Erithonius*-Gruppe „something like those of *P. Demolion*“ sind.

In der That ist diese Gruppe C. aufzulösen, denn die *Erithonius*-Gruppe gehört unstreitig schon nach ihren Fühlern, ihrer Raupe und Puppe in die Nähe der *Machaon*- und *Demolion*-Gruppe, während

¹⁾ Th. Horsfield and F. Moore, Catal. Lepid. Ins. Mus. East-Ind. Comp., London 1857, p. 118—119.

²⁾ A. R. Wallace, On the Phenomena of Variation and Geographical Distribution as illustrated by the Papilionidae of the Malayan Region. (Trans. Linn. Soc. London, XXV, 1865, p. 23.)

die *Dissimilis*-Gruppe nach der Fühlerform sich enger an die *Castor*-Gruppe anschliesst und nach ihrer Puppe ebenfalls zu den Rinnenfaltern gehört, da diese auffallend der Puppe von *P. Turnus* L. (Nordamerika) gleicht und wie diese einem trockenen Aststückchen ähnlich sieht. Dagegen trägt die Raupe von *P. dissimilis* nach Moore (Lep. Ceylon) zwei dorsale und eine abgekürzte seitliche Reihe von „fleischigen Tuberkeln“ [nach Dewitz¹⁾] trägt die von *P. Palephates* „Dornen“, auch ist die Färbung (weissgelbe Querbänder und blutrothe Tüpfel auf dunklem Grunde) sehr auffällig. Jedenfalls sind weitere Aufschlüsse über frühere Stadien dieser interessanten Gruppe sehr erwünscht.

1. Indo-australische Aristolochienfalter.

Während Wallace weiter aus der *Nox*-, *Coon*- und *Polydorus*-Gruppe eine durch die kurze dicke, mit zahlreichen fleischigen purpurrothen Zapfen besetzte Raupe gekennzeichnete weitere Abtheilung A. bildete, nahm er doch die Gattung *Ornithoptera* in dem von Boisduval geschaffenen Umfange an, obwohl er die vollkommene Uebereinstimmung von Raupe und Aufhängungsart der Puppe mit derjenigen der Aristolochienfalter selbst hervorhob und die von Boisduval angeführten Abweichungen auch in Betreff der Gabeldrüse als irrig zurückwies. So begründete er die Gattung *Ornithoptera* Bsd. besonders durch die vorspringenden unbehaarten dornigen Genitalklappen der Männchen, die Stärke und Grösse der Falter, ihre kräftige Flügelmembran, die langen gekrümmten und stumpfen Fühler, ihre eigenartige Form, Farbe und Verbreitung.

In ihrer kurz vor Wallace's Arbeit erschienenen sich über alle bekannte *Papilioniden* erstreckenden „Monographie“ zogen C. und R. Felder die drei auch von Wallace unterschiedenen *Ornithoptera*-Gruppen, die *Priamus*-, *Pompeus*- und *Brookeanus*-Gruppe, im Anschluss an de Haan, J. Westwood, Snellen van Vollenhoven wieder zur Gattung *Papilio*, in welcher sie für jede eine eigene Section errichteten und genau charakterisirten.

Weiter zeigte ich²⁾ dann die auffallende Uebereinstimmung im Bau der Dufteinrichtung bei der *Pompeus*- und *Brookeanus*-Gruppe und ihre Unterschiede von denen der *Priamus*-Gruppe, und endlich wies C. Fickert³⁾ in einer sehr ausführlichen Monographie nach, dass auch die Zeichnung die Unterscheidung zweier unvereinbarer Gruppen verlangt. So kam er zu dem Ergebniss, wegen des langen Gabelstiels und seines mit dem des dritten Radialastes gemeinsamen Ursprunges vom Zellende der Vorderflügel die *Pompeus*-*Brookeanus*-Gruppe wieder zu *Papilio* zu verweisen. Dagegen wollte er die Gattung *Ornithoptera* für die *Priamus*-Gruppe beibehalten und sie durch ein schon seinerzeit von Felder hervorgehobenes Merkmal, den Ursprung des dritten Radialastes weit vor der Radialgabel und die Kürze des Stieles der letzteren, von der Gattung *Papilio* unterschieden wissen.

Nun kommt aber, wie Fickert selbst am Ende seiner Arbeit hervorhebt, dieser selbstständige Ursprung des dritten Radialastes auch bei der (zu den Rinnenfaltern gehörigen) neotropischen *Zagreus*-Gruppe vor, wie ebenfalls Felder l. c. p. 359 angiebt, auch finde ich ihn weniger deutlich bei *Leosthenes*

¹⁾ H. Dewitz, Beschreibungen von Jugendstadien exotischer Lepidopteren. (Nova Acta Leop. Bd. XLIV, 1882, p. 263.)

²⁾ E. Haase, Duftapp. indo-austral. Schmetterl. I und III. (Corresp. nat. Verein „Iris“, Dresden, 1886 und 1888.)

³⁾ C. Fickert, Ueber die Zeichnungsverhältnisse der Gattung *Ornithoptera*. (Zool. Jahrbücher, Abth. für Systematik etc. IV, Bd., 1890, p. 692—770.)

Dtbl. und anderen Arten; ebenso ist der kurze Gabelstiel für viele afrikanische (*Niveus*-Gr.) und indische Rinnenfalter (*Clysses*-Gr.) charakteristisch.

Anscheinend finden sich ausser den erwähnten Unterschieden im Radialgeäder der Vorderflügel, wenn man die *Priamus*- mit der *Pompeus*-Gruppe vergleicht, auch solche im achten bis neunten Randfelde der Hinterflügel ausgesprochen. So verläuft bei den Weibchen der *Priamus*-Gruppe die tiefe über der Analfalte gelegene Einsenkung der Hinterflügel etwas nach aussen convex und erinnert an die Faltung des Innenbordes der Rinnenfalter; ebenso ist die auffallend stark verkürzte Dorsalrippe nicht ganz grade und das Innenfeld sehr schmal, aussen befranzt, nach unten gebogen und am Innenrande schwach concav ausgeschnitten. Bei den Weibchen der *Pompeus*-Gruppe ist dagegen die Rinne über der Analfalte undeutlich und wie die letztere selbst grade und weniger abgekürzt, während die längere Dorsalader nach innen convex vorspringt. Somit ist das achte Randfeld in seinen beiden Abtheilungen, dem zwischen Analfalte und Cubitalis liegenden Subanal- und dem eigentlichen Analfelde, breit und flach und gleichartig entwickelt und wird in der Analfalte nach oben zu umgeschlagen, während das Innenfeld sich in der Dorsalrippe nach unten umbiegt.

Diese verschiedene Entwicklung erreicht in den Männchen ihren Höhepunkt. So ist bei der *Priamus*-Gruppe Anal- und Innenfeld schwach erweitert und auf der Oberseite einfarbig schwarz beschuppt, auf der unteren dagegen seidenglänzend, grau beschuppt und trägt in einer durch die starke Convexität der Dorsalader bedingten Rinne der Unterseite eine entwickelte Strahlhaarbürste, welche über die orangenen Duftschuppen der Hinterleibsoberseite streicht; an trockenen Thieren allerdings ist das ganze Analfeld und Innenfeld meist nach oben umgeschlagen. Bei den Männchen der *Pompeus*-Gruppe ist eine weisswollige Dufteinrichtung auf der Oberseite der Hinterflügel von der Analfalte bis zum Aussenrande wie bei so vielen Aristolochienfaltern entwickelt. So liegt die Dorsalis innerhalb der Duftschuppen, schlägt sich das Anal-Innenfeld in der Achse der concav liegenden Dorsalis nach oben um und biegt sich am Innensaum ebenfalls wie bei der *Priamus*-Gruppe wieder schmal nach unten um.

Wie gross anscheinend auch diese Verschiedenheiten des Analfeldes sind, lassen sie sich doch auf gemeinsame einfachere Bildungen der Aristolochienfalter zurückführen, wie sie *P. Antenor* Dru. aufweist.

Bei dieser Art besitzt das Männchen keine Dufteinrichtung und zeigt wie die indisch-australische *Hector*-Gruppe einen hinten nach innen convexen zweiten Cubitalast, eine ziemlich grade verlaufende deutliche Analfalte, ebenso eine schwach nach innen convexe Dorsalrippe und eine schwache Ausrandung des Innenfeldes. Also lassen sich beide Gruppen, die *Pompeus*-Gruppe über indisch-australische *Hector*-artige Formen, die *Priamus*-Gruppe dagegen nur von *Antenor*-artigen Formen, aber beide von dem einen Stamme der Aristolochienfalter ableiten, sodass ich alle in der Untergattung *Pharmacoptus* vereinigen darf.

Während die *Priamus*-Gruppe eher den letzten Rest eines uralten Stammes darstellt, dessen einziger Nebenzweig noch in dem afrikanischen *P. Antenor* erhalten ist, erweist sich die *Pompeus*- und *Brookmanus*-Gruppe als abgeleitete Form der *Senperi*-*Priapus*-Gruppen und kann somit nur im Anschluss an diese besprochen werden.

Wengleich bei den Weibchen der *Priamus*-Gruppe auf den Vorderflügeln noch zwei Querbinden und eine Aufhellung der Mittelzelle erhalten ist, dürfte die Zeichnung der Hinterflügel nur scheinbar sehr einfach, in Wirklichkeit aber sehr complicirt sein, was die morphologische Deutung der Binden betrifft. Nach meinen Untersuchungen muss ich die Aufhellung im achten Randfelde der Hinterflügel, soweit sie hinter dem schwarzen Fleck liegt, für homolog dem Mondfleck bei *Antenor* Dru. ansehen, doch

Priamus-Gruppe

zwingt ein Vergleich des Letzteren mit *P. Hector* L., ihn der Schmuckbinde zuzusprechen. Dann wäre bei allen Aristolochienfaltern der echte Marginalmond im achten Randfelde durch den starken Ausschnitt am Innenwinkel aufgehoben worden und nur die vorletzten sechs Marginalmonde entwickelt, obwohl der Schmuckbindenrest im Analfelde oft durchaus wie ein Marginalmond aussieht. Nur mit dieser Deutung ist es uns möglich, die Zeichnung von *Euryeus* und *Euryades* befriedigend auf die der Aristolochienfalter zurückzuführen.

Nach der Zeichnung der einzelnen Glieder der *Priamus*-Gruppe stellt Fickert *Victoriae* Gray und *reginae* Salv. (Salomons-Inseln) als ihre ursprünglichsten Arten hin, bei denen allein sich die Zeichnung der Oberseite der Männchen auf die der Unterseite zurückführen lasse. Auch ich möchte mit Fickert in den Weibchen dieser Gruppe die ursprünglichsten Formen sehen, denen sich auch das Weibchen der ältesten *Priamus*-Form, des *Lydius* Feld. (Halmahera), am nächsten anschliesst. So zeigt bei den zwei ersten Arten, wie auch Fickert bemerkte, die grosse Aufhellung der Mittelzelle der Vorderflügel einige Einschnürungen, welche als Reste der dunklen Bänder aufzufassen sein dürften, welche noch bei *P. Antenor* Dru. entwickelt sind. Ebenso ist die Mittelbinde und Marginalbinde der Vorderflügel noch wie ebenfalls bei *P. Antenor* gut ausgebildet und setzen beide sich auf die Hinterflügel fort. So ist das breite dunkle, diese hellen Binden trennende Band im zweiten bis achten Randfelde als Submarginalband anzusehen. Die Aufhellung der Hinterflügelzelle ist von allen Formen der *Priamus*-Weibchen nur bei dem von var. *Lydius* Feld. erhalten, welches auch die regelmässigste Ausbildung der Binden, dagegen wie die übrigen Weibchen von *Priamus* L. und das von *Tithonus* de Haan (Waigiou) ein Zusammenfliessen der Marginal- und Mittelbinden der Hinterflügel aufweist, durch welches das Submarginalband in einzelne Flecke zerschürt wird. Wie bei *P. Tithonus*, ist auch bei *Victoriae* und *reginae* der Sammetfleck auf den Vorderflügeln der Männchen, welcher alle *Priamus*-Formen auszeichnet, nicht entwickelt. Stets ist das Analfeld der Männchen kurz schwarz beschuppt und wird in der Dorsalis nach unten umgeschlagen, sodass die langen rostgelben Borsten der Unterseite verdeckt werden.

Hector-Gr.

Als eine weitere, dem *P. Antenor* Dru. am nächsten stehende Form, welche durch die nach innen convexe Dorsalader der Hinterflügel die Verbindung mit allen übrigen Aristolochienfaltern der Tropen vermittelt, sehe ich den auf das Festland Ostindiens und Ceylon beschränkten *P. Hector* L. an, der die interessantesten auch durch die Säugethiere gegebenen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen madagassischer und ceylonesischer Fauna bestätigt und sich vor allen indischen Arten durch die scharfe Ausprägung der von der Mitte des Vorderrandes bis zum Innenwinkel der Vorderflügel verlaufenden weissen Binde auszeichnet und darin einer südamerikanischen Aristolochienfalter-Gruppe mit ursprünglicher Zeichnung, der *Ascanius*-Gruppe, nähert. Mit *P. Liris* Godt (Timor und NW.-Australien), welchen C. und R. Felder zur selben Section LXXIV rechnen, mit der sie direct an *P. Antenor* an- und die Gattung *Papilio* abschliessen, hat *P. Hector* die stärkeren Antennen und das vollkommene Fehlen männlicher Duftrichtungen im Analfelde der Hinterflügel gemein; somit sind sie die einzigen indischen Arten, in welchen beide Geschlechter ein gleiches, bei den Männchen höchstens etwas stärker gefaltetes Analfeld besitzen. Unter den beiden Arten dieser Gruppe besitzt unstreitig *P. Hector* L. die ursprünglichere Zeichnung, zumal sie oben fast so scharf wie auf der Unterseite ausgeprägt ist und etwas an *Euryades* und an *P. Antenor* Dru. erinnert. Auf den Vorderflügeln geht eine weisse, unten deutlichere Binde über das äusserste Drittel der Zelle und setzt sich in intercostalen, V-förmigen, mit der Concavität nach aussen gerichteten Tüpfeln bis zum Innenwinkel fort, während eine zweite Tüpfelreihe vom Gabelvorfelde bis zum zweiten Randfelde

verläuft. Die Subapicalbinde stellt die Reste der marginalen dar, die Diagonalbinde dagegen dürfte aus der Verschmelzung von einer Zellbinde mit Resten der Mittel- und der Marginalbinde entstanden sein. Auf den Hinterflügeln, welche durch secundäre Verdunkelung, die von der Basis aus begann, alles Weiss der Grundfarbe verloren haben, liegt eine äussere und eine innere parallele Reihe von je sechs abgerundeten blutrothen Tüpfeln, die vom zweiten bis siebenten Randfelde reichen. Der grössere, im achten Randfelde in genauer Verlängerung der inneren blutrothen Reihe gelegene Tüpfel entspricht somit einem Stücke der inneren Reihe und es ist letztere als Schmuckbinde zu bezeichnen, welche die innere Tüpfelreihe mit Resten der Mittelbinde bildet. Die eigenthümlich wellige Contur des Ausseurandes der Vorderflügel, der über jeder Rippe in einem stumpfen Zacken vorspringt, erinnert vor Allem an *P. Antenor*, das grade und feine Schwänzchen am dritten Medianast der Hinterflügel dagegen mehr an *Eurygades Dupouchetii* Luc.

Auch *P. Liris* Godt. stellt eine der ursprünglichsten Formen der Untergattung dar, doch sind bei ihm alle Zeichnungen mehr verwischt. So haben sich die Vorderflügelbinden zu einer breiten, über die äussere Zelhälfte laufenden Mittelbinde vereinigt, welche, aussen und innen gezackt, auch über die Hinterflügelmitte zieht. Eine weitere Unregelmässigkeit der Hinterflügelzeichnung spricht sich darin aus, dass der Marginalmond des zweiten Randfeldes wie der Schmuckbindentüpfel des achten in die weisse Mittelbinde übergegangen sind. Das prächtige reiche Roth der Hinterleibsseiten und des Bauches erinnert an *Hector*.

Wie durch die Form der Mittelzellen und des Schwanzes, bildet *P. Liris* auch durch die Flügel-^{Jophon-Gr.}form einen Uebergang zur folgenden *Jophon*-Gruppe, welche Felder's Section LXXIII entspricht. Dieselbe besteht aus *P. Polyphontes* Bsd. (Celebes), *Jophon* Gray (Ceylon), *Annae* Semp. (Philippinen), *Diphilus* Esp. (China bis Philippinen), *Antiphilus* F. (Philippinen), *aristolochiae* F. (Indien), *Polydorus* L. (Moluccen, Australien) und unterscheidet sich mit der *Hector*-Gruppe von den übrigen indischen Aristolochienfaltern durch das Fehlen der Genitaldeckklappen („Analklappen“) der Männchen. So ragt der äussere Genitalapparat wie bei *Eurygades* Boisd. und *Eurygades* Feld. nackt hervor und ist nur von einem Kranze blutrother Schuppenhaare umgeben. Ebenso zeigt die Hinterflügelzelle noch die ursprünglichere Weite und ist das Analfeld am Hinterrande nur wenig ausgeschnitten. Dagegen sind die Hinterflügel des Männchens schon von der Analfalte an einfach nach oben umgeschlagen und an dem bedeckten Theil mit einer unentwickelten Dufteinrichtung versehen.

Bei den Formen mit complicirterer Zeichnung erinnert letztere an *P. Hector* L. und *Liris* Godt. zugleich. So zeigt *P. Jophon* Gray eine durch die Verdunkelung des Zellendes wie bei *P. Hector* L. unterbrochene breite Querbinde der Vorderflügel, welche wie bei *P. Liris* verläuft. Dieselbe erhält sich theilweise bei *P. Polyphontes* Bsd., *P. Annae* Semp. und *P. Polydorus* L. und wird höchstens bei *P. Antiphilus* Esp. durch Verdunkelung grösstentheils verdeckt. Auch in Beziehung auf die Zeichnung der Hinterflügel stellt sich *P. Jophon* Gray als ursprünglichere Form dar; so besitzt er wie *P. Hector* auf den letzteren vom dritten bis achten Randfelde auch oben deutliche Randmonde, im zweiten Intercostabraum den Rest der purpurnen Schmuckbinde und vom zweiten bis achten Randfelde eine im ersten Zelldrittel innen scharf abgeschnittene, durch Verdunkelung der Adern mehr als bei *P. Annae* Feld. eingeschränkte Mittelbinde. Bei den übrigen Formen wird nun zuerst die Mittelbinde der Vorderflügel undeutlicher, indem sie wie bei *P. Jophon* am Vorderende verdunkelt wird. Dann aber verbindet sich auch meist der kleine im achten Randfelde gelegene Rest der Schmuckbinde mit der Mittelbinde (*P. Polyphontes* Bsd.). Endlich schreitet die Verdunkelung der hellen Vorderflügelbinde weiter fort,

bis endlich von ihr nur noch eine schwache, von den dunkleren Rippen und Falten durchbrochene Aufhellung zurückbleibt. Mit der zunehmenden Verdunkelung der Hinterflügel treten die Monde oben zurück und färbt sich der Mittelbindenrest am Innenrande dunkler. Bei den östlichen Formen des *P. Polydorus* L. tritt eine Verkümmernng der Hinterflügelschwänze ein.

Die nachfolgenden Gruppen sind durch regelmässige Ausbildung der Genitaldeckplatten der Männchen und durch entwickelte Duftapparate im Analfelde der Hinterflügel ausgezeichnet.

Alcinous-Gr.

Nähere Beziehungen zur *Jophon*-Gruppe dürfte noch die allein durch *P. Alcinous* Kl. mit var. *Mencius* Feld. gebildete, auf Nordchina und Japan beschränkte Section LXX Felder's haben. Infolge fortgeschrittener Verdunkelung der Grundfarbe ist die der Vorderflügel einfach schwarz- oder graubraun, nur von dunkleren Intercoastalstreifen durchzogen; die Hinterflügel sind tiefschwarz, an der Unterseite mit den Marginalmonden vom zweiten bis siebenten, mit dem Reste der mit der Schmuckbinde verschmolzenen Mittelbinde vom siebenten bis achten Randfelde verziert. Auch die gleichmässig verlaufende starke Erweiterung der Hinterflügelschwänze fand sich schon in der *Jophon*-Gruppe angedeutet. Ein Fortschritt gegen letztere zeigt sich aber in der viel höheren Ausbildung der männlichen Duftapparate, die schon eine breitere, mit graubraunen Duftscluppen sammetartig besetzte Fläche einnehmen. Bei der japanischen Rasse, var. *Mencius* Feld., erleicht die ganze Körperfärbung zu einem stumpfen Grau.

Latreille-Gr.
Vergl. Taf. V.

Aus Angehörigen dieser Section haben wir wohl die *Latreillei*-Gruppe der indischen Aristolochienfalter abzuleiten, welche, nach Ausschluss einiger nicht dahin gehöriger mimetischer Formen, aus *P. Dasarada* Moore und dem ebenfalls nordindischen *P. Latreillei* Don. mit zahlreichen Localformen (*Philoxenus* Gray, *Polyuctes* Doubl., *Ravana* Moore) bestehen würde. Sicher ist *P. Latreillei* die ursprünglichere von beiden Arten, da einzelne Varietäten auf beiden Seiten der Hinterflügel Reste der rothen Mittelbinde¹⁾ am Innenrande und vom vierten bis siebenten Randfelde entwickelte Marginalmonde besitzen, während die Vorderflügel stark und gleichmässig verdunkelt sind. Schon bei *P. Latreillei* Don. tritt uns eine auffallende, mit der nothwendigen Verschmälerung verbundene Verlängerung der Hinterflügel entgegen, und bei *P. Dasarada* Moore setzt sich endlich der stark spathelförmig verbreiterte Schwanz nur mehr undeutlich ab. Zugleich erstrecken sich diese Zerrungen auf die Marginalmonde, indem die der inneren Randfelder in je zwei Tüpfel auseinandergerissen, die des dritten bis fünften Randfeldes zu grossen, weissen, leuchtenden Spiegeln ausgedehnt werden. Der rothe Tüpfel auf dem Schwanzende dürfte so aus der Hälfte des im fünften Randfelde liegenden Marginalmondes hervorgegangen sein. Die männlichen Duffeinrichtungen dieser Gruppe sind ebenfalls bei *P. Dasarada* Moore am höchsten entwickelt und stellen sich durch die nur weiter ausgedehnte braunschwarze wollige Duftscluppenmasse unter dem mächtig erweiterten Umschlage des Analfeldes als gleichgerichtete Weiterentwicklung der bei der *Alcinous*-Gruppe ausgebildeten Form dar.

Doubledayi-Gr.
Vergl. Taf. VI

Eine geringere Modification der Umbildung auch des Rippenverlaufs der Flügel zeigen die zwei von uns zur *Doubledayi*-Gruppe (*Coon*-Gruppe Wall.) zusammenzufassenden Sectionen LXXI und LXXII Felder's, von deren Angehörigen sich *P. Doubledayi* Wall. (Nordindien), *P. rhodifer* Butl. (Andamanen) und *P. Coon* F. (Birma, Borneo, Java) durch eine ausserordentliche Verlängerung ihrer Flügel auszeichnen, die sich sogar auf den Stiel des breit spathelförmigen Schwanzes ausdehnt. Durch die tiefe Ausbuchtung

¹⁾ Die Mittelbinde ist auch hier mit dem Schmuckbindenrest verschmolzen, wie in den weiteren Gruppen der indischen Aristolochienfalter.

des Analfeldes, welche die nur schwach entwickelte, am Aussenrande lang behaarte Duftleinrichtung auf ein schmales Feld beschränkt, stellt sich diese Gruppe als eine einheitliche dar, obwohl sie sich nach der Zeichnung in zwei Untergruppen zerlegen lässt. Erinnerung *P. Neptunus* Guér. (Penang, Malacca, Borneo) in den weissen Bindenresten, die über die Mitte und unter der Spitze des Vorderflügels sich schart von der schön grauen Verdunkelung abheben, noch etwas an *P. Jophon* Gray, so ist doch die Zeichnung der schwach und schmal geschwänzten Hinterflügel einseitig entwickelt, indem sich wohl die blutrothe, mit der Mittelbinde verschmolzene Schmuckbinde vom fünften bis achten Randfelde ausbildete, aber die Randmonde vollkommen verdunkelt sind. Bei der anderen Untergruppe dagegen tritt die Schmuckbinde zurück, während die Mittelbinde sich basalwärts ausdehnt und die Randmonde sich im sechsten und siebenten Randfelde der Hinterflügel wie bei der *Latreillei*-Gruppe bis zu den Randzacken verlängern und im sechsten Randfelde ebenfalls zerschneiden. Bei *P. rhodifer* Butl. ist sogar die Schwanzspitze in der Mitte rosenroth aufgeheilt. Bei *P. Coon* F. ist die sonst rothe Körperfärbung wie bei *Neptunus* in Gelb übergegangen.

Mit der *Doubledayi*-Gruppe hört die Reihe derjenigen Aristolochienfalter auf, welche durch die grössere Länge und dichtere Bedornung der letzten Torsenglieder noch an *P. Antenor* Dru. und die Gattungen *Euryus* Bsd. und *Eurygales* Feld. erinnern.

Den weiten Sprung von den ursprünglicheren Formen zu den abgeleiteten, stark modificirten Gruppen der indischen Aristolochienfalter dürfte *P. Semperi* Feld. (Philippinen) übermitteln, dessen Weibchen an der Unterseite blutroth leuchtende, oben meist nur angedeutete Binde Reste der Hinterflügel trägt, welche durchaus an *P. Hector* L. erinnern. So ist die innere, vom zweiten bis achten Randfelde ziehende, innen zu einer Zackenbinde zusammenfliessende, nach aussen durch Verdunkelung zerschnürrte blutrothe Tüpfelreihe der mit der Mittelbinde verbundenen Schmuckbinde, die äussere vom zweiten bis siebenten Randfelde entwickelte aber der Marginalbinde zuzuschreiben. Letztere zeigt noch vom fünften bis siebenten Randfelde die charakteristische, schwarze Aussenrandflecke umschliessende Bogenform. Am Männchen tritt die ursprünglichere Färbung auf der Oberseite der Hinterflügel durch eine tief sammet-schwarze Verdunkelung ganz zurück. Am dritten Medianast ist ein Schwänzchen, besonders bei den Weibchen, deutlich entwickelt, welches wie die Flügelform an *P. Hector* L. erinnert. Bei den Männchen ist fast ein Drittel der Hinterflügel in den Dienst der Duftleinrichtung getreten. Diese besteht aus einem seidenweissen, kurzgeschorenem Sammet gleichenden Duftschuppenpelz, über den sich das mächtig erweiterte Analfeld bis zur Cubitalis herüberlegt. Der Leib ist sehr stark und breit blutroth gefärbt und hebt sich vom tiefen Schwarz der Flügel leuchtend ab.

Semper-Gr.

Die übrigen zu erwähnenden indischen Aristolochienfalter haben schwanzlose, höchstens schwach gezackte Hinterflügel und auf den vorderen eine erloschene, durch dunkle Falten und Rippen unterbrochene Aufhellung der Intercostalräume von verschiedener Ausdehnung. Bei keiner Art erhält sich das ursprüngliche leuchtende Roth auf den Hinterflügeln; nur bei wenigen bleibt es am Körper bestehen.

Wahrscheinlich sind die hierher gehörigen Formen, wenn man die Verschiedenheit der an den Stücken der Museen leider nur selten erkennbaren Duftleinrichtungen aus verschiedener Anlage erklären darf, zweierlei Ursprungs. Bei Ableitung der Arten, welche ähnlich *P. Semperi* im Analfelde einen schneeweissen, hier noch rosa gesäumten Schuppenammet besitzen, wie bei *P. Priapus* Boisj. (Borneo, Java, Sumatra) und *P. Aidoneus* Dbl. (= *evoleucus* Oberth.), darf man wohl schon auf Formen zurückgehen, bei denen die Schmuck- und Randbinden mit dem Mittelbindenrest der Hinterflügel verschmolzen waren und sich zu einer breiten gelblichen Aussenbinde zusammengeschlossen hatten, die jederseits der Rippen

Priapus-Gr.
Verst. Tab. VI

wie bei *P. Semperi* an den Rand verlief. Durch diese Zunahme der Aufhellung zerfällt das zwischen Marginal- und Schmuckbinde gelegene trennende Submarginalband in schwarze Makeln; dagegen dehnen die in den Schenkeln der Randmonde gelegenen schwarzen Postmarginalflecke sich desto stärker aus. Hierher gehört auch *P. Sycorax* Dist. und *P. Hageni* Rog. (Sumatra). Bei beiden besitzen die Männchen eine stark entwickelte weisswollige Dufteinrichtung im Anal Felde der Hinterflügel und intercostal aufgehellte Vorderflügel. Die Farbe der Hinterflügel bei *P. Sycorax* ist ein seidenglänzendes Stahlgrün, in dem sich zwei Reihen schwarzer Flecke hervorheben. Von diesen gehört die innere bis zum achten Randfelde gehende Reihe den Resten des Submarginalbandes, die äussere Reihe den Postmarginalflecken an. Die Hinterflügel von *P. Hageni* Rog. sind tiefschwarz und tragen vom dritten bis letzten Anal Felde in dem verhältnissmässig schmalen hellen Bindencomplex je einen grossen schwarzen Submarginalfleck, während die Aussenflecke sich zu einem die Marginalmonde von aussen her einengenden Bande vereinigen. Somit erinnern die Formen dieser Gruppe auffallend an die der *Pompeus*-Gruppe, wozu ihre Grösse, ihre Flügelform, der bei *P. Sycorax* oben gelbgraue, unten schwefelgelbe, mit einzelnen schwarzen Stigmenflecken besetzte Hinterleib besonders beiträgt.

2055-61 An *P. Semperi* schliessen sich auch die weiteren stark verdunkelten Formen der *Nox*-Gruppe an, welchen ich *P. Astorion* Westw. (= *Varana* White) hinzufüge. Dieselben besitzen zwar als Männchen noch stets einen breiten Adalmschlag, jedoch sind die Duftschuppen selbst zu einem reifartigen Belage reducirt, dagegen der auch bei *P. Semperi* Feld. auftretende innere Borstensaum erhalten. Nur einzelne Formen zeigen noch Spuren von Zeichnung auf den Hinterflügeln. So tritt bei einer Varietät von *P. Astorion* Westw. (Assam) eine auf der Unterseite und im weiblichen Geschlecht ausgebildete, an *P. Sycorax* erinnernde hellere, bläulich fettglänzende Binde auf, welche sich ebenfalls aus dem Zusammenfluss der Schmuck- und der Marginalbinde erklären lässt und zwei allerdings nur unvollständige Fleckenreihen trägt. Ebenso erinnert das Weibchen von *P. noctis* Hew. (Borneo) durch die zwei Fleckenreihen in aufgehelltem Grunde, deren innere sich noch gegen die Zelle verlängert, an die Zeichnung von *Priapus*-artigen Formen. Die Zeichnung des *P. Zuleucus* Hew. (Birma) endlich, der wie *P. Hageni* rothgefärbte Abdominalpleuren besitzt, aber noch wie *P. Astorion* Westw. (Nordindien) und *P. Erebus* Wall. (= *nox* var. de Haan) (Malacca) den rothen Halskragen und Vorderkopf mit *P. Semperi* Feld. gemein hat, lässt sich aus einer an *P. Priapus* Bsd. erinnernden Form dadurch ableiten, dass die Postmarginalflecke sich wie bei *P. Hageni* Rog. hinten verbunden, die Submarginalflecke aber verschwanden. So erhält sich nur eine vorn abgekürzte weissliche, hinten gezackte Hinterflügelbinde, deren innere Bindenreste sich bei dem Männchen sogar auf der umgeschlagenen breiten Decke der Duft einrichtung ausprägen und so eine scheinbare Fortsetzung der Oberseitenbinde darstellen. Einem Stamme mit *P. noctis* Hew. gehört auch *P. Erebus* Wall. (= *nox* var. de Haan) (Borneo, Sumatra) an, dessen Vorderflügel bei den Männchen nahe dem Vorderrande in der Aussenhälfte eine besonders starke Ausbildung der intercostalen Aufhellung zeigen, wie man sie auch am Weibchen von *P. noctis* erkennt. Dagegen nehmen die Männchen von *P. nox* Swains (Java, Penang) und *P. noctis* Hew. (Borneo) eine vollkommen schwarze Färbung an und zeigen höchstens einige metallblaue Stellen auf den Hinterflügeln.

Von Formen mit entwickelter Mittelbinde, welche den Vorläufern von *P. Semperi* Feld., *P. Priapus* Bsd., *P. Hageni* Rogentl., *P. Sycorax* Dist. wohl nahe gestanden haben dürften, leite ich auch die sog. „gelben Ornithopteren“, die Arten der *Pompeus*-Gruppe ab. Dieselben schliessen sich in Geäder, Flügelschnitt und Aderung den vorigen an, dagegen nehmen sie durch die höhere Ausbildung des seiden-

weissen Duttwollpelzes im Analfelde der Hinterflügel der Männchen und ihren geschlechtlichen Dimorphismus den höchsten Rang unter der zweiten Cohorte der indischen Aristolochienfalter ein ¹⁾.

Im ungefähren Anschluss an C. Fickert, welcher den weit verbreiteten *P. Pompeus* Cr. wegen seines geringeren Dimorphismus für die Stammart hält, ist es vielleicht erlaubt, mit Berücksichtigung des Weibchens von *P. Magellanus* Feld. (Philippinen) die Stammform der *Pompeus*-Gruppe festzustellen. Dieselbe war schon ungeschwänzt, aber sicher aus einer geschwänzten Form hervorgegangen, wie die Randzacken der Hinterflügel andeuten. Auf den Vorderflügeln besass sie wie *P. Hippolytus* Cr. ♀ (Moluccen) noch eine äussere Zellaufhellung. Auf den Hinterflügeln zeigten die Marginalmonde noch die bogenförmige, bei *P. Magellanus* erhaltene Form, war noch ein auch bei *P. Pompeus* noch nachweisbarer heller Rest der mit der Mittelbinde verschmolzenen Schmuckbinde im achten Randfelde und wahrscheinlich ein wie bei *P. Magellanus* noch kontinuierliches, bald aber durch Ausdehnung der Mittelbinde in Flecke zerschnürtes Submarginalband erhalten, das sich endlich bei den abgeleiteten Formen mit den Postmarginalflecken, die zu einem Zackenbande verschmolzen, verband. Zugleich ist es auch wahrscheinlich, dass der goldgelben Farbe der Hinterflügelbinden eine gelblich-weiße, grau bestäubte Färbung vorausging, wie wir sie bei *P. Priapus* Bsd. noch antreffen, dessen Hinterleibsfärbung ebenfalls an die der *Pompeus*-Gruppe erinnert.

Wie Fickert halte auch ich *P. Hippolytus* Cr. (Moluccen) für einen Endausläufer des gemeinsamen Stammes, da sich bei ihm allein unter der Gruppe eine sexuelle Verschiedenheit des Flügelgeäders ausgebildet hat. C. und R. Felder (l. c. p. 333) wollten in der Zeichnung eine geringe Annäherung an die *Priamus*-Gruppe erblicken, die ich nicht herausfände.

Als Endform eines Seitenzweiges der echten *Pompeus*-Gruppe dürfen wir den herrlichen, an den Schmuck eines *Trogon* erinnernden *P. Brookeanus* Wall. (Borneo) ansehen, bei dem durch stärkere Verdunkelung der vorderen Hälfte der Vorderflügel sich die intercostalen Aufhellungen der Unterseite auf aussen offene, V-förmige Grundfarbenreste beschränkten. Letztere bildeten sich auf der Oberseite über den Rippenenden zu den herrlichen goldgrünen Laufenflecken um, welche sich als „Mittelbinde“ auch über die Hinterflügel und wie bei *P. Zalencus* Hew. sogar über den zur Unterseite gehörigen Umschlag der Duffeinrichtung ziehen. Die Zeichnung des Weibchens lässt sich nur auf die der *Pompeus*-Gruppe zurückführen. — Die Futterpflanzen der Raupen sind bei allen Arten, soviel bekannt, nur Aristolochien.

Wir können nach den obigen Ausführungen folgende Entwicklungsstufen der indo-australischen Aristolochienfalter aufstellen:

<p><i>Nox</i>-Gr.;</p> <p><i>Priapus</i>-Gr.;</p> <p><i>Latreillei</i>-Gr.;</p> <p><i>Alcinous</i>-Gr.;</p> <p><i>Jophon</i>-Gr.;</p> <p><i>Hector</i>-Gr.;</p> <p>Zweite Cohorte:</p>	<p><i>Pompeus</i>-Gr.;</p> <p><i>Semper</i>-Gr.;</p> <p><i>Doublelayi</i>-Gr.;</p> <p>Erste Cohorte: <i>Priamus</i>-Gr.;</p> <p><i>Antenor</i>-artige Formen.</p>
--	---

¹⁾ Die *Priamus*-Gruppe mussten wir nach dem Rippenverlauf der Radialis der Vorderflügel etc. als dem Stamm der Untergattung *Pharmacops* zunächst stehende Formen ansehen.

2. Indo-australische Segelfalter.

Die indo-australischen Arten der Untergattung *Cosmodesmus* zerfallen in drei Cohorten, deren eine Indien eigenthümlich ist, deren zweite ausser indo-australischen noch afrikanische Vertreter enthält und deren dritte cosmopolitisch ist.

Werner
Cohorte

Die letzterwähnte Cohorte besteht aus den durch ihren stark verlängerten Schwanz und die starre, oft parallel zur Körperachse gerichtete Querstreifung ausgezeichneten „eigentlichen“ Segelfaltern¹⁾, deren ausschliesslich indo-chinesische, aus *Altbion* Gray, *Glycerion* Westw. und *Paphus* Nic. bestehende Gruppe von Eimer als Grundform der *Papilioniden* angesehen wird.

C. und R. Felder theilten die indisch-australischen eigentlichen Segelfalter in drei Sectionen, deren erste (XX) aus *P. Glycerion* Gray, deren andere (XXIV) aus *P. Leosthenes* Dbl., deren dritte (XXI) aus den übrigen indischen Arten bestand, die eine weniger deutlich abgesetzte Fühlerkeule und einen kürzer behaarten Kopf besitzen und mit der *Glycerion*-Gruppe ein Structur-Merkmal gemeinsam haben, wie solches nur in der Segelfalter-Gruppe vorkommt: den bald nach seinem Ursprunge erfolgenden Uebergang des ersten Radialastes in die Subcostale der Vorderflügel.

Dem unter allen indischen Segelfaltern im weitesten Sinne verläuft dieser Radialast nur bei dem australischen *P. Leosthenes* Dbl. und der eine eigene Cohorte bildenden rein indischen *Gyas-Ecan*-Gruppe bis an's Ende selbstständig wie in den beiden anderen Untergattungen von *Papilio*.

So ist diese Structureigenthümlichkeit, welche sich auch bei allen afrikanischen Segelfaltern findet, von besonderer Bedeutung für den durch dies Verwandtschafts-Merkmal begründeten inneren Zusammenhang der Arten beider Regionen.

Im Anschluss an C. und R. Felder's Gruppierung müssen wir vorerst (mit Eimer) den nord-indischen *Altbion* Gray, welchen die Wiener Autoren wohl nur aus der zufällig weniger gelungenen Abbildung²⁾ kannten, zu ihrer Section XX ziehen, welche sie für *P. Glycerion* Westw. begründeten. Denn die für letzteren von ihnen angegebenen Merkmale der deutlich abgesetzten Fühlerkeule, des stark behaarten Kopfes etc. passen auch für *P. Altbion*. Dieser immer noch der Definition von Felder's Section XX entsprechenden Gruppe, die wir als *Glycerion*-Gruppe bezeichnen, schliessen wir mit Eimer auch den *P. Paphus* Nic. ein.

Somit bliebe Felder's Section XXI auf drei Untersectionen beschränkt, deren eine von *P. Agetes* Westw. (Nordindien), die zweite von der *Antiphates*-Gruppe, die dritte von *Anticrates* Dbl., *Aristaeus* Cr., *Nomius* Esp. (*Orcstes* J.), *Hermocrates* Feld., *Phreocrates* Feld. und endlich *Rhesus* Bsd. gebildet würde.

Im Gegensatz zu C. und R. Felder fasst Eimer, ohne das Geäder zu berücksichtigen, allein auf Grund von Merkmalen der Zeichnung in seiner „*Podalirius*-Gruppe“ an indischen Arten *P. Glycerion*, *Paphus* und *Altbion* zusammen, denen er den palaearktischen *P. Podalirius* L., die südamerikanische *Bellerophon*-*Agesilaus*-*Protesilaus*-Gruppe (Felder's Section XIX) mit *Epidaus* Bsd. (Section XXII Felder's) und den von C. und R. Felder zur Section XXI gezählten indischen *P. Agetes* Westw. zu-rechnet. Dieser Gruppe lässt er die im Sinne von Felder's Section XXI, Subsection C. gefasste *Antiphates*- und weiter die *Leosthenes*-*Anticrates*-Gruppe (Felder's Sectionen XX und XXI, D) folgen, mit

¹⁾ Wir können diese „eigentlichen Segelfalter“ mit einem J. Hübner entlehnten Ausdruck als *Heracius*-Cohorte bezeichnen.

²⁾ Gray, Cat. Lep. his. 1. Papilionid., London 1852, 4^o. Taf. XIII, Fig. 6.

denen er die nordamerikanische *Ajac*-Gruppe (Section XXIII F e l d e r's mit Ausschluss von Subsection C für *Philolaus* Boisld.) verbindet. Endlich schliesst er mit der *Ajac-Policenes*-Gruppe ab, zu der er den amerikanischen *P. Philolaus*, die afrikanischen Vertreter der *Policenes*-Gruppe (Section XXVI) und den von F e l d e r zur indischen *Anticrates*-Gruppe (Section XXI, Subsection D) gestellten celebensischen *P. Rhesus* Bsd. rechnet.

Im Gegensatz zu diesen der Entwicklung des Geäders und den geläufigen Ansichten über den Zusammenhang der Thierfaunen widersprechenden Hypothesen werden wir erst im Anschluss an die durch Structur-Merkmale zu begründende Verwandtschaft die durch geographische Verbreitung miteinander vergleichbaren Formen auch auf diejenigen Zeichen gemeinsamen Ursprungs untersuchen, welche sich in ihrer Zeichnung erhalten haben.

Vorerst erhalten wir von der *Alcibion-Glycerion-Paphus*-Gruppe durch das erwähnte Structur-Merkmal einen engeren Anschluss an die *Agetes-Antiphates-Anticrates*-Gruppen und zugleich an die afrikanische *Policenes-Antheus*-Gruppe.

Diese verwandtschaftliche Beziehung wird auch in mancher Hinsicht durch die Zeichnung der Flügel und die Färbung des Leibes gestützt.

Die ursprünglichste und entwickeltste Zeichnung finden wir von den durch die Mündung des ersten Radialastes in die Subcosta gekennzeichneten Abtheilungen bei der *Glycerion*-Gruppe, welche von Eimer in *P. Alcibion* Gray als Ausgangspunct auch für die übrigen Segelfalter genommen wurde. In derselben kommt auf den Vorderflügeln nicht nur die höchste überhaupt bei *Papilio* entwickelte Zahl von (sieben) Zellstreifen vor, deren zwei letzte wir als Terminalband zusammenfassen, sondern sind auch die Aussenzellbänder fast so regelmässig wie bei den Grundformen der Rinnenfalter entwickelt. So wird die Marginalbinde aussen vom breiten Postmarginal-, innen von einem Submarginalbände begrenzt, welches eine breite Kernbinde trägt; so findet sich zwischen Terminal- und Submarginalband ein hinten in letzteres übergehendes, aber streifenartig schmales Inframarginalband. Nach der Erhaltung der Unterseitenzeichnung auf der Oberseite zeigt sich *P. Alcibion* Gray (Nordchina) als die ursprünglichste Form, da auf der Oberseite der Hinterflügel die durchgehenden Marginal- und Submarginalstreifen und die Basalbänder scharf wiederkehren, ja sogar ein vorderer Rest des Prachtbandes schwach hervortritt. Den nächsten Grad der Reduction der Oberseitenzeichnung auf den Hinterflügeln zeigt *P. Paphus* Nic. (Nordindien), bei dem durch dichtere weissliche Beschuppung die Mitte des zweiten Basalbandes, das dritte Basalband und das vorderste Ende der Marginal- und Submarginalstreifen überdeckt ist. Noch weiter geht diese Verdeckung bei *P. Glycerion* Westw. (Nordindien).

Im Gegensatz zu der ursprünglicheren Erhaltung der Basalbänder zeigt dagegen bei *P. Alcibion* wie bei *P. Paphus* Nic. das Prachtband nicht den ursprünglichen continuirlichen Verlauf, sondern ist in der Mitte erloschen und nur in einem hinteren „Prachtwinkel“ und einem im zweiten Randfelde gelegenen Bandrest erhalten. Doch lässt *P. Paphus* Nic. noch am Zellende einen dunklen Ring erkennen, welcher dem rückgebildeten Prachtbandfleck von *P. Glycerion* entspricht. Somit müssen wir in Beziehung auf die Zeichnung der Unterseite *P. Glycerion* Westw. mit ganz erhaltenem Prachtbände als die ursprünglichste Form ansehen. Vielleicht dürfen wir als Stammart dieser Gruppe eine Form mit schlärferer, stärkerer Zeichnung der durchgehenden Bandstreifen annehmen, welche in der Zeichnung der Vorderflügel an die weniger aufgehellten *P. Paphus* und *Glycerion* erinnerte, auf der Oberseite der Hinterflügel das Postmarginal-, das Submarginal-, das Pracht- und die Basalbänder continuirlich hervortreten liess und an Analwinkel so wenig ausgezogen war, dass sich die bei dieser Gruppe im fünften bis siebenten Randfelde

auftretenden blauen Postmarginalmonde noch unentwickelt zeigten. Eine solche Stammform mit freieudendem ersten Radialast der Vorderflügel könnte dann zugleich als Vorläufer der *Leosthenes*- und *Podalirius*-Gruppe angesehen werden.

Antiphates-Gr.

Als weiter der Stammform der *Alelion-Glycerion*-Gruppe nächstehend sehen wir die auch von Eimer in Felder'schem Sinne gefasste *Antiphates*-Gruppe an, auf deren Vorderflügeln das Inframarginalmit dem Submarginalbände durch Verdunkelung zusammenfließt, in der Zelle aber noch sechs Bänder erhalten sind, deren letztes allerdings nicht mehr die Zwischenbinde erkennen lässt und deren zweites und drittes bis zum Hinterrande des Vorderflügels gehen können. Erinnert auch die Behaarung und Zeichnung des oben und unten hellen, ventropleural etwas dottergelblichen, jederseits nur durch einen dunklen Längsstreif ausgezeichneten Hinterleibes an *P. Glycerion* Westw., so sind doch die Hinterflügel noch wie bei *P. Ajax* und *P. Podalirius* durch das vollkommene Fehlen besonderer Postmarginalmonde ausgezeichnet. Dagegen ist die Submarginalbinde der Hinterflügel erblasst, nur in dem fünften bis siebenten Randfelde noch deutlich und in den vorderen theilweise mit der ausserhalb des Prachtbandes gelegenen breiten Mittelbinde verschmolzen.

Als einen besonderen mit der *Antiphates*-Gruppe gemeinsam von einem Stamme abzuleitenden Zweig dürfen wir den der letzteren sehr nahe stehenden *P. Agetes* Westw. (Nordindien) ansehen, der eine nur oberflächliche, auch von C. und R. Felder erwähnte Aehnlichkeit mit der südamerikanischen *Protesilaus*-Gruppe zeigt, die besonders auf der analogen Reduction der Vorderflügelbänder beruht. Durch das Fehlen der Postmarginalmonde und die Verästelung der Radialis schliesst sich *P. Agetes* dagegen eng an die *Antiphates*-Gruppe an, welcher er auch durch Leibefärbung und Duftrichtung gleicht.

Zwei auch von Eimer der *Antiphates*-Gruppe zugerechnete celebensische Arten, *Dorcus* de Haan und *Androcles* Bsd., welche auf den Vorderflügeln so stark verdunkelt sind, dass nur bei letzterem noch die Reste der Vorbinde und die Marginalbinde sich erhalten, ohne Postmarginalmonde auf den Hinterflügeln, führen zu der *Anticrates*-Gruppe über, von der ich im Gegensatz zu Eimer natürlich den *P. Leosthenes* Dbld. ausschliesse, der sich schon durch das Geäder der Radialis von den übrigen Formen der Gruppe unterscheidet. So sehe ich den als celebensischen Segelfalter ebenfalls stark verdunkelten *P. Rhesus* Bsd. als Verbindungsglied zwischen beiden Gruppen an, da er noch die Leibefärbung der *Antiphates*-Gruppe besitzt und zugleich an die Zeichnung seiner Heimathsgenossen aus derselben Gruppe erinnert. Besonders das Weibchen zeigt in dem stärker gegen den Aussenwinkel gerichteten Verlauf der ungetheilten, bis zum Hinterrande der Vorderflügel verlaufenden Innenbinde, in der breiten, auch oben auftretenden grauen Bestäubung über dem Submarginalbände und in den scharf und schmal halbmondförmigen weissen Marginalmondflecken der Oberseite der Hinterflügel Verwandtschaft mit beiden Gruppen. So dürfen wir *P. Rhesus* Bsd. wohl als einen der Seitenzweige des gemeinsamen Stammes der *Anticrates*- und *Antiphates*-Gruppe ansehen und ihn somit statt der rein amerikanischen *Ajax-Philolaus*-Gruppe, wie Eimer es thut, besser der indischen *Anticrates*-Gruppe zuzählen, nachdem wir *P. Leosthenes* Dbld. (Australien) wieder im Anschluss an Felder aus ihr entfernt haben.

Leosthenes-Gr.

Vielleicht ist uns in dieser einzigen Art der indo-australischen „eigentlichen“ Segelfalter mit frei verlaufendem ersten Radialast der Vorderflügel ein modifizierter Rest des Stammes auch für die *Alelion-Glycerion*- und die palaearktische *Podalirius*-Gruppe erhalten, zumal seine Halsfärbung und die gelbe Prachtbinde auch an die *Antiphates*-Gruppe erinnern. Zugleich zeigt aber *P. Leosthenes* Dbld. wie *Podalirius* L. die sonst nur in der *Alelion-Glycerion*-Gruppe erhaltene Submarginalbinde der Vorder- und

ausserdem schon drei entwickelte Postmarginalmonde der Hinterflügel. Auch bei dieser Art erinnert besonders das Weibchen durch seine Färbung an *P. Podalirius* L., welchem auch C. und R. Felder den *P. Leosthenes* Dbld. zugesellen, da die bei *P. Podalirius* L. vollendete Unterdrückung der hinteren Discocellulare der Hinterflügel bei *P. Leosthenes* schon angedeutet ist. *P. Leosthenes* scheint der einzige Segelfalter zu sein, bei dem sich der ursprünglichere Ursprung des dritten Radialastes der Vorderflügel vor dem Zellende erhalten hat.

Vorläufig lässt sich über solche biologisch und morphologisch weder hinreichend wichtigen noch interessanten Fragen wohl keine sichere Antwort finden, und es ist sogar fraglich, ob selbst die Kenntniss der Verwandlungsformen etwa das weitere, für definitive Entscheidung der Verwandtschaftsbeziehungen dieser local so entfernten Formen maassgebende Material liefern dürfte.

Auf jeden Fall aber ist die Ableitung aller indo-australischen Formen von einer Gruppe viel wahrscheinlicher als eine Mischung mit nordamerikanischen Elementen, wie Eimer sie annimmt.

Als zweite Cohorte der Segelfalter¹⁾ dürfen wir die zahlreichen meist grün getüpfelten Formen der *Agamemnon*-artigen Segelfalter ansehen, welche sich bei C. und R. Felder durchaus passend an die afrikanische *Policeus-Antheus*-Gruppe der eigentlichen Segelfalter anschliessen und seinen Sectionen XXVII—XXVIII, XXXIII—XXXIV und XXXVI entsprechen. Von den zahlreichen Arten zeigen nur wenige noch eine entwickelte Schwänzung der Hinterflügel, keine aber ein über die Segelfalterzeichnung hinausgehendes Merkmal. Vielmehr findet sich bei ihnen schon eine Auflösung der hellen Binden als Product einer längs der Rippen verlaufenden Verdunkelung. Dieselbe lässt sie als von den Segelfaltern abgeleitet erscheinen, deren Zeichnungstypus man überall bei ihnen wiederfindet.

Zetides-Cohorte

Uebergangsformen beider Sectionen, welche wohl an den afrikanischen *P. Antheus* Cr. erinnert haben dürften, aber keine Postmarginalmonde besaßen, sind nicht bekannt.

Die beiden einzigen Formen mit deutlich abgesetztem, an das der Segelfalter schwach erinnerndem, aber schon etwas verkürztem Schwänzchen sind Angehörige zweier weit von einander entfernten Gruppen. *P. Cloanthus* Westw. und der später zu erwähnende *Macleayanus* Leach, doch finden wir bei beiden keine ursprünglichere Zeichnung mehr.

Vielmehr treffen wir die reichste und zugleich in ihrer Einfachheit am meisten an die afrikanische Segelfalter (*P. Antheus* Cr.) erinnernde Zeichnung bei dem weitverbreiteten *P. Agamemnon* L., dessen Festlandformen bekanntlich noch stumpfe Hinterflügelschwänze tragen, die mit dem Vorschreiten der Art nach Osten zurücktreten.

Agamemnon-Cohorte

P. Agamemnon L. besitzt noch eine undeutliche Längsstreifung des stark wolligen Körpers und in der Vorderflügelzelle wie der afrikanische *Policeus* Cr. sechs Bindenreste der Grundfarbe. Ausserhalb der Zelle erkennt man ebenfalls einen Rest der Vor- und Zwischenbinde, welche zu einer ausgebildeten Mittelbinde zusammentreten, die noch stärker als bei den afrikanischen Segelfaltern durch quere Verdunkelung zerschnürt ist. Wie bei den Letzteren ist der Marginalmond im sechsten Randfelde der Vorderflügel oben noch getheilt und setzt sich die Randbinde ebenso wie die beiden Basalbinden und die anscheinend nur ausserhalb der Zelle liegende Mittelbinde auf die Hinterflügel fort. Die innerste Basalbinde ist noch einheitlich, die äussere aber durch den Cubitalstamm unterbrochen und die Mittelbinde ist wie die Marginalbinde in je sechs Tüpfel zerschnürt. Während bei *P. Agamemnon* die Rothflecke der Schmuck-

¹⁾ Wir können dieselbe mit einem J. Hübner entlehnten Namen als *Zetides*-Cohorte bezeichnen.

binde wie bei *P. Anthous* Cr. nur im zweiten, dritten und achten Randfelde erhalten sind, bilden sie bei anderen Arten eine mehr kontinuierliche Binde, deren vorderster Fleck im ersten Randfelde stets innerhalb der Mittelbinde liegt und bei *Agamemnon* fehlt. Ein Zeichen dafür, dass *P. Agamemnon* ursprünglich weniger verdunkelt war, ist das Zusammenfließen der auf der Oberseite getrennten Vorderflügelzelltüpfel zu Binden auf der Unterseite, wie sie besonders bei var. *Plisthenes* Feld. (Amboina) deutlich ist.

Zu dieser Gruppe gehören auch *P. Aegisthus* L. (Amboina) und *Wallacei* Feld. (Neu-Guinea), bei denen die helle Grundfarbe durch Verdunkelung noch mehr unterdrückt und die Hinterflügel ganz schwanzlos sind.

An diese Untergruppe schliesst sich auch wohl die aus zwei Arten, *P. Argyles* Bsd. (Nordindien) und *Rama* Feld., bestehende (fünfte) Untersection von C. und R. Felder an.

Eurypylus-Gr.

Bei den zahlreichen Arten der *Eurypylus*-Gruppe (Subsection C Felder) tritt im weiteren Verlauf der Reduction der Zeichnungselemente eine Verschmelzung der Mittelbinde mit der zweiten Basalbinde der Hinterflügel ein, sodass eine breitere helle Binde entsteht, die als Fortsetzung einer extracellularen Vorderflügelbinde erscheint. Zugleich wird das Prachtband zerrissen, dessen vorderster Fleck im ersten Randfelde innerhalb, die hinteren vier bis zum siebenten Randfeld ausserhalb der hellen Binde liegen.

Sarpedon-Gr.

Eine noch weiter fortgeschrittene Reduction der hellen Grundfarbe finden wir in der Felder's Subsection B entsprechenden *Sarpedon*-Gruppe. Hier ist die Marginalbinde der Vorderflügel oft ganz unterdrückt und die Zelle derselben vollständig verdunkelt, aber einzelne Arten besitzen noch ein Zählchen am dritten Medianast der Hinterflügel, welches die Ableitung von der *Eurypylus*-Gruppe (mit vollkommen abgerundeten Hinterflügeln!) verbietet.

Codrus-Gr.

Als directer Ausläufer des Stammes der *Agamemnon*-Gruppe ist die von Felder zur Section XXVII, Subsection F. gerechnete, lang und plump geschwänzte *Codrus*-Gruppe anzusehen, bei deren Arten die Mittelzelle der Vorderflügel vollkommen verdunkelt ist, sodass auf der Oberseite der letzteren nur mehr die grün gefärbte, kurz beschuppte, ganz ausserhalb der Zelle gelegene Mittelbinde auftritt, die sich auf den Hinterflügeln nur noch im zweiten Randfelde der Unterseite erkennen lässt. Einen noch stärkeren Grad der Verdunkelung als *Codrus* F. (Moluccen etc.) zeigt *P. Hicetas* Godm. & Salv. (Neupommern), bei dem die anscheinend eine Aussenbinde darstellende Mittelbinde nicht nur auf den Hinterflügeln, sondern auch im fünften Randfelde der Vorderflügel erloschen ist. Diese nach Südosten zunehmende Verdunkelung zeigt sich auch bei der var. *Neopommerana* Honr. von *P. Agamemnon* (ebendaher) auf den Hinterflügeln entwickelt.

Macleayanus-Gr.


Der eigenthümliche *P. Macleayanus* Leach (Australien) zeigt auf der Unterseite der Flügel eine unentwickelte Schutzfärbung, besitzt dagegen auf den Vorderflügeln noch zwei getrennte Zellbinden, deren breite innere aus der Verschmelzung der basalen mit der Mittelbinde hervorgegangen ist und sich auch über die Hinterflügel fortsetzt. Mit deutlichen Hinterflügelschwänzen versehen, dürfte er als dem Stamme näher stehender verkümmertem Zweig einer *Agamemnon*-ähnlichen Form anzusehen sein. Von der Mittelbinde der Vorderflügel ist ein grösserer Tüpfel nahe dem Vorderrande und ein kleinerer vom dritten bis vierten Randfelde reichender durch von der Zelle in das Submarginalband übergehende Verdunkelung abgeschnürt. Auffällig ist bei dieser kleinen Form besonders die starke büschelige Behaarung der Vorderstirn, das schmale fünfte und das breite sechste Randfeld der Vorderflügel, die besonders auf der Unterseite schön smaragdgrüne Färbung der Flügelmembran in den hellen Binden, die kurze zweifarbige Fühlerkeule.

Hieran schliesst sich die ganz allein stehende Gruppe derjenigen Segelfalter, welche eine entwickelte Schutzfärbung an der Unterseite der Hinterflügel besitzen und sich von den erwähnten *Agamemnon*-artigen Gruppen durch den frei verlaufenden ersten Radialast der Vorderflügel und die Zeichnung unterscheiden. Dritte Cohorte

Ihre einzigen Vertreter sind in *P. Gyas* Westw. und *P. Ecan* Dbld. auf Nordindien und in der Varietät des Letzteren *Payeni* Boisd. auf Java beschränkt, also sicherlich continentalen Ursprungs.

Am nächsten dürfte der Grundform *P. Gyas* Westw. stehen, der von seinem Beschreiber als „most nearly allied to *P. Peranthus*“¹⁾, als Verwandter der zu den Rimmentaltern gehörigen *Ulysses*-Gruppe, bezeichnet war, von C. und R. Felder dagegen und nach ihm von F. W. Kirby zwischen die *Codrus-Macleayanus*- und die *Pylades*-Gruppe der Segelfalter-artigen *Papilionen* gestellt wurde, was wir nur bestätigen können. In der That verweisen ihn dahin die mit *P. Ecan* gemeinsamen Eigenthümlichkeiten der stark gekrümmten dicken Fühlerkeule, welche ihre grösste Breite vor dem Endgliede erreicht, die starke Behaarung der Stirn an dem grossen Kopfe, die starke Entwicklung der Analfalte, die einfarbige weiche Behaarung des Nackens, die schmalen und spitzen Genitaldeckklappen der Männchen. Die flache Rinne innerhalb der Dorsalrippe der Hinterflügel verläuft grade und offen wie bei der *Codrus*-Gruppe; auch ist das Analfeld an der Unterseite bei den Männchen wie bei letzterer dicht absteht behaart, während Duffeinrichtungen fehlen. Bei *P. Gyas*, welcher im Männchen eine grau-grüne ebenfalls an *P. Codrus* erinnernde Beschuppung des Hinterleibes und rothbraune Fühler trägt, läuft am Weibchen noch eine breite helle Mittelbinde über beide Flügel. Auf den Vorderflügeln treten oben vom Gabelfelde bis zum sechsten Randfelde entwickelte, in Letzterem gedoppelte Marginalmonde und einige isolirte helle Tüpfel im ersten und dritten bis vierten Randfelde der Vorderflügel auf und entsprechen wohl der Zwischenbinde. Dann ist das in der hellen Aussenzellbinde verlaufende gezackte, bis zum fünften Randfelde erkennbare Band als Inframarginalband aufzufassen, welches in das breitere Submarginalband hinten übergeht. Die Unterseite erinnert bei beiden Geschlechtern an ein dunkelbraunes vermodertes Blatt.

Noch mehr gleicht *P. Ecan* Dbld. einem welken und zwar einem vergilbten Blatte und bildet zugleich durch die sichelförmige Verlängerung der Vorderflügelspitze und der Analgegend der Hinterflügel



Figur 5.

Zeichnung von *P. Ecan* Westw.

III, IV, V Zellbänder; Term, Terminalband; Infr, Inframarginalband; Subm, Submarginalband; Postm, Postmarginalband; Marg, Marginalbinde.

¹⁾ J. O. Westwood, Arcana entomolog. Vol. I, 1845, p. 42.

ein interessantes Analogon zu den eine ähnliche schützende Anpassung an trockene Blätter zeigenden *Nymphaliden* (*Doleschallia Eurodoce* Westw., *Kallima* sp. div., *Anaca* sp. div.) und *Satyriden* (*Caeris* sp., *Corades* sp.). Zugleich zeigt aber *P. Eran* eine grosse Ursprünglichkeit in der Zeichnung, besonders in der Erhaltung des dritten, vierten, des Terminalbandes und von Resten des fünften Bandes der Vorderflügel und in der schärferen Abtrennung des inframarginalen von dem Submarginalbande, welche noch am Hinterrande der Vorderflügel ausgesprochen ist. Auf die Hinterflügel geht das mit dem Inframarginalbande verbundene Submarginal- und das breite, besonders im sechsten Randfelde ausgezogene Marginalband über, auch sind die Postmarginalmonde schärfer als bei *P. Gyas* entwickelt und ist der Saum deutlich abgesetzt. Dagegen ist die weissblaue Zwischenbinde nicht nur auf den ganzen Hinterflügeln, sondern auch am Hinterrande der vorderen ausgebildet.

Somit bietet diese Form unter allen Segelfaltern das beste Prüfungsmaterial für die von mir aufgestellte Bänder- und Eimer's Streifentheorie.

Im achten Randfelde, das auch hier nach hinten stark ausgeschnitten ist, tritt kein Marginalmond mehr auf, denn ein Vergleich der Ober- und Unterseite ergibt, dass die zwei auf der Oberseite vortretenden hellen Tüpfel im fünften und sechsten Randfelde der Submarginal- und Marginalbinde angehören, hinter denen noch der Postmarginalmond und der Limbaltüpfel unten hervortritt. Der helle Tüpfel, der im siebenten Randfelde oben vorleuchtet, gehört also offenbar wieder der Submarginalbinde an. Somit ist die nur unten auftretende, vor ihm gelegene, innen weissblau gesäumte Zeichnung der Zwischenbinde zuzuschreiben, und dasselbe gilt für die zwei im achten Randfelde erhaltenen Bandreste. Daher ist auch bei dieser Gruppe der Marginalmond im achten Randfelde unterdrückt und der Beweis auch für die Zeichnung geliefert, dass ihre Stellung nur bei den Segelfaltern sein kann.

Müssen wir den *P. Eran* auch seiner eigenthümlichen Flügelform wegen als abgeleiteter ansehen, da der Umriss von *P. Gyas* doch noch an *P. Macleayanus* erinnert, so zeigt er doch eine ausgebildete Anpassung an seine Umgebung vermittelt ganz ursprünglicher Zeichnungselemente.

Als besondere Eigenthümlichkeiten des Geäders dieser Gruppe erwähne ich besonders die Einwärtsknüpfung der hinteren Discocellulare und die ungewöhnliche Länge des Stiels der Radialgabel der Vorderflügel, welche die auch in der Zeichnung der Flügel ausgedrückte nähere Verwandtschaft mit der ganz allein stehenden *Papilioniden*-Gattung *Teinopalpus* andeuten. Vielleicht dürfte uns über diese merkwürdigen Beziehungen einmal die Postembryonalentwicklung weiteren Aufschluss geben.

Wie in Afrika, gehen auch in Indien aus einigen der *Agamemnon*-Gruppe näher stehenden schwanzlosen Formen mit vielen Tüpfeln der Grundfarbe, mit theilweise erhaltenen Basalbändern und Schmuckbindenrest der Hinterflügel mimetische Arten hervor, welche sich *Danaiden* anpassen und von Felder zu den Sectionen XXXIII, XXXIV und XXXVI gestellt wurden. Ich fasse alle diese Formen in eine Gruppe zusammen, welche ich mit dem dafür von A. R. Wallace angenommenen Namen als *Macareus*-Gruppe bezeichne.

Manche Arten stehen auch in der Färbung den muthmasslichen *Agamemnon*-artigen Vorfahren näher: so besitzt *P. Thub* Wall. (Neu-Guinea), dessen Modell der *Danaus sobrinus* Bsd. ist, noch die grünen Tüpfel auf schwarzem Flügelgrunde und die Leibsfärbung der *Agamemnon*-*Euryppylus*-Gruppe. Die ursprünglichsten Arten zeigen auch noch deutlichere Reste der ursprünglichen Segelfalterzeichnung, so besonders einen über die Hinterflügelzelle in den vordersten Cubitalast verlaufenden Streifen, welcher

dem dritten Basalbande von *P. Eurypylus* L. entspricht und oben meist früher erlischt. Auch zeigen sie im achten Randfelde der Hinterflügel einen oft sogar oben (*Laodocus* de Haan, *Xenocles* Dbld.) hervortretenden gelben oder orangenen Tüpfel, welcher aus der Auflösung und Verbreiterung des Restes der Prachtbinde entstanden ist.

Zugleich bildet sich die schon bei der *Eurypylus*-Gruppe angelegte weisse Fleckung des Kopfes und Halses und die weisse Längsstreifung der Brust und der Abdominalseiten mehr aus, welche, verbunden mit dem kleineren Kopf, die Aehnlichkeit mit *Danaiden* erhöht. Die Mittelbinde der Vorderflügel kann sich hierbei in continuirliche helle Längsbinden verbreitern und auch in Flecke zerschneiden. Zu den Formen mit ursprünglicherer Zeichnung und Färbung dürfte auch *P. Deucalion* Hew. (Celebes) gehören, eine grössere Art, welche noch zahlreiche Grundfarbereste besitzt und zum Theil die Ableitung der anderen Formen gestattet. Auch gleicht derselbe noch keiner besonderen Art der *Danaiden*, sondern trägt nur den allgemeinen Danaidencharacter mit etwas celebensischer Localfärbung. Die abgeleiteteren, meist kleineren mimetischen Formen bestehen vorerst aus Arten, welche schwärzlich oder braun verdunkelt sind.

Hierher gehören Formen, welche in beiden Geschlechtern, besonders aber im weiblichen, an *Danaus*-Arten der Untergattung *Parantica* erinnern. So gleicht *P. Megarus* Westw. (Malacca) genau dem *Dan. Agleus* var. *Agleooides* Feld.; so gleicht *P. Macareus* Godt.²⁾ (Nordindien, Java, Borneo) dem *Dan. Agleus* Cr., und bei seiner Varietät *Stratocles* Feld. (Mindanao) erinnert besonders das Weibchen an *Danaus vitrinus* Feld. Höher ausgebildete Anpassungserscheinungen treffen wir schon in derjenigen Form, welcher der zur selben Untergattung gehörige *Dan. Tylius* mit stark aufgehellten Vorder- und rostrothen Hinterflügeln als Modell dient, in *P. Xenocles* Dbld. (Silhet), dessen seltenes Weibchen der immunen Art besonders auch in Bezug auf die Färbung der Hinterflügel bedeutend besser angepasst ist als das häufigere Männchen.

Durch noch stärkere braunschwarze Verdunkelung der hellen Grundfarbe vermittelt Zunahme der Zeichnung entstehen weitere mimetische Arten, welche an braune *Euploea* der Untergattung *Crastia* Moore erinnern, so *P. Leucothoe* Westw. (Nordindien).

Die bemerkenswerthesten Formen sind die stark aufgehellten, meist auf weissem Grunde mit einzelnen schwarzen Flecken gezierten Arten, von denen z. B. besonders das Weibchen des kleineren *P. Laodocus* de Haan (Sumatra) an *Ideopsis daos* Bsl., der grosse *P. Ideoides* Hew. (Philippinen) dagegen an die gewaltige *Hestia Idea* Cl. erinnert. Bei letztgenanntem *Papilio* ist die erwähnte ursprünglichere Segelfalterzeichnung schon vollkommen verloren gegangen; denn die Grösse der Art bedingte den höheren Grad der Aehnlichkeit. Ebenso zeichnet sich *Ideoides* Hew. durch kürzere Antennen und längeres Abdomen aus, welche letztere Eigenschaft die Aehnlichkeit mit den *Danaiden* erhöht. Wahrscheinlich steht dieser Art auch *P. Encelades* Hew. aus Celebes noch näher, der ebenfalls kürzere Fühler besitzt, aber nur eine oberflächliche Aehnlichkeit mit dem celebensischen *Dan. Ismaire* Cr. besitzt.

Die Futterpflanze der Raupe ist bei *P. Antiphates* Cr. wie bei *P. Agamemnon* L. nach Horsfield und Moore eine *Uvaria*, bei *Nomius* Esp. und *Dason* Feld. nach Nicéville (Journ. As. Soc. 1885, p. 51) eine *Polyalthia* (Annonaceae).

¹⁾ Vergl. E. Haase, Corr. ent. Ver. Iris, Dresden, III, 1888, p. 290.

²⁾ Anscheinend ist das Weibchen dieser Art noch unbekannt.

Somit können wir folgende Entwicklungsstufen der indischen Segelfalter aufstellen:

		<i>Macareus</i> -Gr.:	
		<i>Eurypylus</i> -Gr.:	
<i>Antiphates</i> -Gr.:	<i>Antirates</i> -Gr.:	<i>Agamemnon</i> -Gr.:	<i>Codrus</i> -Gr.:
	<i>Alebiön-Glycerion</i> -Gr.:	<i>Zetides</i> -Cohorte: <i>Macleayanus</i> :	
<i>Heroicus</i> -Cohorte:	<i>Leosthenes</i> -Gr.:	Dritte Cohorte: <i>Gyas</i> -Gr.	

3. Indo-australische Rinnenfalter.

Diese Untergattung der indischen *Papilionen*, *Papilio* s. str., umfasst folgende Sectionen Felder's: XXXVII—XXXVIII, XXXIX, Subsection B, und LVIII—LXV. Von diesen erscheint der zur Section XXXIX gehörige, weitverbreitete *P. Erithonius* Gr., der in Australien durch die Varietät *Sthenelus* Mael. vertreten wird, zwar durch die Reduction des Hinterflügelschwänzchens zu einem kurzen Zahn der Flügelform nach als abgeleitet, jedoch besitzt er noch die entwickeltste und zugleich ursprünglichste Zeichnung, die grösstentheils in beiden Geschlechtern und auf Ober- und Unterseite die gleiche ist.

Erithonius-Gr.

Wir dürfen ihm als den von China bis Australien verbreiteten Vertreter unserer „Schwalbenschwänze“ ansehen, denn er gleicht letzteren noch in Färbung und Zeichnung. So besitzt er in der Mittelzelle der Vorderflügel einen direct am Ende gelegenen und einen zweiten mehr innerhalb gelegenen Binde rest, von denen der letztere in zwei unregelmässige Tüpfel zerschnürt ist. Die grössere Innenhälfte der Zelle lässt oben circa zehn senkrecht zum Vorderrande verlaufende, unregelmässige schwarze Strichel erkennen, die sich nach hinten innerhalb der Mittelbinde zu einer Sperberung ausbilden; auf der Unterseite dagegen sind im verdunkelten Grunde wie bei *P. Xuthus* L. vier gelbe Längsstriche vorhanden, über welchen auch die hellen Tüpfelpuncte der Oberseite liegen. Vom Vorderrande bis zum sechsten Randfelde treten am Aussenrande die unten stärker als oben entwickelten Limbalbüpfel auf, an welche sich noch innen vom Vorgabel- bis zum siebenten Randfelde die unregelmässig geformten Marginalmonde anschliessen. Die orangene, vom Vordergabel- bis zum zweiten Randfelde ausgebildete Bestäubung der Unterseite halte ich für den Rest der Submarginalbinde, denn es entspricht ihr auch auf der Oberseite eine feine gelbliche Bespritzung. Somit gehören die einzelnen, seltener (im Gabelfelde) getheilten hellen Tüpfel der Aussenzellbinde an, die sich weiterhin mit den Zellbinden zur Mittelbinde vereinigt. Letztere setzt sich auf der dunkleren Oberseite schärfer als auf der mehr einfarbig gelben Unterseite auf die Hinterflügel fort und tritt auf ersterer ausser in der continuirlich über die Zellmitte verlaufenden Binde noch in einzelnen scharfen gelben Tüpfeln im fünften bis sechsten Randfelde ausserhalb der Mittelzelle auf. Somit ist anzunehmen, dass sie ursprünglich wie bei der *Machaon*- und *Daurus*-Gruppe auf den Vorderflügeln breiter war und sich bis zum Submarginalbande der Hinterflügel ausdehnte, nur am Zellende durch einen Rest des Terminalbandes unterbrochen. Dann findet auch der schwarze, scharfe, etwas innen convexe Streif, welcher auf der Unterseite die basale Aufhellung gegen die Mittelbinde abschliesst, eine Erklärung und entspricht dem dritten Basalbande der *Daurus*-Gruppe! Im Gegensatz zur Mittelbinde dehnt sich nun das Submarginalband auf der Oberseite der Hinterflügel besonders deutlich aus und bildet im zweiten Randfelde einen schönen Augenfleck mit orangeschwarzer Pupille, blauer Iris und schwarzem Rande, dem ein ähnlich gezeichneter aber kleinerer Fleck im achten Randfelde entspricht. Auf der Unterseite ist die ursprünglich blaue, schwarz gesäumte Binde innen lebhaft orange gekernt, und es hat sich

diese Bänderbildung auch auf den Fleck im Zellende fortgesetzt, den wir als Terminalband bezeichnen. Die Marginalmonde der Hinterflügel sind oben und unten deutlich, und der im achten Randfelde ist ziegelroth gefärbt. In letzterem ist zugleich auch das sonst breite kräftige Postmarginalband aussen fortgefallen; so gehen Randsaum und Marginalmond in einander über. Vom zweiten bis siebenten Randfelde treten die Limbaltüpfel besonders an der Unterseite der Hinterflügel stark hervor. Die Leibestärbung ist für die ursprünglicheren Arten der Untergattung typisch. Ueber den Kopf und Nacken zieht sich ein dunkleres mittleres Dorsalband, das auf dem Hinterleibe besonders verbreitert und fein gelb bestäubt ist; ein weiterer schwarzer Streif zieht sich an den Seiten des Kopfes zur Flügelbasis, während auf dem stark aufgehellten Hinterleibe sich je ein dunkler Streif über die Stigmenlinie herüber und ein anderer an der Bauchseite entlang ebenfalls bis zur Geschlechtsöffnung zieht. Somit zeigt der Hinterleib fünf normale Längsstreifen. Auch die gelbe Oberseite der Fühler vor der Keule und die helle Keulenspitze deutet auf nahe Verwandtschaft mit der *Machaon*-Gruppe hin.

Als noch geschwänzte Ausläufer einer der *Machaon*-Gruppe nächststehenden Form sehe ich die zu Felder's Section LIX gehörigen Arten *P. Gigon* Feld. (Celebes) und den kleineren bis Indien verbreiteten *P. Demolion* Cr. an, von denen ersterer in der Vorderflügelzelle noch eine schmale terminale Aufhellung trägt. Bei beiden Arten entsteht eine von der Vorderflügelspitze aus gegen die innere Hälfte des Hinterrandes verlaufende, aus Resten der Marginal- und der Aussenzellbinde bestehende Diagonallbinde, deren Tüpfel sich nach hinten zu erweitern und endlich eine breite continuirliche Mittelbinde bilden, welche die Hinterflügelzelle durchzieht. Eine basale Aufhellung an der Unterseite der Hinterflügel erinnert an die von *Erithonius* und dürfte vor dem Reste des dritten Basalbandes liegen. Auf den Vorderflügeln sind selbst bei *P. Gigon* Feld. die Marginalmonde meist unterdrückt und treten nur auf der Unterseite in schmalen queren Tüpfelresten auf. Dagegen sind sie auf den Hinterflügeln auch oben entwickelt, haben jedoch eine submarginale, durch die starke Erweiterung der kräftigen Postmarginalbandflecke bedingte Verschiebung erfahren¹⁾. Im achten Randfelde tritt der Marginalmond aussen mit dem Saamtüpfel in Verbindung; so entsteht ein innen offener, einen schwarzen Fleck umfassender Halbring, der oft wie der Marginalmond im zweiten Randfelde eine orangene Färbung annimmt. Auf der Unterseite der Hinterflügel tritt in dem zwischen Marginal- und Mittelbinde liegenden breiten Bande, welches durch die Verschmelzung des submarginalen mit dem Reste des Inframarginalbandes entstand, eine zarte silberblaue Zackenbinde auf, welche der Submarginalbinde entspricht, aber auf der Oberseite durch Verdunkelung unterdrückt ist. Wie in der *Thoas*-Gruppe entspricht somit die orangene Bestäubung um die Zelle herum der in allen ursprünglicheren Gruppen der Rinnentalter nachweisbaren Zwischenbinde.

Auch die Färbung des Leibes, die auf hellem Grunde eine breite dorsale Verdunkelung und jederseits einen stigmalen und einen ventropleuralen Längsstreif trägt, erinnert an *P. Erithonius* Cr., dagegen sind die Fühler schon einfarbig und stark verlängert.

Als weiteren Ausläufer einer noch vorwiegend gelb gefärbten *Gigon*-artigen Form sehe ich den C. und R. Felder noch unbekannt gebliebenen *P. Antonio* Hew. (Philippinen) an, der wie *P. Gigon* Feld. im Männchen aussen auf der Oberseite der Vorderflügel einen sammetartigen Schuppenfilz trägt, am Hinterrande derselben noch einen unten fast bis zum fünften Randfelde reichenden hellen Binde rest besitzt und ebenfalls noch vier helle Striche in der Vorderflügelzelle erkennen lässt. Ausserhalb der über

¹⁾ Eine analoge Verschiebung treffen wir auch in der neotropischen *Thoas*-Gruppe.

die Hinterflügel sich fortsetzenden Mittelbinde liegen im fünften bis achten Randfelde noch blaue Submarginal- und die regelmässigen Marginalbindenmonde, deren äusserste wie bei *P. Euchenor* Guér. orange gefärbt sind und in ihrer Lage durchaus an die von *P. Gigon* erinnern.

Durch noch stärkere Verdunkelung ging aus ähnlichen Formen wie *P. Antonio* Hew. der ebenfalls noch geschwänzte *P. Noblei* Nic. (Birma) hervor¹⁾, bei dem die Vorderflügelbinde vollkommen erlosch und auch die Mittelbinde auf den hinteren bis auf einen weiss-gelben Spiegel im zweiten bis vierten und einen geringen Rest im achten Randfelde, die Submarginalbinde bis auf einige blaue Stäubchen im siebenten bis achten Randfelde, im sechsten Randfelde sogar der Marginalmond verdunkelt wurde, sonst sich aber in der charakteristischen Lage erhielt.

Auf Formen mit entwickeltem Hinterflügelschwanz und gelblicher Grundfärbung, die uns in der indo-australischen Fauna nicht mehr erhalten sind, aber vielleicht der in ihr nicht vertretenen palaearktischen *Machaon*-Gruppe entsprechen könnten, weist die Zeichnung von Vertretern mehrerer selbstständiger Gruppen hin.

Euchenor-Gr.

So besitzt der grosse ungeschwänzte *P. Euchenor* Guér. (Neu-Guinea) noch die vier hellen Striche an der Unterseite der Vorderflügelzelle wie die *Gigon*-Gruppe, aber zugleich eine auf den Vorderflügeln stark modificirte Zeichnung. Die Apicalbinde, welche nach hinten in einige schwache, nur auf der Unterseite deutliche, bald in den Saum aufgehende Randmonde sich verliert, entspricht wohl einem Theile der Marginalbinde. Dagegen sind die vom dritten bis siebenten Randfelde entwickelten hellen Binde-reste, welche mit der grossen Aufhellung am Zellende zusammentreten, Reste der ursprünglich breiteren Mittelbinde. Letztere setzt sich auf der Oberseite der an der Basis stark verdunkelten Hinterflügel über das mittlere Drittel der Fläche fort, auf der Unterseite dagegen geht sie wie in der *Machaon*-Gruppe bis zur Basis und auf beiden Seiten durchbricht sie im dritten bis vierten Randfelde das Submarginalband, um in die Marginalmonde überzugehen, die so stark nach innen verschoben sind wie bei der *Gigon*-Gruppe. Das Submarginalband reicht somit nur vom achten bis fünften Randfelde, tritt dagegen wieder im zweiten als blaugekernter Augenfleck auf. Während die Randmonde im zweiten und fünften bis achten Randfelde eine orangefarbene Färbung annehmen, bleiben die unten stark entwickelten Saumtüpfel meist weisslich. Marginal- und Submarginalbinde treten auf der Oberseite der Hinterflügel nicht hervor. Da die helle durch einen stigmalen Streifen unterbrochene Farbe der Seiten und des Bauches und die Fühlerform an *P. Gigon* erinnern, möchte ich *P. Euchenor* eher der *Gigon*- als der *Ercethus*-Gruppe anschliessen, wie Felder und Wallace es thaten.

Amphiaraus-Gr.

Am nächsten dürfte der hypothetischen Stammform in der Flügelform und der Erhaltung der Marginalbinde der Vorderflügel noch die *Amphiaraus*-Gruppe stehen. Dieselbe bildet bei C. und R. Felder die Subsection G der Section LX, ist anscheinend in beiden Geschlechtern monomorph und trägt einen schwach spathelförmigen Hinterflügelschwanz. Die ursprünglichste Art ist *P. Amphiaraus* Feld. (*Ilioneus* Don.), von dem ich durch Güte des Herrn Custos A. Rogenhöfer eine nach der Wiener Type angefertigte Farbenskizze erhielt. Hinterleib und Fühler sind ganz schwarzbraun. Auf den Vorderflügeln erhält sich eine vom Vorgabelfelde beginnende Randmondreihe oben bis zum fünften, unten dagegen bis zum sechsten Randfelde. Weiter tritt eine breite weissliche Aussenzellbinde auf, die vorn über dem

¹⁾ Leider kenne ich nur die von L. de Nicéville gegebene Abbildung (Journ. As. Soc. Bengal. LVII, 1889, Taf. XIII, Fig. 2).

mittleren Medianast in die Marginalbinde verläuft, hinten aber durch einen weiteren Rest noch erkennen lässt, dass sie ursprünglich eine durchlaufende Binde bildete. Diese Mittelbinde setzt sich auf das letzte Drittel der Hinterflügelzelle fort, ist besonders in der Mitte erweitert, unten eher breiter als oben und vom ersten bis achten Randfelde entwickelt. Die grossen Marginalmonde der Hinterflügel tragen auf der Unterseite vom zweiten bis siebenten Randfelde in gelblich-weissem Grunde noch einen orangenen Kern, dagegen treten sie oben nur im sechsten bis achten Randfelde als kleinere rothe Tüpfel hervor. Das Submarginalband ist im sechsten bis siebenten Randfelde sehr breit entwickelt, in den vorderen aber durch das nach aussen zunehmende Vordringen der Mittelbinde zu einem dunklen mondformigen Fleck verschmälert.

Dieser Art gegenüber zeigt *P. Amyntor* (Neu-Caledonien, N.-S.-Wales) eine schon fortgeschrittene Verdunkelung der Zeichnung. So tritt auf der Oberseite der Hinterflügel die Mittelbinde nur im sechsten bis zweiten Randfelde und von den Marginalmonden nur der grosse rothe Analmond im achten Randfelde auf. An dem schwarzen Leibe erkennt man jederseits zwei schmale helle Seitenbinden.

Auf einen mit der *Amphiarus*-Gruppe gemeinsamen Stamm, dem sie ebenso nahe wie letztere stehen dürfte, haben wir die ebenfalls in beiden Geschlechtern geschwänzten fast monomorphen Arten der *Godeffroyi*-Gruppe anzusehen, deren zwei auf die Samoa-Inseln beschränkte Arten, *P. Godeffroyi* Semp. und *P. Schmeltzi* Herr.-Schäff., C. und R. Felder noch unbekannt waren.

Die ursprünglichste Form stellt das Weibchen von *P. Godeffroyi* dar, welches auf den Vorderflügeln in der schwarzen Hauptfärbung noch den ausser der Zelle gelegenen Theil einer weissgelben Mittelbinde trägt, die sich auf die Hinterflügel fortsetzt und hinten von einer entwickelten gezackten blauen Submarginalbinde und einer durchlaufenden Reihe rother Marginalmonde begrenzt wird.

Die Raupen beider Arten sind nach Matthew denjenigen der nordamerikanischen *Tenaris*-Gruppe ähnlich und leben auf Aralien.

Von den grossen ungechwänzten Repräsentanten der *Hecataeus*-Gruppe erinnert *P. Hecataeus* Godm. u. Salv. (Salomons-Inseln) in den grossen queren Aussenzelltüpfeln der Vorderflügel, die bei dem Weibchen manchmal eine kontinuierliche Reihe bilden, an die *Amphiarus*-Gruppe. Hier unterscheidet sich das stärker aufgehellte Weibchen von dem anderen Geschlecht durch die erweiterte, nur das erste Drittel der Zelle freilassende Mittelbinde der Hinterflügel, ohne jedoch mimetisch zu sein. Doch dürfen wir diese Abweichung als von Seite des Weibchens ausgegangen und als erste Grundlage einer mimetischen Anpassung ansehen. Hierher gehört wohl auch der stärker verdunkelte, auf den Vorderflügeln höchstens mit einigen subapicalen Bindentüpfeln gezierte *P. Orítas* S. u. G., dessen Weibchen in der Färbung noch dem Männchen gleicht, aber zugleich durch die vollkommene Ausbildung der Zeichnungen an die Stammformen der Gruppe erinnert, von denen das Männchen sich durch Verdunkelung der Binde-monde etc. entfernt.

Hieran schliesst sich die mit einem zahnförmigen Schwänzchen der Hinterflügel versehene *Gambrius*-Gruppe, welche ich Felder's Subsection E und Wallace's *Erechthos*-Gruppe gleichsetze. Diese Gruppe ist in allen ihren Arten durch eine weitgehende Aufhellung des Weibchens unterschieden, welche aber bei keiner Art den Typus der Vorläufer rein zu wiederholen scheint, sondern stets mit meist unvollkommenen Anpassungen an die *Morphidea*-Gattung *Tenaris* oder die *Papilionidea*-Gattung *Eucaris* oder die *Polydorus*-Gruppe der Aristolochientaler verbande ist.

Eine der ursprünglichsten Formen der Gruppe dürfte der riesige, im Aussterben begriffene *P. Gambrius* Cr. (Amboina, Ceram) darstellen, da bei ihm das Männchen auf der Unterseite der Hinterflügel noch eine undeutliche Reihe von Tüpfeln der Mittelbinde trägt, während die Marginalmonde allerdings bis auf den im achten Randfelde erloschen sind. Auch bei dem viel grösseren und selteneren Weibchen (*Drusus* Cr.) treten die Marginalmonde unten zwar regelmässig auf, aber nur schwach hervor, dagegen ist die blaue Submarginalbinde in breitem, dunklem Grunde auf beiden Seiten deutlich und hat die Mittelbinde der Hinterflügel eine etwas gelbliche Färbung angenommen. Auf den Vorderflügeln ist das Ende der Zelle und eine breit entwickelte, durch die Rippen zertheilte, fast den Aussenrand erreichende Binde weisslich. So tritt eine gewisse oberflächliche Aehnlichkeit des Weibchens mit *Tuaris*-Arten entgegen, die allerdings erst sehr gering ist, sich aber in den abgeleiteteren Formen steigert.

Eine weitere ursprüngliche Form dürfte *P. Erechtheus* Don. aus Australien darstellen, dessen Männchen ebenfalls noch eine weisse Subapicalbinde auf den tief schwarzen Vorderflügeln trägt, auf der Unterseite der Hinterflügel dagegen noch zwei vollkommen entwickelte Reihen von rothen Marginal- und blauen Submarginalmonden, aber keine Mittelbinde mehr besitzt, während auf der Oberseite ein weissgrüner zackiger Spiegel⁴⁾ hervorleuchtet. Das oft kleinere Weibchen (*Aegus* Don.) trägt auf den Vorderflügeln eine breitere, ausserhalb der Zelle gelegene, aussen etwas rauchbraun verunkelte Binde und den Rest einer solchen vor dem Zellende. Auf den Hinterflügeln geht die weissliche Mittelbinde über das Zellende und legt sich an sie eine breite Randverdunkelung an, in der man die Reihe der blauen Submarginalmonde und die im zweiten bis siebenten Randfelde abgetrennten rothen Marginalmonde oben und unten unterscheiden kann; im verkürzten achten Randfelde legt sich der Submarginalmond auf den marginalen. Durch die Aufhellung der Vorderflügel, die Lage der Hinterflügelmittelbinde, die ungleichmässige Ausbildung der Marginalmonde und die gelbe Behaarung der Hinterleibsspitze erinnert das Weibchen ganz unbedeutend an *Euryeus Cressida* Bsd.

Bei *P. Ornaeus* Guér. (Waigiou) bildet Wallace drei verschiedene Weibchenformen ab; so ist diese Art von besonderer Wichtigkeit für eine Erkenntniss der Entstehung mimetischer Umbildungen. Das dem Männchen ähnlichste Weibchen, l. c. Taf. III, Fig. 1, trägt auf der Oberseite eine etwas breitere Subapicalbinde der Vorder- und eine schmalere, gegen die Enden verengte, aussen mehr convex abgerundete Mittelbinde der Hinterflügel. Mehr als die Oberseite weicht von der des Männchens die Unterseite dieses Weibchens ab und zwar zeigt sie eine ursprünglichere Regelmässigkeit der Zeichnung, normal entwickelte rothe Marginal- und blaue Submarginalmonde und eine wenigstens vom siebenten bis dritten Randfelde entwickelte Mittelbinde; bei dem Männchen sind dagegen durch zunehmende Verdunkelung alle Marginalmonde bis auf den im Analfelde überdeckt und erhalten sich die Submarginalmonde nur vom siebenten bis fünften Randfelde. So erinnert das erwähnte Weibchen, bei dem sich die Subapicalbinde auch bis zum Innenrande der Vorderflügel fortsetzt, in der Zeichnung durchaus an Formen, welche *P. Godeffroyi* Semp. noch näher standen. Die beiden Weibchenformen aus Waigiou, welche Wallace l. c. Fig. 3 und 4 abgebildet hat, zeigen schon die Anlage zu der mimetischen Anpassung einerseits an *P. Polydorus* L., andererseits an *Tuaris (Drusilla) biculata*. So entsteht bei dem ersten Weibchen (l. c. Fig. 3), das ich als var. *Polydoriina* bezeichne, eine Aufhellung vor dem Ende der Vorderflügelzelle, während sich die Aussenzellbinde fast bis zum Aussenrande ausdehnt; ebenso treten auf der Oberseite der Hinterflügel

⁴⁾ Dieser Spiegel ist aus der Umbildung der Mittelbinde auf der Oberseite der Hinterflügel hervorgegangen.

die Submarginalmonde zurück, die dunkelrothen Randmonde dagegen stark vor. Die zweite Weibchenform (l. c. Fig. 4), *Amanga* Bsd., entsteht dadurch, dass die Vorderflügel sich in der durch var. *Polydorina* angedeuteten Richtung weiter aufhellen. So bleibt nur der Vorderrand näher der Basis und schwächer der Aussenrand verdunkelt. Auf den Hinterflügeln erbleichen die Marginalmonde zu blassen Tüpfeln, die nur im achten und zweiten bis dritten Randfelde noch orangegebb sind; ebenso verdunkelt sich das Submarginalband und lässt sich durch zunehmende, längs der Rippen verlaufende Aufhellung in längliche Flecke zerschneiden. Weiter setzt sich die bei var. *Polydorina* schon entwickelte Mittelbinde bis zum Innenrande fort, lässt aber die Basis und das scharf abgegrenzte zweite Randfeld dunkel. So entsteht eine schon stark an *Tenaris*-Arten mit gelben Hinterflügeladgen erinnernde Weibchenform.

Ähnlich sind bei *P.* (var.?) *Pandion* Wall. (Neu-Guinea etc.), welcher *P. Ormeus* sehr nahe steht, zwei Weibchen entwickelt, deren erstes nach Wallace (l. c. p. 56) an *P. Ormeus* var. *Polydorina* erinnert, aber zugleich wie *P. Erechtheus* ♀ eine vollständige Reihe von Submarginalmonden auf der Unterseite der Hinterflügel trägt. Die zweite Weibchenform besitzt Vorderflügel wie die zu *Ormeus* ♀ *Amanga* gehörige Form *Oncosimus* Hew. und gelbweisse Hinterflügel, deren zweites Randfeld verdunkelt ist, während in der bis zu ihm reichenden Aufhellung das theilweise in blaugekernte Augenflecke aufgelöste Submarginalband und die äussersten gelblichen Randmonde auf der Oberseite hervortreten. So erinnert diese Weibchenform an *Tenaris*-Arten. Die Hinterflügel bilden sich nun im Anschluss an die bei dem Männchen besprochene Artzeichnung zuerst auf der Unterseite dadurch um, dass die Randmonde sich etwas ausdehnen, erblässen und auch oben vortreten, und dass vor Allem die Mittelbinde sich anscheinend von hinten nach vorn erweitert, da ein Theil des Vorderrandes schwarzbraun bleibt. Zugleich verdunkelt sich das Submarginalband auf der Oberseite, und es treten nur wenige grosse und blaue runde Monde im sechsten bis siebenten Randfelde der Oberseite auf, welche bei *T. bioculata* Guér. ebendort entwickelt sind.

Das Männchen von *P. Tydeus* Feld. (Batjan, Gilolo) ist oben auf den Vorderflügeln mit Ausnahme der Subapicalbinde, auf den hinteren mit Ausnahme des aussen gebuchteten durchgehenden Spiegels tief schwarz. An der Unterseite der Hinterflügel liegen noch die Reste einer Mittelbinde, entwickelte blaue Submarginalmonde vom zweiten bis siebenten und orangene Marginalmonde, die hinten meist eckig erweitert sind. Dagegen zeigt die einzige bekannte Weibchenform schon eine ausgebildete mimetische Anpassung an *Tenaris (Drasilla)* und zwar nicht mehr an die Gattung im Allgemeinen, sondern an die charakteristische *T. bioculata* Guér., die überhaupt Gegenstand vielseitiger Nachahmung ist. Diese Ähnlichkeit wird dadurch erreicht, dass sich die Vorderflügel in der Mitte besonders gegen den Hinterrand aufhellen und am Vorder- und Aussenrande eine aschgraue Färbung annehmen.

Auch bei *P. Adrastus* Feld. (Banda), dessen Männchen auf der Unterseite der Hinterflügel noch eine entwickelte Reihe von Marginal-, vom fünften bis siebenten Randfelde blaue Submarginal- und einzelne Innenmonde trägt, treten zweierlei Weibchen auf. Das eine von ihnen (Wallace, l. c. Taf. IV, Fig. 1) gleicht mehr dem Männchen und erinnert zugleich an die Grundformen der Gruppe, da es eine bis zum Hinterrande reichende Aussenzellbinde der Vorderflügel und drei Hinterflügelbinden besitzt, deren eine, die Mittelbinde, an den Enden abgekürzt, aber noch oben theilweise sichtbar ist. Weiter entstand in zunehmender Aufhellung der Vorderflügel und Verdunkelung der Submarginalmonde der Hinterflügel die schwächere Weibchenform, welche C. Felder in der Novara-Reise (Taf. XVI, B) abbildet. Bei dieser ist die dunkle Flügelgefärbung aus Schwarz in dunkles Graubraun übergegangen; die Hinterflügel sind nur gegen das Zellende aufgehellt und diese Aufhellung verläuft ganz allmählig. Die auffallend

grossen orangerothen Marginalmonde, die oben kräftig vortreten, rufen eine oberflächliche Aehnlichkeit mit dem Aristolochientalter *P. Polydorus* L. hervor.

Hierher gehört auch wohl *P. inopinatus* Butl. (Timorlaut), dessen Männchen nur noch in den äussersten Randfeldern der Hinterflügel Monde besitzt, während dieselben bei dem Weibchen auf der Oberseite auffallend gross und leuchtend hervortreten, sodass auch hier eine gewisse Aehnlichkeit mit *P. Polydorus* L. entsteht, die durch die breite Vorderflügelbinde noch verstärkt wird.

Als ebenfalls zur *Ormenus*-Gruppe gehörige, allerdings durch geringere Grösse abweichende Form sehe ich den von C. und R. Felder wegen seiner fast vollkommen abgerundeten Hinterflügel in die besondere Subsection D gestellten *P. Ambrax* Bsd. (Batjan, Neu-Guinea) an. Schon das Männchen kennzeichnet sich durch die apicale Aufhellung der sammet-schwarzen Vorderflügel und den breiten nur auf der Oberseite der Hinterflügel entwickelten Spiegel als der *Ormenus*-Gruppe zugehörig, deren Ansläufer diese Art bildet. Es kommen hier anscheinend nur mimetische Weibchen vor, welche aber selbst in engeren Grenzen variiren und besonders durch die höhere Ausbildung (var. *Ambracia*, Kaiser-Wilhelmsland) oder Unterdrückung (Amboina) des weissen Spiegels am Aussenrande der Vorderflügel meist denjenigen Varietäten von *P. Polydorus* gleichen, welche mit ihnen zusammen vorkommen. Die abgekürzte, grade das Zellende noch umfassende weisse Mittelbinde der Hinterflügel ist am Innenwinkel roth gefärbt, und somit wohl mit den Submarginal- und im achten Randfelde auch mit dem Marginalmonde verschmolzen. Sonst treten die unten normalen Randmonde nur vom fünften Randfelde an auch oben hervor, und wird damit die Aehnlichkeit des Weibchens mit dem *P. Polydorus* noch verstärkt. Ihren Höhepunkt erreicht die Verkümmernng der Form in der var. *minor* Honr., die nur 55—57 mm spannt, im Weibchen aber ebenfalls *P. Polydorus* L. gleicht.

Als peripherische, eine eigene Gruppe bildende Form, welche mit der *Ormenus*-Gruppe am nächsten verwandt ist, sehe ich den von Felder zum Repräsentanten seiner Section LXI gemachten monomorphen, stark an *P. Erechtheus* ♀ (*Aegeus*) erinnernden *P. Anactus* Macleay an. Derselbe zeichnet sich durch die Kürze der Antennen und ihre dickere Keule, die starke Behaarung des Kopfes, die schmäleren Vorderflügel mit ausgezogenem Vorderwinkel, die kürzeren Hinterflügel und breitere Mittelzelle der letzteren aus. Die Zeichnung der Vorderflügel ist sehr ausgebildet. So liegen in der Vorderflügelzelle eine schmale terminale und eine grössere mittlere Aufhellung; so zieht sich ausserhalb der Zelle eine entwickelte, oben mehr erloschene und unregelmässige Mittelbinde hin, an welche sich eine ungleichmässig ausgebildete Marginaltüpfelreihe anschliesst. Im Gabelfelde liegen somit z. B. drei Tüpfel, die je der Mittel-, Submarginal- und Marginalbinde entsprechen dürften; dagegen ist im dritten Randfelde die Mittelbinde getheilt, im sechsten bis siebenten auf die Hälfte verengt. Wie die basale Verdunkelung, setzt sich auch die Mittelbinde der Vorderflügel auf die hinteren fort und verbreitert sich vom dritten Randfelde an so stark, dass sie weit die Zelle umgreift, deren Ende ein breites Terminalband kennzeichnet, das wohl dem letzten Zellbände der Vorderflügel entspricht. Dagegen ist die Ausbildung der sonstigen Hinterflügelzeichnung sehr eigenartig. So sind die Randmonde unten unregelmässig entwickelt, der achte sehr gross und an den Saum gerückt, der sechste und siebente nach aussen verschoben, der zweite und dritte weiss gefärbt. Von ihnen treten nur die rothgefärbten vierten bis achten oben hervor; ebenso ist die Submarginalbinde im zweiten bis dritten Randfelde nicht unterscheidbar. So werden wohl das zweite und dritte Randfeld der Hinterflügel-Oberseite im Fluge andauernd von den Vorderflügeln gedeckt und dadurch eine bedeutende Verschmälerung der freien Hinterflügelfläche bewirkt. Ebenso werden die kurzen Fühler, die orangenen

Palpen und Vorderhüften, die lebhaft orange-gelben Flecke an der Rückenbasis, die gelbe Färbung des Hinterleibes, die grau bestäubten Aufhellungen der Vorderflügel, welche glasige Stellen der Membran vortäuschen, die anscheinend schmalen Hinterflügel mit fünf dunkelrothen Randmonden und stark nach innen vordringender weiss leuchtender Mittelbinde dazu beitragen, dieser seltenen Art in beiden Geschlechtern eine noch grössere, schon von C. und R. Felder (l. c. p. 369) erwähnte Aehnlichkeit mit *Euryeus Cressida* F. zu geben, als *P. Errechtheus* ♀ sie besitzt.

Dem *P. Anactus* steht wohl auch der *P. Alcidius* Butl. (Aruinseln) näher, welcher wie der nahe verwandte *P. Laglaizei* Deyr. (Nen-West-Guinea) dem weiter verbreiteten Uraniden *Alcidis Orontes* Feld. (*Nyctalemon Agathyrus* Kirsch) auffällig gleicht. Die Zeichnung der Vorderflügel, deren Form an *P. Anactus* erinnert, besteht aus einer oben schmälere apicalen Binde und einer auf der Unterseite bis zur Basis reichenden Aufhellung, die durch ein kurzes Terminal- und ein dem von *P. Anactus* entsprechendes, etwas über die Zelle verlaufendes viertes oder fünftes Zellband durchschnitten wird, während oben der basale Theil innerhalb des Letzteren verdunkelt ist und von der breiten Mittelbinde nur ein schmälere, vom Zellende bis zum Innenrande verlaufender Rest übrig bleibt. Sowohl die basale grünschwarze Verdunkelung als die grünweisse Mittelbinde setzen sich auf die Oberseite der Hinterflügel fort, und um das deutliche Schwänzchen herum hellt sich auch der Aussenrand hellgrün auf. Auf der Unterseite der Hinterflügel treten bei beiden Arten die letzten fünf Marginalmonde als gelbe Tüpfel hervor, die aussen schwarz begrenzt sind. Das Submarginalband ist durch eine ziemlich regelmässige Reihe schwarzer, im vierten bis siebenten Randfelde gedoppelter Keilflecke, die Mittelbinde durch einen länglichen orange Fleck im achten Randfelde vertreten, der die gelben Flanken der *Uranide* vortäuscht. Am Kopf stehen wie bei der *Ormenus*-Gruppe einzelne weisse Flecke, dagegen ist der Leib oben grünlich-grau, seitlich aschfarbig aufgehellt. Vielleicht bilden beide unterschiedene Formen, welche ich nie mit einander vergleichen konnte, nur eine Art.

Auf Arten, welche sich wie die der *Goleffroyi*-Gruppe durch gleichartige Färbung und Zeichnung in beiden Geschlechtern, den Besitz eines spathelförmigen Hinterflügelschwanzes und einer breiten, weissen, durchgehenden Aussenzellbinde der Vorderflügel auszeichnen, dürfen wir einige kleinere Formen mit beiderseits erhaltener Vorderflügelbinde zurückführen, so *P. Canopus* Westw. (Australien) und *P. Hypsibolus* Hew. (Nen-Caledonien). Dieselben geben sich aber dadurch zugleich als Seitenzweige des Stammes zu erkennen, dass ihre Marginalmonde wenig oder nicht, die Submarginalmonde nur theilweise auf der Oberseite der Hinterflügel hervorleuchten. Von ähnlichen Formen, bei welchen die Marginal-, Submarginal- und Mittelbinde der Hinterflügel unten ganz regelmässig vom zweiten bis achten Randfelde ausgebildet sind, oben dagegen theilweise fehlen, dürfte *P. Cupaneus* Westw. (Australien) noch der Stammform näher stehen, obwohl die oben normal ausgebildete Vorderflügelbinde auf der Unterseite stark abgekürzt ist. An ihn schliessen sich die grossen übrigen Formen der *Severus*-Untergruppe an, bei welchen die Mittelbinde der Hinterflügel auf der Oberseite am Innenrande abgekürzt ist und wie bei den Männchen der *Gambrisius*-Gruppe in beiden Geschlechtern einen Spiegel bildet. Die ursprünglicheren Formen zeichnen sich aber noch an der Unterseite durch den Rest der Vorderflügelbinde, die durchgehende Mittel-, Submarginal- und Marginalmondreihe der Hinterflügel aus, so *P. Severus* Cr. (Moluccen).

Als abgeleitete Art ist *P. Helenus* L. (Philippinen, Celebes, Malacca) anzusehen, dessen verschiedene Varietäten manchmal die Continuität der Mittelbinde auf der Unterseite der Hinterflügel erhalten zeigen (var. *Proxaspes* Feld., *Isvara* White, Malacca), während sie bei anderen (var. *Hustaspes* Feld.,

Philippinen) im siebenten bis achten Randfelde mit Marginal- und Submarginalbinde zu einem rotgelben Tüpfel verschmilzt.

Durch vollkommene Verdunkelung der Vorderflügel und Beschränkung des Spiegels zeichnet sich *P. Chaon* Westw. (Nordindien) aus, bei dem die Submarginalmonde erloschen sind. Letztere fehlen auch bei *P. Nephelus* Bsd., dessen Subapicalbinde wie der Innenwinkeltüpfel an der Unterseite der Vorderflügel auf Reste einer durchgehenden Aussenzellbinde zurückzuführen sind und wie die nur unten deutlichen Randmonde eine weisse Farbe angenommen haben.

Castor 63

Aus einer verwandten Form ging wohl der auch von C. und R. Felder zur Section LX gestellte *P. Castor* Westw. (Nordindien) mit dem mimetischen Weibchen *Pollux* Westw. hervor¹⁾, dem sich *P. Mehala* Moore (Burmah) anschliesst. Das Männchen von *P. Castor* erinnert in dem Spiegelfleck der Hinterflügel durchaus an *P. Chaon* Westw., dagegen in dem weissen Tüpfel im zweiten Randfelde der Hinterflügel über der Zelle und den weissen Tüpfeln des Hinterleibes eher an *P. Nephelus* Bsd. und ist somit jedenfalls von der *Securus*-Gruppe abzuleiten. Das Weibchen trägt viel vollkommener abgerundete Hinterflügel als das Männchen; weiter ist eine bei Letzterem vorn abgekürzte Reihe von Randtüpfeln auf den Vorderflügeln bei dem Weibchen normal und deutlich entwickelt. Ebenso ist die Tüpfelreihe der Mittelbinde der Hinterflügel bei den Weibchen gegen die Basis derselben erweitert und bis zum Innenrande fortgesetzt. Solche Aufhellungen kommen auf den Vorderflügeln nur auf der Unterseite ausserhalb der Zelle vor, während die der Hinterflügel auch auf der Oberseite hervortreten. So entsteht eine unvollkommene Aehnlichkeit des Weibchens mit *Danaiden*, besonders dem Weibchen von *Danaus (Tirumala) Limnace* Cr., die noch besonders durch die zahlreichen Reihen weisser Tüpfel des Hinterleibes vermehrt wird, deren jederseits eine subdorsal und eine suprastigual, und weitere drei auf der Bauchseite liegen, also sieben vorkommen, zu denen noch die weissen Stigmen in dem schwarzen Stigmalstreif treten.

Bei *P. Mehala* Moore trägt das Männchen auf den dunkelbraunen Vorderflügeln nur den weissen Zellrandtüpfel und auf den Hinterflügeln ausser schmalen gelben Marginalmonden eine durchgehende, innen schmale Mittelbinde, das Weibchen dagegen auf den Vorderflügeln eine submarginale Tüpfelbinde und eine an *P. Pollux* erinnernde, nach innen erweiterte Hinterflügel-Aufhellung.

Panope 31

Wahrscheinlich steht auch die Gruppe der *Euploea*- und *Danaiden*-Nachahmer²⁾, welche Felder's Section XXVII entspricht, durch Formen wie *P. Panope* L. (Nordindien etc.) mit dieser Gruppe in Verbindung. Wie bei dem Männchen von *P. Castor* Westw. sind die Saamtüpfel und Randmonde im sechsten Randfelde der Vorderflügel gedoppelt, was man als ein Zeichen einer durch Rückschlag entstandenen Reproduction ansehen muss, da es bei *P. Nephelus* Boisd. und *Chaon* Westw. und den übrigen Formen der *Canopus*-Gruppe nicht vorkommt. Ebenso tragen die Hinterflügel in jedem Randfelde einen deutlichen Saamtüpfel und einen Randmond, der als eine weitere Ausbildung der bei *P. Castor* ♀ vorhandenen Zeichnungselemente erscheint, indem die Saamtüpfel sich verbreitern und wie der Mond im achten Rand-

¹⁾ Gegen die neuerdings wieder von englischen Autoren vertretene Behauptung, dass *P. Castor* und *P. Pollux* zwei Arten angehören, führe ich ausser dem bekannten Felder'schen Zwitter noch die Angabe des Herrn Mewes (Darjeeling) an, dass er beide aus gleichen Puppen zog und in Copula fand. Sollten *Pollux*-artige Männchen in der That vorkommen, so haben wir darin, wie in anderen Fällen der Mimicry, nur einen Entwicklungsfortschritt in der Anpassung zu sehen, indem die vortheilhafte Aehnlichkeit mit *Danaiden* sich vom Weibchen auch auf das Männchen vererbte.

²⁾ Die für diese Gruppe charakteristische Verlängerung des achten Randfeldes der Hinterflügel dürfte wie die Erweiterung des Innelfeldes das Product einer secundären Anpassung an die Aehnlichkeit mit *Danaiden* sein.

felle eine orangene Farbe annehmen. Zugleich bildet sich neben den Randmonden am Vorderrande der Vorderflügel eine submarginale Tüpfelreihe aus, die *P. Castor* ♀ noch fehlt, während der helle Zellrandtüpfel mit einigen Tüpfeln der Mittelbinde der Hinterflügel durch Verdunkelung schwindet.

Während *P. Panope* an braune *Euploen* mit vereinzelt hellen Ausserandtüpfeln, wie *E. Core* L. und *E. Godartii* Luc. erinnert, gleicht *P. Clytia* L.¹⁾ (mit *dissimilis* de Haan) durch Ueberwiegen der weisslichen intercostalen Färbung gewissen hellen *Danaiden* der Untergattung *Radema* Moore, wie *D. similis* L. Zu den bei *P. Panope* L. erwähnten Aufhellungen kommt auf den Vorderflügeln weiter noch eine sich um die Zelle herumlegende Mittelbinde hinzu, die im dritten bis siebenten Randfelde durch Verdunkelung in Tüpfel zerschnürt wird. In der Mittelzelle tritt dagegen eine näher dem Ende gelegene Binde auf, während sich durch die Basalhälfte vier weisse Längsstriche erstrecken. Auf den Hinterflügeln verlängern sich die bei *P. Panope* angedeuteten Aufhellungen der Mittelbinde bis an die Basis und heben sich nur die schwarzen Rippen und einige schwarze Streifen in der Mittelzelle in der weissen Hauptfarbe hervor, wie wir es auch oft bei den *Danaiden* antreffen. Zugleich wird der Hinterleib durch das Verfließen der Tüpfel von je zwei seitlichen weissen Binden durchzogen und leuchten auch die weissen Nacken- und Brusttüpfel mehr hervor.

Auf *Panope*-ähnliche Formen ist auch *P. Palephates* Westw. (Luzon) zurückzuführen, der ebenfalls braunen *Euploen* gleicht, sich jedoch im achten Randfelde der Hinterflügel durch das Zusammenfließen des Marginalmondes mit dem Saumtüpfel auszeichnet.

Durch weitere Verdunkelung entstanden Formen mit einfarbig düsterem Braun und kaum erkennbaren Aufhellungen der Hinterflügel, wie *P. Hewisonii* Westw. (Borneo), deren leuchtend orangerother Fleck im Aachfelde sie fast allein im Fluge noch von dunklen *Euploen* (*E. Menitriesi* Feld.) unterscheidet. Ein schönes Analogon dazu ist *P. Slateri* Hew. (Java), der in seiner tief metallblauen Färbung dem Männchen der *Euploea Linnaci* Moore ebenfalls noch bis auf den orangenen Tüpfel im achten Randfelde gleicht.

Aus Formen mit wenig ausgebildeten Saum- und Marginalmonden, welche wohl an *P. Astrea* Horsf. (Java) erinnerten, die einer kleinen braunen *Euploea* mit einzelnen weissen Randtüpfeln gleicht, gingen die zahlreichen variablen Formen des *P. Paradoxus* Zinck. hervor, welche sich jedesmal den verschiedenen Arten der *Euploen* anpassen, welche an dem gemeinsamen Aufenthaltsort am häufigsten sind.

Während das Weibchen von var. *Zawoa* Butl. (Malacca) durch weitere intercostale Aufhellung dem Weibchen von *Euploea Linnaci* Moore (= *Clytia* L.) gleicht, bildete sich bei dem Weibchen von var. *Telesicles* Feld. (Borneo) mit schmälere[n] Flügeln am Vorderrande der Oberseite der Vorderflügel der herrlich blaue Glanz aus, welcher die Männchen der schönen *Euploea* kennzeichnet, die häufiger als die Weibchen sind und viel mehr durch ihren herumirrenden Flug auffallen. So erinnert var. *acutigena* Westw. (Borneo) in dem einfacher gefärbten Weibchen an die Männchen brauner *Euploen* der Untergattung *Salpinx*, deren hinten erweiterte eigenthümliche Vorderflügelform²⁾ es sogar wiedergiebt. Zugleich erweiterte sich das Innenfeld und kam dadurch eine Flügelentfaltung zu Stande, welche von der bei *Papilionen* gewöhnlichen abweicht und den Leib, der sonst frei ist, von unten her umschliesst. Die stark

¹⁾ Nach der Ansicht neuerer indischer Lepidopterologen gehören *P. Panope* und *Clytia* vielleicht zu einer Art und lebt die helle Form besonders im Osten des Verbreitungsgebietes. (Journ. As. Soc. Beng. 1886, p. 433.)

²⁾ Diese Erweiterung des Hinterrandes der Vorderflügel bei *Salpinx* wird durch die hohe Entwicklung des Dattschuppenpfegels auf der Oberseite der Hinterflügel bedingt und dient zur Bedeckung des letzteren.

verdunkelten Männchen gleichen durch die tief rauchbraunen, kaum getüpfelten Hinterflügel und den herrlichen Blauschiller der verschieden schwach aufgehellten Vorderflügel wiederum den Männchen von *Euploea Linnaei* Moore.

Aus stärker aufgehellten Formen, die an *P. Clytia* L. erinnerten, gingen wohl die hellen, ebenfalls *Danaiden* gleichenden Formen mit kürzeren Fühlern hervor, von denen der kleine *P. epyrides* Hew. (Sikkim), der noch einen auffallenden orangenen Analtüpfel auf den Hinterflügeln besitzt, an *Danaus similis* L. erinnert. Auch der ebenfalls stark aufgehellte grössere celebensische *P. Vicioris* Hew., den Kirby nach dem Vorgange von Wallace zwischen Angehörige der Segelfalter stellte, gehört hierher. Bei ihm ist besonders das Weibchen sehr durchsichtig und in der Vorderflügelzelle schneeweiss aufgehellt; das Analauge ist oben schon durch Aufhellung erloschen. So erinnert diese Form etwas an *Danaus Ismare* Cr. (Celebes).

Durch weitere Ausbildung der mimetischen Anpassung fällt das Analauge ganz fort. Zugleich bildet sich die Aehnlichkeit mit bestimmten *Danaiden* noch stärker aus. So erinnert *P. Gocindra* Moore (Himalaya) durch die braune Färbung der Hinterflügelrippen ausserhalb der Zelle und auf der Unterseite schon an *Danaus Tytius* L., welche Aehnlichkeit bei *P. Agestor* Gray (Sikkim) den höchsten Grad erreicht.

Dem bei dieser Art gleichen in beiden Geschlechtern die Vorderflügel durch die zarte blaugraue Bestäubung ihrer Aufhellungen täuschend den fast glasigen durchsichtigen Stellen des Vorderflügels von *Danaus Tytius* und haben auch die Hinterflügel eine diffusere rothbraune Färbung angenommen, während die weissen Querringe des dunklen Hinterleibes noch an *P. Gocindra* Moore erinnern.

Um wieder auf die *Capaneas*-Gruppe zurückzugreifen, so sehe ich *P. Vollenhovi* Feld. (Timor) mit äusserst kurzem Schwänzchen, über beide Flügel laufender Aussenzell- und rückgebildeter Submarginalbinde der Hinterflügel als letzten Ausläufer einer an *P. Hypsicles* Hew. (Neu-Caledonien) erinnernden Form an, während Arten wie *Hipponous* Feld. (Luzon) zu der *Panmon*-Gruppe überführen dürften, welche aus den durch den mimetischen Polymorphismus ihrer Weibchen ausgezeichneten, von Wallace zuerst genauer unterschiedenen Formen ¹⁾ *P. Panmon* L., *P. Theseus* Cr., *P. Alphenor* Cr. und *P. Nicanor* Feld. besteht, unter denen die Männchen der beiden letzten Arten fast oder ganz schwanzlos sind.

Daher sehe ich den auf das indische und chinesische Festland, Malacca und Ceylon beschränkten *P. Panmon* L. der in beiden Geschlechtern constant geschwänzt ist, als der Grundform am nächsten stehend an. Die weissen Nageltüpfel am Aussenrande der normalen Vorderflügel sind dieser Gruppe eigenthümlich und entsprechen wohl einer Verlängerung der Saumtüpfel; auch hier sind sie im sechsten Randfelde wie bei *P. Hipponous* gedoppelt.

Von den verschiedenen Weibchen von *P. Panmon* entsprechen einige nun fast durchaus den Männchen (Wallace, l. c. Taf. II, Fig. 3), nur ist ihre Grundfarbe weniger tief verdunkelt. So tritt auf der Oberseite des achten Randfeldes der Hinterflügel noch Rand- und Submarginalbinde hervor und ist erstere auf der Unterseite orangeroth, statt, wie bei dem Männchen, weisslich.

Eine weitere Weibchenform entsteht durch zunehmende Aufhellung der Hinterflügel, indem alle unten angelegten Randmonde auch auf der Oberseite orangeroth auftreten, während zugleich die Submarginalbinde sich in zerstreute Blauschuppen auflöst.

¹⁾ Vielleicht bilden *P. Panmon*, *Theseus*, *Alphenor* und *Nicanor* nur eine Art.

Vergl. Taf VII.

Vollenhovi-cr.

Panmoni-cr.

Aus diesen Formen, die wir als rückgeschlagen bezeichnen müssen, entsteht nun durch Umbildung der gegebenen Binden die mimetische Anpassung. Die Vorderflügel verschmälern sich am Aussenrande und zacken sich zugleich seicht aus: so werden die Nageltüpfel zu gewöhnlichen schmalen Saummonden reducirt. Zugleich bildet sich ausserhalb der Zelle eine von hinten theilweise in letztere eindringende, durch die dunklen Rippen und Intercoastalstreifen durchbrochene Aufhellung der Mittelbinde wie bei den Aristolochienfaltern der *Jophon*-Gruppe. Weiter bilden sich auf den Hinterflügeln die Marginalmonde weiter aus, und auch die Limbaltüpfel nehmen eine orangerothe Farbe an. Endlich wird durch zunehmende Verdunkelung des zweiten und dritten Randfeldes die Mittelbinde vorn abgekürzt, während sie sich sonst bis über das Zellende ausdehnt und im siebenten Randfelde am Hinterende, im achten aber sich vollständig orangeroth färbt.

Dieser einfacheren Grundform steht noch die auf dem Festlande häufigste Weibchenform, ♀ *Polytes* L., am nächsten, welche an den *P. aristolochiae* L. erinnert und sich ihm speciell durch die Verbindung der Mittel- mit der Marginalbinde des achten Randfeldes anpasst, die einen grösseren rothen Analtüpfel vortäuscht.

Die ursprünglichere Zeichnung dieses Feldes erhält sich dagegen bei *Polytes* var. *ceylonicus* (Ceylon), welcher auch die stärkere mehr grauweisse Aufhellung der Vorderflügel durchmacht, wie die Ceylon-Varietät desselben Aristolochienfalters.

Eine dritte mimetische Varietät des Weibchens entsteht durch einseitige noch weitere Aufhellung, die sich auf einen ausserhalb der Zelle gelegenen und auf den innersten Theil der Vorderflügelbinde erstreckt. Zugleich verdunkeln sich die Hinterflügel und nimmt die mit dem Marginalmonde des achten Randfeldes vollkommen verschmolzene Mittelbinde eine gleichmässige dunkelrothe Färbung an, die höchstens mit blauen Stäubchen besäet ist. So gleicht diese auf Indien und Ceylon beschränkte Weibchenform besonders dem Weibchen des nur hier vorkommenden Aristolochienfalters *P. Hector* L., einer immunen Art mit abgekürzter Subapical- und durchgehender Mittelbinde der stark gezähnelten Vorderflügel und etwas blau glänzenden Hinterflügeln, die zwei rothe Mondreihen parallel dem Aussenrande ausserhalb der Zelle tragen. Wie ihr Modell hat auch diese den *P. Hector* L. nachahmende weibliche Varietät dünnere Hinterflügelschwänze als die übrigen mimetischen Weibchen. Die grosse Aehnlichkeit beider Formen täuschte selbst einen de Haan, der *P. Ronulus* als das Weibchen von *P. Hector* bezeichnete.

Statt des Schwanzes trägt *P. Theseus* Cr., der auf Java, Sumatra, Timor und Borneo verbreitet ist, nur ein Zähnchen auf den Hinterflügeln. Die am meisten dem Männchen ähnliche Weibchenform besitzt wie *Pannon* L. noch ein kurzes aber deutlich spathelförmiges Schwänzchen, kleinere Limbaltüpfel auf den vorderen Flügeln und auf der Oberseite der Hinterflügel eine schwache bläuliche Bestäubung im achten und neunten Randfelde, die den Submarginalmonden entspricht; auch ist die Mittelbinde schmaler. P. Theseus

Die zweite Form der Weibchen (Wallace, Taf. II, Fig. 4) hat wieder in der Aussenhälfte aufgehellte Vorderflügel, auch oben leuchtend vortretende rothe Marginalmonde und eine centrale Aufhellung der Hinterflügelmitte im fünften bis siebenten Randfelde, die hinten von einer rothen Tüpfelbinde eingefasst wird, welche im achten Randfelde der Vereinigung des Marginal- mit dem Submarginalmonde, im siebenten bis vierten dem letzteren allein entspricht. Dadurch entsteht eine solche Aehnlichkeit dieser auf Java, Borneo, Timor vorkommenden Form mit Aristolochienfaltern (*P. aristolochiae* var. *Diphilus* Esp.), dass dieselbe von de Haan als Weibchen zu *P. Polyphontes* gerechnet wurde.

Dagegen gleicht die auf Java und Sumatra vorkommende Localform des Weibchens ohne Weiss auf den Hinterflügeln (Wallace, Taf. II, Fig. 7), welche von de Haan wieder als Weibchen von *P. Antiphus* F. angesprochen wurde, besonders in den Varietäten, bei welchen die inneren Rothtüpfel sich auf die innersten Randfelder beschränken, durchaus diesem ebendort vorkommenden stark verdunkelten Aristolochienfalter, und ebenso thut dies in geringerem Grade die auf Borneo beschränkte ♀ var. *Melanides* de Haan, bei welcher Marginal- und Mittelbinde zu langen, keilförmigen, rothen Wischen verschmolzen.

Als weitere mimetische Weibchenform erwähne ich noch eine solche aus Timor, var. *Timorensis* Feld. (Coll. Staudinger), welche durch die breite bis in die Zelle gehende Aussenrands-Aufhellung der Vorderflügel und die dunklen Hinterflügel mit vom sechsten bis achten Randfelde deutlichen violettrothen Submarginalmonden und aufgehelltem Zellende an den dortigen Aristolochienfalter *P. Livis* Godt. erinnert.

P. Ledebourius

Der grössere *P. Ledebourius* Esch. besitzt im Männchen keinen Schwanzanhang der Hinterflügel mehr und trägt auf der Oberseite der letzteren nur die breite weissgelbe Mittelbinde, während auf der Unterseite die Submarginalmonde vollkommen erloschen, die Marginalmonde blass und undeutlich sind. Das männchenfarbige Weibchen mit schmalerer Mittelbinde zeigt noch einen deutlichen Zahn am dritten Medianast der Hinterflügel, entwickeltere Marginalmonde als das Männchen, die zum Theil oben hervortreten, und im achten Randfelde einen Rest der Submarginalbinde. So erscheint dasselbe nach Flügel-schnitt, Zeichnung und Schuppenarmuth ursprünglicher als das Männchen, aber doch wohl nur als Rückschlagsform auf die Vorfahren der Art. Diese nach Wallace bisher nur auf den Philippinen beobachtete Form kommt ebenfalls noch an anderen Orten (Ceram etc.) vor (Coll. Staudinger).

Dagegen hat die über Celebes, Baro, Amboina und Ceram verbreitete zweite Weibchenform, *P. Alphenor* Cr., eine über die Vorderflügel verlaufende, besonders nach hinten ausserhalb der Zelle stärker leuchtende Aufhellung, welche an diejenige der Vorderflügel des Aristolochienfalters *P. Polydorus* L. (Moluccen etc.) erinnert. Auf den Hinterflügeln, die ein kurzes Schwänzchen wie Varietäten des Aristolochienfalters tragen, leuchten die Marginalmonde vom zweiten bis siebenten Randfelde einzeln hervor. Im achten sind sie, wie die Submarginalbinde im sechsten, mit der über das Zellende bis in das vierte Randfeld hineinreichenden weissen Mittelbinde verbunden. So gleicht das Weibchen besonders dem im Osten des Archipels vorherrschenden Aristolochienfalter *P. Polydorus* L.

Die dritte Weibchenform (*Elyros* Gray), nach Wallace auf die Philippinen beschränkt, nach O. Staudinger¹⁾ auch auf Palawan beobachtet, hat eine fast ganz schwärzlich verdunkelte Mittelbinde der Hinterflügel und schmale, längere Schwänze; so erinnert sie an den stark verdunkelten Aristolochienfalter *P. Antiphus* F.

Eine vierte Weibchenform aus Celebes, *Alcindor* Oberth., hat auf den Hinterflügeln eine etwas bräunlich verdunkelte Aufhellung, die fast die äussere Hälfte der Zelle einnimmt, und auffällig lange und plumpe Schwänze; so erinnert dieselbe an den Aristolochienfalter *P. Polyphontes* Bsd. (Celebes).

P. Nicamor

Der *P. Alphenor* verwandte, auf die Moluccen beschränkte *P. Nicamor* Feld. endlich, bei dessen Männchen die gelben Marginalmonde der Hinterflügel auch oben vorleuchten, hat nur ein ebenfalls schwanzloses Weibchen, dessen Vorderflügel wieder in der Aussenhälfte intercostal aufgehellt sind und auf dessen Hinterflügeln oben vom zweiten bis siebenten Randfelde die vergrösserten rothen Marginalmonde vortreten, während der kleine weisse Mittelbindenrest wieder innen von den Marginalmonden des

¹⁾ O. Staudinger, Lepidopteren der Insel Palawan. (Corr. ent. Ver. Iris, Dresden, II, 1889, p. 11.)

achten und den Submarginalmonden des siebenten bis fünften Randfeldes roth gesäumt wird. So tritt auch hier eine grosse Aehnlichkeit mit dem *P. Polydorus* L. hervor, wie bei *P. Alpheus* Cr.

Um zu den weiteren Gruppencomplexen der indo-australischen Rimnenfalter überzugehen, so kennzeichnet sich die auf die australische Inselwelt beschränkte *Ulysses*-Gruppe durch den kurzen Stiel der Radialgabel, den bei den Weibchen deutlich vor dem Zellende entspringenden dritten Radialast und die gedoppelten Saumtüpfel im sechsten Randfelde der Vorderflügel, wie durch die breite und kräftige Ausbildung des Innenfeldes der Hinterflügel als einem alten Stamme angehörig, obwohl sie in ihrer Zeichnung, die oben und unten wenig übereinstimmt, den Einfluss tief eingreifender Modificationen erkennen lässt. Der dunkle Leib ist oben mit metallisch grünen Schuppen bespritzt: die Föhler haben eine starke, stumpfe Keule und sind ziemlich lang. Während die langgestreckten Filzstreifen auf der Oberseite der Vorderflügel der Männchen an *P. Gijon* Feld. und an Vertreter der *Severus*-Gruppe zugleich erinnern, ist bei allen Formen die entwickelte Zeichnung der Unterseite schon in den Dienst einer an moderne Blätter erinnernden Schutzfärbung getreten. So erhalten sich von ihr auf der Oberseite nur die blauen Submarginalmonde der Hinterflügel, und dadurch ist diese Gruppe der afrikanischen *Orbazus*-Gruppe vergleichbar.

Die complicirteste Zeichnung der Unterseite zeigt die von C. und R. Felder als Subsection B abgetrennte Untergruppe, deren drei von Felder unterschiedene Formen Kirby in eine Art zusammenzieht. Dieselbe, *P. Montrouzieri* Bsd. (Neu-Caledonien), ist eine nur mittelgrosse Form, besitzt aber doch eine verhältnissmässig längere Vorderflügelzelle als *P. Ulysses* L. Man kann auf der Unterseite der Vorderflügel eine gegen das Ende der Mittelzelle auftretende Zellbinde, eine hinten stark verschmälerte Aussenzellbinde, ein verdunkeltes Submarginalband und eine erloschene Marginalbinde unterscheiden. Auf den Hinterflügeln dagegen läuft eine breite erloschene Mittelbinde über das Zellende, ausserhalb deren ein breites dunkles Zackenband liegt, das dem Inframarginalbande entspricht. So treten zur Bildung der Randaugen mehrere Binden zusammen: die aussen schwarz gerandeten rothen Monde entsprechen der Marginalbinde, die schmalen, blauen, sichelförmigen der Submarginal- und die innen entwickelten erloschenen Aufhellungen der Zwischenbinde. Diese Verschmelzung der Marginal- mit den Submarginalmonden ist für alle mit der *Ulysses*-Gruppe verwandte Formen charakteristisch, wemgleich nicht immer mehr nachweisbar und erklärt das Auftreten der blauen Kernung im rothen Marginalmonde. So müssen wir für letztere hier einen besonderen Terminus, Admarginalmonde, einföhren.

Auf dem Stamme der *Ulysses*-Gruppe nahestehende Formen ist auch die *Peranthus*-Gruppe zurückföhren, welche C. und R. Felder's Section LXVIII entspricht und sich vor der ersteren dadurch auszeichnet, dass die Aussenbinden auf der Unterseite der Hinterflügel noch scharf von einander getrennt und gleichmässiger ausgebildet sind. Daher entspricht die stets vorhandene mittlere, blau gefärbte Binde der Submarginalbinde. Dagegen sind die Zwischenbindenmonde entweder sehr deutlich (*Pericles* Wall., *Lorquinianus* Feld., *Adamantius* Feld.) oder fast erloschen (*Blumei* Bsd.). Meist steht auch hier die Ausbildung der Marginalmonde zu derjenigen der Zwischenbinde in umgekehrtem Verhältniss: so sind erstere bei *P. Blumei* Bsd. sehr gross, bei *Pericles* Wall., *Lorquinianus* und *Adamantius* Feld. dagegen auf undeutliche graue Aufhellungen reducirt. Daher erinnert die Zeichnung der Unterseite von *P. Blumei* Bsd. (Celebes) besonders an die der *Ulysses*-Gruppe, während bei *P. Pericles* Wall., *Lorquinianus* Feld., *Adamantius* Feld., welche Kirby als Varietäten zu dem bis Cochinchina und Java gehenden *Peranthus* F. rechnet, die Marginalmonde unten erblassen. Formen mit breit spathelförmigem Schwanz, die in der Beschränkung

der Oberseitenbinden auf die Flügelmitte und in der Zeichnung der Unterseite an *P. Blumei* erinnerten und wie dieser die Zellaufhellung der Vorderflügel schon verloren hatten, führten zu Arten wie *P. Crino* F. (Ceylon, Cochinchina) und weiter zu solchen mit schlankerem, länger gestielten Schwänzchen wie *P. Daedalus* Bsd. (Luzon), *P. Brana* Guér. (Nordindien, Sumatra), *P. Palinurus* F. (Indien) über. Dieselben lassen auf der Unterseite noch die der *Peranthus*- mit der *Ulysses*-Gruppe gemeinsame Verschmelzung der Hinterflügelbinden erkennen, bei welcher die in einer breiteren Aufhellung liegenden nierenförmigen rothen Marginalmonde innen von den sichelförmigen, blauen Submarginalbinden eingefasst werden; dagegen ist die Mittelbinde nicht mehr deutlich.

Paris-Gr.

Als Abkömmlinge eines mit der zuletzt besprochenen Untersection der *Peranthus*-Gruppe gemeinsamen Stammes lassen sich die zur *Paris*-Gruppe (Section LXIV) gehörigen Arten der *Arjuna*-Untergruppe auffassen, welche Felder's Subsection A entspricht. Wie die der Grundform näher stehenden Arten der *Peranthus*-Gruppe besitzen sie noch einen breiten, spathelförmigen Hinterflügelschwanz, und trägt z. B. *P. Krishna* Moore (Nordindien) noch eine entwickelte weisse Aussezellbinde auf der Unterseite beider Flügel, die als Rest der Mittelbinde anzusehen ist. Wie *P. Krishna* Moore besitzen nach Felder auch die Männchen von *P. Arjuna* Horsf., *P. Karna* (Java) und dem indischen *P. Paris* L. keine Filzstreifen auf den Vorderflügeln mehr, während diese bei *P. Ganesa* Dbld., *P. Polyctor* Bsd. und entgegen Felder's Angabe auch bei *P. Arcturus* Westw. (alle aus Nordindien) entwickelt sind. Als Ausläufer dieser Untergruppe haben wir *P. Bianor* Cr., ihren nördlichsten Vorposten, anzusehen, bei dem die Blaubinde der Oberseite auf einige zerstreute Schuppen reducirt ist. Sicher ist auch die auf Nordchina und Japan beschränkte *Raddei*-Untergruppe mit etwas dickerer Fühlerkeule und gleichmässig breitem, nicht spathelförmigen Schwanz von demselben Stamme abzuleiten. Bei ihr löst sich die Blaubinde der Hinterflügeloberseite theilweise in Stäubchen auf, doch fragen die Vorderflügel der Männchen manchmal noch Filzstreifen. Wie Christoph feststellte, ist *P. Raddei* Brem. die Frühlingsgeneration von *P. Maackii* Mén.

Elephenor-Gr.

Als Vertreter einer durch die blau und grün bespritzte Oberseite, die mit einander verbundenen Marginal- und Submarginalmonde, die Filzstreifen auf der Oberseite der männlichen Vorderflügel und die Fühlerform durchaus an die *Paris*-Gruppe erinnernden besonderen Gruppe sehe ich *P. Elephenor* Westw. (Sikkim) an, der sicher von einer breit geschwänzten Form abstammt, wie die starke Verlängerung der Hinterflügel zeigt.

Nach gütiger Mittheilung des Herrn Dr. Staudinger monomorph, zeichnet er sich durch die eigenthümlich gelbrothe Behaarung der Palpen und des Nackens und die weissliche Aufhellung der Seiten des Hinterleibes aus, welche sich bei zwei interessanten, von C. und R. Felder noch zu den Aristolochienfaltern gestellten und erst von J. Wood-Mason 1882 als mimetische Formen erkannten nordindischen Arten, *P. Janaka* Moore und *P. Bootes* Westw. wiedertindet. So haben wir nach Analogie anderer Fälle wohl auch zwischen *P. Elephenor* Westw. und den zwei erwähnten Arten noch eine Zwischenform zu erwarten, deren Weibchen dem von *P. Elephenor* gegenüber die ersten Fortschritte in der Nachahmung der Aristolochienfalter machte. Dasselbe wird dadurch bewirkt, dass die gelblichen Aufhellungen des Körpers allmählig eine mehr rothe Farbe annehmen, die Farbe der Vorderflügel schwärzlich wird, plumpe Schwänze sich entwickeln und die Zeichnung und Färbung sich unändert.

Janaka-Gr.
Verz. Tab. V.

Die niedere Stufe in der Umbildung nimmt *P. Bootes* Westw. ein, der dem Aristolochienfalter *P. Dasarada* Moore gleicht und bei dem der Schwanz sich erst schwach von dem noch stark verlängerten Hinterflügel absetzt und die Oberseite der letzteren noch einige grünliche Stäubchen trägt, während nur

erst die beiden innersten Admarginalmonde und zwei Tüpfel der weissen Mittelbinde auftreten und auf der Unterseite die violettrothe Färbung auf die Basis beschränkt ist.

Bei *P. Janaka* Moore, der dem *P. Latreillei* Don. gleicht, ist der Hinterflügelsschwanz deutlich gestielt, treten die rothen Admarginalmonde in den letzten vier, die Mittelbindenreste im vierten bis sechsten Randfelde auf der Oberseite der Hinterflügel auf und dehnt sich die violette Färbung der Hinterflügelbasis im achten Randfelde bis nach hinten aus. Mit dieser weiteren Ausbildung nimmt auch die Länge des Radialgabelstieles, die Verschmälerung der Hinterflügelbasis und die Verbreiterung des Vorderflügelendes zu, welche die Aehnlichkeit mit den Aristolochienfaltern noch erhöhen.

Als weiteren Ausläufer der *Paris*-Gruppe ähnlicher Formen muss man die von C. und R. Felder in ihrer Section LXV zusammengefassten, sich in der Fühlerform an die *Paris*-Gruppe anschliessenden Abtheilungen indischer Rinnenfalter mit weiss getüpfeltem Kopf und Halsschild und dunklem Hinterleibe ohne Filzstreifen auf den Vorderflügeln der Männchen ansehen, welche Wallace in zwei Gruppen, die *Protenor*- und die *Memnon*-Gruppe, theilt.

Die *Protenor*-Gruppe entwickelte sich aus Formen, welche den Ausläufern der *Paris*-Gruppe Demetrius-Gr. näher standen, eine mit der submarginalen verschmolzene Marginalbinde auf den Hinterflügeln und einen spatelförmigen Schwanz besass, wie ihn *P. Demetrius* Cr. nebst *P. macilentus* Jam. (Japan), ihre nördlichsten und einfachsten Formen, in beiden Geschlechtern, besonders stark aber im Weibchen, besitzen. Hierher gehört auch wohl der 1889 von Leech beschriebene *P. Elwesi* aus Kiuikiang, der dem dort gemeinen Aristolochienfalter *P. Alcinous* Klug schon im männlichen Geschlecht gleicht. Derselbe zeichnet sich vor allen übrigen *Papilio*-Arten dadurch aus, dass in seinen breiten Schwanz nicht nur der dritte Medianast, sondern auch noch der vorderste Cubitalast hineintritt).

Auf *Demetrius*-artige Vorfahren lässt sich auch der von C. und R. Felder zur selben Unter- Protenor-Gr. section gerechnete *P. Protenor* Cr. (Nordindien, Nordchina) zurückführen. Derselbe besitzt ungeschwänzte aber gleichmässig stark verlängerte, auf der Oberseite wie bei *P. Demetrius* sogar noch bläulich bespritzte Hinterflügel, deren Analange ebenfalls auf der Oberseite hervortritt. Wie *P. Demetrius* Cr. und *macilentus* Jam. ist auch *Protenor* auf der Oberseite der männlichen Hinterflügel noch durch die dicke weissliche Beschuppung des zweiten Randfeldes ausgezeichnet.

Aus ähnlichen Formen ging wohl *P. Rhetenor* Westw. (Assam) hervor. Hier zeigt das Männchen Verl. T. C. V schon eine stärkere Verschmälerung der Hinterflügel, auf deren Unterseite im siebenten und achten Randfelde die Binden mit einander verschmelzen und der Innenrand bis zur Vorderflügelbasis blutroth gefärbt ist. So entsteht eine oberflächliche Aehnlichkeit des ruhenden Thieres mit einem ruhenden rothleibigen Aristolochienfalter. Das im Verhältniss zum Männchen sehr seltene Weibchen dieser Art wurde von Westwood als *P. Icarus* beschrieben und noch von C. und R. Felder und Kirby zu der *Latreillei*-Gruppe der Aristolochienfalter gestellt, bis Wood-Mason 1882 dasselbe als zu dem bekannten *P. Rhetenor* Westw. gehörig nachwies und als eine mimetische Form erkannte, welche durchaus dem grossen Aristolochienfalter *P. Dasarada* Moore gleicht. Die Umbildung desselben entstand durch die Verlängerung besonders des fünften und sechsten Randfeldes der Hinterflügel, wodurch sich ein lappenartiger Schwanz bildete, durch das Auftreten der ebenfalls rothgefärbten Saumtüpfel und Admarginalmonde, die sich im sechsten bis achten Randfelde mit einander verbinden, auf der Oberseite, durch die

¹⁾ Ich erwähnte, dass auf einem frühen Stadium der Puppe sogar drei Tracheen in den Hinterflügelsschwanz treten.

Ausbildung eines leuchtend weissen, der Mittelbinde angehörigen Spiegels um das Zellende, und die Verbreiterung der Vorderflügel.

In einem an *P. Icarus* Westw. erinnernden kleineren Weibchen aus Assam glaube ich auch das *Almenor*-Weibchen gefunden zu haben. Dasselbe zeichnet sich vor *Icarus* Westw. als weitere Entwicklungsstufe durch die infolge Verdunkelung entstandene Trennung der Saum- und Admarginalmonde im siebenten und achten Randfelde und die ebenfalls roth vortretenden Zwischenbindentüpfel zwischen Innenrand und dem der Mittelbinde zuzurechnenden Spiegelfleck auf der Oberseite der Hinterflügel, durch schmälere Form der letzteren, die stärkere Abrundung der Vorderflügel und einen an *P. Dasarada* erinnernden bläulichen Glanz der Hinterflügel aus. Die orangenen Randsaumtüpfel im vierten bis sechsten Randfelde der Vorderflügel sind wohl nur als Zeichen von weiterem Rückschlag aufzufassen, da sie die mimetische Aehnlichkeit verringern.


Vielleicht steht der nordindische *P. Sakontala* Hew., den ich nicht untersuchen konnte, ebenfalls wie Wallace angiebt, der *Rhetenor*-Gruppe näher: sicher muss er aber aus der *Pammon*-Gruppe entfernt werden, zu welcher C. und R. Felder, die ihn ebenfalls nicht vergleichen konnten, ihn gestellt haben.

Der zweite Gruppencomplex der C. und R. Felder'schen Section LXV entspricht der *Memnon*-Gruppe Wallace's, doch ist aus ihr der zu den Aristolochienfaltern gehörige *P. Priapus* Boisd. zu entfernen.

Auch diese die Felder'sche Subsection A umfassende Abtheilung dürfte auf eine vielleicht der *Paris*-Gruppe ähnliche Grundform und zwar eine solche mit entwickelter Aussenzellbinde beider Flügel zurückzuführen sein, welcher von den bekannten Arten wohl *P. Ascalaphus* Bsd. (Celebes) am nächsten steht. Das Männchen letztgenannter Art trägt auf der Oberseite der Vorderflügel eine grüngrau, auf den Hinterflügeln eine bläulich bestäubte Aussenzellbinde, auf der Unterseite dagegen mit den marginalen verschmolzene Submarginalmonde und eine bläulich bespritzte Aussenzellbinde der Hinterflügel. Auch ist *P. Ascalaphus* Bsd. die einzige der noch zu besprechenden indischen Arten, bei welcher die rothe Basalaufhellung an der Unterseite der Flügel in beiden Geschlechtern (wie noch bei *P. Demetrius* Cr.) fehlt.

Das Weibchen von *P. Ascalaphus* zeigt eine über die grössere Aussenhälfte der Vorderflügel gehende Verbleichung der dunklen Grundfarbe, regelmässig entwickelte orangene, aus Verschmelzung der Marginal- und Submarginaltüpfel entstandene Monde und eine bis zum Innenrande ausgedehnte, fast die halbe Flügellänge bedeckende, sehr schuppenarme Aufhellung der Hinterflügel. So kommt eine gewisse Aehnlichkeit mit dem meist etwas kleineren *P. Polyphontes* Bsd. (Celebes) zu Stande.

An *P. Ascalaphus* schliesst sich enger der riesige *P. Deiphobus* L. (Amboina, Ceram) an, dessen Männchen sich dem von *P. Ascalaphus* gegenüber dadurch als weiter entwickelt erweist, dass bei ihm auch die Aussenzellbinde auf der Unterseite der Hinterflügel sich nur innen erhält, rüthlich färbt und mit den Admarginal- und Limbalmonden verschmilzt. Ebenso zeigt die Flügelbasis unten schon blutrothe Tüpfel, wie die Aristolochienfalter sie an der Brust tragen. Durch eine stark ausgebildete Aufhellung der Vorderflügel und eine geringere im fünften und sechsten Randfelde der Hinterflügel, die hinten roth



Figur 6.

Hinterflügel von *P. Alcmenor* ♀.
S, Saum-, R, Rand-, Z, Zwischen-,
M, Mittelbinde.

Sakontala

Ascalaphus

gesäumt ist, gleicht das Weibchen etwas einem grossen *P. Polydorus* L. Die eigenartige Zeichnung an der Unterseite der Hinterflügel der Weibchen entsteht somit secundär durch die Vergrösserung der Postmarginalbandflecke. Somit treten an der Oberseite der Hinterflügel hinten statt der Marginal- die Limbalmonde hervor.

Auch bei der var. *Deiptylus* Feld. (Papua) mit einem kurzen, etwas spathelförmigen Schwanz, die eine kleinere Localform des amboinesischen *P. Deiphobus* L. darstellt, gleicht das noch durch einige auf der Oberseite der Hinterflügel gelegene blaubehäubte Aussenzellbindenreste ausgezeichnete Weibchen durch die innere, hinten roth begrenzte Aufhellung der Hinterflügelmitte dem *P. Polydorus* L., und Aehnliches gilt für die auf Ternate beschränkte Varietät *Deiphontes* Feld., welche nur mehr ein Zähnchen statt des Hinterflügelschwanzes besitzt.

Hieran schliesst sich als weitere Form *P. Emalthion* Hb. (Philippinen) mit kurzem Schwanzzahn an, dessen Weibchen (*P. Ramanzovius* Esch.) durch eine fortschreitende, an die von *Deiphobus* erinnernde Verdunkelung der Postmarginalflecke der Hinterflügel vom zweiten bis siebenten Randfelde ebenfalls nur die Limbalmonde oben vortreten lässt und durch die vom fünften bis siebenten Randfelde am Zellende und am Aussenwinkel der Vorderflügel ausgebildete Aufhellung ebenfalls an *P. Polydorus* L. erinnert.

Nun kommen zwar langgeschwänzte Aristolochienfalter, aber keine *P. Polydorus* L. mehr auf den Philippinen vor; somit ist die mimetische Aehnlichkeit der Weibchenform *Ramanzovius* den einheimischen Vögeln gegenüber von geringem Werth, auch konnte sie keinesfalls auf den Philippinen, wo das Modell fehlt, entstehen; so kann die Weibchenform *Ramanzovius* nur von Osten eingewandert sein. In der That entwickelt sich nun auf den Philippinen eine zweite Form des mimetischen Weibchens, wie sie nur in dieser Inselgruppe sich bilden konnte. Denn ihr Modell ist der auf die Philippinen beschränkte Aristolochienfalter *P. Semperi* Feld., weshalb ich sie als ♀ var. *Semperinus* bezeichne. Diese Varietät entsteht nicht von der var. *Ramanzovius* Esch., sondern von mehr männchenfarbigen Weibchen aus, die wohl zugleich mit var. *Ramanzovius* einwanderten. Durch die Erweiterung der schon bei dem Männchen mit den Saumtöpfeln ringförmig verbundenen Marginalmonde, an die sich im siebenten und achten Randfelde wohl noch der Rest der Aussenzellbinden anschloss, entstand eine breite, blutrothe, schwarze Flecke umschliessende Einfassung des Innenrandes, welche schon lebhaft an die Unterseitenfärbung von *P. Semperi* erinnert. In weiterer Ausbildung dieser Anpassung wird das Weibchen oben sammetschwarz, und treten unten auch die basalen Aufhellungen mit den Randbinden zusammen. So läuft endlich eine oft blutrothe Binde auf der Oberseite der tiefschwarzen Flügel neben dem Körper hin und dadurch erhält das fliegende Thier, von oben gesehen, eine grosse Aehnlichkeit mit dem viel häufigeren Männchen von *P. Semperi*, dessen scharlachrothe Brust und Hinterleib sich leuchtend von der sammetschwarzen Oberseite der Flügel abheben. Durch die kurz geschwänzten Hinterflügel schliesst sich das Männchen von *P. Mayo* Atk. (Andamanen) näher an *P. Emalthion* Hb. an, während die Zeichnung der Unterseite zugleich an *P. Memnon Androgeus* Cr. erinnert. Nach Dr. Staudinger ist von dieser auf die Andamanen beschränkten Art bisher nur eine Weibchenform bekannt, welche den spathelförmig geschwänzten mimetischen Endformen des *P. Memnon* L. entspricht. Dieselbe ist ähnlich wie *P. Descombesii* Rog. ♀ darin modificirt, dass auf den Hinterflügeln nur im achten Randfelde ein Rest der Randmonde auftritt, dass sich um das Zellende eine breite weisse Aufhellung im Innenrande aus entwickelt und dass vom zweiten bis siebenten Randfelde oben nur die theilweise röthlich gefärbten Saummonde auftreten. Wie sein Modell, *P. rhodifer* Butl., trägt auch *P. Mayo* ♀ einen rothweissen Tüpfel am Ende des Schwanzes.

Vergl. Taf. V.

Hierher gehört auch wohl der sich im Geäder enger an *P. Memnon* anschliessende, in beiden Geschlechtern stumpf geschwänzte *P. Oenomaus* Godt. von der Insel Timor, dessen Männchen mit dem Weibchen die rothe Basis der Flügelunterseite und die Ausbildung der regelmässigen breiten Admarginalmonde auf der Unterseite der Hinterflügel, die breite ausserhalb der Zelle liegende Aussenzellbinde und die Aufhellung der Mittelzelle der Vorderflügel gemein hat. Bei dem Weibchen treten der rothe Basalfleck auch auf der Oberseite der Vorderflügel und die Admarginalmonde auf der Oberseite der Hinterflügel auf und setzt sich eine Mittelbinde scharf bis zum Innenrande über letztere fort. So entsteht eine überraschend grosse Aehnlichkeit des Weibchens mit dem auf derselben Insel häufigen Aristolochienfalter *P. Liris* Godt.

Lowm-cr.

Eine andere, wie *P. Ascalaphus* Bsd. in beiden Geschlechtern geschwänzte Art, *P. Lowii* Druce (Borneo, Palawan), besitzt mehrere Formen von Weibchen, deren eine noch dem Männchen ähnlich ist und auf der Oberseite der Hinterflügel die Zeichnung der Unterseite schwach wiederholt, während andere Formen durch Aufhellung der Flügelmitte und Verdunkelung des Randes innerhalb der rothen Limbalmonde etwas an *P. Memnon*, ♀ *Achates* Cr. erinnern.

Diese Art führt uns zu *P. Memnon* L. selbst über, der durch den mimetischen Polymorphismus seiner Weibchen als bisher bestes Beispiel für die Erscheinungen der Mimicry galt. Ueber den specifischen Werth der vielen Formen von *P. Memnon* L. haben wir noch keinen befriedigenden Aufschluss erhalten. Während z. B. Distant und Butler mehrere Arten unterscheiden, nahm Wallace deren nur zwei an, eine continentale, *Androgeus* Cr., und eine insulare, *Memnon* L., welche wir als Rassen führen wollen. Als ursprünglichere Form der Art überhaupt nehme ich diejenige an, welche in Färbung, Zeichnung und Flügelform ihren Verwandten am nächsten steht, und finde dieselbe in dem Männchen der Festlandsform *Androgeus*. Wenn auch beide Männchenformen durch die Oberseite der Hinterflügel, welche bis zur Zelle reichende, von den Intercoastalstreifen durchbrochene Spritzstriche blauer Schuppen trägt, die auf den Vorderflügel viel schwächer auftreten, an *P. Ascalaphus* Bsd. erinnern, so ist doch die Unterseite der Hinterflügel bei der Continentalform *Androgeus* Cr. ursprünglicher gezeichnet und gefärbt als bei der Insularform. Bei beiden Formen treten nämlich auf der Unterseite der Hinterflügel drei Mondbinden auf, die meist längs der Rippen mit einander verbunden sind und der Limbal-, Admarginal- und Aussenzellbinde entsprechen. Bei der Continentalform *Androgeus* sind diese aber im sechsten bis achten Randfelde roth, dagegen die Aussenzellbinde vom fünften bis zweiten blau gefärbt, während bei der Insularform alle Binden mehr verloschen sind und eine graublau Farbe tragen.

An weiblichen Varietäten der Festlandsrasse *Androgeus* Cr. erwähnt Wallace zwei Formen, *Agenor* Cr. und *Achates* Cr.¹⁾ (mit *Aleanor* Cr.). Von diesen ist *Agenor* Cr. dadurch ausgezeichnet, dass sich, ebenfalls vom schwach orangenen Randmond des achten Randfeldes beginnend, eine weisse breite Binde über die Hinterflügel hinzieht, die ausserhalb der Zelle liegt. So erinnert *Agenor* Cr. etwas an den Aristolochienfalter *P. Zalcucus* Hew.

An weiteren ungeschwänzten Weibchenformen erwähne ich noch die var. *Esperi* Butl. (Malacca) mit weisser, subapicaler Aufhellung der grauen Vorderflügel und blau bespritzten Hinterflügel, in deren

¹⁾ Der Esper'sche *Achatiades* entspricht dem *Achates* Cr. t. 243 A., der Esper'sche *Achates* (t. 28, f. 1) aber entspricht dem *Achates* Cr. t. 182, A. B., nicht umgekehrt, wie bei Kirby. Somit ist für die gelbgesäumte Form der Name *Achatiades* Esp. beibehalten worden. Ebenso muss an Stelle von *P. Agenor* L. wie bei Wallace der Name *Androgeus* Cr. treten, der das ursprünglichere Männchen bezeichnet.

achtem Randfelde oben der mit dem Limbaltüpfel verbundene Admarginalmond auftritt. Dieser erinnert ebenso wie die var. *Mestor* Hb., bei der die Aufhellung an den Innenwinkel herantritt, an den Aristolochientalter *P. Astorion* Westw., ebenda, bei dem die weisse Aufhellung der Vorderflügel ebenfalls sehr variabel ist.

Endlich tritt, ohne Uebergang, auch eine lang und breit spathelförmig geschwänzte Form des Weibchens auf, *Achates* Cr. (Taf. 182, A B), welche auf die *Agenor*-Form zurückzuführen ist, vor der sie sich durch stärkere Aufhellung der Hinterflügel auszeichnet. So treten die rothen Saummonde, im achten Randfelde noch der Admarginalmond, auch auf der Oberseite hervor und sind die Flügel bis über die Zellmitte weiss aufgehellt und dünn beschuppt, der Hinterleib dagegen seitlich gelb gefärbt. Die Form der Schwänze ist nicht so plump wie bei der Inselform: so gleicht das Weibchen auch nicht bloß dem *P. Doubledayi* Wall. von geringerer Verbreitung, sondern auch dem kleineren *P. Diphelus* Esp., der mit ihm zusammen vorkommt. Die wohl nur in China beobachtete Weibchenform *Aleanor* Cr. lässt sich aus *Achates* Cr. durch eine weiter fortgeschrittene Verdunkelung ableiten, welche die Aufhellung der Hinterflügelmitte auf schmale Tüpfel beschränkt und nur die innersten Rothtüpfel unverdeckt lässt. So erinnert diese Weibchenform an dunklere Varietäten des *P. aristolochiae*.

Von der Inselrasse, *P. Memnon*, unterschied Wallace zwei bis drei weibliche Varietäten, zu denen er fragweise die Form *Laomedon* Cr. und den langgeschwänzten *Achates* Cr. (Taf. 243, A) stellte, den wir als *Achatiades* Esp. bezeichnen.

Von diesen Formen dürfte *Laomedon* Cr. (Java, Sumatra) die ursprünglichste sein, da bei ihr die Zeichnung der Hinterflügel-Unterseite auch auf der Oberseite auftritt und am meisten an die des Männchens erinnert. Doch scheint zugleich eine unvollkommene Aehnlichkeit auch der Oberseite mit Aristolochienfaltern der *Priapas*-Gruppe vorzuliegen. Hierauf lässt sich auch die sammetartige Verdunkelung der Unterseite zurückführen, welche die Aussenzellbinde oft unterdrückt, zugleich aber den grauen Ton der Admarginal- und Saumbinden, welcher im achten Randfelde in Orange übergeht, bedeutend hervorhebt.

Ein von de Haan¹⁾ (Taf. III, Fig. 2) abgebildeter, ungefähr der Festlandform *Mestor* Dist. entsprechendes Weibchen aus Borneo mit gelbem Analsamtüpfel, blauschwarzen Hinterflügeln, weiss leuchtender subapicaler Aufhellung der Vorderflügel und hinten gelbem Hinterleibe, das ich als Varietät von *Laomedon* Cr. ansehen möchte und als var. *Erebinus* bezeichne, erinnert an das ebendort, Taf. V, Fig. 3, abgebildete Weibchen des Aristolochientalters *P. Ercebus* Wall.

Durch weitere Umbildung der var. *Agenor* Cr. dürfte die gleichfalls von de Haan (Taf. III, Fig. 3) abgebildete, auf Java beschränkte Weibchenform anzusehen sein, auf deren Hinterflügeln die Postmarginalflecke in einer gelblichen, bis zur Zellmitte vordringenden Aufhellung liegen. Wie durch die Flügelfärbung, erscheint diese Varietät, die wir als *jaconus* bezeichnen, auch durch den gelben, nur in der Mitte von Bauch und Rücken verdunkelten Leib als eine Art Vorstufe zur Form *Achatiades* Esp.

Bei der Weibchenform *Auceus* Cr. (Java, Borneo) tritt eine leuchtend schneeweiße Basalfärbung der Vorderflügelzelle auf, welche verbunden mit der blauen Bespritzung der Hinterflügeloberseite oberflächlich an Aristolochientalter wie *P. Sycorax* (Grose-Smith²⁾ (mit weissem Halskragen) erinnern könnte.

Endlich ist die mit langem, breit spathelförmigen Hinterflügelschwanz versehene Weibchenform

¹⁾ W. de Haan, Bijdragen tot de kennis der Papilionidae. (Verh. over d. nat. Gesch. nederl. overz. Bezitt. 1849, fol.)

²⁾ Wie ich nachträglich erlaube, stellte H. Grose-Smith *P. Sycorax* (p. 28) und *Mchala* (p. 46) auf.

Achatiades Esp. durch starke Verdunkelung seitens des Postmarginal- und Submarginalbandes ausgezeichnet. Wie schon Oberthür bemerkte, lässt sich Zeichnung und Färbung dieser Art auf var. *javanus* zurückführen. So geht die von dem Admarginalmonde des achten Randfeldes beginnende Aufhellung der Hinterflügel bis weit über die Zellmitte hinauf, dagegen treten nur am zweiten, siebenten und achten Randfelde die unten regelmässig entwickelten Limbaltüpfel auch oben hervor. So entsteht eine grosse Aehnlichkeit dieser Varietät mit dem Aristolochienfalter *P. Coon* F., die durch die gelbe Farbe der Abdominalsseiten, die stark gestreckten und aufgehellten Vorderflügel, deren Basalfärbung wie der Halskragen des Modells gelb ist, und durch den gewaltigen, breit spathelförmigen Schwanz sehr auffällig wird; nur ist das Modell stets kleiner.

Nach Oberthür kommt nun auch *P. Agenor* Cr. und *P. Achates* Cr. in Java vor; so wird es wahrscheinlich, wie schon die Zeichnung der Männchen es ausdrückte, dass *P. Memnon* auf dem Festlande entstand und diese Formen von ihm auf die Inseln mit übernommen wurden, auf denen nun *Laomedon* Cr., *Auceus* Cr. und endlich *Achatiades* Esp. sich selbstständig bildeten.

Als weitere schon stark abgeleitete, ziemlich monomorphe Form dieses Stammes sehe ich den schwanzlosen *P. Polynestor* Cr. aus Nordindien und Ceylon an, der noch auf der Unterseite die rothen Basalflecke der Flügel trägt, aber oben keiner lebenden Art der Aristolochienfalter mehr gleicht, obwohl seine Zeichnung durch mimetische Anpassung entstanden sein dürfte. Dieselbe ist nämlich nur auf eine Ausbildung der bei den vorher erwähnten Arten vorkommenden Anlage zurückzuführen, indem alle Admarginal-, Aussenzell- und Saumbindenmonde sich längs der Rippen mit einander verbanden und so zwei Reihen schwarzer Flecke abschneiden, wie sie uns in den Submarginalbandflecken der Aristolochienfalter *P. Priapus* Boisd., *Sycoras* Grose-Sm. und *Hageni* Rog. noch vorliegen. Somit sind es vielleicht ausgestorbene oder nachträglich schneller umgeänderte Vorläufer der *Pompeus*-Gruppe gewesen, welche dieser grossen Art als Modell dienten. Eine abweichende, sehr seltene Weibchenform des Berliner Museums aus Ceylon trägt in der That diese Flecken auf gelblich-grauem Grunde, dem auch die frühere Färbung der Hinterflügelbinden in der *Pompeus*-Gruppe entsprochen hat, wie wir unten nachwiesen.

Den einzigen biologischen Beweis für diese Annahme liefert uns der kleine *P. Pampsucus* Boisd. (Java), welcher wohl aus Formen wie *P. Forbesi* Smith u. Kirby (Sumatra) hervorging, und noch eine auffallende, erst von C. und R. Felder als solche erkannte Analogie zu dem Aristolochienfalter *P. Priapus* Boisd. bildet, die sich sogar auf die Farbe des Leibes und die Verkleinerung der inneren Fleckenreihe erstreckt, weshalb auch Boisduval beide Arten als verwandt neben einander stellte.

Was die Nahrung der Raupen der indischen Rinnenfalter betrifft, so leben die Raupen von *P. Ledebourius* Esch., *P. Memnon* L., *Pammon* L., *Arjana* Moore (*Paris*-Gruppe), *Demolion* Cr., *Erithonius* Cr. meist nach Horsfield und Moore an Citrus, die von *P. Alphenor* nach Dewitz¹⁾, die von *P. Helmus* L. nach Hampson²⁾, die von *P. Ascalaphus* Boisd. nach Kühn³⁾ auf Citrus, die von *P. Gigon* nach Denselben auf Aurantiaceen. Weiter lebt nach Nicéville⁴⁾ die von *P. Pammon* auf *Glycosmis pentaphylla*, Citronen und wie die von *P. Erithonius* auf *Aegle marmelos* (Aurantiaceen). Dagegen lebt die Raupe von *P. Palephates* nach Dewitz l. c. auf *Sebitera gelutinosa* (Laurineen), die von *Panope dissimilis* nach

¹⁾ Nova Acta Leop. LVII, 1882, p. 265.

²⁾ Proc. As. Soc. Calcutta, LXIII, 1889, p. 364.

³⁾ H. Kühn, Zur Kenntnis indischer Lepidopterenlarven. (Correspondenzbl. ent. Ver. „Iris“, Dresden, I, 1887, p. 180.)

⁴⁾ L. de Nicéville, List Butterfl. Calcutta. (Journ. As. Soc. LIV, 1885, p. 39—54.)

Horsfield und Moore an Tetranthera (Laurineen), nach Nicéville aber an der das giftige Antiarin liefernden *Antiaris toxicaria* Leschen. (Artocarpeen).

Schliesslich können wir ungefähr folgende Entwicklungsstufen für die indisch-australischen Rinnenfalter aufstellen:

<i>Alcidinus</i> -Gr.		<i>Panope</i> -Gr.		<i>Jauaka</i> -Gr.		<i>Polymnestor</i> -Gr.
<i>Anactus</i> -Gr.						<i>Oenomaus</i> -Gr.
	<i>Gambrius</i> -Gr.					<i>Lowii</i> -Gr.
	<i>Hecataeus</i> -Gr.	<i>Castor</i> -Gr.	<i>Pannon</i> -Gr.	<i>Protenor</i> -Gr.	<i>Oenomaus</i> -Gr.	<i>Ascalaphus</i> -Gr.
				? <i>Sakontala</i> -Gr.		
		<i>Vollenhorstii</i> -Gr.	<i>Hipponous</i> -Gr.	<i>Elephenor</i> -Gr.		<i>Demetrius</i> -Gr.
	<i>Euchenor</i> -Gr.	<i>Amphiaraus</i> -Gr.	<i>Capaneus</i> -Gr.		<i>Paris</i> -Gr.	
					<i>Peranthus</i> -Gr.	
<i>Rithonius</i> -Gr.	<i>Demolion</i> -Gr.	<i>Codeffroyi</i> -Gr.				<i>Ulysses</i> -Gr.

Machaon-artige Vorfahren.

Afrikanische Papilionen.

Die über fünfzig Arten afrikanischer *Papilioniden* gehören nach Felder und Kirby sämtlich der Gattung *Papilio* an. Dagegen wurde neuerdings von E. Schatz *P. Zulmoëis* Hew. zu *Ornithoptera* gerechnet und *P. Antimachus* Dru. von Aurivillius¹⁾ zum Vertreter einer eigenen Gattung *Druryia* gemacht. Wir ziehen es vor, beide Arten den Rinnenfaltern einzureihen und werden die Beweise dafür bei letzteren bringen.

1. Afrikanische Aristolochienfalter.


Ihre einzige erhaltene Art bildet der gewaltige *P. Antenor* Dru., welcher auf Madagascar und an der Westküste des Continents vorkommt. Zugleich stellt derselbe auch, was die Zeichnung der Flügel betrifft, die der Grundform der Aristolochienfalter überhaupt zunächst stehende Art dar. In der Zelle der Vorderflügel besitzt er drei unregelmässige weisse Tüpfel, welche als Zwischenräume zwischen dem (ersten und zweiten)²⁾ und dritten, dem dritten und (vierten und fünften) und dem (vierten und fünften) und sechsten Zellbände der Segelfalter aufzufassen sind. Infolge längs der Adern fortgeschrittener Verdunkelung sind die Binde ausserhalb der Zelle in Flecke zerlegt, welche um die Zelle herum der Mittelbinde, am Rande aber der Marginalbinde entsprechen.

Auf die Hinterflügel setzt sich die Mittelbinde breit über die Mittelzelle fort und bildet einen in derselben gelegenen grösseren und eine kontinuierlich sie umziehende bindenartige Reihe von sieben kleineren Tüpfeln, deren letzter sich in das Analfeld nach hinten verlängert. Innerhalb dieser Mittelbinde

¹⁾ Vergl. E. Schatz, l. c. p. 40

²⁾ Die Klammern bezeichnen die Verschmelzung der Bänder.

liegt wie bei der Gattung *Euryades* Feld. die Fortsetzung des dritten Basalbandes, und so lassen die zwei weisslichen Aufhellungen vor diesem Bande und an der Basis vermuthen, dass die zwischen ihnen durchgehende Verdunkelung dem zweiten Basalbande zugerechnet werden darf. Ausserhalb der Mittelbinde findet sich eine blau- und goldgrüne Bestäubung, welche ich als Rest der bei *Euryades* noch scharf begrenzten Submarginalbinde ansehe. Da der Innenrand stark ausgeschnitten ist, dürfte der einzelne „Mondfleck“ desselben zur Schmuckbinde zu rechnen sein. Somit wären wie bei *Euryades* nur mehr sechs Marginalmonde vom zweiten bis siebenten Randfelde erhalten, deren zwei vorderste weisslich sind.



Figur 7.

Skizze von *P. Antenor* Dru., halbschematisch.

III, IV und V Zellbänder, Term, Terminalband; Mitt, Mittelbinde; Marg, Randmonde; Schm, Schmuckbinde-rest.

Die Form der Flügel, deren vordere am Rande wellig gezackt, deren hintere in einen kräftigen, schwach spathelförmigen Schwanz ausgezogen sind, lässt an den indischen *P. Hector* L. denken; die rothe Färbung des Kopfes und Halskragens und der mit Ausnahme der vordersten Rückenplatten zart fleischfarbene Hinterleib erinnern an *P. Semperi* Feld. Dagegen stehen die rothen Fühler mit deutlicher Gliederung in der Untergattung ganz vereinzelt da. Bei *P. Antenor* Dru. sind keine Duftapparate im Analfelde der Männchen entwickelt; die Analfalte bewirkt eine tiefe aber ziemlich grade Einsenkung, welche besonders bei den Weibchen der australischen *Priamus*-Gruppe wiederkehrt. Auch das Innenfeld innerhalb der Dorsalis der Hinterflügel ist nur schmal und am Rande ganz seicht ausgeschnitten wie bei letzteren;

auffallend dagegen ist die Länge des Stiels der Radialgabel, durch welche der eigentlich der Mittelbinde angehörende, bei *P. Lydius* Feld. (*Panthous*-Gruppe) noch direct der Zelle anliegende Tüpfel fast in die Reihe der Marginalbindenflecke gerückt wird.

Wie in der *Priamus*-, *Pompeus*- und *Daurus*-Gruppe sind auch bei dem Weibchen von *Antenor* kleine, aber nackte Genitaldeckklappen entwickelt, welche ich bisher nicht erwähnt gefunden habe.

2. Afrikanische Segelfalter.

Alle afrikanischen Angehörigen dieser Untergattung haben ein wichtiges Structurmerkmal gemein: Pithe Colona Gr. der erste Radialast der Vorderflügel geht in die Subcostale über. Diese Eigenthümlichkeit theilen sie mit allen indischen Segelfaltern (ausgenommen die *Gyas*-Gruppe und *P. Leosthenes* Dbl.).

Nach der eigenthümlichen Verschmälerung der Vorderflügel, welche eine Verkürzung der Cubitaläste bewirkt, und dem langen Radialgabelstiel muss man die afrikanischen Segelfalter für jüngere Entwicklungsformen ansehen, als die indischen es sind, und darf sie von den Vorfahren der letzteren herleiten.

Am nächsten dürfte der Stammform der afrikanischen Segelfalter *P. Colonna* Ward Colonna Gr. stehen, der in vieler Hinsicht an *P. Rhesus* Bsd. (Celebes) erinnert und wohl der aus Indien eingewanderten Stammart noch am nächsten steht, zumal auch seine Hinterleibsfärbung durchaus an die der *Andocrates*-Gruppe erinnert. Wie *P. Porthaon* Hew. besitzt auch *P. Colonna* in dem Gabelfelde zwei helle Tüpfel, deren äusserer der marginalen Binde zuzurechnen ist, während der innere der Aussenzellbinde angehört und bei *P. Antheus* Cr. kaum angedeutet ist. Trotz grosser Verdunkelung der ursprünglichen Zeichnung, welche z. B. die Marginalbinde im sechsten Randfelde der Vorderflügel ganz und die Mittelbinde der Hinterflügel bis auf wenige schwache Reste im zweiten, vierten bis fünften und siebenten bis achten Randfelde verdeckt, zeichnet sich doch *P. Colonna* Ward noch durch die ursprüngliche Einfachheit des Postmarginalbandes aus. So besitzt er keine blauen Postmarginaltüpfel, sondern es liegen die Randmonde wie bei *P. Ajax* L. (Nordamerika) und *P. Rhesus* Bsd. hart am Saum.

Sehr eigenthümlich ist der Verlauf der Vorderflügelbinden. Wie die zwei ersten geht nämlich auch die dritte Zellbinde an den Hinterrand und ist von der anscheinenden Aussenzellbinde, die aber der Mittelbinde entspricht, durch eine breite Verdunkelung getrennt, die so scharf an den abgestumpften Aussenzellwinkel herangeht, dass die Mittelbinde im sechsten Randfelde anscheinend mit der Marginalbinde zusammenfällt. So tritt hier ein breites aus dem vierten und fünften Zellbande gebildetes Querband auf. Als weitere Eigenthümlichkeit erwähne ich noch die mit Ausnahme der schwarzen Keule rothbraune Farbe der Fühler, welche an die ganz rothbraunen Antennen der nordamerikanischen *Ajax*-Gruppe erinnert.

Als weitere ursprünglichere Form dürfen wir den *P. Pollicus* Cr. (Westafrika, Natal) Pollicus Cr. ansehen, obwohl er schon eine starke Zerschürung der Mittelbinde der Vorderflügel durch längs der Rippen entstehende Verdunkelung zeigt und die Submarginalbinde auf den Vorderflügeln ebenfalls durchaus unterdrückt ist. In der langgestreckten Vorderflügelzelle besitzt *P. Pollicus* Cr. eine ebenso hohe Bänderzahl wie der indische *P. Alabion* Gray, nämlich fünf einfache und ein vorn durch einen Bänderrest getrenntes Terminalband. Auch die vollkommene Ausbildung des Prachtbandes, der regelmäßige Verlauf der Basalbinden und der Mittelbinde auf den Hinterflügeln stellen *P. Pollicus* als eine der ursprünglichsten Arten unter den afrikanischen Segelfaltern hin. Dieselbe erinnert, abgesehen von den Postmarginalmonden, vor

den indischen Formen, mit denen sie nach dem Aderverlauf zusammengehört, noch am meisten wiederum besonders an *P. Rhesus* Boisd. (Celebes), sodass wir die afrikanischen Segelfalter wohl von einem mit der *Anticrates*-Gruppe gemeinsamen Stamm ableiten dürfen.

Eine neben *P. Polices* Cr. mit graden Zellbinden einhergehende Entwicklungsreihe eröffnet *P. Porthaon* Hew. (Zambesi) mit zwei Gabelfeldtöpfeln, bei welchem die dritte bis fünfte Vorderflügelzellbinde einen welligen Verlauf zeigen und wie bei *P. Polices* Cr. noch der Rest einer Terminalbinde und wie bei *P. Colonna* der innere Gabelfeldtöpfel sich erhalten hat. Hier reichen die bläulichen Postmarginalmonde erst bis zum zweiten Randfelde, dagegen ist die Mittelbinde durch zunehmende Verdunkelung vom vierten Randfelde an auf rundliche Tüpfel reducirt und das Prachtband selbst in der Mitte des Flügels unterdrückt, vorn und hinten dagegen gut entwickelt.

An *P. Porthaon* Hew. schliesst sich noch am besten *P. Ecombar* Boisd. (Madagascar) an, der wie *P. Anthus* Cr. nur fünf Zellbinden und einen Gabelfeldtöpfel besitzt und am Innenwinkel der Vorderflügel stark verdunkelt ist. Zwar ist bei ihm noch das Prachtband in seinem inneren Grenzstreifen erhalten, dagegen sind die rothen Bindenreste bis auf den im zweiten und die im siebenten und achten Randfelde aufgelöst, wie auf der Oberseite auch die äussere Basal- und die Mittelbinde in einander übergehen, sodass das dritte Basalband nur schwach durchscheint.

Hierher gehört auch *P. Anthus* Cr. (Westafrika, Natal), der sich durch seine geschwungenen Zellbinden mehr an *P. Porthaon* Hew. anschliesst und sich von *P. Ecombar* besonders durch die weiter fortgeschrittene Auflösung des inneren Schmuckbandstreifens und die Verbindung der Mittel- mit der zweiten Basalbinde in der Mittelzelle auch der Unterseite der Hinterflügel unterscheidet. Zugleich zeigt *P. Anthus* Cr. eine sehr hohe Ausbildung der Postmarginalmonde, denn es setzen sich Andeutungen der letzteren sogar auf die Vorderflügel fort.

Kirby's.

Die merkwürdigsten Formen der afrikanischen Segelfalter, welche C. und R. Felder noch unbekannt waren, sind von Eimer nicht besprochen, also wohl nicht für solche angesehen worden, obwohl ihre Flügelform, der Rippenverlauf und, wie wir zeigen werden, auch ihre Zeichnung sie nur hierher verweist. Es sind dies *P. Kirbyi* Hew. und *Illyris* Hew., von der Westküste, bei welchen durch starke Verdunkelung der Vorderflügel die Zellbinden fast oder ganz geschwunden sind und nur mehr eine breite „Aussenzellbinde“ bis zum Hinterrande geht, die sich über die äussere Hälfte der Hinterflügelzelle bis in das siebente und achte Randfeld fortsetzt. Das Prachtband, das auch hier vorkommt und für die eigentlichen Segelfalter bezeichnend ist, fehlt im ersten Randfelde wie bei *P. Anthus* Cr. und *P. Ecombar* Boisd., ist dagegen im zweiten (und manchmal im dritten) Randfelde innerhalb der breiten gelblich-weißen Mittelbinde, im sechsten bis achten Randfelde ausserhalb derselben und am Zellende erhalten. Daraus darf man schliessen, dass die Mittelbinde über das Zellende hinüber mit der äusseren Basalbinde verschmolzen ist. So erklären sich die hellen Tüpfel im fünften und sechsten Randfelde ausserhalb der Zelle als Reste der hinteren Mittelbindenhälfte; daher müssen wir beide Arten, deren ursprünglicher *P. Kirbyi* Hew. mit Resten von Zellbinden auf der Unterseite der Vorderflügel ist, zwar auf Formen mit zahlreicheren hellen Querbänden zurückführen, sie aber selbst wegen ihres Prachtbandes, ihrer Basalbinde, ihrer Postmarginalmonde, ihrer männlichen Dufteinrichtung doch noch den eigentlichen Segelfaltern zuzählen. Unter diesen erscheinen sie allerdings durch die Form der Randmonde, die starke Verdunkelung, die allmählig sich verstärkende Fühlerkeule, die plumpen Schwänze als periphere Form, weisen aber zugleich auf Vorfahren mit gelblich-weißer Grundfarbe hin, wie sie uns in keiner weiteren afrikanischen Art erhalten sind.

Diese in sich abgeschlossene Cohorte der afrikanischen Segelfalter eignet sich zu einem ausgezeichneten Prüfstein für jede Theorie von der Entstehung und Umbildung der Zeichnungen bei den *Papilioniden* überhaupt.

Segelfalter-artige Formen mit lebhaft grüner Grundfarbe, vollkommen erhaltenen Binden und allmählig sich verkürzenden Hinterflügelschwänzen führten vielleicht durch zunehmende Verdunkelung und theilweise Verschmelzung der hellen Binden zu *Agamemnon*-artigen Formen über, von denen *P. Tyndaracus* F. (Sierra Leone) am meisten an die Stammform erinnern dürfte. Dass letztere vielleicht von *Antheus*-artigen Formen ausging, deutet die starke Entwicklung der allerdings undentlichen und durch die Intercostralfalten getrennten Postmarginalmonde auf der Unterseite der Flügel an. In der Vorderflügelzelle liegen noch vier, theilweise in Tüpfel zerlegte Bindenreste, welche den drei vorletzten Binden von *P. Antheus* und der Terminalbinde entsprechen; ebenso kommen wie bei *P. Portham* Hüb., sogar noch zwei Gabelfeldtüpfel vor. Die marginalen Monde sind durch Intercostralfalten gespalten. An der Basis der Vorderflügel tritt anscheinend die Mittelbinde mit der äusseren Basalbinde zusammen; so dürfte die basale Verdunkelung an der Unterseite der Hinterflügel nur dem ersten und zweiten Basalbinde entsprechen und die Mittelbinde breit über die Zelle bis in's achte Randfeld vorgezogen sein. Zwar haben sich Reste der Prachtbinde nur in feinen silberglänzenden Zeichnungen im siebenten Randfelde und am Zellende erhalten, doch sind die innersten schwarzen Flecke im dritten und vierten Randfelde dem Prachtbände, wie die dahinter gelegenen dem Submarginalbände, zuzuschreiben. Es scheint dies ebenfalls dafür zu sprechen, dass hier die Mittelbinde in die Flur der zweiten Basalbinde eindrang und so das Prachtband hinten nach aussen drängte. Die rosenrothe Färbung der Bauchseiten und des Kopfes lässt sich von der bei *P. Antheus* Gr. und *Ecombar* Bsd. ange deuteten ableiten, und auch die stark gezackte Form der Hinterflügel erinnert an diese Gruppe.

Zelles-Cohorte
Tyndaracus-Gr.

Eine ebenfalls selbstständig abzuleitende Form ist *P. Cyrus* Boisd. (Madagascar), welcher nur mehr die zwei grossen hinteren Zellbinden von *P. Tyndaracus* F. in der Vorderflügelzelle, dagegen ebenfalls noch zwei Gabelfeldtüpfel besitzt und somit auf den Vorderflügeln eine regelmässige Mittelbinden- und ungetheilte Marginaltüpfelreihe erkennen lässt. Hier setzt sich die Mittelbinde schon bis an die Basis selbst fort. So tritt auch auf den Hinterflügeln die ursprüngliche Bänderung ganz zurück und verläuft die breite Mittelbinde über die Innenhälfte der Flügel. Auch diese Zeichnung lässt sich auf eine Segelfalter-artige zurückführen, indem der helle vorderste Tüpfel im achten Randfelde der ursprünglichen Mittelbinde, der leuchtend weisse im achten und siebenten der Prachtbinde und die hinter den innersten schwarzen Flecken, die dem Prachtbände zuzurechnen sind, gelegenen Aufhellungen wieder der ursprünglichen Mittelbinde angehören dürften. So entsprechen die vom zweiten bis siebenten Randfelde entwickelten schwarzen Flecke dem Submarginalbände und die ausserhalb von ihnen entwickelten der Marginalbinde. Auch das besonders an den Rändern der Flügelunterseite verbreitete Blutroth lässt sich auf Ausbildung der bei *P. Antheus* und *Erombar* Bsd. ange deuteten Färbung zurückführen. An dem kurzen breiten Kopf entwickeln sich hier die ersten Andeutungen weisser Tüpfel aus den Längsbinden.

Als weiteren Ausläufer eines *Agamemnon*-artigen Stammes, der vielleicht aus *Eucyphus*-artigen Formen hervorging, haben wir die kleine *Angolanus*-Gruppe anzusehen, welche noch helle Binden an der Stirn und am vordersten Cubitalast der Hinterflügel ein Zähnchen als Rest des Schwanzes aufweist, im achten Randfelde der Hinterflügel einen oft deutlichen orangenen Analleck besitzt, der dem Rest der Schmuckbinde entspricht, und im fünften bis siebenten Randfelde sogar noch Postmarginalmonde zu tragen

Angolanus-Gr.

scheint, wie sie noch *P. Tyndaræus* F. besitzt. Während die Marginalmonde vom zweiten bis siebenten Randfelde der Hinterflügel entwickelt sind, zieht sich der Rest der ursprünglichen Mittelbinde vom siebenten bis zum vierten Randfelde hinauf. So ist hier ebenfalls die nach innen vorgedrungene ursprüngliche Mittelbinde der Vorderflügel in die zweite Basalbinde der hinteren übergegangen. Kopt., Nacken und Brustseiten tragen weisse Flecke: somit stellt die *Angolanus*-Gruppe ein Analogon zu *P. Xenocles* etc. (Indien) dar.

Die schon in *P. Angolanus* Goeze (*Pylades* F.), der in seinen verschiedenen Varietäten oberflächlich betrachtet mehr an *Danaiden* als an Segelfalter erinnert, angedeutete mimetische Anpassung findet ihren weiteren Ausdruck in *P. Ridleyanus* White (Congo), der sich durch die stärkere Verlängerung der Vorderflügel und die Verkürzung der hinteren als abgeleitet erweist, aber noch wie *P. Pylades* drei bis vier Vorderflügel-Zellbindenreste und einige Postmarginalmonde am Innenwinkel der Hinterflügel besitzt. Hier geht die Mittelbinde so breit über die hinteren Flügel, dass nur mehr die drei Saummonde im fünften bis siebenten Randfelde von ihr abgetrennt, die Randbindenflecke dagegen theilweise von ihr aufgenommen sind. Diese Art ist schon als mimetische Form aufzufassen, da nicht allein die lebhaft rothe Färbung der letzten sieben Mittelbindenflecke der Vorder- und der Hinterflügelbinde der Färbung von *Acr. curyta* L., sondern auch die Flügelform dem *Acraeentypus* überhaupt angepasst ist.

Leonidas G.

Von *Cyrenus*-artigen Formen, denen er noch in der Längsstreifung des Hinterleibes gleicht, haben wir den *P. Leonidas* F. abzuleiten, welchen C. und R. Felder mit *P. Ridleyanus* White in ihrer Section XXXI vereinigten. *P. Leonidas* besitzt drei Zellbinden, deren basale bis zur Basis verlängert ist, und zwei Gabelfeldtüpfel wie *P. Cyrenus* F., dagegen sind einzelne Tüpfel der Aussenzellbinde, so im zweiten und fünften Randfelde, durch Verdunkelung stark verkleinert. Auf den Hinterflügeln sind die schwarzen Flecke erloschen und liegen somit in einer röthlich-grauen, breiten Aufhellung helle Tüpfel, von denen die inneren im achten Randfelde der Pracht-, im siebenten bis vierten aber der ursprünglichen Mittelbinde, die äusseren dagegen im achten Randfelde der Mittelbinde und sonst der Marginalbinde entsprechen dürften. An der Basis der Hinterflügel tritt ein schwarzer weissgekernter Fleck an der Zelle und eine rostrothe, an *Cyrenus* erinnernde Vorderrandsfärbung auf; letztere wiederholt sich auch auf den Vorderflügeln. Während *P. Leonidas* F. (Westküste) nur auf der Oberseite etwas der schwarzgrünen *Donaus Limniace* var. *Petieranus* Doubl. ähnlich ist, auf der Unterseite dagegen höchstens an *Amauris*-Arten erinnern dürfte, gleicht die capländische Rasse, *Anthemonus* Wall., mit viel stärkerer Verdunkelung der weisslichen statt grünen Tüpfel und schwach lehmgelber Aufhellung der Hinterflügel ebenfalls in beiden Geschlechtern durchaus einer *Amauris Eschervia* Tr., wie auch Trimen hervorbebt.

Näher an *P. Tyndaræus* F. schliesst sich *P. Latreilleanus* Godt. (Westküste) an. So besitzt er nur mehr die mittlere der drei Vorderflügelzellbinden von *P. Tyndaræus*, eine entwickelte, wie bei letzterem gegen die Basis vorspringende Mittelbinde und ebenfalls getheilte, noch undeutlichere Marginalmonde, von denen im sechsten Randfelde der Vorderflügel der hintere auf der Oberseite fehlt. Auch die Ausdehnung der Mittelbinde über die Hinterflügel zeigt ähnliche Lage, doch ist sie durch die Ausdehnung des dunklen Submarginalbandes über das Zellende aussen unterdrückt.

Eine Weiterbildung der mimetischen Anpassung erfolgt wieder durch Erblässen der grünen Farbe in eine weissliche und fortgesetzte Verdunkelung, welche auf den Vorderflügeln im zweiten Randfelde sich längs über den Flügel zieht und auf den Hinterflügeln das vollkommene Erlöschen der Randbindenflecke bedingt. So entstehen Formen wie *P. Ucalagon* Hew. (Alt-Calabar), welche eine gewisse oberflächliche

Ähnlichkeit mit der gemeinsten *Acras*, dem Weibchen der *Acr. Gea* L., besitzen, aber noch die etwas gezackten Hinterflügel von *P. Latreilleanus* Godt. erkennen lassen, während die bei *P. Latreilleanus* Godt. über die Zelle verlaufende Binde zahlreicher Flecke ganz erloschen ist. Wie bei *P. Tyndaracus* lassen sich auch hier im siebenten und achten Randfelde und in der Mittelzelle vorkommende geschlängelte silberweisse Linien als Reste der Prachtbinde auffassen, dagegen hat sich das erste und zweite Basalband in Flecke aufgelöst. Die Flecke des Submarginalbandes bilden eine über das Zellende verlaufende mehrfache Reihe, ausserhalb deren die Randmonde zwar oben noch gelbgrün vorleuchten, unten aber erloschen sind. Zugleich bilden sich die dunklen Zellfalten in der Vorderflügelzelle aus; so entsteht eine gewisse Ähnlichkeit des ruhenden Thieres mit Vertretern einiger Gruppen von *Acras*, die sich durch starke Fleckung der Unterseite der Hinterflügel auszeichnen.

Aus *P. Leonidas* ähnlichen kleineren Formen entstanden jene zahlreichen Arten der von C. u. R. Felder noch nicht abgetrennten *Agameles*-Untergruppe, welche auf der Oberseite durch die weissliche Mittelbinde, die in die dunkle Vorderflügelzelle hakig einspringt, und die Aufhellung der Flügelspitze; oberflächlich an kleine schwarzweisse *Acras*, auf der Unterseite dagegen durch die schwach rauchbraune Verdunkelung des Aussenrandes und die rostgelbe, einen schwarzen weissgekernten Fleck tragende Färbung der Basis mehr an *Amauris*-Arten erinnern. Doch dürfte immerhin auch diese aus dürftigen schwachfliegenden und selteneren Formen bestehende Untergruppe nicht allein als typisch afrikanisch, sondern zugleich als in geringem Grade mimetisch, den herrschenden immunen Formen der *Amauris* und *Acras* angepasst, anzusehen sein, obgleich keine der Arten eine besondere Ähnlichkeit mit einer der immunen Formen besitzt.

Die Nahrung der Raupen gleicht der bei den indischen Segelfaltern; so frisst nach R. Trimen die Raupe von *P. Leonidas* F. *Pupovia caffra* und die von *P. Policeus* F. ebenfalls *Amanoa*.

Schliesslich erhalten wir folgende Entwicklungsstufen der afrikanischen Segelfalter:

	<i>Angolanus</i> -Gr.	<i>Leonidas</i> -Gr.
Zweite Cohorte:	<i>Tyndaracus</i> -Gr.	
	<i>Policeus</i> -Gr.	<i>Kibaji</i> -Gr.
Erste Cohorte:	<i>Colonna</i> -Gr.	

Rhesus-artige Vorfahren (echte Segelfalter).

2. Afrikanische Rinnenfalter.

Die reichste und zugleich ursprünglichste Zeichnung unter denjenigen afrikanischen Rinnenfaltern, welche stets zu *Papilio* gerechnet wurden, finden wir bei *P. Demoleus* Cr., welcher den indisch-australischen *P. Erithonius* Cr. vertritt, aber nicht einmal mehr den zahnartigen Schwanzrest des letzteren besitzt. Auch seine Zeichnung weicht von der der indisch-australischen Art durch grössere Rückbildung einiger ursprünglicher Charactere ab; so ist die als Rest der Submarginalbinde auftretende orangene Bestäubung auf der Unterseite der Vorderflügel weniger deutlich, wemgleich sie noch ein Randfeld weiter nach hinten reicht; weiter ist die Mittelbinde der Hinterflügel stark verschmälert, da sich das dritte Basalband stark verbreiterte und nach aussen vorrückte. Zugleich ist die Verdunkelung am Zellende der Hinterflügel stärker ausgebildet als bei *P. Erithonius* Cr. und auch der Flügelbrunn zwischen Mittelbinde und Submarginalband unter Ausdehnung des inneren Grenzstreifens des letzteren stark verdunkelt. Dagegen muss man die mehr

an den Aussenrand gerückte Lage der Marginalbinde und des Submarginalbandes, dessen vorderster Fleck ebenfalls augenartig umgewandelt ist, für ursprünglicher halten als sie bei der vicariirenden indischen Art ist. Auch bei *P. Demoleus* Cr. ist die Fühlerkeule an der Oberseite gelb gefärbt, trägt der Kopf und Nacken noch zwei gelbliche Längsbinden, ist der Hinterleib von einem breiten, grün bespritzten dorsalen Bande, zwei auf den Stigmen und zwei ventral gelegenen schwarzen Längsstreifen durchzogen.

Menestheus-
Gr.

In der Flügelform steht *P. Menestheus* Dru. (Westafrika), welcher bei C. u. R. Felder die Section LII bildet, der hypothetischen Stammform der afrikanischen Rinnenfalter noch näher als *P. Demoleus* L., dem er trägt noch einen kräftigen spathelförmigen Hinterflügelschwanz. Dagegen sind seine schwarzen Fühler schon stark verlängert und die Zeichnung grossentheils durch Reduction auf die von *P. Demoleus* zurückführbar. So besitzt er in der Mittelzelle noch die hellen Streifen an der Unterseite auch der Hinterflügel. Auf den Vorderflügeln ist nur der innere, allerdings noch unten verschmolzene Bindenrest der zwei bei *P. Demoleus* L. erhaltenen Zellbinden erhalten; ebenso ist im sechsten Randfelde der Randmond mit dem Saamtüpfel verbunden und fehlt der Marginaltüpfel im siebenten Randfelde der Vorderflügel wie bei den übrigen Formen; auch ist die Submarginalbinde vollkommen verdunkelt. Wie bei *P. Demoleus* zieht sich auf den Hinterflügeln die Mittelbinde über die Aussenhälfte der Mittelzelle und entwickelt sich die Marginalbinde in grossen Tüpfeln, deren vorderster ebenfalls noch orangene Farbe trägt; dagegen ist das Submarginalband verschwommen und gegen die Zelle hin auseinandergezogen. Vor *P. Demoleus* zeichnet sich das Männchen von *P. Menestheus* Dru. noch durch den seidenglänzenden Filzbelag auf der Oberseite der Vorderflügel ausserhalb der Zelle aus, der nur die weissen Bindentüpfel frei lässt und sich sonst vom ersten Medianast bis zur Dorsalis ausdehnt. Solche sexuelle Auszeichnung finden wir ausser bei einigen abzuleitenden afrikanischen Arten als Filzstreifen auch auf den Vorderflügeln von Vertretern der indischen *Gigas*-, *Ulysses*-, *Paris*- etc. Gruppe. — Der südlichere Vertreter dieser westafrikanischen Art ist *P. ophidicephalus* Tr.

Hesperus-Gr.

Auf ähnliche Formen wie *P. Menestheus* Dru. dürfte auch *P. Hesperus* Dbld. von der Goldküste zurückzuführen sein, der auf der Oberseite noch den für die folgenden Gruppen so charakteristischen Rest der Marginalbinde im Gabelfelde der Vorderflügel besitzt und dessen Aussenzellbinde auf letzteren in der Mitte durch Verdunkelung undeutlich geworden ist und sich über die Zelle der Hinterflügel wie bei *P. Menestheus* Dru. fortsetzt. Auf der Oberseite der Hinterflügel sind einzelne weisse Tüpfel des zweiten, fünften und sechsten Randfeldes der Randbinde zuzuschreiben. Die Hinterflügel sind unten zum Zweck der Entwicklung einer bräunlichen, etwas bronceglänzenden, typisch-afrikanischen Schutzfärbung selbst über die Mittelbindenränder hinaus stark verdunkelt. Dieselbe Färbung trägt auch die Unterseite der Vorderflügel an der Spitze soweit, dass das Thier in der Ruhestellung die lebhaft schwefelgelben Flecke auf sammet-schwarzem Grunde nicht auffällig werden lässt.

Hierher gehört auch wohl der mir unbekannt gebliebene *P. Euphrator* Tr. (Kattierland).

Delalande-Gr.

Auf ähnliche Formen wie *P. Menestheus* Dru. ist *P. Delalandi* Lac. (Südafrika) zurückzuführen, der sich an ihn so eng anschliesst, dass wir es vorziehen, ihn aus der etwas gemischten Gesellschaft, in der er bei C. und R. Felder in Section LV steht, hierher zu stellen. Er steht *P. Menestheus* Dru. durch die theilweise Erhaltung der Filzstreifen auf der Oberseite und besonders durch die beiden gemeinsame Zellbinde der Vorderflügel nahe, während die Abweichungen der Zeichnung meist auf Modifikation und Verdunkelung der bei *P. Menestheus* ausgesprochenen ursprünglicheren zurückzuführen sind. So sind die Marginal- und Aussenzelltüpfel der Vorderflügel unten zwar noch zu einer continuirlichen Binde ver-

schmolzen. Dagegen sind auf den Hinterflügeln, deren Mittelbinde nur über das äusserste Zellende geht und nach aussen über den Rippen zackenartig vorspringt, Marginal- und Submarginalbinde vom zweiten bis siebenten Randfelde erloschen, aber die Limbalhäufel stark ausgebildet. Der spatelförmige Schwanz trägt nur einen Endtüpfel statt der symmetrischen Limbalmonde. Im achten Randfelde liegt noch ein entwickelter orangener, auch oben vortretender Rand- und ein blauer Submarginalmond, doch tritt im siebenten nur ein Rest der Submarginalbinde innerhalb der breiten Mittelbinde auf. Von einem an *Delalandei* erinnernden Stamm ist auch *P. Moingoua* Hew. (Madagascar) abzuleiten, welcher noch die Form der Mittelbinde und die Zellaufhellung der Vorderflügel wie erstere Art besitzt. Derselbe leitet aber schon durch die Umwandlung der hellen Grundfarbe in Blau auf der Oberseite und die Verdunkelung der Deckfarbe zu den folgenden Gruppen über, bei welchen beide Geschlechter die schöne blaugrüne oder lasurblaue Mittelbinde auf der Oberseite der Vorderflügel, unten hingegen eine oft nur im Weibchen besser ausgebildete rauchbraune Schutzfärbung besitzen, welche die ursprüngliche Zeichnung theilweise verdeckt. Es sind dies die von C. und R. Felder direct hinter *P. Menestheus* Orb. (Zanzibar) Drn. gestellten Formen seiner Section LIV, die stärkere Fühler, einen schwarzen Thorax, weisse Tüpfel auf Kopf und Nacken, breitere Genitaldeckklappen des Männchens und ein in beiden Geschlechtern ausgebildeteres und flacheres Innenfeld besitzen. Nach der Form besonders der Hinterflügel, die noch einen deutlich spatelförmigen Schwanz tragen, und nach der Zeichnung besonders der Unterseite dürfte wohl der madagassische *P. Oribazus* Westw. der Grundform näher stehen. Derselbe besitzt auf der Oberseite noch eine breite, lasurblaue, mit der Zellbinde verschmolzene Mittelbinde und am Vorderrande der Vorderflügel zwei Marginalbindenlecke. Dagegen treten auf den hinteren noch ausser der breiten blauen Mittelbinde vom dritten bis siebenten Randfelde entwickelte blaue Marginalmonde auf, welche allerdings in den letzten Feldern durch Intercostalfalten getheilt sind. Auch die durch ausgebildete rauchbraune Schutzfärbung verschwommene Unterseitenzeichnung lässt mehrere Binden erkennen; so scheint auf dem Vorderflügel die breite Aussenzellbinde noch durch ein entwickeltes Inframarginalband getheilt, während auf den Hinterflügeln sich ausser einer über die Zelle gehenden Mittelbinde noch zwei helle, wohl der Zwischen- und Submarginalbinde zuzurechnende Binden und eine ebenfalls im achten Randfelde erloschene Marginalbinde erkennen lässt. Daher erinnern die Blaubinden der Oberseite und die Unterseitenzeichnung an die australische *Ulysses*-Gruppe; dagegen scheinen Filzstreifen auf der Oberseite der Vorderflügel in dieser Gruppe nicht mehr vorzukommen.

Die weiteren mehr abgeleiteten Arten, deren manche noch eine Zellbinde und eine regelmässiger Erhaltung der Marginalhäufel auf der Oberseite der Vorderflügel besitzen, zeichnen sich im Allgemeinen durch allmälige Zerschnürung der blauen Mittelbinde der Vorderflügel und durch allmälige Reduction der Schwänze aus. So führt *P. Oribazus* Boisld. (Madagascar) in die Felder's Subsection A entsprechende Untergruppe über, die aus *P. Epiphorbas* Boisld. (Madagascar), *P. Phorbanta* L. (Mauritius, Bourbon) und den continentalen Formen *Bromius* Dblld., *Erinus* Gray, *Pseudo-Niveus* Feld., *Niveus* L. und *Lycus* Dblld. besteht und sich durch die hinten stark ausgezogenen vorletzten Randfelder der Hinterflügel auszeichnet, in welche der Schwanz innen allmälige übergeht. Bei diesen Arten tritt nun zuerst ein Dimorphismus der Geschlechter besonders an der Unterseite der Hinterflügel hervor, indem sich bei den Weibchen die ursprünglichere Zusammensetzung aus drei bis vier hellen Binden erhält und zugleich in den Dienst der Schutzfärbung tritt, während bei den Männchen auf den Hinterflügeln meist nur die gedoppelten Randbindenlecke in leuchtendem Silberweiss von dem stark verdunkelten Grunde sich abheben. Bei *P. dispersus*

Boisd. (Bourbon, Madagascar) tritt endlich bei den Weibchen auch auf der Oberseite die Innenbinde zurück, sodass wir eine unscheinbare rauchbraune Form mit helleren Randbündentüpfeln vor uns haben, wodurch die Erscheinung des viel selteneren Weibchens an die auf ihrem Wohngebiet ja noch erhaltenen, auf dem Continent Afrikas aber fehlenden *Euploea*, wenn auch nur oberflächlich, erinnern dürfte.

Constantinus-
Gr.

Eine zweite ursprünglichere von *Menestheus*-artigen Vorfahren abzuleitende Form ist *P. Constantinus* Ward (Ost- [und West-?] Küste), eine C. und R. Felder noch unbekannte Art, bei deren Männchen auf der Oberseite beider Flügel noch breite Filzschuppenmassen entwickelt sind. Wie *P. Menestheus* Dru. besitzt auch noch *P. Constantinus* Ward einen Rest der äusseren Zellbinde der Vorderflügel, eine an *P. Demoleus* L. erinnernde gelbe Fühlerspitze und jederseits zwei Abdominalstreifen. Auf den Vorderflügeln ist dagegen ein Theil der Randmonde ausgefallen, während der doppelte Schwanztüpfel der Hinterflügel noch an *P. Menestheus* selbst erinnert. Die Zellfallen sind an der Unterseite beider Flügel dunkel gefärbt.

Phorcas-Gr.

Wie die *Oribazus*-Gruppe auf *Menestheus*-artige, darf *P. Charopus* Westw. (Goldküste), eine von C. u. R. Felder nicht untersuchte Art, auf *Constantinus*-artige Vorfahren zurückgeführt werden. So stelle ich diese Form, welche sich von *P. Phorcas* nur durch die stärkere Umbildung der Hinterflügelunterseite zur Schutzfärbung unterscheidet, die ja schon bei *P. Constantinus* angedeutet ist, mit *P. Phorcas* Cr. (Westküste) in eine Gruppe. Den Grundformen derselben dürfte aber letztere Art noch näher stehen, da die eine ihrer beiden Weibchenformen, früher als *P. Thersander* F. unterschieden, sich in der Zeichnung von *P. Constantinus* ♀ fast nur durch das Verschwinden der Vorderflügelzellbinde unterscheidet, und ebenfalls im ersten und zweiten Randfelde derselben Flügel keine Marginalmonde mehr besitzt, dagegen noch die zwei hellen Tüpfel am Hinterflügelchwanz trägt. Diese seltene Weibchenform ist somit als ursprünglicher als die häutigere Form anzusehen; sie steht den Vorfahren der Art näher und kann ebensowohl sich ursprünglich erhalten haben als neu durch Rückschlag auf die nächste Vorform entstanden sein. Im Gegensatz zu var. *Thersander* trägt das gewöhnliche Weibchen, wie *P. Charopus* Westw., auf dem grauschwarzen Grunde der Oberseite beider Flügel eine lebhaft maiengrüne Mittelbinde und weniger Randbindenflecke der Vorderflügel. Diese Färbung findet bei den Männchen noch stärkeren Ausdruck und stellt offenbar eine Schmuckfarbe dar, die zuerst bei dem Männchen entstand, zumal mit ihr eine Reduction des exclusiv männlichen Filzbelages auf der Oberseite zusammenhängt wie bei der *Oribazus-Nireus*-Gruppe.

Meropis-Gr.

Ein weiterer Ausläufer *Thersander*-artiger Formen dürfte auch *P. Meropis* F. sein, dessen Männchen in der Scheibe beider Flügel durch die von hinten und aussen fortgeschrittene Ausdehnung der Mittelbinde bis zur Basis aufgehellt und schwefelgelb gefärbt ist. So heben sich auf den Vorderflügeln eine schmal-schwarze Vorderrands- und eine breite, von dem in der Gabelzelle liegenden Marginalbindenrest unterbrochene Seitenrandumfassung scharf ab, während auf den Hinterflügeln ausser dem breiten stark verdunkelten Submarginalbände noch das aussen die Marginalmonde begrenzende Postmarginalband auftritt. Auch die Zeichnung der Unterseite entspricht bei den ursprünglicheren Formen mit wenig abweichendem Weibchen, so *P. var. Meropis* Feld. (Madagascar), dieser durchaus an *P. Thersander* erinnernden Zeichnung. Wie bei letzterwähnter Art zeigt die Hinterflügelzelle auch noch drei dunkle Medianstreifen und ist der Schwanz noch spatelförmig und kräftig entwickelt. Die ausgesprochene Aufhellung der Flügel erstreckt sich auch auf den Leib, welcher statt breiter dunkler Streifen nur mehr schwarze Fleckreihen auf bedeutend aufgehelltem fahlgelben Grunde trägt. In *P. Meropis* tritt uns nun wieder eine Form entgegen, bei welcher der Polymorphismus der Weibchen nur durch secundäre mimetische Anpassung an Arten der

Panaisengattungen *Danaus* und der rein afrikanischen *Amauris* entstanden ist. Zugleich bietet diese Art sicherlich das werthvollste Beispiel der Mimicry unter allen Thieren.

So besitzt die madagassische Form *P.* var. *Meriones* Feld, ein Weibchen, welches sich von dem Männchen nur durch einen in die Vorderflügelzelle vorspringenden schwarzen Keilfleck unterscheidet.

Auf dem Continent treten dagegen schon Varietäten des Männchens auf, zu welchen bestimmte weibliche Formen gehören, die mit ihnen geographisch bestimmte Rassen bilden, welche ineinander theilweise übergehen.

So unterscheide ich die abessinische Rasse als var. *Antinorii* Oberth., die westafrikanische (Goldküste) als var. *Brutus* F. (*sulphureus* Beauv. bei C. und R. Felder), die capländische als var. *Tiballus* Kirby (*Cenca* Trin.).

Die Unterschiede der Männchen sind gering und wenig constant. So zeichnet sich *P. Merope* var. *Tiballus* (= *Cenca* Trin.) nach Trimen¹⁾ vor *P. Merope* var. *Brutus* F. durch kürzere Flügel, dunklere und mehr röthliche Unterseite, kürzeren Schwanz, feinere Nervenstriche auf der Unterseite beider und mehr zusammenhängendes, rostramrothes, nicht dunkles (submarginal-) Band auf der Unterseite der Hinterflügel aus. Bei *P. Merope* var. *Brutus* F. sind die Submarginalflecke auf der Oberseite der Hinterflügel im sechsten Randfelde meist ganz oder doch theilweise unterbrochen, und ist das Submarginalband an der Unterseite matt kaffeebraun. Noch stärker wird diese Aufhellung bei der abessinischen *Merope* var. *Antinorii* Oberth.²⁾, indem hier zwar das schwarze Vorderrandsband der Vorderflügel etwas schärfer vorspringt, aber das Submarginalband auf den Hinterflügeln im vierten bis sechsten Randfelde ganz zurücktritt oder doch nur in einigen Flecken sich erhält und auch das Band auf der Unterseite der Hinterflügel noch mehr verschwimmt.

Bei *P. Antinorii* Oberth. treten nun, wie N. Kheil³⁾ vor Kurzem erörterte, mehrere Formen der selteneren Weibchen auf, die aber noch alle den spathelförmigen Schwanz des Männchens tragen. Von ihnen besitzen zwei Varietäten auch noch die Färbung der Männchen und die eine derselben zeichnet sich nur durch lebhafteres Gelb der Grundfarbe und mehr rostgelbliches Submarginalband der Hinterflügelunterseite aus. Ausser diesen beiden treten aber noch zwei mimetische Weibchenformen auf (vergl. Tafel II, deren Zeichnungsanlage an die Zeichnung von *P. Constantinus* Ward oder *P. Phorcas* ♀ *Thersander* F. erinnert, indem auf den Hinterflügeln zahlreiche tüpfelartige, getheilte Randmonde in dunklerem Grunde erscheinen und solche sich auch in den hintersten Rand-, einem Vorderrandfelde und, zu einem breiteren Binde rest vereinigt, ausserhalb der Zelle der Vorderflügel zeigen. Durch Variation und Auslese der Varietäten entstanden hieraus wohl allmählig die beiden charakteristischen, zuerst von Kheil abgebildeten Formen, die auf schwarzem Grunde der Aussenrandfärbung der Vorderflügel einen Aussenzellbinderrest und einen breiten, nur vom vierten Randfelde bis zum Innenrande gehenden Spiegel tragen. Letzterer ist bei der var. *Nivioides* Kheil leuchtend schneeweiß, bei der var. *Raspinae* Kheil dagegen auffällig rostroth. Bei der var. *Raspinae* scheint am Vorderrande des rostrothen Spiegels der Vorderflügel wie am Aussenrande der ebenfalls rostrothen Hinterflügel aufhellung das ursprüngliche Schwefelgelb der Grundfarbe noch schmal durch; daraus erhellt, dass die Umbildung auf jedem Flügel von Linien nach

¹⁾ R. Trimen and Bowker, South African Butterflies, III, 1889, p. 251.

²⁾ Vergl. Ch. Oberthür, Catal. raisonné des Papilionides. (Études d'Entomol. III.) Rennes 1878.

³⁾ N. Kheil, Fieber geschlechtlichen Dimorphismus des abessinischen *Papilio Antinorii*, Correspondenzblatt des Vereines „Jbis“ [Deutsche ent. Zeitschr. Lepidopteren], Helvet., 1890, p. 333, 336.

vorn vor sich gegangen ist. Dagegen bleiben die am Vorderrande gelegenen Bindenreste in schwarzem Grunde bei beiden leuchtend weiss. So entsteht eine, von den Schwänzen abgesehen, in die Augen springende Aehnlichkeit beider Formen mit *Danaiden*. Und zwar gleicht die Form *Niavioides* Kheil dem *Amauris Niarius* L., die Form *Ruspinae* Kheil dem *Danaus Chrysippus* L.

Mit der Verbreitung der Art nach Süden tritt eine Erhöhung der mimetischen Umbildung der Weibchen ein. So kommen anscheinend schon bei den Formen von der Sierra Leone keine männchenfarbigen, ja nicht einmal geschwänzte Weibchen mehr vor. Auch dort müssen die Weibchen noch sehr selten sein, denn unser Museum erhielt unter zehn Männchen, die ihm durch die gütige Vermittlung des Herrn Prof. Chun von Herrn Bullheimer aus Accra überwiesen wurden, kein weibliches Stück. Die Weibchen der Form *Brutus* sind nur eine Weiterbildung der abessinischen Varietäten, insofern als das ♀ *Hippocoon* F. (*Westermanni* Boisd.) genau dem *Amauris Niarius* L. gleicht.

Weiter entsteht aus der var. *Ruspinae* durch Fortfall des Hinterflügelchwanzes die vielleicht auch schon in Westafrika vorkommende Form *Trophonius* Westw., die dem rotbraunen *Danaus Chrysippus* L. gleicht, und die var. *Cephonius* Hopffr., die wiederum an *Amauris*-Arten erinnert. In Südafrika dagegen tritt als neue mimetische Form das ♀ *Cenea* Stoll auf, das in überraschender Weise dem dort häufigen *Am. Escheria* gleicht, indem es auf den schwarzbraun verdunkelten Vorderflügeln zahlreiche weisse Tüpfel trägt, deren einer wie bei den abessinischen mimetischen Weibchen in der Zelle, andere ausserhalb derselben neben und hinter ihr liegen. Weiter nimmt auf den an der Basis wie bei dem Modell verdunkelten Hinterflügeln die Mittelbinde eine gelbbraune Färbung an und heben sich in dem breiten Randsaum die getheilten Marginalmonde deutlich ab. Die mimetische Färbungsanpassung erstreckt sich auch auf die Unterseite. Zugleich wandelt sich die var. *Hippocoon* entsprechend ihrem Modell, das als *A. Dominicanus* Trim. sich durch leuchtendere grössere Aufhellung der Flügel auszeichnet, ebenfalls in eine Form mit stärker contrastirender Flügelfärbung um, die wir *Hippocoonides* nennen wollen.

In Zanzibar und besonders dem Caplande giebt es zahlreiche Zwischenformen zwischen *P. Cenea* und *P. Hippocoonides*, welche von Trimen, Butler und Kirby genauer unterschieden werden, zu deren Beurtheilung mir es aber an Literatur und Material fehlt. Eine der häufigeren, *Diomyos* Dobl., die mit anderen Varietäten auch von Hewitson¹⁾ abgebildet wurde, ist eine durch die fast schneeweissen Vorderflügel und die saffrangelben Hinterflügel sehr auffällige und zudem nutzlose Varietät, da sie kein Modell in Afrika besitzt: so ist es wahrscheinlich, dass sie bei starker Verfolgung der Art bald aussterben wird.

Bei den nachfolgenden Formen hat sich der Verlust des Hinterflügelchwanzes auch auf das Männchen ausgedehnt.

Zenobasid.

So ergab eine fast schwanzlose, auf *Menestheus*-artige Vorfahren zurückzuführende Form mit schwarzbrauner Flügelfarbe und breit entwickelter, über die äussere Zelhälfte gehender Mittelbinde beider Flügel die *Zenobia*-Gruppe, welche theilweise Felder's Sectionen LVI und LVII entspricht. Die ursprünglichste Art derselben dürfte nach der lang und schmal ausgezogenen Form der Hinterflügel, welche an *P. Nireus* L. erinnert, *P. Mechowianus* Dew. sein. Sind auch die Marginalbindenflecke auf beiden Flügeln mit Ausnahme des Tüpfels im Gabelfelde durch Verdunkelung des Aussenrandes vollkommen verdeckt, so finden wir doch die drei dunklen Streifen von *P. Nireus* etc. in der Hinterflügelzelle wieder.

¹⁾ Exotic Butterflies. IV, *Papilio*, Taf. XII, Fig. 39, 40 etc.

Auch die rostbraune Basalfärbung der Unterseite der Hinterflügel erinnert an diese Untergruppe. Wie *P. Mechorianus* Dew. hat auch *P. Cypraeajila* Butl. im zweiten Randfelde der Hinterflügelunterseite noch einen einfachen schwarzen Intercoastalstreif. Bei *P. Zenobia* F. und *Cyorta* F., bei denen auch zwei Innenbindentüpfel auf den Vorderflügeln durch Verdunkelung ausfallen, ist dieser Streifen in zwei neben einander liegende Flecke zerlegt, wodurch die schützende Aehnlichkeit mit *Aeraca (Planema) Gea* L. in der Ruhestellung erhöht wird. Die übrigen Intercoastalstreifen sind sehr deutlich und reichen, nur durch die weisse Mittelbinde unterbrochen, bis zur Basis des Flügels.

Bei *P. Cyorta* F. (Westafrika), welches als Männchen noch die bei *P. Cypraeajila* Butl. weniger deutliche Filzbekleidung auf der Oberseite der Vorderflügel trägt, wird dieser Nutzen oberflächlicher *Aeraca*-Aehnlichkeit, welche auch die übrigen Glieder der Gruppe zeigen, für das Weibchen (*P. Boisduvalianus* Westw.) noch dadurch erhöht, dass dieses sich auch auf der Oberseite durchaus dem Weibchen der häufigsten *Aeraca*, *Planema Gea* L., anpasst.

Bei dem auf Südafrika beschränkten *P. ochrooides* Trim., dessen Männchen auf der Oberseite der Vorderflügel ebenfalls einen Filzschuppenbelag trägt, gleicht das äusserst seltene Weibchen einer anderen innumen Art, der für südafrikanische Wälder typischen *Amauris Escheria* Trim., auf das Täuschendste und lebt auch an denselben Orten.

Besprechen wir nun die in beiden Geschlechtern wahrscheinlich gleichgefärbten abweichendsten Arten afrikanischer Papilionen, *P. Zalmois* Hew., *var* Oberth. und *Antimachus* Dru.

Gegen die von E. Schatz 1885 befürwortete Zurechnung des *P. Zalmois* zur Gattung *Ornithoptera* Boisd. wandte sich auch C. Fickert (l. c. p. 755) insoweit, als er jegliche Hypothesen über die Entstehung der Zeichnung sowohl wie über den Platz im System für diese Art mehr oder minder vage nannte, wenn man nicht die damals noch unbekanntem Weibchen berücksichtigte. Jedenfalls aber hält er es für gewiss, „dass die Art weder zu den *Pompeus*- noch auch zu den *Priamus*-Arten in irgend welchen genetischen Zusammenhang gebracht werden kann.“ Während dessen ist mittlerweile auch das Weibchen von *P. Zalmois* Hew. gefangen worden, welches sich von dem Männchen in wesentlichen Punkten nicht unterscheidet. Aber auch ohne diese Entdeckung war die Stellung der Art durch die Untersuchung des Flügelgeädels bestimmbar.

In der Zelle der Vorderflügel zeigt *Zalmois* vier, in der der Hinterflügel drei dunkle Concaavtalen, wie sie bei den meisten Formen der afrikanischen Papilionen mit Annäherne der Hinterflügel vorkommen. So ist auch die letztere noch deutlich erkennbar und ebenso findet sich die starke Ausbildung des flachen Innenfeldes innerhalb der Dorsalrippe wie in der *Zenobius*-Gruppe, welche auch die verdunkelten intercoastalen Falten in der äusseren Flügelhälfte besitzt. Auch die Zeichnung der Unterseite von *P. Zalmois* lässt sich bei vielen Formen dieser Untergattung (*Nireus* F., und wie auch Fickert richtig hervorhebt, *Merope*-Weibchen) wiederfinden und erinnert zugleich an die der *Zenobius*-Gruppe; ebenso entsprechen die blauen, in jedem Randfelde der Hinterflügel durch den Einfluss der Intercoastalfalten gespaltenen Marginaltüpfel den ebenfalls oben blaugrünen Randbindenflecken der *Nireus*-Gruppe. Auch die weissen paarigen Tüpfel des dunklen Vorderkörpers, die weiche Behaarung des Thorax, der kurze Stiel der Radialgabel, die mit einem spitzen Zipfel endigende Fühlerform hat *P. Zalmois* mit der *Nireus*-Gruppe gemein. Weiter besitzt er noch einige Zacken am Aussenrande und einen schwachen Zahn am Ende des dritten Medianastes der Hinterflügel. Auch die basal rostbraun, median weisslich aufgehellte Schutzfärbung

Zalmois-Gr.

der Unterseite der Hinterflügel lässt sich auf die *Nireus*-Gruppe zurückführen und *P. Zalmoxis* Hew. hiermit in Beziehung auf Zeichnung und Flügelform als ihr Endausläufer ansehen.

Rex-Gr.

An *P. Zalmoxis* Hew. schliesst sich am besten der bisher nur in einem Stück gefundene *P. rex* Oberth. an, der eine genaue Copie des ebenfalls in Centralafrika vorkommenden *Danaus formosus* Godm. darstellt, mit dem er auch die rostgelbe Aufhellung der Vorderflügelbasis theilt. In der Aussenhälfte der Mittelzelle liegen zwei scharf umgrenzte, unten grössere, helle Tüpfel, die wie alle übrigen Aufhellungen der Oberseite eine grünliche Farbe tragen und als Zellbindenreste anzusehen sind. Ausserhalb der Flügelzelle treten nur noch zwei weniger regelmässige Binden auf, deren innere bis zum Vorgabelfelde reicht und die Aussenzellbinde darstellt, deren äussere ebensoweit entwickelte dagegen der Marginalbinde entspricht; auch die Saumbindentüpfel sind gut ausgebildet. Auf den Hinterflügel geht die basale Aufhellung mit der Aussenzellbinde verbunden als Mittelbinde noch über die Zelle hinüber. Dagegen ist die Marginalbinde durch die Intercostralfalten derart zerschnürt, dass ihre äussere Hälfte im siebenten bis achten und die innere im dritten bis fünften Randfelde nach innen vorspringt, sodass eine Doppelreihe heller Tüpfel wie bei den *Danaiden* vorgetäuscht wird. Nach der Abbildung, welche ich der Liebenswürdigkeit des Herrn René Oberthür in Rennes verdanke, tritt das Innenfeld innerhalb der Dorsalrippe der Hinterflügel ebenso flach und horizontal vor wie bei *P. Zalmoxis* und ist auch die sonst so charakteristische Rinne ausserhalb der nach innen concav gekrümmten Dorsalis weniger scharf. Das Männchen hat Analklappen wie *P. Zalmoxis* und einen Radialgabelstiel von etwas grösserer Länge.

Diese hochinteressante Art, welche ich leider nicht zu untersuchen Gelegenheit hatte, ist nun dadurch von besonderer Wichtigkeit, dass sie uns den Uebergang von *P. Zalmoxis* Hew. zu der riesigen absonderlichen *Druryia Antimachus* Dru. vermitteln hilft.

Antimachus-
Gr.


Für eine nähere Verwandtschaft schon von *P. Zalmoxis* mit *P. Antimachus* spricht der Umstand, dass bei ersterem nur angedeutete Abweichungen von der normalen Gruppe bei letzterem weiter ausgebildet erscheinen. So tritt der dritte Radialast noch deutlicher als bei *P. Zalmoxis* und der *Nireus*-Gruppe an den Aussenrand der Vorderflügel, so ist der Vorderrand der stark abgerundeten Hinterflügel durch Verengung auch des zweiten Randfeldes noch gerader gestreckt. Weiter entspricht die Länge des Gabelstiels der Vorderflügel, das Vorkommen von zwei an die von *P. Zalmoxis* erinnernden dunklen Falten in der Zelle der Hinterflügel, die starke Ausbildung der Intercostralfalten, die Fühlform, die Färbung von Kopf und Hinterleib derjenigen von *P. Zalmoxis*. Ebenso findet sich die eigenthümliche Erweiterung des Innenfeldes der Hinterflügel, welche den landläufigen, für *Papilioniden* geltenden Definitionen widerspricht, schon in der *Zenobia*-Gruppe in beiden Geschlechtern wieder. Dieselbe ist bedingt durch das fast vollkommene Ausfallen der Analfalte, welche auch die beginnende Ausgleichung der bei *P. Nireus* und *P. Zalmoxis* noch scharf hervortretenden Rinne ausserhalb der Dorsalis bewirkt. Zugleich bildet sich dann das abgekürzte Innenfeld hohlkehlig um und nimmt, sich mit dem der gegenüberliegenden Seite zusammenschliessend, den Leib so auf, dass er nicht mehr frei bleibt, sondern wie bei den Familien mit entwickelter zweiter Dorsalader getragen wird. So wird functionell die concave Analrippe durch die sonst convexe, hier concav vortretende Dorsalrippe ersetzt. Auch die complicirte Zeichnung von *Antimachus* Dru. findet nur in der von *P. rex* Oberth. ein Analogon, denn dieser zeigt wie letzterwähnte Art drei getrennte Binden in der Mittelzelle der Vorderflügel und ausserdem in dem mittleren Bande einen inneren, hellen Kern. Die Aussenzellbinde ist stärker entwickelt und im ersten und zweiten Randfelde in Vor- und

Zwischenbinde zerspalten, und die Randbindenmonde sind entsprechend der Verlängerung der Vorderflügelspitze ausgezogen. Auch die Hinterflügel zeigen eine weiter fortgeschrittene Aufhellung und Umbildung. So sind die Reste des Submarginalbandes nur mehr als circumcellulare Flecke erkennbar und die Marginalmonde mit der Mittelbinde verschmolzen. Daher zeigt uns *P. Antimachus* Drn. neben acraïoïder Färbungsanpassung zugleich die complicirteste Zeichnungsanlage, die bei den afrikanischen Rinnenfallern überhaupt vorkommt.

Unstreitig ist, wie *P. rex* Oberth. beweist, auch die durchaus nur an eine riesige *Acraca* erinnernde Färbung und Flügelform des *P. Antimachus* auf eine mimetische Anpassung an vielleicht minder grosse *Acracæ* zurückzuführen, die wir heute nicht mehr kennen. So dürften wir in *P. Antimachus* einen überlebenden Zeugen gewaltiger Kämpfe um die Existenz erblicken, in welchen seine Modelle zu Grunde gingen, während er selbst, durch *Acracæ*-Ähnlichkeit und gewaltige Flugkraft zugleich geschützt, sich bis in unsere Zeit erhielt.

Die Futterpflanzen der afrikanischen Rinnenfaller scheinen nur wenigen Familien anzugehören. So frisst nach Trimen, welcher zuerst die Nahrungspflanze für seine Eintheilung der südafrikanischen Tagfalter verwendet hat, die Raupe von *P. Nireus* L. Rutaceen, die von *P. disparilis* Boisl. nach Boisduval¹⁾ Orange; die von *P. ophidiocephalus* Tr. nährt sich von Zanthoxylon und die von *P. Merope* L. von *Vepris lanceolata* (Zanthoxyleen). Dagegen lebt die polyphage Raupe von *P. Demoleus* L. an Aurantiaceen (Orangen, Limonen), an Umbelliferen (Bubon), an Diosmeen (*Calodendron capense*), Sapindaceen (*Hippobromus alata*) und endlich ebenfalls Zanthoxyleen (*Vepris*). Die junge Larve von *P. ophidiocephalus* Tr. ist nach Trimen der von *P. Demoleus* sehr ähnlich.

Schliesslich können wir folgende Entwicklungsreihen der afrikanischen Rinnenfaller aufstellen:



¹⁾ Hist. nat. Ins. Spec. general. Lépidoptères, Paris 1836, p. 228.

Amerikanische Papilionen.

Ich theile diese Region in die nearktische und die neotropische Subregion und bespreche die nur der ersteren angehörigen Arten am Anfange der Untergattungen, um die verwandtschaftlich von ihnen abzuleitenden neotropischen darauf folgen zu lassen.

1. Amerikanische Aristolochienfalter.

Erste Cohort

Der einzige bis in die südlichen Staaten Nordamerikas vordringende Vertreter der Untergattung ist *P. Phileor* L., ein Vertreter einer eigenen Gruppe, die aus wenigen in beiden Geschlechtern geschwänzten Arten besteht und mit der *Polydamus*- und *Protodamus*-Gruppe die rein amerikanische *Laertias*-Cohorte¹⁾ bildet, welche in manchen Punkten zwischen Rinnen- und Aristolochienfaltern zu vermitteln scheint. Vor allen übrigen Angehörigen¹ der Untergattung *Pharmacophagus* zeichnet sich diese Cohorte dadurch aus, dass Kopf und Halsschild keine rothe Färbung, sondern wie bei vielen abgeleiteteren Formen der Rinnenfalter weisse Tüpfel besitzen; ebenso ist auch Bauch und Brust gelbweiss gefleckt. Weiter unterscheidet sie sich von den übrigen neotropischen Aristolochienfaltern durch kürzere, stärkere Antennen mit stumpfer Keule, länger behaarte Stirn, kürzeres Abdomen, kürzere und breitere Hintertügelzelle, kleinere und spitzere Genitaldeckklappen des Männchens. Auch die bedeutend geringere terminale Verengung der Vorderflügelzelle, die Kürze des Radialgabelstiels und der Ursprung des dritten Radialastes etwas vor dem Zellende lässt uns diese als die ursprünglichere Cohorte der amerikanischen Aristolochienfalter ansehen. Dieselbe ist auch durch die in beiden Geschlechtern gleichmässiger Ausbildung des Analfeldes der Hinterflügel ausgezeichnet, welche eine nur geringe Entfaltung der männlichen Dufteinrichtung gestattet. So entwickelt sich letztere nur in dem schwach erweiterten, nach oben umgeschlagenen Innenfelde, in dem sich ein Besatz kurzer brauner Duftschuppen findet, die, wie ich an frisch ausgeschlüpften Männchen feststellte, fein und aromatisch duften, während das Thier selbst unangenehm „muffig“ riecht. Ausserhalb der Dorsalrippe liegt ein schmaler glänzender Raum, an welchen sich der Umschlag der Dufteinrichtung anschmiegt, der wiederum selbst an der Basis sich schmal nach aussen umschlägt. So erinnert diese Cohorte nach den Structurmerkmalen der Hinterflügel in gewissen Punkten an die *Priamus*-Gruppe, auch entspringt der vorderste Medianast der Vorderflügel noch hinter der Mitte des Zellschlusses. Diesen ursprünglicheren Structurmerkmalen gegenüber ist die Zeichnung dagegen als stark abgeleitet anzusehen, doch lassen einige Merkmale uns auch bei ihr ursprünglichere Verhältnisse erkennen.

So finden wir nur in dieser Cohorte unter den Aristolochienfaltern wie in der *Priamus*- und *Antenor*-Gruppe eine entwickeltere Zeichnung der Vorderflügel. Dieselbe tritt besonders bei den Formen mit entwickeltem Hinterflügelschwanz, in der *Phileor*-Gruppe, hervor.

Phileor-Gr.

Die ursprünglichste Zeichnung dieser Gruppe scheint *P. Zetes* Westw. zu besitzen, eine äusserst seltene, aus St. Domingo stammende Art. Zwar keine ich von derselben, wie C. und R. Felder, nur die von Westwood gegebene Abbildung, doch glaube ich sie schon nach dieser wegen der Form des Analfeldes in die *Laertias*-Cohorte versetzen zu müssen, entgegen C. und R. Felder, welche sie in die

¹⁾ *Laertias*, eine von S. H. Scudder (Butt. East. Un. States Can. p. 1233) für *P. Phileor* aufgenommene Gruppenbezeichnung.

Section XL. zu der *Cuiguanabus*-Gruppe der Rinnenfalter, stellen. In der Vorderflügelzelle liegt der Rest einer Zellbinde und weiter zieht sich um erstere vom Vorderrande bis zum ersten Randfelde ein heller Binde Rest, den man nur als Vorbinde ansprechen kann und zu dem auch die drei hellen, im dritten bis fünften Randfelde gelegenen Tüpfel gehören dürften. Dann entspräche die im Vorgabelfelde beginnende Binde der Zwischenbinde und wäre bei den Vorläufern der Art das Inframarginalband verhältnissmässig stark entwickelt gewesen. Von diesen Binden setzt sich auf der Oberseite der Hinterflügel die Mittelbinde, welche durch Verdunkelung zu einer Aussenzellbinde reducirt ist, bis zum Innenrande breit fort; dagegen scheinen die Randmonde auf den Vorderflügeln wie bei allen amerikanischen Aristolorhienfaltern ganz erloschen zu sein. Auf der Unterseite der Hinterflügel liegt bei *P. Zetes* innerhalb der Zelle als Rest der ursprünglich wohl bis zur Basis der Flügel reichenden Mittelbinde ein heller Randsaum, dagegen setzt sich eine breite „Aussenzellbinde“ vom ersten bis achten Randfelde vollständig fort, hinter der im letzten Randfelde ein schmaler Binde Rest liegt, welcher der Schmuckbinde von *P. Antenor* entspricht. So wären auch hier nur sechs echte Randmonde vom zweiten bis siebenten Randfelde auf der Unterseite entwickelt, von denen keiner mehr oben vortritt und deren zweiter bis vierter vorn weiss gesäumt sind, während der fünfte im sechsten Randfelde beiderseits weiss ist, wie bei *P. Philenor* L. Nach der Abbildung Westwood's trägt der Hals oben vier gelbe Tüpfel und der Leib einen gelben Längsstreifen.

An *P. Zetes* schliesst sich der ebenfalls deutlich geschwänzte *P. Villiersii* Godt. (Cuba, Florida) an, der sich auf *P. Zetes* zurückführen lässt. So besitzt er noch ausserhalb der Vorderflügelzelle drei helle Vorbindentüpfel und zugleich ist die Mittelbinde so stark an den Aussenrand gedrängt, dass sie an Marginalmonde erinnert. Als Reste einer ursprünglich breiteren Mittelbinde der Hinterflügel betrachte ich einen am Vorderrand nahe der Basis gelegenen Binde Rest, einen in der Zelle und zwei um letztere herum gelegene Tüpfel. Wie bei *P. Zetes* sind die Randmonde auf der Unterseite der Hinterflügel vom zweiten bis siebenten Randfelde weiss gesäumt, so der im siebenten innen, der im sechsten beiderseits, der im zweiten bis fünften vorn oder aussen; auch ist der Saum der Hinterflügel stark ausgebildet, und der Schmuckbinde Rest im achten Randfelde noch ziemlich breit.

Aus ähnlichen Formen entstand nun endlich *P. Philenor* L., eine bis in die südlichen Staaten Nordamerikas vordringende sehr gemeine Art, bei der die Vorderflügeltüpfel nur noch bis zum zweiten Randfelde hinaufgehen, während die randmondartigen Aussenzellbindentüpfel sich bis in's achte Randfeld der Hinterflügel fortsetzen, aber nur auf der Oberseite auftreten und unten vollkommen fehlen. Auf der Unterseite der Hinterflügel leuchten die grossen rothen, weissgesäumten Randmonde in metallgrünem Felde hervor, und der einzige Rest der Mittelbinde liegt vor der Radialzelle. Die bläuliche Bestäubung des schwarzen Bandes innerhalb der Randmonde erinnert an das Submarginalband von *P. Antenor*. Ebenso ist der rothe Tüpfel im achten Randfelde, der keine weisse Einfassung besitzt, der Schmuckbinde zuzuschreiben.

Von ähnlichen Formen mit deutlichen Hinterflügelschwänzen sind die übrigen Arten dieser Cohorte abzuleiten, und zwar schliesst sich die kleine centralamerikanische *Corbis*-Untergruppe nach der runden Form der Marginalmonde auf der Unterseite der Hinterflügel an *P. Philenor*, die übrigen Formen aber mit gewinkelten Randmonden an *P. Zetes* Westw. an.

Am nächsten steht letzteren noch die Felder's Subsection B entsprechende *Polydamus*-Gruppe, Polydamus-Gr. die sich durch eine mit *P. Zetes* gemeinsame helle Seitenbinde des Hinterleibes und starke Hinterflügelzacken auszeichnet. Auch in dieser Gruppe zeigen einzelne Formen noch die Spaltung der Mittelbinde

der Vorderflügel in Vor- und Zwischenbinde erhalten, so *P. Madyes* Gray (Bolivia), *P. Copanae* Reak. (Guatemala), *P. Archidamas* Gray (Chile). Allmählig geht die schwarzbraune Verdunkelungsfarbe, welche, ähnlich *P. Zetes*, noch *P. Archidamas* Gray und *P. Madyes* Gray von der *Polydamus*-Gruppe besitzen, wie bei *P. Villiesii* Godt. und *P. Philenor* L. auf der Oberseite in ein dunkles Stahlgrün über (so bei *P. Copanae* Reak., *Polydamus* L. etc.), während die Hals-, Brust- und Abdominaltüpfel sich roth färben und die Vorderflügelbinde zuerst unten an der Spitze erlischt, sodass eine Art unvollkommener Schutzfärbung der matt rauchbraunen Unterseite eintritt.

Protodamas-
Gr.

Durch weitere Uferdrückung der ursprünglich regelmässigen Mittelbinden schliesst sich hier die *Protodamas*-Gruppe an, welche Felder's Section C entspricht, sich durch die Verlängerung der vorderen und die Abkürzung der hinteren Flügel auszeichnet und zugleich den ersten äusserlichen Geschlechtsunterschied in der Färbung entwickelt, einen mit Ausnahme der Basis leuchtend gelben Hinterleib der Männchen. Sind schon bei *P. Protodamas* Godt. (Südbrasilien) die Aussenzellbinden besonders auf der Oberseite der Vorderflügel undeutlich, so treten sie bei *P. Belus* Cr., *Lycidas* Cr., *Laodamas* Feld. auf den Vorderflügeln zuerst oben, dann auch unten allmählig ganz zurück. Weiter bildet sich die Mittelbinde der Hinterflügel bei *P. Laodamas* Feld. (Bogota) wie in der indischen *Helanus*-Gruppe zu einem hinten abgekürzten, nur oben entwickelten Spiegel um und entsteht bei dem Männchen von *P. Belus* ein leuchtend gelber Einschluss des Analfeldes, der die gelbe Hinterleibs-färbung noch hervorhebt.

Bei *P. Crassus* endlich tritt eine weitere Auftheilung der Vorderflügel auf, die auf einseitige Ausbildung eines Theiles der Mittelbinde zurückzuführen ist und, vom vierten bis fünften Randfelde beginnend, sich in die Zelle hineinerstreckt.

Das überaus seltene Weibchen von *P. Belus* Cr., welches von Kollar als *P. Varus* beschrieben und von Bates überhaupt während seines zehnjährigen Aufenthaltes am Amazonenstrom nur einmal beobachtet war, besitzt schwarze, nur am Innensaum blauglänzende Vorderflügel mit einem leuchtend gelben, das Zellende einnehmenden Tüpfel und metallisch blaue Hinterflügel, in deren erstem Felde noch der Rest einer gelben Mittelbinde sich erhielt. Das Postmarginal- und Submarginalband treten auch auf der Oberseite auf und lassen so die Monde zwischen ihnen erkennen. Diese eigenthümliche Färbung der widrigen Art scheint durch die grosse Seltenheit des Weibchens (auf 200 Männchen nach gütiger Angabe des Herrn Dr. Staudinger ein Weibchen!) erklärbar. Sicher erinnert sie an die ursprüngliche complicirtere Zeichnung des Weibchens, wie sie sich noch in der *Polydamus*-Gruppe erhielt.

Zweite Cohort.

Die Verbindung mit den übrigen, vor Allem durch roth, seltener gelb behaarten Kopf und Hals und rothe Bauchtüpfel, längere Antennen mit schlankerer Keule und längeres Abdomen, stark herabgebogenen Radialstamm und oberhalb der Discocellularkante abgehenden ersten Medianast der Vorderflügel ausgezeichneten südamerikanischen Aristolochientaltern, die wir mit einem Hübnern entlehnten Ausdruck als *Aseanides*-Cohorte bezeichnen können, dürften Angehörige der etwas stark gemischten Section VI C. und R. Felder's vermitteln, d. h. Formen mit in beiden Geschlechtern gleicher Färbung und entwickelterer Zeichnung, mit grösserer Mittelzelle und kräftigem Schwanz der Hinterflügel, und mässigen Genitaldeckklappen der Männchen. Leider sind gerade die Arten dieser Section theilweise sehr selten und ungenügend bekannt; auch sind wohl noch neue interessante Formen sowohl aus Mittelamerika als aus dem zwischen dieser und der südbrasilianischen Verbreitungsgrenze gelegenen Gebiet zu erwarten, woher C. und R. Felder noch keine Vertreter der Section kannten.

Am nächsten dürfte dem gemeinsamen Stamme in Bezug auf die complicirte Zeichnung noch ^{Grundlachanus-Gr.}*P. Guadaluhanus* Feld. (Cuba) stehen. Derselbe besitzt nämlich noch zwei Binden in der Vorderflügelzelle, deren äussere weisse nur auf der Unterseite auftritt und nahe dem Zellende liegt, während die innere, verwaschenero, metallisch grüne Binde, wohl zugleich in Fortsetzung einer allerdings nur oben entwickelten grünen Subapicalbinde, als Mittelbinde an den Innenrand verläuft. Auf den Hinterflügeln, deren zwei Cubitaläste noch in Zacken vorspringen, liegt im zweiten bis siebenten Randfelde eine unten durchgehende Reihe viereckiger, aussen concaver rother Marginalmonde und im achten ein rother Schmuckbindenrest, der nur unten vortritt. An diesen schliesst sich eine schmale, weisse, bis zum dritten Randfelde verlaufende Binde an, die wir wohl als Rest einer ursprünglich breiteren Mittelbinde aufzufassen haben. Im Analfelde der Männchen ist ein dichter gelblicher Wollpelz entwickelt, der bis zur Analfalte reicht.

Weiter dürften auch Formen wie *P. Phalacus* Hew. (Ecuador) in Färbung und Zeichnung noch ^{Phalacus-Gr.}am meisten an die Grundform erinnern. Derselbe besitzt ausser einem weissen Bindentüpfel am Ende der Vorderflügelzelle eine über beide Flügel gehende Mittelbinde, eine regelmässige Reihe der Randmonde und den Schmuckbindenrest im achten Randfelde der Hinterflügel.

Dieser Form am nächsten stehen noch die Arten der südbrasilianischen *Ascanius*-Untergruppe, welche noch in beiden Geschlechtern gleich gefärbt sind und bei denen sich eine breite Mittelbinde über beide Flügel zieht. Die ursprünglichste Form ist *P. Ascanius* Cr. selbst, bei dem die Vorderflügelbinde breit über die Zelle geht, sich über die Hinterflügel, aussen breit rosenroth gefärbt, bis zum Innenwinkel fortsetzt und mit dem Schmuckbindenrest im achten Randfelde verschmilzt, während die Randmonde im zweiten bis siebenten Randfelde auf beiden Seiten entwickelt sind und eine hautförmige Gestalt haben, welche an die bei *P. Villiersii* etc. erinnert. Bei den Männchen dieser Gruppe ist ein schneeweisser dichter Duftschuppenpelz ausgebildet, der vom Innenrande bis zur Analfalte reicht. Die schwarz-weiss-rothe Flügel färbung von *P. Ascanius* findet sich bei den kleineren Arten ebenfalls entwickelt, doch ist bei diesen die Vorderflügelbinde schon stark verschmälert und liegt ausserhalb der Zelle, während die Hinterflügelbinde sich nur bis in's siebente Randfeld fortsetzt (*P. Bannichus* F.) oder gar (*P. Agarus* L. und *Proncus* Hb.) schon um die Zelle herum durch Verdunkelung schwindet. Meist ist dann aber der Schmuckbindenrest im achten Analfelde stärker entwickelt. Durch weitere von vorn vorschreitende Verdunkelung der Vorderflügel erlischt endlich auch bei *P. Perychus* Boisd. fast die ganze Vorderflügelbinde, von der nur ein schwacher Rest, und dieser beim Männchen nur auf der Unterseite, am Hinterende der Vorderflügel sich erhält.

Als weitere selbstständige Ausläufer dieses Stammes dürfen wir noch zwei andere hauptsächlich ^{Photinus-Gr.}mexikanische kleinere Gruppen ansehen. Von diesen schliesst sich die *Photinus*-Gruppe allerdings in der Ausbildung des weissen Duftschuppenpelzes der *Agarus*-Gruppe näher an, unterscheidet sich aber durch die Kürze des Medianschwanzes, die vollkommene Verdunkelung der Vorderflügel, den Blauglanz der Hinterflügel und zwei Reihen blutroth leuchtender Tüpfel auf letzteren, deren innere bis in's achte Randfeld gehende Reihe auf die Verschmelzung von Schmuck- und Mittelbinde zurückzuführen ist. Hierher gehört auch der fast ungeschwänzte *P. Dares* Hew. -

Als ebenfalls selbstständige Gruppe führe ich hier nach Godman und Salvin¹⁾ die ebenfalls

¹⁾ Biolog. central-americ. Expedic. 1. 196

Montezuma-Gr. mexikanische von *P. Montezuma* Westw. und *Alopius* gebildete Gruppe an, bei welchen nach der Angabe der Verfasser der weisse Dufschuppenpelz der Männchen in einer einfacheren Falte liegt, das Schienenblatt der Vorderbeine etwas näher dem proximalen als dem distalen Gliedende liegt und den Hintergliedern der Opalglanz fehlt. Während der rothleibige *P. Montezuma* Westw. nur sieben rothe Hinterflügelbüpfel trägt, deren innerster der Schmuckbinde angehört, zeichnet sich der auf den Hinterflügeln länger geschwänzte und tiefer gezähnte *P. Alopius* Gray durch vier weisse Discalflecke aus.

Dardanus-Gr. Von einer *Aescanius*-artigen Form hat man wohl *P. Dardanus* F. mit ebenfalls weisswolliger Dufteinrichtung der Männchen abzuleiten, der in beiden Geschlechtern noch am dritten Mediamaste einen kräftigen Schwanz trägt und Genitaldeckklappen wie die *Agacus*-Gruppe besitzt. Während das Weibchen noch eine gelbe Vorderflügelzelle besitzt, ist auf den Hinterflügeln nur mehr die mit dem Schmuckbindenrest verbundene, meist ausserhalb der Zelle gelegene, rothgefärbte Mittelbinde vorhanden, denn die Marginalbinde sind durch Verdunkelung vollkommen erloschen. Diese ursprünglichere Zeichnung des Weibchens, welche in mehreren folgenden Gruppen wiederkehrt, wird bei dem schuppenreicheren Männchen auf den Vorderflügeln vollkommen verdunkelt. Dafür entwickelt sich aber ausserhalb der Zelle auf der Vorderflügelmitte aus Resten der ursprünglichen Ausseenzelle ein schön grüner Spiegel, der auf der Unterseite fehlt, also nur noch in Contrast zu dem schwarzen Sammet des Vorderflügelgrundes tritt und als Schmuck aufzufassen ist; auf den Hinterflügeln ist die blutrothe Mittelbinde ebenfalls durch stärkere Beschuppung an beiden Enden weiter abgekürzt als bei dem Weibchen.

Ähnliche Formen mit allmählig sich verkürzendem Medianschwanz der Hinterflügel dürften den Ausgangspunct für die beiden formenreichen Gruppen abgegeben haben, welche wir als *Vertannus*-Gruppe (Section V) und als *Aeneas*-Gruppe (Section VII zum Theil bei Felder) bezeichnen wollen.

Vertannus-Gr. Am nächsten an die *Dardanus*-Gruppe schliesst sich durch die weiss bleibenden Randsäume der Hinterflügel und die höhere Entwicklung des Duftapparates die *Vertannus*-Gruppe an, in der sich schon eine weitere Ausbildung des Dimorphismus der Geschlechter entwickelt. So treten ungefähr drei Weibchenformen auf, welche schon von C. und R. Felder l. c. p. 335 unterschieden wurden als solche 1) mit weissem, inneren, von der Zelle weit entfernten oder höchstens in ihr unterstes Drittel hineinragenden Spiegel, 2) ohne Spiegel, 3) mit einer die Zelle bis zur Subcostale durchziehenden Binde der Vorderflügel. Neuerdings sind die zahlreichen früher ansichander gehaltenen Formen dieser Gruppe durch Kirby und Oberthür, von denen ich mich an Ersteren anschliesse, in nur wenige Arten zusammengezogen worden, innerhalb deren ebenfalls die von Felder angenommene Verschiedenheit der Zeichnung der Weibchen auftreten kann. So gehört, um nur ein Beispiel zu erwähnen, bei *P. Vertannus* Cr. von den nach F. W. Kirby zu ihm gerechneten Weibchenformen die var. *dicerus* Gray und *Cirius* Gray zur ersten, dagegen die var. *Erithalion* Gray, *Alyathes* Feld. und *Zenxis* Gray eher zur dritten Abtheilung Felder's. Somit genügt es, für die Weibchen der *Vertannus*-Gruppe anzugeben, dass ihre Vorderflügel dunkelbraun oder schwarzgrau und meist mit einem weissen, bindenartig über die Zelle herüberreichenden oder in der Flügelmitte gelegenen hellen Spiegel versehen sind, dass die dunklen Hinterflügel stets eine breite, innen oft hellere, orangene, rothe oder violette Mittelbinde tragen, die meist aussen mehr oder minder abgekürzt ist. Die Männchen besitzen meist einen grünen oder blauen Glanzfleck um einen weisslichen, ausserhalb der Zelle gelegenen Spiegel der Vorderflügel, und um die stärker abgekürzte rothe Hinterflügelbinde manchmal noch einen bläulichen Schiller der Oberseite. Von dieser Regel machen nur wenige Arten eine Ausnahme. So hat nur das Männchen von *P. Sesostris* auf der

Oberseite ganz sammetschwarze Hinterflügel und dafür einen desto ausgedehnteren grünen Spiegel auf den vorderen. Dadurch zeigt es sich als abgeleitete Färbungsform, zumal es auf der Unterseite der Hinterflügel noch die rothe Mittelbinde besitzt, welche das Weibchen auch oben trägt. Mit dieser durch zunehmenden Schuppenreichtum bedingten Verdunkelung der Flügel hängt auch die basale Schwärzung des wolligen Dufschuppenbelages zusammen, welche *P. Sesostris* mit dem *P. Chidreuae* Gray theilt; letzterer trägt noch einen rothen Bindenrest im siebenten Raufelde der Hinterflügeloberseite.

So geht aus der Zeichnung beider Geschlechter hervor, dass die Vorfahren dieser Gruppe eine mit der Zellbinde verbundene Aussenzellbinde auf den Vorderflügeln, auf den hinteren dagegen nur eine mit der Schmuckbinde verbundene Mittelbinde besaßen.

Dieser Gruppe schliessen sich die in der geringeren Entwickelung der Duft-einrichtung und grösseren Fühlerlänge mit *P. Dardanus* übereinstimmenden, auf den Hinterflügeln aber meist rosenrothe Saumfransen tragenden Formen der *Aeneas*-Gruppe an, welche grossentheils Felder's Section VII entsprechen. Auch hier kommen nach Felder die drei Zeichnungsformen der Weibchen wie in der *Vertumnus*-Gruppe vor, besonders auch solche mit ganz verdunkelten Vorderflügeln und oft sehr regelmässiger Hinterflügelbinde. Hierher gehört z. B. *P. Aeneas* L., *P. Aglaope* Gray, *P. Panthous* Cr., *P. Callicles* Bates, *P. Anchises* L., *P. Erichlus* Wb. — Bei *P. Bolivar* Hew. (Eggs) tritt bei dem Weibchen statt der rothen eine schwefelgelbe Hinterflügelbinde auf und sind die Vorderflügel vollkommen verdunkelt, während die des Männchens ebenfalls einen matten grünen Innenrandsspiegel führen.

Venezuela.

Als einen verkümmerten Seitenzweig dieser Gruppe sehe ich die *Eurimedes*-Untergruppe an, bei der die Männchen zwar noch ein stark entwickeltes Analfeld, aber keinen Wollpelz, sondern eine einfach mehrlartige, violett-schwarze Beschuppung tragen. Hierher gehört ausser *P. Eurimedes* Cr. noch *P. Aeneides* Esp. und *P. Zaydhas* F. mit zahlreichen Varietäten.

Als einen weiteren von *Ascanius*-artigen Vorfahren abgeleiteten selbstständig modificirten Aussenläufer sehe ich die *Triopas*-Gruppe (Amazonas) mit besonders stark ausgezogenem, die männliche Duft-einrichtung tragenden Analfelde an, welche sehr schlanke Antennen, eine verschmälerte Vorderflügelzelle, einen dem dritten stark genäherten zweiten Medianast der Hinterflügel, stark verlängerte vordere und stark verkürzte hintere Flügel besitzen, die in *P. Hehneli* Stdgr. noch einen entwickelten Medianschwanz tragen. Während *P. Chabrias* Hew. nur eine Reihe von weissen Tüpfeln nahe dem Aussenrande der Vorderflügel und auf den hinteren eine gelbliche, um das Zellende gelegene Mittelbinde besitzt, liegen bei *P. Triopas* Godt. zwei weisse Spiegel auf den Vorderflügeln, eine vor der Spitze und eine in der Mitte gelegene, in die Zelle hineinreichende; bei *P. Pizarro* Stdgr. sind die Vorderflügel ganz schwarzbraun. Endlich treffen wir in *P. Hehneli* Stdgr. eine grössere Art dieser Gruppe, bei welcher noch eine dritte Aufhellung der ausserordentlich vergrösserten Vorderflügel auftritt, während die Hinterflügel nur am Aussen- und Vorderrande schwarz gesümt sind und in der Mitte die breit zum Innenrande vorlappende Mittelbinde tragen. So entsteht, wie schon Dr. Staudinger l. c. p. 19 erwähnt, eine mimetische Anpassung beider Geschlechter dieser selbst immunen, aber überaus seltenen Art an die für Südamerika so typische Färbung der Neotropide *Methona Psidii*, welche allerdings durch den kräftigen Median-schwanz beeinträchtigt wird.

Tropas-Gr.

Nach den Angaben von Fritz Müller¹⁾ leben die Raupen von *P. Polydamus*, *Protodanus* und

¹⁾ Pflanzengattungen, auf denen etc. Tagfalterraupen leben. (Stett. Ent. Zeitg. XXIX, 1878, p. 296.)

P. Nephelion Goelt. (*Vertumnus*-Gruppe) auf Aristolochien¹⁾; nach gütiger Mitteilung des Herrn Dr. W. Müller stimmen auch die Puppen der drei Arten in allen wesentlichen Punkten überein. Nach Edward's lebt die Raupe des nördlichsten Vertreters, *P. Philenor*, besonders an *Aristolochia serpentaria* und *A. siphno*, nach Riley auch an *Asarum canadense* (Aristolochiaceen). Nach Scudder l. c. p. 1251 ist bei dieser Art bisher kein Parasit beobachtet worden.

Wir können folgende Entwicklungsstufen der amerikanischen Aristolochienfalter aufstellen:

- | | |
|------------------------|---|
| | <i>Triopas</i> -Gr. |
| | <i>Vertumnus</i> - und <i>Arucas</i> -Gr. |
| | <i>Dardanus</i> -Gr. |
| <i>Protodamas</i> -Gr. | |
| <i>Polydamas</i> -Gr. | <i>Phidias</i> -Gr. <i>Montezuma</i> -Gr. |
| <i>Philenor</i> -Gr. | <i>Gemellachianus</i> -Gr. <i>Phalacro</i> -Gr. |
| | <i>Ateuor</i> -artige Vorfahren. |


Amerikanische Segelfalter.

a. Nearktische Subregion.

Als der Stammform der amerikanischen Segelfalter noch am nächsten stehend sehen wir mit Eimer den rein nearktischen *P. Ajax* L. an, der sich schon durch seine rothbraunen Antennen mit abgestutzter Keule von allen übrigen Arten unterscheidet. Wie die meisten amerikanischen eigentlichen

Segelfalter trägt auch er auf dem Nacken eine mittlere, über den Rücken verlaufende Verdunkelung, einen seitlichen, von den Augen aus über die Stigmen ziehenden breiteren, am Abdomen darunter einen feineren Streif und eine verdunkelte Bauchmitte. So ist der Hinterleib von sechs Längsstreifen durchzogen, während bei den Rinnenfaltern der unpaare Bauchstreif stets fehlt. In der Vorderflügelzelle besitzt *P. Ajax* die normalen sechs Bänder, deren letztes, das Terminalband, ganz verdunkelt ist. Von diesen Bändern dehnt sich das dritte, bei einigen Stücken von var. *Walshi* auf der Unterseite deutlich vom vierten getrennt, bis zum Hinterrande aus; ebenso tritt die nach innen vorspringende Erweiterung des einfach schwarzen Inframarginalbandes, welches mit dem

Telamoneid-
Gebirge
Mex-Gr.



Figur 8.
Skizze von *P. Ajax* L., halbschematisch.
Bezeichnung wie sonst: *Prachtb.* Prachtband.

inneren Submarginalstreif verschmilzt, derart gegen die Zelle vor, dass auch das Terminalband mit ihm hinten sekundär vereinigt erscheint. So trennt ein längerer Verbindenrest das Terminal- von dem

¹⁾ Dem widerspricht Matthew's Angabe (Ent. Monthl. Mag. XIV, p. 452), dass die Raupe von *P. Archidamus* auf *Tropaeolum* lebt.

Inframarginalbände. Ein bis zum Gabelstiele reichender Zwischenbindenrest scheidet das Inframarginalband von dem eine bis fast zum fünften Randfelde reichende innere Binde führenden Submarginalbände. Daran schliesst sich die continuirliche Marginalbinde an, welche aussen von einem stark verbreiterten Postmarginalbände eingeschlossen wird und auf beiden Flügelseiten noch fast gleich breit ist. Auf der Oberseite der Hinterflügel treten ausser den Basalbändern noch das Prachtband, das verdunkelte Submarginalband, einzelne Prachtbindentüpfel und die vollständige Reihe der Marginalmonde auf; allerdings sind die letzten zwei Randmonde im sechsten und siebenten Felde bläulich gefärbt wie der Submarginalfleck im achten. Unten erscheinen dagegen auch die Submarginalmonde vom zweiten bis vierten Randfelde deutlich, dann aber nur durch helle Bestäubung angedeutet.

Bedeutend weiter abgeleitet ist die Sommerform *Marcellus* Boisid.; so sind bei ihr die dritte und vierte Zellbinde schon vollkommen verschmolzen, das Terminalband mit dem Inframarginalbände breit verbunden, die Oberseitenzeichnung viel verschwommener und die hellen Hinterflügelbinden weniger scharf.

Nach älteren Angaben Abbot's, die von de Haan und Boisduval reproducirt werden, lebt die Raupe des einzigen rein nearktischen Segelfalters (wie viele ihrer pygäischen Verwandten) auf Annonaceen, *Porcelia pygmaea* und *Annona palustris*.

b. Neotropische Segelfalter.

Von Vorfahren, welche *P. Ajax* var. *Walshii* Edw. noch näher standen, dürften sich in hauptsächlich zwei verschiedenen Entwicklungsrichtungen die fast ausschliesslich neotropischen Formen sowohl der *Arcesilaus*- und *Xanticles*-, als der *Philolaus-Celadon-Simon*-Gruppe entwickelt haben, die sich von *P. Ajax* durch die Ausbildung besonderer Postmarginalmonde im fünften bis siebenten Hinterflügel Felde unterscheiden, dagegen die kürzeren Fühler mit ihm gemeinsam haben.

Wie bereits C. und R. Felder scharfsinnig hervorhoben, erinnert die *Arcesilaus-Xanticles*-Gruppe Arcesilaus-Gr. in Zeichnung und Form der Flügel an die indische *Anticrates*-Gruppe, von der sie sich durch gleichmässiger scharfe Randzacken der Hinterflügel unterscheidet. Bei ihren beiden Arten tritt eine verstärkte Aufhellung der Flügelmitte ein, welche das vierte Zellband vom dritten und bei *P. Xanticles* Bates (Panama) zugleich auch das Inframarginalband vom Terminal- und Submarginalbände abtrennt.

Hierzu kommt eine theilweise Abschwächung der Randzeichnungen, sodass die Submarginalbinde nicht mehr hervortritt, und bei *P. Arcesilaus* Luc. (Venezuela, Bogota) schliesst sich sogar das Terminalband wie bei Formen von *Ajax* var. *Marcellus* eng an das Inframarginalband an. Somit zeigt *P. Xanticles* durch die regelmässige Entwicklung der getrennten Bänder am Vorderrande der Vorderflügel sich als eine für die Morphologie der Zeichnung besonders wichtige Form, die aber zugleich so stark aufgehellt ist, dass z. B. ihr zweites Basalband nur mehr am Vorderrande der Hinterflügel erhalten ist.

Um so bemerkenswerther ist es, dass *P. Xanticles* Bates zugleich das einzige bisher bekannte Beispiel eines Dimorphismus der Weibchen unter den „eigentlichen“ Segelfaltern giebt, welcher nur einer mimetischen Anpassung zuzuschreiben ist. So trägt die erst von Godman und Salvin (Biolog. centralamer.) beschriebene, von dem Männchen abweichende Weibchenform auf der umherbraun verdunkelten Oberseite nur einen tüpfelartigen Rest der Vorbinde auf den vorderen, die entwickelte Marginaltüpfelreihe auf beiden, einen Mond der Submarginal- und zwei solche der Prachtbinde auf der Oberseite der hinteren Flügel. Dadurch erinnert dasselbe oberflächlich an den Aristolochienfalter *P. Philenor* L.

Philoilaus-Gr.

Als weiteren Ausläufer nearktischer, in beiden Geschlechtern gleich gefärbter *Ajax*-ähnlicher Formen sehe ich *P. Philolaus* Boisd. (südl. Verein. Staaten und Mittelamerika) an, der auf den Vorderflügeln nur mehr den tüpfelartigen Rest der Zwischenbinde wie *P. var. Marcellus* Cr. zeigt, bei dem aber die Submarginalbinde ganz verdunkelt ist und sich ähnlich wie bei *P. Xantides* Bates breit über die Hinterflügel fortsetzt, während in der Mitte der letzteren das Prachtband ebenfalls zu schwinden beginnt und sich nur die rothe Binde erhält.

Weiter lassen sich auf *Ajax*-ähnliche Formen die meist auf die westindischen Inseln beschränkten kleineren Arten *P. Celadon* Luc., *Sinon* F. und *zonarius* Butl. zurückführen, von welchen nur noch *P. zonarius* Butl. auf den Vorderflügeln den Zwischenbindentüpfel und fünf Zellbinden besitzt, von denen die letzten zwei hinten noch zusammenhängen. Bei *P. Celadon* Luc. gilt dies nur für die dritte und vierte, und bei *P. Sinon* F. erlischt vorn auch die dritte Zellbinde.

Im Gegensatz zu Eimer führe ich auch die *Agesilaus-Protosilaus*-Gruppe (Section XIX Felder) und die *Epidaus*-Gruppe, statt auf hypothetische mit *P. Albion* gemeinsame Vorfahren, auf amerikanische Vorläufer zurück. Letztere besaßen jedenfalls noch eine beiderseits schwarz eingefasste, wie bei *P. Ajax* am Ende des ersten Cubitalastes in den „Prachtwinkel“ übergehende Prachtbinde, ein regelmässig verlaufendes Submarginal- und ein ausgebildetes Inframarginalband der Vorderflügel in einer bleichen Grundfarbe.

Agesilaus-Gr.

Aus einem Zweige dieser Formen ging *P. Agesilaus* Boisd. hervor, bei dem der innere Grenzstreif des Schmuckbandes verloren ging und sich auch am zweiten Basalbande etwas Roth entwickelte. Von seinen Varietäten halte auch ich *Autosilaus* Bates und *Agesilaus* Boisd. mit Eimer wegen der auf beiden Flügeln deutlichen Submarginalbinde für die ursprünglicheren Formen dieser über Neu-Granada, Venezuela, Columbien verbreiteten Art.

Protosilaus-Gr.

Weiter abgeleitet sind dagegen die Formen der *Protosilaus*-Gruppe, bei denen das Submarginalband der Vorderflügel durch stärkere Aufhellung auf einen schmalen Streif reducirt ist, der sich eng an das Terminalband anlegt. Während das erste Basalband fast ganz geschwunden, das zweite und dritte hinten stark abgekürzt ist, sind das fünfte und siebente oft nur in Spuren vorhanden. Zugleich ist auch auf den Hinterflügeln das Submarginalband verschmälert und seine Binde nur mehr vom dritten bis sechsten Randfelde deutlich, während die Postmarginalbinde sich bis zum vierten Randfelde ausdehnen können. So sehe ich auch *P. Bellerophon* Dalm. (Brasilien), der nur noch das dritte oder vierte Zellband besitzt und auf den Hinterflügeln eine weiter fortgeschrittene Reduction des Submarginalbandes erkennen lässt, trotz seines beiderseits schwarz begrenzten Schmuckbandes wegen des längeren Radialgabelstiels und der stärker ausgezogenen Analgegend für einen Endausläufer der *Protosilaus*-Gruppe an, zu welcher auch C. und R. Felder ihn stellen.

Epidaus-Gr.

Den höchsten Grad der Rückbildung in der Beschuppung erreicht *P. Epidaus* Boisd., der sich ebenfalls an die *Protosilaus*-Gruppe anzuschliessen scheint, in der Zeichnung besonders der Hinterflügel durchaus an *Protosilaus* L. erinnert und ebenfalls nur den inneren Grenzstreif des Schmuckbandes vom ersten bis sechsten Randfelde führt. Ebenso dürfte der anscheinend eine Verlängerung des Terminalbandes bezeichnende längere Vorderflügelstreif wohl einer Verschmelzung dieses Bandes mit dem inneren Streifen des stark aufgehellten Submarginalbandes zuzuschreiben sein, wie auch Eimer annimmt. Jedenfalls stellt sich diese Art durch das theils pergamentartige, theils glasige Aussehen und die schwache Beschuppung der Flügel, das Fehlen der männlichen Duftendrüse, durch den längeren Radialgabelstiel, die an *P. Podalirius* erinnernde Entdrückung der unteren Discocellulare der Hinterflügel, welche die grosse

Verschmälerung der Mittelzelle auf letzteren bewirkt, als peripherischer Ausläufer der Grundform des *Protesilaus*-Stammes dar, wie auch Eimer dies in seinem „Stammbaum der *Podalirius*-Gruppe“ p. 116 ausdrückt.

Auf *Xanthicles*-artige Formen lässt sich wohl auch die zweite Cohorte neotropischer Segelfalter zurückführen, die von Eimer in seinem Werke nicht mehr berührt wird, den Felder'schen Sectionen X—XVIII entspricht und sich mit einem J. Hübner entlehnten Ausdruck als *Iphicledes*-Cohorte bezeichnen lässt. Ihre ursprünglichsten Formen sind sicherlich in den Gruppen mit getrennt verlaufenden Radialästen der Vorderflügel und zwar in den Sectionen XVI und XVII Felder's enthalten, welche keine mimetische Anpassung zeigen, sondern noch den Typus gelber, schwarz gebänderter Segelfalter erkennen lassen.

Zweite Cohorte

Iphicledes-Cohorte

Nach der kürzeren Behaarung der Stirn, den kürzeren Fühlern, dem noch mit zwei hellen Längsbinden verzierten wollig behaarten Thorax, dem wie bei den eigentlichen Segelfaltern der *Agesilaus*-, *Arcesilaus*-, *Ajae*-Gruppe von sechs Längsstreifen durchzogenen, allerdings lebhafter gelbgefärbten Abdomen, der Verbreiterung der Vorderflügel am Vorderrande dürfen wir die Angehörigen der Section XVII in mancher Beziehung den afrikanischen Segelfaltern an die Seite stellen, denen sie auch durch die bis zum dritten Randfelde der Hinterflügel, also weiter als bei den oben erwähnten Gruppen, fortgesetzten, selbst auf der Oberseite deutlichen Postmarginalmonde der Hinterflügel gleichen. Auch ihre Zeichnung ist durch starke Verdunkelung beeinflusst: so treten nur drei äussere helle Zellbinden auf, die höchstens auf der Unterseite continuirlich sind. Ebenso ist bei allen Formen die Mittelbinde so weit gegen die Basis der Vorderflügel vorgeückt, dass ihre Fortsetzung sich auf den Hinterflügeln bis an das erste Basalband erstreckt. Letzteres verläuft auf der Analfalte wie bei *P. Archesilaus* Feld. und mündet vorn in den Rest des zweiten Basalbandes ein. So ist auch hier die zweite Basalbinde in die Mittelbinde aufgegangen, hingegen wird das Schmuckband nicht durchbrochen, sondern in seiner Continuität erhalten und nur nach aussen gedrängt.

Die ursprünglichste Form dieser Gruppe stellt *P. Thyastes* Dru. mit citrongelber Grundfärbung dar, der drei deutliche Zellbinden besitzt, die sich mit einer ganz dicht an das Zellende herantretenden Aussenzellbinde zu einer Mittelbinde verbinden. An letztere tritt noch in einem stumpfen Winkel die Marginalbinde heran, welche vom vierten Randfelde an selbst auf der Unterseite sehr undeutlich wird. Eine ähnliche, aber noch schärfer gewinkelte, kreuzweise Vereinigung von Binden findet sich auch bei *P. Calliste* Bates (Neu-Granada, Guatemala), welcher weniger ursprünglich ist als *P. Thyastes*. Bei *P. Marchandi* Bois. (ebendaher) mit orangegelber Grundfarbe ist die Marginalbinde der Vorderflügel regelmässiger erhalten, doch treten auch hier die drei letzten gestreckten gelben Tüpfel derselben auf der Oberseite etwas zurück. Auf den Hinterflügeln liegt ausserhalb der verbreiterten Mittelbinde das vom zweiten Randfelde beginnende Prachtband; dann folgen einige undeutliche, im fünften bis siebenten Randfelde aber vorbereitete Tüpfel, welche vielleicht der früheren Mittelbinde entsprechen. Ihnen schliessen sich weiter die oben weniger vorseheinenden ganz schmalen Marginalmonde, zu äusserst aber die bläulichen Postmarginalmonde an. Somit dürfte wie bei *P. Xanthicles* Bates die Submarginalbinde durch Verdunkelung erloschen sein.

Thyastes-Gr.

Bei den durch einen langen Stirnschopf ausgezeichneten, aber am Hinterleibe noch entschieden längsgestreiften Formen der *Dioippus*-Gruppe (Felder's Section XVI), die sich mit ihren wenigen Arten eng an die *Thyastes*-Gruppe anschliesst, ist die Verdunkelung der hellen Grundfarbe soweit vorgeschritten,

Dioippus-Gr.

dass auf den Vorderflügeln nur noch Reste der gelblichen Binden am Vorder- und Hinterrande der Mittelzelle, ein einziger Tüpfel der Vorbinde und undeutliche oder abgekürzte Marginaltüpfel erhalten bleiben.

Während sich diese Gruppe jedoch enger an die *Thyastes*-Gruppe anschliesst, möchte ich die drei Sectionen XIV—XVI C. und R. Felder's, welche sich durch Abweichungen im Verlauf der Radialäste der Vorderflügel als peripherische Ausläufer des Segelfalterstammes erweisen, auf *Bellerophon*-artige Formen der *Protesilaus*-Gruppe zurückführen.

Columbus-Gr.

Die ursprünglichste dürfte die *Columbus*-Gruppe sein, welche eine stark behaarte Stirn, eine gelbe Fühlerkeule, noch vier Längsstreifen auf dem gelblichen Hinterleibe und an Brust, Schultern und Hals weisse Flecke trägt, noch entwickelte männliche Dufteinrichtungen, aber dünne, nur gegen die Spitze etwas verbreiterte Schwänze besitzt, deren Spitze aufgeheilt ist. Wie in der Flügelform, erinnert diese Gruppe auch in der Zeichnung besonders an die *Protesilaus*-Gruppe, denn ihre Arten tragen in der Mittelzelle der Vorderflügel nur das dritte oder vierte ¹⁾, dem von *P. Bellerophon* entsprechende Zellband, das allerdings stark nach aussen vorspringt. Weiter ist das Terminalband mit dem Submarginalbände verbunden, zugleich aber durch Verdunkelung der Raum zwischen beiden oben verringert und die Marginalbinde undeutlich geworden. Bei *P. Columbus* Hew. (Amazonenstrom) findet sich nur noch der Prachtbindenfleck im achten Randfelde, der sich ja stets am längsten erhält. Dagegen ist das Prachtband in seiner Hinterhälfte durch längs der Rippen gegen den Aussenrand verlaufende, sich netzartig verbindende Zeichnungen scheinbar zweispaltig geworden.

Bei den weiteren Entwicklungsstufen dieser Gruppe, *P. Dolicaon* Feld. (Brasilien) mit seinen Varietäten und *P. Iphitas* Hb. ebendaher, dehnt sich nun der anscheinend von dem Prachtbände eingeschlossene Bindentheil weiter nach innen aus und drängt so den sich inzwischen verstärkenden inneren Schenkel in die Flügelmitte, wo er sich senkrecht gegen das zweite Basalband anstemmt. So entsteht das für die Nachahmer des südamerikanischen *Lycorca*-Typus so charakteristische Längsband der Hinterflügel. Zugleich wird bei *P. Dolicaon* die schon bei *P. Columbus* angedeutete Zerschnürung der Marginal- und Postmarginalmonde und ihre Umbildung zu leuchtend weissen resp. bläulichen Tüpfeln weiter entwickelt und setzen sich die Postmarginalmonde bis zum Vorderrande der Hinterflügel fort. Bei *P. Iphitas* Hb. nimmt auch die Grundfarbe einen etwas orangenen Ton an, treten die Kreuzbänder der Hinterflügel mehr hervor und bildet sich endlich auf den abgerundeten Hinterflügeln ausserhalb der ursprünglichen Mittelbinde eine Reihe in schwarzem Grunde stark hervortretender, gedoppelter, schneeweisser Tüpfel aus, welche den Postmarginalmondern entspricht. So tritt eine unbedeutende Aehnlichkeit der ruhenden Art mit einer abgeflogenen *Lycorca* in Wirkung, welche noch durch die fast hinfälligen Schwänze erhöht wird.

Während bei der *Columbus*-Gruppe nur der vorderste Radialast gegenüber dem Gabelanfrage in die Subcostale mündet, gehen bei den weiteren zwei Gruppen, welche sich in Beziehung auf die Zeichnung näher an die *Protesilaus*-artigen Vorfahren anschliessen, die beiden ersten Radialäste in dieselbe Concavrippe über.

Serrillei-Gr.

So zeigt die *Serrillei*-Gruppe, welche Felder's Section XV entspricht und nach Kirby aus nur einer Art, *P. Serrillei* Godt. (Neu-Granada) besteht, zu der *P. Hippodamus* Feld. als Varietät zu ziehen ist, einen einfarbigen Leib, stark gestreckten Analwinkel der Hinterflügel und sehr lange Schwänze, die wie in der vorigen Gruppe am Hinterende aufgeheilt sind. Ebenso lässt sich die Zeichnung auf diejenige

¹⁾ Es ist nicht möglich, diese Frage ohne entwicklungs-geschichtlichen Nachweis zu entscheiden.

Protesilaus-artiger Vorfahren zurückführen, da sich das dritte oder vierte Zellband und das breite Terminalband mit dem Submarginalbande verbinden, hinter welchem eine nur unten deutlichere Marginalbinde liegt. Auf den Hinterflügeln tritt unten die Prachtbinde noch im siebenten und achten Randfelde hervor, doch sind die Zeichnungen etwas verloschen und trübe und die äussere Mittelbinde unendlich. Marginal- und Postmarginalmonde sind noch wie bei der *Protesilaus*-Gruppe schmal und ungetheilt.

Die höchste Reduction in der Zeichnung treffen wir bei *P. Salvini* Bates (Guatemala) mit ebenfalls zwei in die Subcostale verlaufenden Radialästen, welcher Felder's Gruppe XVIII bildet, und sich durch die fast einfarbig grüngelben Hinterflügel besonders nahe an *P. Bellerophon* anschliesst, mit dem er in der geringeren Ausbildung der Postmarginalmonde, der theilweisen Unterdrückung der Marginalmonde, dem Vorleuchten der Prachtbinde im siebenten und achten Randfelde der Oberseite übereinstimmt. Dagegen erinnert das durch den Fortfall des äusseren schwarzen Streifes ausgezeichnete Schmuckband auch durch seine Lagerung durchaus an die *Protesilaus*-Gruppe. SALVINI-GR.

Den Uebergang zu einer vielseitig und spezifisch entwickelten Gruppe von mimetischen Segelfaltern, welche sich durch freie Endigung der Radialäste auszeichnen und wohl von Vorfahren abstammen dürften, welche der *Xanticles*-Gruppe nahe standen, vermittelt der von C. und R. Felder in ihre Section XIII gestellte *P. Asius* F. (*Astyages* Dru.) aus Brasilien. Derselbe zeichnet sich durch kürzere Behaarung der Stirn und kürzere Fühler, undeutliche helle Längsbinden auf dem Thorax, jederseits eine scharfe untere und eine verloschene seitliche Hinterleibsbinde und längere Hinterflügelschwänze aus. Die einzige über die Vorderflügel sich hinziehende, nach hinten zu sich verbreiternde Mittelbinde scheint nicht, wie in der *Thyastes*-Gruppe, sich nach innen von dem Prachtbande in die zweite Basalbinde fortgesetzt, sondern vielmehr wie bei der afrikanischen *Kirbyi-Illyris*-Gruppe, das Prachtband durchbrochen zu haben und so in die zweite Basalbinde übergegangen zu sein. Dann gehörten der rothe im achten Randfelde sich nach vorn fortsetzende Streifen zu der inneren Basalbinde und die drei rothen, aussen schwarz gesäumten Tüpfel innerhalb der weissen Mittelbinde im ersten bis dritten Randfelde, wie der im achten Randfelde, zu dem Prachtbande, während die rothen Tüpfel im sechsten und siebenten Randfelde wohl der ursprünglichen Mittelbinde entsprechen. Für den engen Anschluss dieser alleinstehenden Form an die Segelfalter weise ich auf die auch auf der Oberseite deutlichen schmalen Marginalmonde und die ausserhalb derselben entwickelten bläulichen Postmarginalmonde der Hinterflügel hin, welche jede andere Stellung der Art verbieten. ASIUS-GR.

Lässt schon *P. Asius* F. eine oberflächliche allgemeine Aehnlichkeit mit Aristolochienaltern der *Ascanius*-Gruppe erkennen, so entwickelt sich diese in der *Harrisianus*-Gruppe, welche Felder's Section XII entspricht und längere Fühler ohne scharf abgesetzte Keule, kürzere Vorderflügel und längeren Gabelstiel, einen kürzeren Schwanz, ein schmäleres erstes Randfeld der Hinterflügel und eine stärker behaarte Stirn besitzt, zu einer spezifisch ausgebildeten Anpassung an die einzelnen Glieder dieser immunen Faltergruppe. Zuerst gleicht die grösste Art, *P. Harrisianus* Swains. (Brasilien), mit breiter weisser Vorderflügelbinde, weisser, schmalerer, bis zum siebenten Randfelde reichender Hinterflügelbinde und auch oben roth hervorleuchtenden, etwas eckigen Marginalmonden und mit rother Basalbinde im achten Randfelde der Hinterflügel dem *P. Ascanius* F. Zugleich hat sich die rothe Basalfärbung schon auf die Vorderflügelbasis fortgesetzt und tritt sogar manchmal auch oben auf; so wird die rothe Tüpfelung der Brust des Aristolochienfalters vorgetäuscht. Aehnlich erinnert der kleinere *P. Lysithous* Hb. mit mehr blutrothen Marginalmonden der Hinterflügel, in deren Reihe wie schon bei *P. Asius* F. auch der Prachtbidentüpfel des achten Randfeldes zu treten scheint, durchaus an die ebenfalls kleineren *P. Agarus* F. und *Bovicus* Hb. HARRISIANUS-GR.

mit schon im sechsten Randfelde der Hinterflügel abgekürzter, auf den Vorderflügeln schmalerer Binde; so erinnert *P. Rurikii* Esch. mit auf einen weissen Hinterrandsfleck beschränkter Mittelbinde der Vorderflügel an das Weibchen von *P. Perrhebas* Boisd. und zeigt *P. Latus* Rog. sogar den eigenthümlichen metallgrünen Glanz des Aristolochienfalters. Die mimetische Anpassung erklärt es auch, dass die Fühlerkeule sich nicht mehr scharf absetzt, wie es für die Segelfalter typisch ist und noch bei *P. Asiis* auftritt, sondern sich allmählig verdickt, wie bei den Aristolochienaltern.

Thymbracus:
Gr.
Vergl. Tab. IX.

An die *Harrisianus*-Gruppe schliesst sich ein Theil der Section XI C. und R. Felder's an, die *Thymbracus*-Gruppe, welche auf Mexico beschränkt ist, breite Vorderflügel und kräftig geschwänzte Hinterflügel trägt und noch die ursprüngliche Form der Fühlerkeule und die stärker behaarte Stirn wie *P. Asiis* bewahrt hat. Ihre Formen haben ganz verdunkelte Vorderflügel, die einen etwas bläulichen Glanz zeigen. Von diesen grossen Arten zeigt *P. Aconophos* Gray durchaus schwarzblau Vorderflügel und auf den hinteren neben dem rothen Basalstreif und Basaltüpfeln vom zweiten bis achten Randfelde einen oben eher rosa, unten blutroth vortretenden Tüpfel, der im achten Randfelde der Schmuck-, sonst aber wohl der Marginalbinde angehört und hinter sich die weissen Submarginal-, und theilweise Postmarginalmonde erkennen lässt. Bei *P. Pomponius* Hopffr. trägt wie bei der folgenden Art auch die Vorderflügelbasis eine rothe Aufhellung, dagegen entspricht die Zahl der Hinterflügel-Tüpfel der von *P. Aconophos*; so ahnen beide den mit nur einer Tüpfelreihe der Hinterflügel gezierten *P. Montezuma* nach. Bei *P. Thymbracus* Boisd. bilden sich ausserdem noch eine innere Reihe von circa fünf wohl der äusseren Mittelbinde angehörigen Aufhellungen zu rothen, auch auf der Oberseite vortretenden Tüpfeln um. So entsteht, verbunden mit dem bläulichen Glanz der Oberseite eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Weibchen des Aristolochienfalters *P. Photinus* Westw. An diese Gruppe scheint sich auch die des C. und R. Felder noch nicht bekannten *P. Xynias* Hew. (Neu-Granada) anzuschliessen, dessen Männchen einen leuchtend malengrünen Spiegel am Hinterrande der Vorderflügel besitzt, auf den Hinterflügeln eine schmale, rothe, stark abgekürzte Binde trägt und somit besonders an dunklere Männchen der *Aeneas*-Gruppe erinnert.

Xynias-Gr.
Vergl. Tab. IX.

Durch ihr kleines, feines und hüpfälliges Schwänzchen bildet diese Art anscheinend einen Uebergang zu der schwanzlosen, ebenfalls noch durch die stark gekrümmte dicke Fühlerkeule, zottige Stirn und kräftigen Körper ausgezeichneten *Harmodius*-Gruppe, welche die Felder'schen Subsectionen B—F umfassen dürfte, die wir in drei Untergruppen zusammenfassen. Die *Harmodius*-Untergruppe (Subsection B) zeichnet sich noch durch undeutliche weisse Tüpfel auf Kopf und Halsschild aus und dürfte den Stammformen näher stehen. Während *P. Harmodius* Dbld. (Bolivia, Ecuador) den Männchen des zur immunen *Aeneas*-Gruppe gehörigen *P. Callides* Bates gleicht, erinnert *P. Hostilius* Feld. (Venezuela), der ebenfalls eine hintere Aufhellung der Vorderflügel und eine im vierten Randfelde abgekürzte rothe Tüpfelbinde auf den Hinterflügeln trägt, welche der ursprünglichen Mittelbinde der Segelfalter entspricht, an Männchen der *Vetannus*-Gruppe, *Scrapis* Boisd. var. *Osyris* Feld. Bei dem sich hier anschliessenden *P. Euryleon* Hew. (Bogota) treffen wir schon eine weitere Ausbildung der mimetischen Anpassung, indem die Geschlechter dimorph sind und das Männchen mit mittlerem grünem Vorderflügelsspiegel und stark abgekürzter blutrother Hinterflügelbinde durchaus an das Männchen von *P. Erithalion* Boisd. erinnern; das Weibchen mit weisser über die Zelle der schwarzbraunen Vorderflügel ziehender Schrägbinde und breiterer, innen orange aufgehellter, über das Zellende laufender Hinterflügelbinde ist dagegen dem Weibchen des Aristolochienfalters auffallend ähnlich, wie schon C. Felder (Novara-Rhopaloc. p. 14) angibt.

Harmodius-Gr.

Die zweite Untergruppe zeichnet sich durch einheitliche dunkelgrüne Färbung der Vorderflügel

aus, auf denen eine unten weniger deutliche hellere Marginalbinde entsteht und eine weitere Aussenzellbinde sich meist nur auf der Oberseite der Hinterflügel anlegt. Ueber Arten, wie *P. Xenarchus* Hew., welche beide Untergruppen verbinden dürfte, entwickelte sich nun eine auffallende Anpassung der abgeleiteteren Formen an die *Protodamas*-Gruppe der Aristolochienfalter, welche sich bis auf die Unterseite erstreckt, die bei Originalen und ihren Copien auf den Hinterflügeln dunkelbraun und mit schmalen, bei den Modellen orangeröthen, bei den Copien blutrothen Ausserandrtüpfeln besetzt ist, hinter denen sich allerdings bei den Nachahmern noch oft die feinen Marginalmonde erkennen lassen. Weiter wird auch der orangeröthe Seitenstreif des Hinterleibes der *Polydamas*-Gruppe wiederholt. So erinnert der heller grüne *P. Phaon* Luc. (Honduras) an den *P. Protodamas* Godt., so der dunklere *P. Therodamas* Feld. (Neu-Granada) an *P. Xenodamas* Boisd. und der ähnliche *P. Hyperion* Hb., der selbst in Kirby's Catalog noch p. 251 bei seinem Modell in der *Polydamas*-Gruppe steht, an *P. Polydamas*; *P. Choridamas* Boisd. (Südamerika) erinnert an den ebenfalls durch breite gelbliche Mittelbinde der Vorderflügel ausgezeichneten *P. Crassus* F.

Aehnliche Formen wie *Choridamas* ergaben wohl auch den Vertreter der dritten Untergruppe, *P. Pausanias* Hew. (Brasilien), der sich durch die starke Verlängerung seiner Vorderflügel, noch grössere Kürze des Innenrandes und den fast gradlinigen Aussen- und Hinterrand der Hinterflügel als peripherische Form erweist. Zugleich ist durch Verdunkelung die Mittelbinde der Vorderflügel stark verkleinert, beide Flügel bis auf die hellere Vorderflügelspitze verdunkelt und ein schöner blauer Metallglanz auf der Oberseite nahe der Basis entwickelt. Dadurch entsteht eine grosse Aehnlichkeit mit den Vertretern einer *Heliconius*-Gruppe, welche aus individuenreichen Arten mit schwefelgelben Bidentüpfeln auf den schwärzlichen Vorderflügeln und mit einfarbig stahlblauen Hinterflügeln (wie *H. Apseutes* Hb., *Clytia* L., *Rhea* Cr.) besteht.

Hieran schliesst sich die ebenfalls nur aus mimetischen Formen bestehende X. Section C. und R. Felder's mit Ausnahme des *P. Rhetus* Boisd., der zuerst von Oberthür als Weibchen des Rinnenfalters *P. Erostratus* Westw. erkannt wurde. Es zeichnet diese Gruppe, die wir als *Ariarathes*-Gruppe bezeichnen wollen, sich vor den bisher erwähnten Abtheilungen durch dünnere, eher spindelförmige Fühlerkeule, schwächer behaarte Stirn und schlankeren Körper aus; weiter verläuft der hintere Radialast der Hinterflügel fast grade. Dadurch wird auch das zweite Randfeld stark verschmälert und tritt zugleich die für die Segelfalter sonst so charakteristische Concavität des vordersten Medianastes stark zurück, während die Mittelzelle sich verschmälert. Das kurze Zähnen am dritten Medianast der Hinterflügel bei der Subsection A, zu welcher nach C. und R. Felder *P. Eragoras* Westw. und *Ariarathes* Esp. (nach Kirby mit den Varietäten *Aristagoras* Feld., *Gaji* Luc., *Cyamon* Gray) gehören, und die weisse Tüpfelung am Kopf und Thorax deuten an, dass wir in dieser Untergruppe die ursprünglicheren Formen vor uns haben. Von ihnen erinnert z. B. *P. Cyamon* (Para) besonders in dem Weibchen an das des Aristolochienfalters *P. Anchises* L., *P. Eragoras* Westw. (Neu-Granada) ebenfalls im Weibchen an *P. Vertumnus* Cr., *P. Aristagoras* Feld. (Neu-Granada) an das von *P. Cyphotes* Gray. Bei der zweiten Untergruppe dieser Section, der *Brachnus*-Untergruppe, welche aus Formen besteht, deren Hinterflügel in keinen Zahn, sondern nur mehr in scharfe regelmässige Zacken auslaufen, tritt statt der weissen Tüpfelung an Hinterkopf und Nacken schon eine rothe auf. Zugleich sind die Geschlechter weniger verschieden als in der *Ariarathes*-Gruppe, bei welcher sie, wie schon C. und R. Felder hervorhoben, an die sexuellen Verschiedenheiten in der *Vertumnus*- (*P. Polyclus* Boisd.) und *Aeneas*-Gruppe erinnern. *P. Hephaestion* Feld. (Mexico), welcher

Ariarathes-Gr.

Fig. 1. Taf. 8.

sich hier anschliesst, mir aber nicht vorlag, scheint ebenfalls eine grosse Aehnlichkeit mit einem der Aristolochienfalter, *P. Dares* Hew., zu besitzen.

Wie mir Herr Dr. W. Müller freundlichst mittheilte, lebt die Raupe des *P. Hyperion* Hb. an *Rollinia longiflora* (Annonaceae).

Wir dürfen schliesslich folgende Entwicklungsstufen der amerikanischen Segelfalter aufstellen:

	<i>Salvini-Gr.</i>	<i>Ariarathes-Gr.</i>	
	<i>Serrilei-Gr.</i>	<i>Harmodius-Gr.</i>	
	<i>Columbus-Gr.</i>	<i>Xynias-Gr.</i>	
<i>Epidaurus-Gr.</i>		<i>Harrisianus-Gr.</i>	<i>Thynbraeus-Gr.</i>
		<i>Diocippus-Gr.</i>	
	Zweite Cohorte: <i>Thyastes-Gr.</i>		<i>Astygus-Gr.</i>
<i>Ag-silaus-Protosilaus-Gr.</i>	<i>Xanticles-Gr.</i>		
	<i>Philolaus-Gr.</i>	<i>Arcesilaus-Gr.</i>	
Erste Cohorte: <i>Ajax-Gr.</i>			

Ajax-artige Vortahren.

Amerikanische Rinnenfalter.


a. Nearktische Subregion.

Im Gegensatz zu den Segelfaltern sind die Rinnenfalter in der nearktischen Region in zahlreichen, theilweise südlich vordringenden Arten vertreten, welche zwei arktischen Gruppen angehören, der *Machaon*- und *Danaus*-Gruppe, deren nächste Verwandte wir schon in der palaearktischen Region besprechen durften.

Die ursprünglichsten Zeichnungsformen und dabei zugleich bedeutende Grössenverhältnisse finden wir in der nord- und mittelamerikanischen *Danaus*-Gruppe, deren ursprünglichste Form *P. Danaus* Boisid.¹⁾ selbst (Bergegenden der südlichen Vereinigten Staaten) vorstellen dürfte. Hier liegen in der Vorderflügelzelle drei kräftige Bänder, deren innerstes aus der Verschmelzung der beiden Basalstreifen entstanden zu sein scheint. Mit diesem verbindet sich das mittlere Zellband, welches dem dritten Basalbande der Segelfalter entspricht, durch einen gegen den Innenrand ziemlich senkrechten Winkel, der sich auch bei den Segelfaltern wiederfindet und vorn den „Prachtwinkel“ begrenzt. Hinter dem mittleren liegt das wenig über die Zelle vordringende dritte Zellband, das dem vierten oder fünften der Segelfalter entspricht und hart an den Zellschluss legt sich ein gelbgefülltes Terminalband an. Weiter tritt dann noch ein breites, hell gefülltes, bis zum ersten Randfelde reichendes Inframarginalband auf, dessen äusserer Grenzstreif sich an das breit bis zum Hinterende laufende Submarginalband legt; die Binde des letzteren tritt auch auf der Oberseite hervor. Daran schliesst sich die gleichmässige Marginalbinde, die aussen von der Saumbinde durch das entwickelte Postmarginalband abgetrennt wird. Von diesen Bändern lassen sich auf den Hinterflügeln zwischen dem äusseren Basal- und dem regelmässig verlaufenden Submarginalbande

¹⁾ Der von Donovan abgebildete, von Kirby und Felder noch geführte, nach Boisduval *P. Danaus* nahe stehende *P. Antinous* Don. wird schon von G. R. Gray (List. Lepidopt. insects I. Papilionid. London 1856, p. 23) zu *P. Danaus* L. als Synonym gezogen, ist aber nach Me Leay (Proc. ent. Soc. New South Wales I, p. XXXII) eine australische Art der *Podalirius*-Gruppe, was dringend der Bestätigung bedarf.

nur einzelne Reste in den dunklen Bestäubungen der Hinterhälfte auf dem dritten Median- und dem ersten Cubitalast und in dem oft breiten und gelbgefüllten Terminalbände erkennen. Wahrscheinlich gehören dieselben als Reste der Fortsetzung des letzten Zell- und des Terminalbandes der Vorderflügel an, da die Verlängerung des ersteren durch die des letzteren verstärkt sein dürfte. Zwischen dem Basalbandwinkel und dem Submarginalbände ist der äussere Rand der gelben Mittelbinde etwas orangeroth verblunkelt, wie wir dies auch in der *Machaon*-Gruppe feststellten. Das breite Submarginalband selbst hat die Form eines continuirlichen Zackenbandes und trägt einen bläulichen Bindenkern. Auch die orangegelben Randmonde der Hinterflügel sind ziemlich regelmässig entwickelt und nur im siebenten Randfelde etwas verschmälert. Durch die aber schon hier erfolgte Verkürzung des achten Randfeldes ist das sonst ebenfalls als regel-



Figur 9.

Halbschematische Skizze der Flügelzeichnung von *Papilio Danaus* Boisduvali (Mexico), einem Riesenfalter.

mässiges einfach schwarzes Zackenband verlaufende Postmarginalband in diesem Felde undeutlich geworden und nur an einzelnen Stücken theilweise erkennbar; so geht auch der Marginalmond meist ohne Grenzstreif in den Limbalmond über, was wir als abgeleitet anzusehen haben. Der gelbe Leib ist von einem breiten Rücken, je einem Stigmal- und je einem Infrastigmalstreif durchlaufen, zeigt also noch die ursprünglich ausgesprochene Längsstreifung erhalten. Wie der dritte Medianast ist auch der zweite mit den beiden Cubitalästen in längere Zacken ausgezogen.

Näher als die übrigen Arten steht *P. Danaus* Boisduvali, wohl *P. Rutilus* Boisduvali (Californien), bei dem das Schmuckband noch gelb gefärbt und nur der dritte Medianast in einen Schwanz verlängert ist. Bei *P. Eurymedon* Boisduvali (ebenda) sind die Bänder ganz segelfalterartig entwickelt und das dritte Zell-

band der Vorderflügel stärker verbreitert, dagegen ist das Intramarginalband der Vorderflügel stärker abgekürzt und das Submarginalband stärker verdunkelt.

Bei *P. Plumus* Boisd. verbindet sich endlich das dritte Zell- mit dem Terminalbande der Vorderflügel, doch bleiben hier die zwei Cubitaläste der Hinterflügel zackenartig verlängert und ist im achten Randfelde auch noch ein Rest des Postmarginalbandes erhalten, während auf der Oberseite wie bei *P. Ajax* im siebenten und achten Randfelde ein schöner „Prachtwinkel“ antritt, der vorn wie bei den Segelfaltern weiss gesäumt ist.

*Turnus-
Entzugi.*

Hierher gehört auch *P. Turnus* L., als peripherische Form der Gruppe, bei der durch zunehmende Aufhellung der Zeichnung das Terminalband der Hinterflügel schon stark verschmälert ist und im achten Randfelde derselben bereits ein tieferer Ausschnitt sich ausbildet, während die Zacken an den Cubitalästen noch an die ursprünglicheren Formen der Gruppe erinnern. Infolge stärkerer Verdunkelung tritt die Submarginalbinde auf den Vorderflügeln nur noch nahe dem Aussenwinkel auf und ist die Marginalbinde derselben zwar unten noch in einer bindenartigen Mondreihe, oben aber infolge erhöhter, längs der Rippen verlaufende Verdunkelung nur mehr in kleineren Tüpfeln erhalten.

Während die nördlicheren Stücke von *P. Turnus* in beiden Geschlechtern gleich gefärbt sind, tritt bei den Weibchen der südlicheren Formen ein ausgebildeter Melanismus auf und in den Dienst der schützenden Anpassung an den anscheinend erst von Süden her vorgebrungenen Aristolochienfalter *P. Philenor* L. Uebergänge zwischen beiden Weibchenformen sind erst neuerdings von Edwards beobachtet und l. c. auf Taf. III und V abgebildet, aber ungeheuer selten; aus ihnen geht hervor, dass die schwarze Färbung gradweise, nicht durch einen Rückschlag, wie man meist annimmt, durch Verdunkelung der Grundfarbe erfolgte, zumal die dunklen Rinnenfalter, wie wir grade bei den amerikanischen Arten zeigen werden, erst von gelbflügeligen Formen zum Theil wohl durch klimatische Einflüsse abzuleiten sind. Bei den vollkommen dunklen Weibchen (*P. Glaucus* L.) wird die Zeichnung fast ganz verdeckt, ohne deshalb merkbar zu werden; daher entsteht die Verdunkelung hier also nicht durch Ausbreitung der Zeichnung, sondern durch Auftreten einer Deckfarbe. So traten auf den Vorderflügeln oben vorn nur die gelben Randmonde und Limbaltüpfel, hinten aber, wie durchgehend auf den Hinterflügeln, auch die blauen Submarginalmonde auf. Von letzteren aus geht eine blaue Bestäubung über die Oberseite herüber, sodass die Hinterflügel in einem bläulichen Glanz erscheinen, von dem sich die Randmonde des sechsten bis dritten Randfeldes, welche im Fluge nicht verdeckt werden, gelblich-weiss abheben, wie die weissen Bindenreste auf den Hinterflügeln des Aristolochienfalters. Wie bei letzteren sind auch die Vorderflügel gegen die Basalhälfte stärker verdunkelt. Der Leib ist ganz schwarz gefärbt. An der Unterseite, auf welcher die Zeichnung besonders deutlich ist, treten auf den Hinterflügeln vor Allem die Randmonde des zweiten bis sechsten Randfeldes deutlich hervor; vergrössert und roth gefärbt, sind dieselben jederseits von einem schmalen weissen Grundfarbenerest eingefasst, sodass sie auch hierin an das Modell erinnern.

Palamedes-Gr.

Nähere Beziehungen zur *Danus*-Gruppe zeigen auch die bei Kirby weit von einander getrennten Arten der *Palamedes*-Gruppe. Während ihre Stammform wohl noch die helle Färbung der *Danus*-Gruppe besass und an *P. Plumus* Boisd. erinnert haben dürfte, zeichnet sich *P. Palamedes* Dru. schon durch die fortgeschrittene Verdunkelung als stark umgebildete Form aus. So sind die hellen Körperstreifen des Hinterleibes stark zurückgetreten und ist in der Vorderflügelzelle nur mehr ein Rest der äussersten Binde erhalten. Ausserhalb dieser Zelle tritt eine anfangs doppelte, später vereinigte Reihe heller Bindentüpfel auf, deren äussere Concavität wohl dem Submarginalbandrande entspricht. Von den zwei Tüpfeln,

die im Gabelfelde liegen, gehört der äussere wie die zwei hinter ihm folgenden der Zwischenbinde an. Ausserhalb der bis in's siebente Randfeld reichenden Aussenzellbinde, die durch zunehmende Verdunkelung einer ursprünglicheren breiten Mittelbinde entstand, liegt eine vom Vorgabelfelde bis zum sechsten Randfelde regelmässig entwickelte, in letztgenanntem wie die Limbaltüpfel durch die Analfalte zerschnürte Reihe von Marginalmonden, wie bei *P. Turnus* L. Auf den Hinterflügeln erkennt man eine helle Basis wie bei *P. Daanus* und einen gelben, nur auf der Unterseite auftretenden Rest einer hellen Querbinde, der sich äusserst zart noch in der Vorderflügelzelle erkennen lässt und der äusseren Basalbinde entspricht, die in der *Turnus*- und *Daanus*-Gruppe noch ausgebildet ist. So ist die Verdunkelung der Hinterflügel besonders von dem dritten Basalbande nach aussen fortgeschritten und hat auf der Unterseite die Mittelbinde auf eine schmale, innen weisslich gesäumte, aussen rothe Binde zurückgedrängt, gegen die sich von aussen her auch das Submarginalband stark auseinanderzog und einen innen blauen, aussen gelblich bestäubten Kern entwickelte. Ausserhalb dieses Bandes sind die Marginalmonde regelmässig ausgebildet, oben wie die übrigen Binden gelb, unten dagegen in der Mitte rötlich. Im achten Randfelde ist der schmale Marginalmond vom Saum deutlich durch das Postmarginalband getrennt.

Auf *Palamedes*-ähnliche Formen lässt sich nun auch der nordamerikanische *P. Troilus* L.¹⁾ zurückführen, welcher einen weiteren Grad des Umbildungsprocesses der Gruppe darstellt. Die bei den ursprünglicheren Arten oben deutliche Anthellung der Vorderflügelzelle tritt bei ihm nur noch unten auf, und ebenso sind die kleinen Tüpfel der Mittelbinde nur unten vom zweiten Randfelde an entwickelt, während die Randmonde oben und unten im Gabelfelde beginnen und bis zum sechsten Randfelde reichen, in dem sie getheilt sind. Auf den Hinterflügeln tritt die Mittelbinde scharf nur mehr unten auf und ist schon durch längs der Rippen fortschreitende Verdunkelung in einzelne Tüpfel von orangerother Farbe mit weisslichem Innenrande zerschnürt. Der Tüpfel der Mittelbinde im sechsten Randfelde ist durch das Vordringen der Submarginalbinde verdeckt, aber bei durchfallendem Licht auch von der Oberseite noch zu erkennen. Ebenso dürfte die hellgrüne Oberseitenbinde der Hinterflügel von var. *Ilioneus* Smith-Abbot ausserhalb der Zelle ebenfalls der Mittelbinde von *P. Palamedes* entsprechen, wenngleich ihr Aussenrand nicht mehr mit dem der Mittelbinde auf der Unterseite zusammenfällt, wie es bei letzterwähnter Art noch der Fall ist. Die früheren Längsbinden des Kopfes und Nackens sind wie die der Abdominalseiten in Tüpfel zerschnürt. Bei var. *Troilus* tritt auf der Oberseite der Hinterflügel die Submarginalbinde stärker silberblau hervor und ist innen von einer grünen Bespritzung begrenzt. Die Vorderflügelmonde sind kleiner als bei der vorigen Form, die Schwänze schmaler und kürzer. Die Färbung und Zeichnung der Hinterflügelunterseite erinnert durchaus an die von *P. Palamedes*; so ist im achten Randfelde auch das Postmarginalband regelmässig entwickelt.

Auch bei dieser Art erinnert die Unterseite durch die leuchtend rothen, weiss-gesäumten Monde, die hier allerdings der Mittelbinde angehören, und die breite Submarginalbinde, wie die Oberseite besonders der var. *Troilus* L., etwas an *P. Philenor*; so sind *P. Troilus* und *P. Turnus* ♀ *Glauca* auch analoge Anpassungsformen, deren Verbreitung ebenfalls ungefähr zusammenfällt.

Hieran schliessen sich die Angehörigen der ursprünglich arktischen *Machaon*-Gruppe, welche sich von *Daanus*-artigen Vorfahren ableiten lassen und sich von den Arten der *Daanus*-Gruppe durch dickere, stets gekrümmte Fühlerkeule, längere Mittelzelle, kleinere, nur am dritten Medianast auftretende Hinter-

¹⁾ S. Scudder errichtet für ihn die „Gattung“ *Euphodes*, für *P. Turnus* die „Gattung“ *Jessoides*.

flügelschwänze und geringere Krümmung der Subcostiradialis derselben Flügel unterscheiden. Das achte Analfeld ist hinten weniger ausgeschnitten als in der *Tarnus*-Gruppe und lässt somit stets Marginal- und Saummond unterscheiden, zwischen denen ein punctförmiger Rest des Postmarginalbandes liegt.

Am nächsten steht den palaearktischen Formen *P. Oregonius* Edw., dessen Analfeldzeichnung der Hinterflügel zwischen der von *P. Machaon* und *P. Xanthus* die Mitte hält, die hellste aller nordamerikanischen Arten.

Die übrigen zeichnen sich durch eine zunehmende Verdunkelung aus, die bei *P. Zolvaon* Boisd. (Californien) die Vorderflügelbasis ergreift und sich auch auf die Bauchseite des Abdomen fortsetzt.

Von den zwei auch bei *P. Zolvaon* noch erhaltenen Zellbinden der Vorderflügel wird bei den übrigen Arten zunächst die innere verdunkelt und zwar tritt dies bei *P. Bairdii* Edw. zuerst bei dem Weibchen ein: Allmählig geht die Verdunkelung der Vorderflügel bei *P. Americus* Koll. (Neu-Granada, Venezuela, Ecuador) auch auf die Hinterflügel und zwar zuerst auf die Oberseite über, um dann auch auf der Unterseite aufzutreten. Zugleich werden Supra- und Infrastigmalbinde des Hinterleibes in gelbe Tüpfel zerschnürt. Endlich wird bei *P. Asterius* Cr. (*Polycaenus* F.) die Aussenzellbinde der Vorderflügel auf eine schmale gelbe Tüpfelreihe beschränkt und die ganze Innenhälfte der Flügel mit Ausnahme eines oft nur auf der Unterseite erkennbaren Tüpfels der Vorderflügelzelle verdunkelt. Zugleich tritt die Submarginalbinde auf der Oberseite der Hinterflügel oft blau hervor. So erhalten wir wieder eine stark verdunkelte peripherische Form, wie in den anderen Gruppen der besprochenen nordamerikanischen Rinnenfalter. Als südlichen Vorposten dieser Gruppe erwähne ich hier noch den eigenthümlichen *P. Hellenichus* Hew., eine von C. und R. Felder noch nicht besprochene dunkle Art aus Paraguay, mit zwei leuchtend gelben Tüpfelreihen am Hinterende des Körpers, einer gelben Vorderflügelzell- und einer noch über die äussere Zellhälfte der Hinterflügel gehenden gelben Mittelbinde, die am äusseren Ende roth gefärbt ist. Auf der Unterseite sind diese Binden stark vergrössert, rostbräunlich, ebenfalls aussen roth gefärbt und auf den Hinterflügeln von einem dunklen, über die Zelle gehenden Bande durchzogen; auch die blauen Submarginale sind deutlich. So tritt eine mimetische Anpassung an Aristolochienfalter der Gattung *Eurygales* auf, welche jene Gegenden bewohnen. Und zwar gleicht *P. Hellenichus* auf der Oberseite besonders dem Männchen von *Eu. Duponcheli* Luc., auf der Unterseite durch das schmale über die Zelle laufende Band dem Weibchen dieser und der verwandten Art, *Eu. corathrus* Boisd.

In Bezug auf die Raupennahrung lassen sich zwei Gruppen nicht scharf von einander trennen: so lebt die Raupe von *P. Tarnus* L. nach S. H. Scudder an Magnoliaceen, Tiliaceen, Rutaceen (*Ptelea*) und zahlreichen Rosaceen, besonders *Prunus*, die von *P. Eurymedon* Boisd. und *Rotulus* Boisd. nach Edwards an *Prunus*. Die Raupen der *Palamedes*-Gruppe leben nach Scudder*) einzeln in Florida auf Magnolien und *Nanthophyllum* (Rutaceen), auf Rosaceen, meist aber auf Lauraceen, besonders *Benzoin odoriferum* und *Sassatras officinale*, und bilden auch durch ihre aufgeblasene Leibeshöhle mit denen von *P. Tarnus* L. nach Boisduval l. c. p. 335 eine natürliche Gruppe.

Dagegen leben die Raupen der *Machaon*-Gruppe, soviel bekannt, wie ihre palaearktischen Verwandten auf Umbelliferen.

*) S. H. Scudder, Entom. East. Un. Stat. Cal. 1888, p. 1294.

b. Neotropische Subregion.

Die zwei Cohorten der rein neotropischen Rinnenfalter stehen offenbar den zwei nearktischen Hauptgruppen näher, von denen sie auch abzuleiten sein dürften.

An die *Danaus*-Gruppe schliesst sich vor Allem durch die nur wenig längeren und schwächer gekeulten Föhler, die Behaarung des Innenrandes und die Form der Hinterflügel die vollkommen schwarze *Asclepius*-Gruppe an, welche C. und R. Felder's Section XLVIII entspricht. Bei *P. Asclepius* Hb. (Mexico) besitzt das Männchen eine feine helle Subapicalbinde der Vorderflügel, welche wohl theilweise der Marginalbinde entspricht. Weiter setzt sich vor dem Ende der Vorderflügelzelle eine vom Vorder- rande des Flügels beginnende breit gelbweisse Binde bis nahe an den Innenwinkel fort, um die Hinter- flügel bis zum Innenrande ausserhalb der Zelle zu durchlaufen. Somit entspricht diese Binde auf den Vorderflügeln der Vereinigung einer Aussenzell- mit der hintersten Zellbinde, auf den Hinterflügeln dem ausserhalb des Terminalbandes gelegenen Theil der ursprünglich breiteren Mittelbinde. Wie bei *P. Pala- medes* Dru. ist auch hier der Aussenrand der Hinterflügelbinde rostroth gefärbt. Auf den Vorderflügeln ganz verdunkelt, ist das Submarginalband auf den Hinterflügeln gleichmässig entwickelt und lässt seine ab- gerundeten Monde auch auf der Oberseite auftreten. Die Randmonde sind nur sehr schwach ausgebildet; der im hinten stärker ausgeschnittenen achten Randfelde gelegene geht fast unmerklich in den Saum über und auch der Submarginalfleck verkürzt sich. Der zackartigen Ausdehnung des ersten Cubitalastes schliessen sich kürzere Vorsprünge des zweiten Median- und des zweiten Cubitalastes an.

Als Weibchen gehört der noch von C. und R. Felder und Kirby als gesonderte Art geführte *P. Garamus* Hb. hierher, bei welchem zuerst auf den Vorderflügeln eine von der des Männchens ab- weichende Zeichnung entsteht, welche wir als Rückschlagserscheinung auffassen. Es bildet sich nämlich in den circa vier letzten Randfeldern der Vorderflügel eine Doppelreihe undeutlich erhaltener Bidentüpfel aus, die der Marginal- und Submarginalbinde entsprechen, aber durch Verdunkelung fast vollkommen unterdrückt sind. Diese Verdunkelung lässt auf den Hinterflügeln die Mittelbinde nur in ihrem äussersten Theile bestehen; zugleich färbt sich letzterer durchgehend orangeroth und tritt wie die grösseren heller gefärbten Marginal- und die bläulichen runden Submarginalmonde auch auf der Oberseite der Hinterflügel auf. Endlich erhält das Schwarz der Flügeloberseite einen leuchtenden dunkelblauen Schiller, und so erinnert das Weibchen oberflächlich an den Aristolochienfalter *P. Photinus* Dbl. (Mexico).

Einen weiteren Ausläufer des *Danaus*-artigen Stammes bildet die grosse *Eurymander*-Gruppe, welche sich der *Asclepius*-Gruppe gegenüber durch verschiedene Sculpturmerkmale, besonders die gesägte Subcosta der Vorderflügel und die Reduction der Hinterflügelschwänze als abgeleiteter darstellt. Von den drei von C. und R. Felder unterschiedenen Untergruppen dieser Section XLVII dürfte die Sub- section B dem Stamme am nächsten stehen. Denn obwohl sie sich durch den dicht hinter dem Zellende erfolgenden Ursprung des dritten Radialastes der Vorderflügel als abgeleitet darstellt, besitzt sie doch noch auf den Hinterflügeln zwei kurze Zacken an den Cubitalästen und einen deutlichen Medianschwanz. Auch ist ihre Zeichnung offenbar auf einer niederen Stufe stehen geblieben als sie bei *P. Asclepius* Hb. erscheint. So tragen die Vorderflügel oft den Rest einer Zellbinde, eine regelmässige Reihe von Marginal- tüpfeln und einen ausserhalb der Zelle verlaufenden Mittelbindenrest, während sich über die Hinterflügel continuirlich die rothe Rand- und Submarginal- und die weissgelbe Aussenzellbinde ziehen, welche auch auf der Oberseite hervortreten. Dadurch erinnert die Zeichnung etwas an die von *P. Palamedes* Dru.

Einen Ausläufer desselben Stammes stellt die von C. und R. Felder als Subsection C unterschiedene *Cucicus*-Untergruppe dar, welche sich in der Hinterflügelform noch enger an die *Asclepius*-Gruppe anschliesst. Bei *P. Cucicus* Westw. (Ecuador, Neu-Granada) tritt auf der Unterseite der Hinterflügel eine ausgebildete Schutzfärbung auf, welche die Mittelbinde der Hinterflügel überdeckt und an welke Blätter erinnern dürfte. Bei den Weibchen (*Zaddachii* Dew.) tragen die Vorderflügel eine breite leuchtend rothe Binde; so erinnern sie etwas an den mit ihnen zusammen vorkommenden *Heliconius Melponene* L.

Einem mit der *Gragi*-Untergruppe gemeinsamen Stamme dürfte auch die *Cleotas*-Untergruppe entsprungen sein, welche C. und R. Felder's Subsection A entspricht und sich von den besprochenen Untergruppen durch die Reduction des Medianschwanzes auf einen zahntförmigen Vorsprung und die bei den meisten Arten durch eine kurze schiefe Verbindung bewirkte Trennung des dritten Radialastes vom Zellende der Vorderflügel unterscheidet. Einige der Arten dieser Gruppe, so *P. Lycortas* Feld., *Cleotas* Gray, erinnern in der Zeichnung des Männchens durchaus an die erste Untergruppe. Zugleich treffen wir aber bei dem Weibchen z. B. von *P. Lenaeus* Dbl. (Bolivia) eine Umbildung der ursprünglichen Zeichnung, indem im vierten und fünften Randfelde der Vorderflügel die Mittelbinde sich längs erweitert und auch in die Zelle eintritt. Durch weitere Ausbildung einer ähnlichen Binde, welche durch die stärkere Verdunkelung der Vorderflügel mehr hervortritt, und durch weitere Unterdrückung der Bänderreste auf den Hinterflügeln zu grüngrauen Tüpfeln entstanden Formen wie *P. Bitias* Godt. (Neu-Granada), der schon unvollkommen an den Aristolochienfalter *P. Crassus* F. erinnert. Bei anderen Arten tritt durch weitere Verdunkelung eine Verschmälerung aller Flügelbinden ein, indem diese auf der Oberseite zu grünlichen Tüpfeln reducirt werden und als solche noch theilweise auf der Unterseite der Vorderflügel auftreten; dagegen nehmen Rand- und Mittelbinde auf der Hinterflügel-Unterseite eine dunkelrothe Farbe an und wird die Submarginalbinde verdunkelt. So ähnelt *P. Victorinus* Dbl. (Mexico) durch die schwarzgrüne Flügelfärbung und auch die Unterseitenfärbung etwas Aristolochienaltern der *Protodamas*-Gruppe. Auch *P. Birchallii* Hew. (Neu-Granada), bei dem die innere Binde der Vorderflügel unterdrückt wird, während die Mittelbinde der Hinterflügel sich gegen die Zelle erweitert und wie die übrigen Binden auf der Oberseite einen grünlichen Ton annimmt, erinnert an grüne Aristolochienfalter derselben Gruppe. Noch grösser wird diese Aehnlichkeit bei *P. Menatius* Hb. (Surinam), einer kleineren Art, bei welcher die Mittelbinde der Hinterflügel sich bis über das Zellende erweitert, während die der Vorderflügel unendlich in die Randbinde übergeht. So entsteht eine gewisse Aehnlichkeit der Art ebenfalls mit Formen der *Protodamas*-Gruppe, wie *P. Amalcius* Mart. In diese Gruppe gehören weiter einige C. und R. Felder noch unbekannt gebliebene Formen, wie der schöne *P. xanthopleura* Hew. mit gelben Hinterleibsseiten und grünblau bestäubten Hinterflügeln, welcher etwas an den ebenfalls zur *Protodamas*-Gruppe gehörigen *P. Lycidas* Cr. erinnert. Hierher gehört auch wohl der C. und R. Felder ebenfalls unbekannte, äusserst seltene, ungeschwänzte *P. enterpinus* Hew. (Ecuador), welcher ein unverkennbares Abbild des erwähnten *Heliconius Melponene* L. darstellt und auf dessen stark braunschwarz verdunkelter Oberseite nur mehr die leuchtend rothe Vorderflügelbinde auffällt.

Vol. I. Tab. XI.
Fig. 84.

Zagreus-Gr.

Als einen Endausläufer dieser Cohorte haben wir die *Zagreus*-Gruppe anzusehen, welche C. und R. Felder's Section XLVI entspricht und in ihren wenigen seltenen Arten in beiden Geschlechtern an die Danaidengattung *Lycorca* Dbl. erinnert. So ist hier auch der grösste Theil der Fühler ockergelb, Kopf und Thorax weiss, der Nacken an den Vorderecken und in der Mitte gelb gefleckt, der Hinterleib

seitlich mit hellen Binden verziert, wie bei den Modellen. Merkwürdig ist der Gegensatz, in dem der vor dem Zellende ausgehende dritte Radialast zu dem langen Gabelstiel der Vorderflügel steht, was bereits C. und R. Felder l. c. p. 359 erwähnen. Die Zeichnung lässt sich auf diejenige der *Eurymander*-Gruppe zurückführen, zeigt jedoch auch einige ursprüngliche Züge. So entspricht die quere Zellbinde der auch in dieser Gruppe vorkommenden Vorderflügelbinde und entstand die strahlige Aufhellung der Zellbasis wohl durch Weiterwuchern der Mittelbinde. Auf den Hinterflügeln gehören die gedoppelten weissen Tüpfel in schwarzem Grunde, welche wieder zuerst auf der Unterseite auftreten, der Submarginalbinde an und erhöhen in der Ruhestellung die Aehnlichkeit mit der erwähnten Danaidengattung. Die stark variable Oberseitenfärbung fällt meist mit derjenigen entsprechender Localvarietäten der *Lycorcen* zusammen.

Die zweite Cohorte der neotropischen Rinnenfalter scheint sich enger an die *Machaon*-Gruppe anzulehnen.

Die ursprünglichste Zeichnung und Flügelform zugleich finden wir in der *Machaonides*-Gruppe, welche C. und R. Felder's Section XLI entspricht und sich durch die scharf gezackten, am dritten Medianast einen etwas spathei- oder gleichförmigen Schwanz tragenden Hinterflügel, die gelbliche Basalhälfte der Fühlerkeule und die zwei schmalen gelben Schulterstreifen vor den übrigen Gruppen auszeichnet, während der secundär aufgehellte Hinterleib nur das Rückenband trägt. Die Zeichnung von *P. Machaonides* Esp. (Cuba, St. Domingo) erinnert besonders auf der Unterseite an ursprünglichere Verhältnisse. So entspricht die hellere, auch auf der Oberseite vortretende Zellbinde der Vorderflügel anscheinend der zwischen dem dritten Basal- und dem folgenden Zellbände gelegenen Binde der *Danaus*-Gruppe; dann wäre die nur unten auftretende schwächere Anhellung am Aussenrande dieser Binde der letzten Zellbinde gleich zu setzen, welche durch ein bis zum Innenwinkel durchgehendes schwarzes Band geschlossen würde. Letzteres entspräche hinten einer Vereinigung des Terminal- und Inframarginal- und schliesslich des Submarginalbandes. So ist auch nur ein kleiner Theil der Mittelbinde, deren innere Hälfte auch oben auftritt, und ein wenig bedeutender Rest der Submarginalbinde erhalten. Von den Bändern tritt nun auf die Hinterflügel zu innerst eine basale Verdunkelung über, welche wie in der *Danaus*-Gruppe hinten einen schmalen Bänderrest im siebenten und achten Randfelde frei lässt, sich aber sonst breit über beide Felder hinzieht und wohl der Verdunkelung zwischen den Basalbändern oben erwähnter Gruppe entspricht. Doch ist die Mittelbinde auch aussen durch eine Verdunkelung beschränkt, die sich vom sechsten Randfelde aus bis an den vordersten Submarginalbandfleck hinzieht und wohl dem ausserhalb des Terminalbandes gelegenen Inframarginalbände entspricht

Machaonides-
Gr.

Zur selben Gruppe gehört der auf Jamaica beschränkte gewaltige *P. Homerus* F. mit stark verdunkelter Unterseite, auf dessen Vorderflügeln eine Zellbinde, eine breite Mittelbinde und einige Marginalbindentüpfel sich erhalten haben. Auf den Hinterflügeln finden wir eine über das Zellende gehende breite Mittelbinde, ausserhalb deren der ganze Aussenbord rauchbraun verdunkelt wird, doch verändert sich die Form und Ausbildung der Marginal- und Submarginalbinde mehr auf der Unter- als auf der Oberseite.

Näher an *P. Machaonides* schliesst sich *P. Andraemon* Hb. (Cuba, Mexico, Honduras) an, dessen Vorderflügelmittelbinde die für zahlreiche folgende Arten charakteristische Zusammensetzung zeigt. Sie entsteht hier aus den zwei Zellbinden der Vorderflügel, deren hintere abgekürzt ist, aus der Vor- und der durch ein kurzes Inframarginalband getrennten Zwischenbinde, welche etwas gegen die Basis der Flügel herantritt und so am Hinterende wieder einen Inframarginalbandrest hervortreten lässt, der das Sub-

marginalband innen verstärkt und bei *P. Machaonides* noch deutlicher war; zugleich wurde durch das Vordringen der Mittelbinde die basale Verdunkelung stark beschränkt. Sonst zeigt *P. Andraemon* zwar schon eine Verdunkelung der Marginalbinde auf der Oberseite der Vorderflügel, doch eine sehr gleichmässige, am meisten an die der *Machaon*-Gruppe erinnernde Zeichnung, während die Hinterflügelzacken noch auf die *Danaus*-Gruppe hinweisen.

Thoas-Gr. Einen weiteren mit der *Machaonides*-Gruppe verwandten Hauptstamm bildet die C. und R. Felder's Section XLII entsprechende, aus oft gewaltigen Formen bestehende *Thoas*-Gruppe. Dieselbe besitzt schwarze Fühler, einen kurzen Stiel der Radialgabel, kürzere Hinterflügel mit breiterer, an die *Danaus*-Gruppe erinnernder Mittelzelle, einen nur oben noch schmal verdunkelten, sonst gelben Leib und auf dem Nacken Spuren heller Längsbinden. In der Vorderflügelzelle wird das einstige Vorhandensein der Binden nur noch durch die gelben Längsstriche ausgedrückt. Die Unterseite der Vorderflügel ist stärker aufgehellt als die obere, so ist auch der oben breit entwickelte Rest des Inframarginalbandes unten unendlich. Die Marginalmonde setzen sich so breit über das zweite bis siebente Randfeld der Hinterflügel fort, dass sich C. und R. Felder täuschen liessen und die Saumflecke für die Randmonde ansahen, während sie diese selbst der Mittelbinde zurechneten. Innerhalb der Randmonde ist auf den Hinterflügeln ein schmales Submarginalband und um die Zelle herum im fünften und sechsten Randfelde ein Rest der oft erwähnten rothbraunen Färbung entwickelt. So ist die Zeichnung der Unterseite auch hier regelmässiger als die der Oberseite, denn auf den Vorderflügeln treten oben die mittleren Tüpfel der verschmälerten Marginalbinde scheinbar an die Mittelbinde heran, welche vorn durch das breite Inframarginalband getheilt ist. Da die Mittelbinde der Vorderflügel hinten durch eine dem Inframarginal- und Submarginalbande entsprechende Verdunkelung nach innen gedrängt wird, setzt sie sich auf die Hinterflügel über die Zellbasis fort; so wird die basale Verdunkelung der Hinterflügel unten bis zur Basis aufgehellt. Zugleich entwickelt sich zwischen Mittelbinde und den unten stark erweiterten Randmonden ein breites schwarzes Band, welches der Verschmelzung des Inframarginal- mit dem Submarginalbande entspricht und über die Zelle hinübergehen kann.

Mentor-Gr. Wohl eines Ursprungs mit dieser in beiden Geschlechtern gleichgefärbten, ausgezeichnete Flieger und meist kräftige Formen umfassenden, in *P. Cresphontes* Cr. bis Nordamerika sich verbreitenden Gruppe ist die über Mexico und Cuba nicht hinausgehende *Mentor*-Gruppe, welche C. und R. Felder's Section XLIV entspricht und aus noch ziemlich kräftigen Formen besteht, die ebenfalls einen kurzen Stiel der Radialgabel besitzen. Von ihren Arten besitzen die der *Mentor*-Untergruppe noch an die bisher besprochenen geschwänzten Formen erinnernde Hinterflügel, weshalb wir sie mit C. und R. Felder an den Anfang der Entwicklungsreihe stellen. Diejenige Art, welche sich durch ein männchenfarbiges Weibchen am engsten der *Thoas*-Gruppe anschliesst, dürfte *P. Mentor* Boisld. (Brasilien) sein, bei welchem die rothen Tüpfel der Zwischenbinde der Hinterflügel wie in letzterwähnter Gruppe nur um die Zelle herum ausgebildet sind und das Weibchen noch in Zeichnung und Färbung der Flügel und des Leibes dem gelben, schwarz gesäumten und gebänderten Männchen sehr ähnlich ist. Bei den übrigen weiter entwickelten Arten mit einer schon im Männchen durchgehenden rothen Zwischenbinde der Hinterflügel tritt schon meist eine weiter gehende Differenz der Färbung beider Geschlechter ein, indem die Grundfarbe des Weibchens braun oder grau verdunkelt wird, wie dies bei *P. Orbalus* Gray und anderen Arten vorkommt, bis es allmählig eine schwärzliche Färbung annimmt, welche es weniger auffällig und dabei den meist dunklen Aristolochienfalttern in geringer Weise ähnlich macht. Diese Verdunkelung betrifft zuerst

die Hinterflügel; so tritt bei *P. Thersites* F. (Antillen) ein Weibchen (*Acamas* F.) auf, das zwar noch gelbe Leibseiten trägt wie das Männchen, aber schon vollkommen verdunkelte Hinterflügel besitzt, auf deren beiden Seiten Rand-, Submarginal- und Zwischenbinde in regelmässigen gelblichen, blauen und rothen Monden auftreten, während die schwarzen Vorderflügel ausser einer gelben Saumeinfassung noch eine breite ausserhalb der Zelle verlaufende Binde besitzen. Bei *P. Lycophron* Hb. tritt bei der dem Männchen weniger ähnlichen Weibchenform (*Pyriothous* Rog.) (Cuba) die Verdunkelung auch auf die Oberseite der Vorderflügel über, sodass die breite weisse Aussenzellbinde oben fast ganz verdeckt wird und nur mehr undeutlich durchscheint.

In der zweiten Untergruppe, welche von *P. Polycæon* Cr. gebildet wird, sind die Hinterflügel in beiden Geschlechtern stark gezackt und tragen nur einen kürzeren, schmäleren Medianschwanz. Erinnert das Männchen noch durch die breit über beide Flügel sich fortsetzende gelbe Mittelbinde an die übrigen Formen der Gruppe, an deren Ende es auch durch die schon vollkommen ausgebildete rothe Zwischenbinde der Hinterflügel verwiesen wird, so gleicht die anscheinend südlichere Weibchenform, *Androgeos* Cr., mit schwarzen Vorderflügeln, deren Innenrand oben wie die ganze Oberseite der Hinterflügel einen stahlblauen Glanz zeigt, während parallel dem Innenrande der Vorderflügel sich eine aus der Mittelbinde des Männchens hervorgegangene gelbweisse Binde vom zweiten bis vierten Randfelde in die Zelle zieht, dem seltenen Weibchen des Aristolochienfälters *P. Belus*. Dagegen stellt die Weibchenform, *Piranthus* Cr., eine in der Zeichnung ungefähr dem *Asclepius* ♀ *Garamas* entsprechende Rückschlagsform mit einigen Marginalmonden auf den Vorderflügeln, bei denen die gelbweisse Längsbinde nur in einigen Fällen auf der Unterseite der Vorderflügel erhalten ist, durch den grünen oder bläulichen Metallglanz, der die hintere Hälfte der Vorder- und Hinterflügel überzieht und die fast vollkommene Rückbildung der Schwänze den höheren Entwicklungsgrad der mimetischen Anpassung dar, indem sie an die fast einfarbig bronzegrüne Oberseite der Männchen der *Protodamus*-Gruppe (*Belus* Cr. etc.) erinnert.

Wahrscheinlich stammt auch die *Torquatinus*-Gruppe, welche C. und R. Felder's Section XLIII entspricht, mit der *Mentor*-Gruppe von gemeinsamen Vorfahren ab, die noch an die *Machaonides*-Gruppe erinnerten. Der Grundform der Gruppe steht wohl das Männchen von *P. Torquatinus* Esp. (= *Argentus* Mart.) näher, bei welchen sich die Aussenzellbinde der Vorderflügel über die hinteren Flügel breit und gelb fortsetzt und die Zeichnung der Unterseite an die von *P. Andraemon* Boisd. erinnert. Die starke braunschwarze Verdunkelung beider Flügelseiten lässt bei dem Weibchen (*Hectorides* Esp.) von der hellen Grundfarbe auf der Unterseite der Vorderflügel nur eine schmale Marginal- und eine wenig breitere weisse Aussenzellbinde, auf der Oberseite derselben nur letztere auftreten. Dieselbe setzt sich bis über das Zellende der Hinterflügel fort, sich nach hinten verbreiternd, und wird durch einige rothe Tüpfel der Zwischenbinde abgeschlossen, welche ebenso wie die letzten rothen sechs Marginalmonde und blauen vier Submarginalmonde auf der Oberseite hervortreten. So wird eine überraschende mimetische Anpassung des Weibchens an die Glieder der ebenfalls südbrasilianischen, zu den Aristolochienfaltern gehörigen *Agarus*-Gruppe bewirkt, welche sich auch in den stark gezackten Hinterflügeln ausspricht. Das mimetische Weibchen scheint in geringeren Grenzen, besonders was die Weisse und Breite der Zellbinde betrifft, zu variieren und so sich verschiedenen Arten der *Agarus*-Gruppe, meist *P. Agarus* F. und *Banichus* F. anzupassen.

Viel stärker variiert das Weibchen von *P. torquatus* Cr., und zwar stellen seine zahlreichen Varietäten meist Anpassungen an die Weibchen der höchst entwickelten Aristolochienfalter der *Vertumnus*-

Torquatinus-
Gr.

Vend. Tab. X
Fig. 67, 68.

Arneas-Gruppe dar. Doch giebt es selbst hier noch vereinzelte Weibchenformen, welche gelbe Zellstreifen auf der Unterseite der Vorderflügel und wie das Männchen eine gelbe Mittelbinde besitzen, ausserhalb deren allerdings einige Bindentüpfel auf den Hinterflügeln zu auch oben deutlichen rosenrothen, grösseren Tüpfeln verschmelzen. Aus ähnlichen Formen entstand zuerst eine mimetische Weibchenform, *Polybius* Swains., durch stärkere Verdunkelung der Vorderflügel, welche die Mittelbinde auf einen in die Zelle reichenden Rest beschränkte, während auf den Hinterflügeln die Marginalmonde mit den Submarginal- und Zwischenbindentüpfeln des sechsten und siebenten Randfeldes verschmolzen und oben rosenroth hervortraten. — Bei der Weibchenform *Patros* Gray wurden die Hinterflügelschwänze schon kleiner, und bei der var. *flava* Oberthür aus Para verdunkelten sich die Vorderflügel, während die grossen Spiegelflecke der Hinterflügel im sechsten und siebenten Randfelde in Anpassung an das Weibchen von *P. Bolivar* Hew. eine gelbe Färbung annahmen. Endlich werden in der var. *Caudius* Hb. (Para) die Schwänze schon sehr fein und rückt der weisse Spiegel der Vorderflügel von der Zelle weg, während er bei der ebenfalls kurzschwänzigen Varietät *Orehamus* Boisl. (Venezuela) die Vorderflügelzelle durchzieht. Die dunklen Vorderflügel mit weissem oder gelbem Spiegelfleck, verbunden mit den dunklen, meist von einer rosenfarbigen oder violetten, breiten, innen entwickelteren Binde durchzogenen Hinterflügeln, lassen diese selteneren Weibchen denen der höheren schwanzlosen Aristolochienfalter (*Vertumnus* Cr. etc.) gleichen.

Bei *P. Tolus* Godm. u. Salvin (Mexico), dessen Männchen vor dem von *P. torquatus* sich durch ausgedehntere Erhaltung der Marginalmonde auf der Unterseite der Vorderflügel auszeichnet, sind die Vorderflügel des Weibchens vollständig verdunkelt; die Marginal- und Zwischenbindentüpfel der Hinterflügel sind violett gefärbt und treten auf der Oberseite durch. So entsteht eine wenig vollkommene Aehnlichkeit des Weibchens mit der *Photinus*-Gruppe der Aristolochienfalter.

Caiguanabus-
Gr.

Als weiteren Ansläufer einer der *Thoas*-Gruppe wohl näher stehenden Form sehe ich die *Caiguanabus*-Gruppe an, zu welcher ich ausser den Formen der Section XL C. und R. Felder's, von denen ich nur *P. Zetes* Westw. zu den Aristolochienfaltern versetzte¹⁾, auch *P. Erostratus* Westw. (Guatemala) rechne, welchen C. und R. Felder, allerdings, ohne ihn untersuchen zu können, zu der *Torquatus*-Gruppe gestellt hatten. Die Arten dieser Gruppe zeichnen sich durch einen kräftigen Hinterflügelschwanz und eine auf den Hinterflügeln ausgebildete, ziemlich weit vom Saum entfernte Randmondreihe aus, welche auf den Vorderflügeln oft unterdrückt ist.

P. Caiguanabus Poey (Cuba) dürfte der Stammform der Gruppe noch am nächsten stehen, da er auf den Vorderflügeln ausser einer entwickelten Marginalbinde noch einzelne undeutliche Mittelbindentüpfel auf der Unterseite der Vorderhälfte ausserhalb der Zelle besitzt und auf den Hinterflügeln noch durch die blauen Submarginalmonde und die wenigen rostbraunen Zwischenbindentüpfel ausserhalb der Zelle an die *Thoas*-Gruppe erinnert. Bei dieser Art zeigt das Weibchen durch das Erblässen der Marginalbinde und das Vortreten der Submarginalmonde auf der Oberseite der Hinterflügel eine geringe Aehnlichkeit mit dem stahlgrünen, schwache weissliche Aussenrandflecke tragenden Aristolochienfalter *P. Villiersii* Godt. (Cuba).

Bei dem noch stärker verdunkelten *P. Pelas* Westw. (Jamaica, Cuba, St. Domingo) tritt am Männchen eine über das Zellende nach dem Innenwinkel der Vorderflügel verlaufende gelbliche Binde auf, während auf den Hinterflügeln die Randmonde eine orangerothe Färbung annehmen und der sub-

¹⁾ Vergl. Seite 74

marginale Mond sich nur im achten Randfelde erhält; zugleich treten nur die innersten Randmonde auf der Oberseite vor. Das Weibchen dieser Art, dessen Untersuchung ich der Güte des Herrn Dr. Staudinger verdanke, trägt eine rein weisse Vorderflügelbinde in schwarzbraunem Grunde ausserhalb der Zelle. Auf den Hinterflügeln tritt der Marginalmond des achten Randfeldes ebenfalls nicht auf der Oberseite auf, sondern wird hier durch den rothen Saum vertreten, an den sich die grossen, innen rothen, aussen weiss gesäumten Randmonde anschliessen, die nach innen von einigen feinen Submarginaltöpfeln begleitet werden. Bei dieser Art trägt die Brust schon lebhaft rothgelbe Flecke. So entsteht eine geringe Aehnlichkeit des Weibchens mit dem des Aristolochienfalters *P. Gaudluchianus* Feld. (Cuba), die sich besonders durch die Färbung der Randmonde der Hinterflügel ausspricht.

Hierher gehört auch *P. Oxygus* Hb. (Cuba), dessen Weibchen nach der Beschreibung von Boisduval dem von Hübner abgebildeten Stück gleicht und sich von dem von *P. Pelaeus* Westw. besonders durch die stärkere Ausbildung der Limbaltüpfel auf beiden Flügeln unterscheidet, während sonst nur ein fast verdunkelter Aussenzellbindenrest der vorderen und eine schmale röthliche Marginal- und feine gelbe Submarginalbinde der hinteren sich erkennen lassen.

Hieran schliesse ich auch *P. Erostratus* Westw. (Guatemala) an, dessen stark verdunkeltes Männchen den Rest einer Marginaltüpfelreihe auf der Unterseite der Vorderflügel und eine rothe Marginal- und Submarginaltüpfelreihe auf der Unterseite der Hinterflügel trägt, von der nur die äussere Marginalreihe oben auftritt. Bei dem Weibchen sind die Vorderflügel stark verdunkelt und haben einen grünlichen Glanz, während auf den Hinterflügeln die doppelte, stark erweiterte Tüpfelreihe in blutrother Färbung mit bläulichem Glanz auch auf der Oberseite auftritt und somit *P. Pholinus* Westw. gleicht.

Hieran schliesst sich ungezwungen die *Pharuces*-Gruppe an, welche C. und R. Felder's Section XLV entspricht und sich durch die rothen Tüpfel auf Halsschild und Thorax, die verschälerten kürzeren Vorderflügel, die in der Analgegend etwas vorgezogenen, gezackten, oft schwanzlosen Hinterflügel und die in beiden Geschlechtern gleiche Färbung auszeichnet. Wie *P. Epenetus* Hew. (Ecuador) sich auf Formen zurückführen lässt, die *P. Oxygus* nahe standen, bietet er zugleich in der Zeichnung der Hinterflügel die ursprünglichsten Verhältnisse, nämlich eine vom Rande entfernte Marginalbinde und eine entwickelte rothe Submarginalbinde, endlich einen Rest der Vorderflügelmittelbinde dar, woraus sich der Anschluss an Formen wie *Anchisiades* Esp., *Erander* Godt., *Isidorus* Dbld. etc. ergibt, welche Kirby sämmtlich als *P. Pompejus* zusammenfasst. Dieselben zeichnen sich durch eine schwächere Aufhellung über dem Ende der Vorderflügelzelle und ähnlich der Weibchenform *Caudius* Hb. von *P. torquatus* Cr. durch eine getrennte, verschmolzene oder theilweise unterdrückte Doppelreihe violetter Flecke auf den Hinterflügeln aus, wodurch sie etwas an Weibchen der *Aeneas*-Gruppe mit stärker verdunkelten Vorderflügeln erinnern. Wie der deutlich geschwänzte *P. Pharuces* Dbld. (Mexico) beweist, dürften die directen Vorfahren der Gruppe noch Medianschwänzchen wie die *Caiquanabus*-Gruppe besessen haben.

Den Höhepunct der mimetischen Ausbildung erreicht der vielleicht von der *Pharuces*-Gruppe (*P. Chinsiales* Westw., Ecuador) abzuleitende *P. Hippason* Cr. aus Surinam, bei dem sich infolge der Anpassung die Innenrandrinne fast vollkommen ausgleicht und wie bei den mimetischen Arten der Segelfalter-Gruppe ein rother Fleck hinter der Zelle an der Unterseite der Hinterflügel entwickelt, sodass selbst C. und R. Felder ihn vor die zu den Segelfaltern gehörende Section X stellten. Bei dem Männchen von *Hippason* ist durch zunehmende Verdunkelung die Violettbinde der Hinterflügel oben auf das siebente und achte, unten auf das fünfte bis achte Randfeld beschränkt und zugleich ein weisser keilförmiger

Vergl. Taf. IX.
Fig. 60-61.

Pharuces-Gr.
Vergl. Taf. IX.
Fig. 64.


Hippason-Gr.
Vergl. Taf. X.
Fig. 74.

Bindenrest am Hinterrande der Vorderflügel entwickelt. So erinnert es an die Männchen von *P. Anchises* L. Das Weibchen dagegen (*Anosis* Cr.) mit schwarzgrauen, gegen die Spitze schwach aufgehellten Vorderflügeln, breiter, rother, schön violett schillernder Hinterflügelbinde und schärfer ausgeprägtem Basalfleck lässt sich im Fluge wohl nur durch die längeren Fühler von dem Weibchen von *P. Anchises* (*Arbates* Esp.) und *P. Orellana* Hew. unterscheiden.

Für die Stellung dieser schwierigen Art unter die Rinneufalter führe ich die Annäherung des zweiten an den ersten Cubitalast der Vorderflügel, welche schon in der *Caiguanabus*-Gruppe auftritt, den langen Hals, den Verlauf der Subcostiradialis der Hinterflügel, den einfachen Bindentüpfel des Analfeldes, endlich die Schuppentorm auf, denn auch *P. Hippason* besitzt wie die Mehrzahl der Rinneufalter Sinusschuppen. Auch die von Stoll abgebildete Raupe und Puppe erinnern an solche der Rinneufalter.

Nach den Beobachtungen von Fritz und Wilh. Müller leben die Raupen von *P. Lyophron* und *P. Oebalus* auf Citrus, von *P. Thoas* auf Piper, von *P. Mentor* auf Citrus, Orangen und Piper; nach Dewitz lebt die Raupe von *P. Erwander* (= *Pompejus* Cr.) schaarenweise auf Orangen.

Wir stellen am Schluss folgende Entwicklungsstufen der amerikanischen Rinneufalter auf:



Zusammenfassung der Resultate aus der Zeichnung der Papilionen.

In der Untergattung der Aristolochienfalter fanden wir die ursprüngliche Zeichnungsform bei dem afrikanischen *P. Antenor* Dru., welcher noch allein drei Vorderflügelzellbinden wie die *Daurus*-Gruppe besitzt. Dagegen zeigte er sich in Bezug auf die Zerschmürung der Aussenzellbinde in einzelne Tüpfel, welche das Product stark fortgeschrittener, längs der Rippen verlaufender Vermehrung der Zeichnung ist, als stark abgeleitet. Die so entstandene eigenthümliche Tüpfelung der Vorderflügel erinnert unter den übrigen *Papilionen* am meisten an die *Agamemnon*-Gruppe der Segelfalter und an die nordamerikanische *Palamedes*- und die afrikanische *Menestheus*-Gruppe der Rinneufalter. So ist wie bei diesen Formen auch der Gabelfeldtüpfel der Mittelbinde durch das Wachstum des Radialgabelstieles nach aussen verschoben, der bei *P. Lydius* Feld. (australische *Priamus*-Gruppe) noch in der Reihe der übrigen liegt. Daher dürfen wir wohl als Vorläufer der Aristolochienfalter eine weniger verdunkelte Form annehmen, bei welcher auf den Vorderflügeln das erste und zweite, das dritte, das fünfte Zellband und das Terminalband der Vorderflügel ursprünglich getrennt auf hellerem Grunde verliefen. Aehnlich zog sich das erste und zweite und das dritte Basalband über die Hinterflügel herüber, während die Mittelbinde sich zwar bei indischen Arten (*P. Jophon* etc.) erhielt, bei *P. Antenor* aber durch längs der Rippen verlaufende Ver-

mehring der Zeichnung in Tüpfel zerschnürt wurde. Das Schmuckband ist nur selten weiter entwickelt (*P. Hector*), sondern meist auf den innersten Tüpfel im achten Randfelde reducirt, der dann bei den weiter abzuleitenden Formen sich gewöhnlich mit der Mittelbinde verbindet. Nur bei *P. Antenor* treffen wir noch eine diffuse blaue submarginale Bestäubung als Rest der Submarginalbinde an. Im achten Randfelde dürfte der Marginalmond infolge Verkürzung des Flügelinnenrandes mit dem der Saumbinde verschmolzen sein, somit ist er nur noch im zweiten bis siebenten Randfelde selbstständig erhalten und tritt endlich bei den abgeleiteteren Formen auch auf diesen zurück. Folglich haben wir nach ihrer Zeichnung die Aristolochienfalter als abgeleitete UnterGattung anzusehen und wohl auf Rinnenfalter-artige Vorfahren mit gleichmässig entwickeltem Anal- und Subanalfelde der Hinterflügel zurückzuführen; dann entspräche die Schmuckbinde der Zwischenbinde der Rinnenfalter.

Die UnterGattung der Segelfalter zeichnet sich vor den Rinnenfaltern durch Reduction einiger Zeichnungselemente aus; so fehlt wie bei den Aristolochienfaltern stets der Marginalmond des Analfeldes, dagegen geht bei der *Gyas*-Gruppe sogar das Inframarginalband noch über beide Flügel. Somit dürfen wir als Vorläufer der Segelfalter vielgebänderte Formen von heller, gelbweisser Grundfarbe ansehen, über deren beide Flügel ursprünglich alle überhaupt vorkommenden neun Bänder¹⁾ continuirlich verliefen. Allmähig trat jedoch durch Verschmälerung der Fläche eine oft noch durch Verbreiterung der Längszeichnung geförderte Verschmelzung der Bänder ein; so vereinigt sich bei *P. Ajax* var. *Marcellus* das dritte und vierte, bei *P. Colonna* Ward das fünfte mit dem vierten und dem Terminalband, bei *P. Ajax* letzteres (secundär!) mit dem Inframarginalbande und dem Innenstreif des Submarginalbandes.

Wie wir am Puppenflügel von *P. Podalirius* erkannten, entsteht der Ausfall der Bänder durch steigende Aufhellung, indem sich die Binden der hellen Grundfarbe mit einander vereinigen und die zwischen ihnen gelegenen Bänder, von dem Punkte ihrer Vereinigung an, auflösen. So entsteht bei den Segelfaltern die im Vergleich mit den Rinnenfaltern stärkere Verkürzung des fünften Zellbandes, so die Reduction des Inframarginalbandes. Ebenso treten durch steigende Aufhellung des Bandkerns die Bandstreifen anscheinend als einzelne Streifen auf (Submarginalband der Vorderflügel von *P. Aebion*). Von den normalen Vorderflügelbändern erhalten sich bei den eigentlichen Segelfaltern auf den Hinterflügeln nur die ersten drei Basalbänder, der äussere Prachtbandstreif, das Submarginal- und Postmarginalband. An Binden dagegen tritt ausser der inneren und äusseren Basal- noch die Mittelbinde, d. h. die mit der letzten Zellbinde verfloessene — bei *Ajax* nur secundär getrennte — Vorbinde auf die Hinterflügel über. Der äussere Prachtbandstreif entspricht nun wohl dem Terminalbande der Hinterflügel bei den Rinnenfaltern und wäre dann auf das fünfte Zellband der Vorderflügel zurückführbar. Somit entspricht die Prachtbinde im siebenten und achten Randfelde der Zwischenbinde der *Dauus*-artigen Rinnenfalter und dürfte vom sechsten bis ersten Randfelde als eine Umbildung der ursprünglichen Binden anzusehen sein, die vom Innenrande her entstand und welche alle Segelfalter mit Ausnahme der *Gyas*-Gruppe besessen zu haben scheinen. Auch die Postmarginalmonde, welche nur in dieser UnterGattung vorkommen, entstanden vom Innenwinkel der Hinterflügel aus durch secundäre Aufhellung des Postmarginalbandes.

So sind die „eigentlichen“ Segelfalter trotz der grossen Ursprünglichkeit und höchsten Erhaltung der einzelnen Querbänder schon wegen der grade gestreckten Form der letzteren als abgeleitete Formen anzusehen, indem die Verlängerung der im dritten Medianast gegebenen Hauptachse des Hinterflügels

¹⁾ Ich rechne in der Uebersicht das Terminal- und Submarginalband als je ein Band.

eine Zerrung und Verschiebung der einzelnen Zeichnungselemente bewirkte, welche ihre Zurückführung auf die der übrigen *Papilionen* so erschwerte.

Endlich finden wir, wenn auch nicht die höchste Zahl, doch die klarste einfachste Fortsetzung der Zeichnungen beider Flügel in einander bei den Rinneufaltern, besonders der *Danaus*-Gruppe. In der That hat wohl auch die Untergattung der Rinneufalter die ursprünglichste Flügelform bewahrt, aus welcher erst die gestreckte der Segelfalter hervorging. Nur bei den Rinneufaltern ist im achten Randfelde der Hinterflügel noch Marginalmond und Postmarginalstreif deutlich entwickelt und nur bei ihnen und der *Gyas*-Gruppe der Segelfalter tritt ein continuirliches Submarginalband der Hinterflügel, eine ausgebildete Zwischenbinde und manchmal ein durchgehendes Inframarginalband auf. Ebenso finden sich bei ihnen die bei den Segelfaltern vorkommenden Zellbänder, allerdings nie in gleicher Deutlichkeit, sondern die ersten beiden stets verschmolzen und eines der hinteren, das vierte, nur in der *Machaon*-Gruppe erhalten. Das fünfte Zellband ist häufig sogar noch nach hinten verlängert und tritt uns wieder in dem Terminalbande der Hinterflügel entgegen.

Daher dürfen wir denn eine einheitliche Grundform der *Papilionen* annehmen, welche in der Flügelform den breitflügligen Rinneufaltern näher stand und deren achttes Randfeld noch in gleichartige Halbfelder getheilt war. Der Zeichnung nach besass diese Form zahlreiche über beide Flügel verlaufende Bänder, deren erstes wohl das erste und (?) zweite Band der Segelfalter darstellt und sich (vielleicht erst secundär?) in dem Bindenkern aufhellte und spaltete, während das folgende dem dritten, die weiteren dem vierten und fünften Zellbande und dem Terminalbande entsprechen. Wie das Submarginalband setzte sich auch das Inframarginalband, die Zwischen- und die Marginalbinde bis in's achte Randfeld der Hinterflügel fort. So haben wir eine Form mit den 8—9 angenommenen durchlaufenden Bandsystemen vor uns. Schliesslich wage ich noch darauf hinzuweisen, dass die zahlreichen mimetischen Formen der Segel- und besonders Rinneufalter sich erst entwickeln konnten, nachdem schon normal gefärbte Weibchenformen vorhanden waren, dass also schon hieraus hervorgeht, dass beide Untergattungen ältere Zeichnungsformen bewahrt haben als die Aristolochienfalter. Zugleich lässt sich darauf hinweisen, dass mit dem Auftreten der verschiedenen Zeichnungsformen der Aristolochienfalter Angehörige sowohl der Rinneufalter als der Segelfalter sich jeder Entwicklungsphase der ersteren anpassten und nur die abgeleitetesten, ganz dunklen oder durch riesige Grösse ausgezeichneten Formen keine Nachahmer fanden.

Versuchen wir jetzt den Nachweis, ob sich die Zeichnung der übrigen Gattungen der *Papilioniden* ebenso auf das Schema der *Papilio*-Zeichnung zurückführen lässt, wie dies mit dem Rippenverlauf möglich war.

Die Gattung *Teinopalpus* Hope.

Teinopalpus

Der einzige Vertreter der Gattung *Teinopalpus* ist der prächtige, auf die östlichen Theile des Himalaya beschränkte *T. imperialis* Hope.

Während C. und R. Felder diese Gattung l. c. p. 331 als „certe perfectissimum totius familiae formam“ an den Endpunkt des Systems der *Papilioniden* gestellt wissen wollten, scheint es uns natürlicher,

sie als einen modificirten Seitenzweig des gemeinsamen Stammes aufzufassen, der durch die Verzweigung der Radialader und die ausserordentliche Länge der Palpen gekennzeichnet ist.

T. imperialis trägt in beiden Geschlechtern am dritten Medianast einen langen und kräftigen, wie bei vielen Segelfaltern am Ende aufgehellten Schwanz, und ausserdem im Weibchen eine nach innen convexe Verlängerung am ersten und eine zackenförmige am zweiten Medianast; somit sehen wir in dem Weibchen wieder wohl die ursprünglichere Flügelform erhalten. Auch die Zeichnung dieses als *T. Parrnac* Hope unterschiedenen Geschlechts ist entschiedener und zugleich ursprünglicher im Ton als die des Männchens. Zunächst erkennt man am Aussenrande der Vorderflügel eine sehr schmale, unten braune, oben grüne Marginalbinde, ausserhalb deren das Postmarginalband hart den Saum begrenzt. Dann folgt eine nach hinten zu sich verschmälernde, innen von einem breiteren Grenzstreif eingefasste, oben und unten bläulich graue Binde, die Submarginalbinde. Weiter verläuft ausserhalb der Vorderflügelzelle ein schmales, nur hinten etwas verbreitertes, vorn abgekürztes Inframarginalband, tritt an der Unterseite ein kurzes Terminalband und endlich innerhalb der Zelle ein bis zum Hinterrande des Flügels verlaufendes Band auf, das wohl dem dritten Basalbande entspricht. So ist die oben blaugraue, unten grüngraue Binde zwischen Basal- und Inframarginalband als Mittelbinde zu bezeichnen. Das dritte Basalband setzt sich auch auf die Hinterflügel bis zum Innenwinkel fort und schliesst eine beiderseits smaragdgrüne Basalverdunklung ab. Auch die Mittelbinde setzt sich breit über die Hinterflügel fort und ist oben ganz und unten besonders gegen den Innenwinkel gelb gefärbt. Ebenso geht das Submarginalband als im fünften bis siebenten Randfelde besonders stark verbreitertes, innen blau gekerntes Zackenband über die ganze Flügelbreite, aussen von theilweise undeutlichen sichelförmigen Randnaden begleitet, deren hinterster im achten Randfelde mit dem Saumtippel verschmolzen ist, während im dritten bis fünften Randfelde sich noch Postmarginalnaden erhalten haben. Bei dem bunteren Männchen ist die ganze Aussenhälfte der Vorderflügelunterseite ausserhalb des Basalbandes, das dem Zellende viel näher liegt, als am Weibchen, rostroth gefärbt und die Mittelbinde der Hinterflügel durch das Ueberwiegen des Submarginalbandes hinten auf einen schmalen weissen Binde rest zurückgedrängt, während auf der Oberseite der Vorderflügel zugleich der grüne Ton und die Verdunklung der Bänder zunehmen.

Die Krümmung des Schwanzes am dritten Medianast, die Zeichnung, die Fühlerform, der lange Radialgabelstiel und die nach innen vorspringende lange mittlere Discocellulare, wie die Färbung des Leibes erinnern so sehr an dieselben Verhältnisse bei der *Evan-Gyas*-Gruppe der indischen Segelfalter, dass wir *Teinopalpus* als peripherische Form eines gemeinsamen nordindischen Stammes ansehen dürfen, dessen Endglieder uns einerseits in der *Evan*-Gruppe, andererseits in *Teinopalpus* erhalten sind.

Die Gattung *Leptocircus* Swains.

Die wenigen Arten dieser von Nordindien bis Celebes verbreiteten Gattung sind kleine robuste Leptocircus Formen, welche einen Schwanz von mehr als doppelter Leibeslänge besitzen und schon durch ihre keuligen Fühler ebenfalls an die Segelfalter erinnern. Auch diese Gattung dürfen wir als peripherische Form der Vorfahren der Segelfalter auffassen, mit deren *Cadmus*-Gruppe sie auch besonders in der Entwicklung des Duftapparates im Analfelde der Männchen übereinstimmt. Die Zeichnung der Arten ist recht eiförmig. Ueber die Vorderflügel geht eine gelbgrüne Zellbinde, welche aussen von einem breiten schwarzen

wohl aus mehreren Bändern verschmolzenen Aussenbände und innen von einer wohl auf die Basalbänder zurückzuführenden Verdunkelung eingeschlossen wird, sich auf die Hinterflügel auf beiden Seiten fortsetzt und gegen den Schwanz verstreicht. Innerhalb dieser breiten gehen drei feine Binden auf der Unterseite senkrecht an den Innenrand, deren äusserste der Marginal-, deren mittlere der Submarginal-, deren innerste der Mittelbinde entsprechen dürfte. Sonst ist nur noch im zweiten Randfelde der Hinterflügel ein schwacher Mondfleck auf der Unterseite entwickelt und die übrigen Binden verdunkelt, während auf den Vorderflügeln der scharfbegrenzte Raum zwischen Terminal- und Randbände glasig aufgehell ist, wie wir es ebenfalls nur bei Angehörigen der Segelfalter antreffen.

Die weiter zu besprechenden Gattungen der *Papilio*-Gruppe schliessen sich enger an die Aristolochienfalter an.

Die Gattung *Euryades* Feld.

Euryades

Nach den gründlichen Auseinandersetzungen C. und R. Felder's I. c. p. 376 steht die auf die östlichen La-Plata-Länder beschränkte Gattung *Euryades* der Gattung *Papilio* und unter dieser der *Hector*-Gruppe am nächsten. Sicher lässt sich wenigstens die Verwandtschaft mit den Aristolochienfaltern nachweisen. So erinnern die Fühler an die *Hector*-Gruppe, die Tüpfelung der Ventropleuralkanten des Abdomens an die *Philenor*-Gruppe, die Rothfärbung von Halsseiten und Hinterleibsbasis an die übrigen Aristolochienfalter. Weist die breite Form der Vorderflügelzelle eher auf die *Philenor*-Gruppe hin, so erinnert doch der Abgang des ersten Medianastes vor der Mitte der Discocellulare an die *Hector*-Gruppe, welcher sich *Euryades* auch im Verlauf der ersten zwei Radialäste und der grösseren Länge des Gabelstiels der Vorderflügel anschliesst. Dagegen gleicht der Verlauf der Subcostradialis der Hinterflügel, die Form der Mittelzelle und die regelmässige Vertheilung der Median- und Cubitaläste wieder den Verhältnissen bei *P. Philenor*. Grosse Aehnlichkeit mit *P. Hector* spricht sich auch im achten und neunten Randfelde der Hinterflügel aus, denn hier sind Subanal- und Analfeld ziemlich gleich breit und verläuft die Analfalte ziemlich grade über die Mitte des Schmuckbindenrestes. Ebenso hat die weniger abgekürzte Dorsalrippe und das gleichmässig schmale, ausserhalb der letzteren rinnenförmig ausgehöhlte Innenfeld einen nach innen convexen Verlauf. Da auch der hintere Ausschnitt des achten Randfeldes geringer ist, ist der bei *P. Hector* L. schon fehlende Saummond wie in der *Philenor*-Gruppe noch erhalten. Bei *E. Corethrus* ist das Anal- und Innenfeld stärker verkürzt, auch ist letzteres aussen weniger convex als bei *E. Duponcheli* Luc. und erinnert so etwas an das der *Priamus*-Gruppe. Ebenso entspricht die Art der Faltung der bei den Aristolochienfaltern besprochenen. So ist diese kleine Gattung in der Flügelform nur letzteren, nicht den *Parassiern*, wie man bisher allgemein annahm, näher verwandt.

Von den beiden Arten trägt *E. Duponcheli* Luc. noch ein feines gleichmässiges Schwänzchen am dritten Medianast, wie wir es, etwas stärker entwickelt, auch bei *P. Hector* und *P. Philenor* treffen. Auf den Vorderflügeln treten die Saummonde wie in der *Philenor*-Gruppe deutlich hervor, dagegen sind die übrigen Binden so verloschen und in einander übergegangen, dass man nur von einer breiten Aussenzellebinde sprechen kann, die am Vorderrande durch den Rest eines Inframarginalbannes gespalten ist. Unten treten zwar die Bidentüpfel selbst deutlicher hervor, doch sind die Rippen von fast unbeschuppten glänzenden Flächen umgeben und der Zellraum selbst nur schwach beschuppt. Die Zeichnung der Hinterflügel ist sehr reich entwickelt und verbindet die der *Hector*- mit der der *Antenor*-Gruppe. An die

regelmässigen deutlichen Saamtüpfel schliesst sich die Reihe der ründlichen blutrothen Marginalmonde an, deren vorderster im zweiten Randfelde nur punctförmig ist, während der im achten Randfelde wie bei den Aristolochienfaltern ganz fehlt. Dann folgt ein ebenfalls in den zwei distalen Feldern undeutlicher, in den übrigen ausgebildeterer gelbweisser Tüpfel, der der Submarginalbinde entspricht, und endlich tritt eine kontinuierliche Reihe von sieben Schmuckbindentüpfeln auf, welche wohl der Zwischenbinde der Kinnenfalter angehört und innen von dem Inframarginalbande begrenzt wird. Wie bei *P. Antenor* entspricht somit das sich über die Zellmitte der Hinterflügel hinziehende schwarze Band dem dritten Basalbande und die breite sich um die Zelle herumziehende fortlaufende Binde der Mittelbinde. Also hat sich auf den Hinterflügeln des *Eu. Duponchelii* eine ursprünglichere Zeichnungsform als selbst bei *P. Antenor* erhalten, trotzdem wir die Gattung *Euryades* als jüngeren Zweig des *Papilioniden*-Stammes ansehen müssen.

Der schwanzlose *E. Corethrus* Bois. lässt die Trennung der Mittelbinde der Vorderflügel in Vor- und Zwischenbinde durch ein durchlaufendes Inframarginalband noch deutlicher, besonders im Vorgabel- bis ersten Randfelde, erkennen. Das Schmuckband der Hinterflügel ist fast ganz verdunkelt und sein rother Bindenkern nur mehr im achten Randfelde erhalten, wie wir dies bei *P. Antenor* sehen. Ebenso ist die Zerschnürung der Mittelbinde der Hinterflügel durch längs der Rippen verlaufende Verdunkelung besonders oben schon angedeutet, auch sind die Submarginalmonde vom siebenten bis dritten Randfelde stark ausgedehnt und noch im achten als Rest hinter dem Schmuckbindentüpfel erkennbar. Somit stellt *E. Corethrus* wie in der Flügelform auch in der Zeichnung der Hinterflügel sich als abgeleitet dar, während die Vorderflügel eher ursprünglichere Verhältnisse bewahrt haben.

Die Gattung *Eurycus* Bois.

Wie schon C. und R. Felder hervorhoben, nähert sich diese australische Gattung, die wohl nur aus einer Art, dem *E. Uressida* Bois., besteht, in der abgestumpften Form der Fühlerkeule, in der Form der Mittelzelle, der Verästelung der Radialis der amerikanischen *Phileor*-Gruppe, während die Form des Hinterleibes, die rothen Flecken an Hals und Brust, der Verlauf des ersten Medianastes und des zweiten Cubitalastes der Hinterflügel an die indische *Hector*-Gruppe erinnert. So haben wir auch *Eurycus* auf Aristolochienfaltern entsprechende Vorfahren zurückzuführen und als peripherischen Ausläufer derselben anzusehen. Bei *Eurycus* ist das achte Randfeld hinten so stark verschmälert, dass das Schmuckband nur noch durch den punctförmigen Inframarginalbandrest des achten Randfeldes dargestellt wird. Endlich treten auch hier nur noch fünf Randmonde (im dritten bis siebenten Randfelde) auf. Merkwürdig ist die Zeichnung der Vorderflügel dadurch, dass sich auf ihr Reste der ursprünglichen Querbänder erhalten haben. So dürfte die basale Verdunkelung der Verschmelzung der Basalbänder, der in der Zellmitte gelegene grosse Fleck, der sich im Terminalbande der Hinterflügel wiederzufinden scheint, dem vierten und fünften Zellbande und der am Ende der Zelle gelegene dem Terminalbande entsprechen. Durch die Verbreiterung der basalen Verdunkelung auf den Hinterflügeln wird die sonst durchgehende weisse Mittelbinde auf letzteren stark eingeengt. Das seltene Weibchen dieser Art ist durch fortgeschrittene Aufhellung, wie die Weibchen von *Euryades*, von dem Männchen unterschieden und besitzt fast hornartig durchscheinende Vorderflügel mit schwachen Resten der Terminal- und mittleren Zellbinde, während auf den Hinterflügeln die Färbung stark verblasst. So erinnert dies Geschlecht zugleich an die am selben Aufenthalts-

Eurycus

ort häufige *Acraea Andromache* ♀ und diese Ähnlichkeit wird durch die schwarzen Flecke um die Zellmitte der Vorderflügel gehoben, welche dem Reste des dritten Basalbandes entsprechen dürften.

Die Gattungen der *Thais*-Gruppe.

Die vier von E. Schatz in diese Gruppe gestellten Gattungen haben mit der *Papilio*-Gruppe noch die fünfästige Radialis der Vorderflügel und meist die Präradialzelle der Hinterflügel gemein und unterscheiden sich besonders durch das Fehlen des erst secundär im Puppenflügel auftretenden Cubitalsporns der Vorderflügel der *Papilionen* und die stark verlängerten Palpen. Da die Nahrungspflanzen (Aristolochiaceen) ihrer Raupen nähere Beziehungen zu den Aristolochienfaltern andeuten, ist Zeichnung und Flügelform der Falter von besonderem Interesse. Die ursprünglichsten Gattungen haben wir sicherlich in *Sericinus* Westw. und *Armandia* Blanch. zu sehen, welche sich durch einen kräftig entwickelten Hinterflügelschwanz auszeichnen. Nach dem Verlauf des dritten Radialastes der Vorderflügel vom Zellende selbst ist wiederum unstrittig *Sericinus* als die ursprünglichere der beiden anzusehen.

Die Gattung *Sericinus* Westw.

Sericinus

Wahrscheinlich gehören die vier von Gray und Reakirt unterschiedenen Formen alle zu nur einer Art, die wir mit dem ältesten Namen als *S. Telamon* Don. bezeichnen können und welche ausschliesslich dem chinesischen Faunengebiet angehört. Während alle diese Varietäten sich in der grossen Länge des gleichmässig breiten Schwanzes am dritten Medianast gleichen, ist doch die Zeichnung äusserst variabel, und zwar ist sie bei den Weibchen reicher und zugleich gleichmässiger als im männlichen Geschlecht. Am entwickeltsten scheint sie bei der von Gray als *S. Fortunei* unterschiedenen Weibchenform anzutreten, welche wir deshalb auch der Beschreibung zu Grunde legen wollen.

Am Vorderrande der Vorderflügel finden wir hier ein unentwickeltes erstes und ein breiteres zweites und drittes Basalband, die sich bis zum Innenwinkel der Hinterflügel verlängern, und von denen das zweite und dritte sich auf der Unterseite der Hinterflügel aus Flecken zusammensetzen, während sie oben eher continuirliche Bänder bilden. Ausserhalb des letzten Basalbandes liegt ebenfalls in der Vorderflügelzelle ein durch das hinten vollendetes Zusammenfliessen zweier Zellbinden abgeschlossenes viertes Zellband, während das fünfte sich breit bis zum Hinterrande fortsetzt und im letzten Randfelde einen rothen Kern entwickelt. Anscheinend tritt auch das Terminalband zu dem fünften hinzu und das im ersten und zweiten Randfelde ebenfalls rothgekernte Inframarginalband an das fast ganz verdunkelte Inframarginalband heran. Wie die Vorbinde zeigt auch die Marginalbinde einen geschlängelten Verlauf. Von diesen Binden setzt sich vorerst die zwischen dem dritten und fünften Zellbände gelegene Innenbinde bis zum Innenwinkel der Hinterflügel fort. Ebenso findet sich das rothgekernte fünfte Zellband in den rothgefüllten Augenflecken wieder, die vom zweiten bis vierten Randfelde auch oben auftreten und sich unten vom sechsten, oben schon vom vierten Randfelde an zu einer prächtig blutrothen Schmuckbinde vereinigen. Letzterer schliesst sich nach aussen vorn noch die Vorbinde, das Submarginalband, die Marginalbinde und das Postmarginalband an, doch gehen diese Zeichnungen hinten in dem breiten blaugekernten Submarginalbande auf. Bei dem Männchen treten nun die ursprünglichen Zeichnungen, wie sie das Weibchen bewahrt hat, intolge gesteigerter Authellung stark zurück. So bleiben in der Vorderflügel-

zelle meist nur drei Zellbänder übrig, deren eines an der Basis liegt und als zweites Zellband anzusehen ist, während das mittlere dem vierten entspricht und das Terminalband ebenfalls auftritt. Doch erhält sich ausserdem noch mehr oder weniger unzusammenhängend ein rothgekernter Rest des Inframarginalbandes, der mit letzterem anscheinend verbundene rothgekernte Rest des fünften Zellbandes am Innenrande und einzelne dunkle Submarginalflecke. Auf die Hinterflügel setzt sich manchmal noch das zweite Basalband, stets aber, wenn auch in seiner Continuität unterbrochen, auch das Schmuckband fort, das einen leuchtenden Innenrandswinkel bildet und hinten von dem schön blaugekernten Innenrest des Submarginalbandes eingeschlossen wird.

Diese Art dürfte sich ganz besonders zu Untersuchungen über etwa in der Veränderung der Zeichnungen eintretende Gesetzmässigkeiten eignen, welche den Rahmen der Art allerdings nicht überschreiten würden.

Die Gattung *Armandia* Blanch.

Diese bisher in zwei einander nahe stehenden Arten, *Armandia Thaitina* Blanch. und *A. Lüdderdalii* Armandia Atk., bekannte, auf das tibetanische Hochland beschränkte Gattung zeichnet sich durch den Ursprung des dritten Radialastes vom Gabelstiel als abgeleitet aus, wenngleich die Präradialzelle der Hinterflügel noch gut entwickelt ist. Ihre Arten tragen ausser dem entwickelten Schwanz am dritten Medianast noch zwei stark verlängerte Zacken an den Cubitalästen, wie wir sie z. B. in der *Danus*-Gruppe der Rinnenfalter finden: so wird es wahrscheinlich, dass *Armandia* sich wie die übrigen Gattungen der Gruppe vom *Papilio*-Stamme entwickelte, ehe die Scheidung desselben in die Untergattungen eingetreten war. Wie bei *Sericinus* ist der Leib noch längsgestreift und die Fühler sehr kurz und kaum merklich am Ende verdickt. Sehr merkwürdig und zugleich sehr ursprünglich ist die Zeichnung, welche an dem Weibchen von *A. Thaitina* näher untersucht wurde. So finden wir in der Vorderflügelzelle drei starke, anscheinend secundär verbreiterte Bänder, deren erstes dem ersten und zweiten Basalbande entspricht und wie das dritte bis zum Hinterrande verläuft, während das vierte durch die Vereinigung zweier Binden am Hinterrande der Zelle aufgelöst ist, das fünfte aber wieder bis zum Hinterrande geht. Dagegen steht die letzte Zellbinde noch mit der Vorbinde in Verbindung und schliesst so das Terminalband ab. Hieran schliesst sich ein breites, aber durchgehendes Band, das in seiner Vorderhälfte einen Bindenrest trägt, der wohl der Inframarginalbinde entspricht. Gegen den Rand finden sich drei weitere Binden, welche als Zwischen-, Submarginal- und Randbinde anzusehen sind, und das Flügelende säumt ein breites Postmarginalband ein. So sind bei dieser Art unter allen bisher besprochenen die ursprünglichsten Verhältnisse der abwechselnd verlaufenden Binden und Bänder erhalten. Von diesen Bändern geht der grösste Theil auch auf die Hinterflügel über: doch wird ihre Verfolgung dadurch sehr erschwert, dass die Randfelder der Hinterflügel sich vom vierten an bedeutend und zunehmend verschmälern, sodass z. B. das zweite Randfeld stark unterdrückt ist. Dadurch wird der Verlauf besonders der äusseren Binden treppenartig gebrochen und vermag nur eine genauere Vergleichung die zusammengehörigen Felder zu ermitteln. Das dritte Basalband begrenzt aussen eine sich winkelig an den Innenrand ansetzende äussere Basalbinde und innen die das vierte Vorderflügelzellband anfließende Innenbinde, welche sich bis zum Innenwinkel hinzieht. Hinwiederum sind die folgenden Bänder und Binden nur am Vorderrande der Hinterflügel, in den ersten Randfeldern, unterscheidbar und treten schon im fünften Randfelde theilweise zusammen; nur die orangegebehen

Marginalmonde lassen sich bis zum achten Randfelde verfolgen. Dagegen entsteht die rothe Schmuckbinde, welche vom achten bis zum vierten Randfelde reicht, hier wohl aus einem Bandkern, denn ausserhalb der schon fertig im vierten Randfelde gebildeten lässt sich noch der Rest der Mittel-, der Zwischen- und der Submarginalbinde nachweisen. Dadurch wird es wahrscheinlich, dass sich auch hier wie bei *Sericinus* eine Aufhellung des hinten stark verbreiterten fünften Zellbandes zur Schmuckbinde umwandelt, und das ebenfalls erst hinter ihr sich bildende blau gefüllte sehr breite Submarginalband aus der Vereinigung aller Binden und Bänder zwischen Schmuckbinde und Marginalmonden sich bildet. Somit ist die Zeichnung von *Arundia* ein Beweis dafür, dass viele einzelne Zeichnungselemente zur Bildung auffallenderer, hervortretender Auszeichnungen zusammentreten können und dass diese Umbildungen wieder von hinten nach vorn am Flügel fortschreiten.

Die Gattung *Thais* L.

Von den drei Arten dieser rein palaearktischen und besonders mediterranen Gattung der „Osterluzeifalter“ besitzt *Thais Cerisyi*, die östlichste, in Griechenland und Kleinasien vorkommende Species, noch ein Schwänzchen am dritten Medianast und eine hohe Zahl von Zellbändern, nämlich fünf, von denen aber nur das erste, das dem ersten und zweiten Basalbande entsprechen dürfte, bis zum Hinterrande des Flügels verläuft. Die Zeichnung der Vorderflügel wird dadurch interessant, dass sich das Terminal-, das Inframarginal-, das Submarginal- und Postmarginalband regelmässig bei den Weibchen bis zum Hinterrande der Vorderflügel fortsetzen, wie wir es bei der doch ursprünglicheren Gattung *Sericinus* bereits nicht mehr fanden, während bei den Männchen allerdings nur einige Flecke des Inframarginalbandes sich erhalten. Auf die Hinterflügel setzt sich das erste und zweite Basalband continuirlich fort; ebenso ist die auch bei den übrigen Gattungen vorkommende Fleckenreihe um das Zellende herum nur dem dritten Basalbande zuzuschreiben, obwohl letzteres schon in der Zelle der Vorderflügel abgekürzt ist. Weiter entspricht der nach aussen folgende rothgekernte Fleck im zweiten Randfelde wohl der Fortsetzung des ursprünglich fünften Zellbandes der Vorderflügel und tritt, im dritten und vierten Randfelde unterdrückt, doch wieder im vierten bis achten Randfelde auf, aussen von dem staubartigen Submarginalbande eingeschlossen. Die Marginalmonde sind auf den Hinterflügeln nur im achten Randfelde unterdrückt, auch schneidet das Postmarginalband noch stets einen Limbaltüpfel ab. Bei *Thais Polyrena* S. V. und besonders manchen Varietäten von *Rumina* L., zwei Arten ohne Mediauschwanz, mit abgerundeten Randzacken der Hinterflügel, erhalten das dritte und fünfte Zellband der Vorderflügel wie das Inframarginalband einen rothen Kern, der oben nicht hervortritt; ebenso findet sich im sechsten Randfelde der schwarze Fleck wieder, der hier, nach der Oberseitenzeichnung, aus der Vereinigung von dem fünften Zell-, dem Terminal- und dem Inframarginalbande entsteht. So ist Vorder- und Zwischenbinde gut entwickelt und die Flügelfläche stark aufgehellt. Während das dritte Basalband sich auf der Oberseite bis zum Hinterrande der Vorderflügel fortsetzt, ist es unten auf die Zelle beschränkt, denn wie bei *Eurytus* und *Euryades* tritt auch besonders in dieser Gattung secundär eine Schuppenarmuth der Unterseite der Flügel ein, welche die Zeichnung verschwinden lässt und sich bei den *Parnassiern* später noch stärker ausbildet. Im dritten Randfelde der Hinterflügel ist das Schmuckband noch durch einen schwarzen, sonst aber durch einen rothgekernten Fleck dargestellt. Die Submarginalbinde ist besonders hinten entwickelt und die schleifenförmig gezackte Marginalbinde reicht bis bis in's achte Randfelde.

Während *Sericinus* noch einen rothen Halskragen, rothe Brustflecke und die höchste überhaupt nur bei *Papilioniden* vorkommenden Streifenzahl am Hinterleibe, jederseits drei, fleckig aufgelöst und ein mittleres Rückenband besitzt, tritt bei *Thais* eine dichtere weiche Behaarung des Kopfes auf, welche sich auch auf Nacken und Hinterleib ausdehnt, doch erhalten sich die sieben dunklen Längs-streifen noch bei einzelnen Arten und nehmen die hellen Binden eine rothgelbe Farbe an.

Die Gattung *Luehdorfia* Crüg.

Die Stellung dieser interessanten Gattung ist, wie E. Schatz l. c. p. 50 sich ausdrückt, „weder genau in der *Thais*-Gruppe, noch bei den *Parnassiern*. Die grösste Aehnlichkeit in der Structur hat sie noch mit *Doritis*, die äussere Erscheinung aber stellt sie unzweifelhaft in die Nachbarschaft von *Thais*“. In der That verbieten die kaum verlängerten Palpen einen näheren Anschluss an die besprochenen Gattungen der *Thais*-Gruppe, während dagegen das E. Schatz unbekannt gebliebene Copulationszeichen der befruchteten Weibchen durch seine unsymmetrische pflegscharförmige Gestalt etwas dem von *Euryales* gleicht. Ebenso erinnert die weiche abstehende Behaarung des kleinen Kopfes und die Verästelung der Radialis der Vorderflügel an *Parnassier* (*Doritis*) und *Thais* zugleich, das Geäder der Hinterflügel dagegen nur an letztere Gattung. So haben wir denn noch ihre „äussere Erscheinung“, d. h. Flügelform und besonders Zeichnung, zu prüfen, welche sie nach Schatz „unzweifelhaft in die Nachbarschaft von *Thais*“ stellt. Als Untersuchungsmaterial diente *L. Puzilii* Esch.

In der That kommen auf den Vorderflügeln noch acht deutliche Bänder vor, deren erstes dem ersten und zweiten und deren zweites dem dritten Basalbande entspricht. Während das vierte Band nicht über die Zelle herüberreicht, geht das fünfte bis zum Hinterrande und während das Terminalband durch die Vereinigung der letzten Zellbinde mit der Vorbinde wieder abgekürzt wird, vereinigt sich das Inframarginalband, wie in der *Thais*-Gruppe oben deutlicher als unten, mit dem einen hellen Bindekern führenden Submarginalbande. Die breite Marginalbinde wird endlich durch ein unten aufgehelltes Postmarginalband abgeschlossen. Auf die Hinterflügel gehen ähnelnd wie bei *Sericinus* das erste und zweite Basalband und am Zellende das dritte in den Innenrand über. Weiter setzt sich auch hier das fünfte auf die Hinterflügel fort und wird die ausserhalb desselben gelegene Mittelbinde schon im vierten Randfelde in eine innen weisse, aussen rothe Schmuckbinde umgewandelt, während Inframarginal- und Submarginalband vom siebenten bis zum vierten Randfelde sich an ihrem Aussenrande, im achten Randfelde sogar ganz, zu einem blangekernten Augenfleck umwandeln. So sind auch die Randmonde noch im sechsten Randfelde gross und deutlich, aber schon im siebenten reducirt. Das Innenfeld ist sehr stark verschmälert und bildet über der Schmuckbinde einen scharf vorspringenden Winkel. Somit lässt die Zeichnung von *Luehdorfia* sich leicht auf die von *Sericinus* zurückführen, wie ja auch der rudimentäre Schwanzrest am dritten Medianast und die Hinterflügelrandzacken die Abstammung von einer länger geschwänzten Form bekräftigen.

Die Parnassier-Gruppe.

Von den drei Gattungen dieser Gruppe, welche alle umgeschwänzte Hinterflügel besitzen, ist, nach der fünftheiligen Radialis zu schliessen, *Doritis* F. die ursprünglichste.

Die Gattung *Doritis* F.

Ihre einzige Art, der *D. Apollinus* Hbst., ist auf Kleinasien und Syrien beschränkt, wo die Raupe, ähnlich der von *Parnassius*, auf *Aristolochia hastata* lebt. Die Zeichnung des Falters lässt sich dagegen auf keine der bisher besprochenen Papilionidenzeichnungen mehr zurückführen. Erinnern auch die beiden grossen Flecke in der Mitte und am Rande der Vorderflügelzellen an die Reste der fünften und Terminalbinde, und lässt sich auch das schmale, am Aussenrande herlaufende Band als Submarginalband, die eng an ihn sich anschmiegende Binde als Marginalbinde deuten, so finden sich doch am Vorderrande zwanzig bis dreissig schwarze Streifen, welche theilweise und unregelmässig verfliessend, sich in welliger Zeichnung als Strichel über die Flügel ziehen, dem Aussenrande ungefähr parallel verlaufen und einzeln noch bis zum Innenwinkel sich fortsetzen. Dagegen dürfte die ausserhalb der Zelle auftretende continuirliche rothe Vorderflügelbinde der Rothbinde von *Sericinus*, die über die Hinterflügel gehende schmälere der Schmuckbinde, die blaugekernten Augen des zweiten bis achten Randfeldes dem Submarginalbande entsprechen, also die Randbinde auf letzteren erloschen sein. So steht diese isolirte Form der Ansicht Eimer's, dass alle *Papilioniden* auf die *Alcbion*-Streifung zurückzuführen wären, durchaus entgegen, und wir werden auf ihre abweichende Zeichnung noch in der Schlussbetrachtung zurückzukommen haben. Hier genügt es, darauf hinzuweisen, dass sich die Zeichnung in keiner Weise durch Sprengung der ursprünglichen Bänder in ihre zwei Grenzstreifen erklären lässt, da die Zahlen der Streifen mit denen der Bänder nicht vereinbar sind und ausserdem bei allen untersuchten Exemplaren auf beiden Seiten der Oberfläche unsymmetrisch, also unregelmässig waren.

Die Gattung *Hypermnestra* Mén. (*Ismene* Nick.)

Diese aus einer einzigen Art, *H. Helios* Nick. bestehende Gattung bildet ebenfalls ein Bindeglied zwischen der *Thais*- und *Parnassier*-Gruppe. So nähert sie sich ersterer durch die an *Sericinus* erinnernde ausgebildete Rinne am Innenrande der Hinterflügel, durch die verdickten Schenkel und die Form der Flügelschuppen, letzterer durch die Form der Fühler und Palpen und die vierästige Radialis der Vorderflügel. Die Raupe ist nach Christoph¹⁾ „fast genau wie die von *P. Machaon*, hellgrün mit weissen, hinten gelben Quergürteln auf der Mitte jedes Segments und einigen schwarzen Punkten darin: dieselbe lebt auf *Zygophyllum*, einer den Rutaceen verwandten Gattung und „die Puppe ruht tief in der Erde“.

Die Zeichnung schliesst sich enger an die der Männchen von *Sericinus* an. So liegen in der Vorderflügelzelle nur zwei Bandreste, die dem vierten oder fünften und dem Terminalbande entsprechen, und tritt ausserhalb der Zelle noch ein rothgekernter Vorderrandsrest des Intramarginalbandes auf; ebenso kehrt im sechsten Randfelde der rothgekernte Schmuckbandrest wieder, der sich auf den Hinterflügeln im zweiten und vierten Randfelde erhält und ebenfalls in einem schmalen Winkel an den Innenrand tritt. Weiter sind Reste des Submarginal- und Postmarginalbandes erhalten, welche die weissen, auf den Hinterflügeln nur vom dritten bis siebenten Randfelde sichtbaren Marginalmonde einschliessen. Obwohl die Basalbänder auf den Vorderflügeln ausgefallen sind, finden wir doch auf den hinteren noch

¹⁾ Citirt nach E. Schatz, l. c. p. 50.

eine basale, aussen röthlich gekernte grüngaue Verdunkelung, die den ersten zwei, und eine weitere, über dem Zellende liegende, die dem dritten Basalbande entspricht.

So dürfen wir die Zeichnung von *Hypermoestra* auf die von *Sericinus* zurückführen.

Die Gattung *Parnassius* Latr.

Von den zahlreichen Arten dieser über die europäischen Alpen, den Himalaya, die Rocky Mountains verbreiteten Gattung finden wir die höchste Entwicklung der Zeichnung bei einer überaus seltenen Varietät des Weibchens von *P. Hardwickei* Gray (Himalaya), der Varietät *Charino* Gray, von der ich durch Güte der Herren Dr. Staudinger und Honrath ihre Unica untersuchen durfte.

Hier kommt auch die höchste Zahl der bei *Parnassius* zu beobachtenden Zellbänder auf den Vorderflügeln vor: eine breite Verdunkelung, die den ersten drei Basalbändern, zwei Bandreste, deren breiterer dem vierten, deren schmalerer dem fünften Zellbande entspricht, und ein Terminalband. Ausserhalb der Zelle liegt ein rothgekerntes Inframarginalband und im sechsten Randfelde vor dem Zellende wiederum ein rothgekernter Fleck, an dem auch letzterwähntes Band Antheil hat. So zieht sich die Zwischenbinde über beide Flügel. Das Submarginalband der Vorderflügel ist einfach grau verdunkelt, das der Hinterflügel bildet sich dagegen zu isolirten, nach hinten an Grösse zunehmenden weisskernigen Blauaugenflecken um. Innerhalb des Submarginalbandes tritt hier ein hinten bindenartig verbundenes Schmuckband in Fortsetzung des rothgekernten Fleckes am Hinterrande der Vorderflügel auf und setzt sich wieder in scharfem Winkel an den Innenrand heran. Während bei dieser Art die Randmonde auf den Vorderflügeln noch deutlich erkennbar, auf den Hinterflügeln jedoch wenig ausgebildet sind, treten sie bei anderen Formen, von denen ich den *P. Jacquemontii* Gray (Cat. Pap. Taf. XII, 1) hervorhebe, auch auf den Hinterflügeln deutlich und scharf vom Rande abgesondert auf, so dass sie an die Form der Marginalmonde bei *Thais* erinnern. So dürfen wir auch die Zeichnung der *Parnassier* nicht auf *Euryces* und *Euryales*, sondern nur auf *Thais*-artige Vorläufer zurückführen.

Zugleich dürfte es sich empfehlen, entweder *Luchdorpia* den *Parnassiern* beizurechnen, oder noch besser beide Gruppen in eine zusammenzuziehen, deren Endausläufer die Gattung *Parnassius* bildet, während sie selbst sich durch *Sericinus* an die *Papilio*-Gruppe anschliesst.

Zusammenfassung.

Durch vorstehende etwas ermüdende Untersuchungen, welche ich auf das grösstmögliche Material auslehnte, glaube ich den Beweis für die *Papilioniden* erbracht zu haben, dass eine Untersuchung über Verwandtschaften, welche allein, wie die Eimer's es unternahm, die Zeichnung berücksichtigt, unmöglich zu irgendwie verwendbaren Resultaten führen kann. Als geradezu überzeugenden Beweis dafür führe ich nur die Gattungen *Doritis* und *Parnassius* an, welche in der That sehr nahe miteinander verwandt sind und doch eine durchaus verschiedene Zeichnung besitzen.

Weiter haben wir aber zu zeigen Gelegenheit gehabt, dass in der That eine gewisse Regelmässigkeit vorhanden ist, mit welcher die Umbildung der Zeichnungen erfolgt, dass aber diese nicht einmal im Rahmen einer Gattung in jeder Beziehung streng durchgeführt ist.

So sind wir in Beziehung auf die Arten von *Papilio* zu dem Resultat gekommen, eine gelblich gefärbte Urform anzunehmen, welche ungefähr zehn quer über beide Flügel verlaufende, ursprünglich wohl einfarbig dunkle Bänder besass. Dagegen hatten wir in den kleinen, dem Geäder nach von *Papilio* abzuleitenden Gattungen in *Sericinus* und *Armandia* Zeichnungsverhältnisse angetroffen, wie sie ungefähr der ersten Umbildung der primären Zeichnung zuzuschreiben wären. Vereinigungen zweier benachbarter Binden oder Bänder, welche das dazwischen liegende Element, das Band oder die Binde, verkürzten, indem sie selbst an dem Orte höherer Concentration, meist dem Hinterrande, zusammentraten.

Vielleicht liegt uns in der Querstrichelung der Flügeloberseite von *Doritis* noch eine weitere Vorstufe der Zeichnung vor, die unentschiedene unregelmässige Querstrichelung, aus der erst wie bei *Doritis* selbst die Flecke und dann die Bänder hervorgingen. Wenigstens ist diese Strichelung weit verbreitet und offenbar in vielen Fällen die ursprünglichste Zeichnungsform.

Unter den *Papilio*-Arten dürfte sie uns in der eigenthümlichen queren Strichelung der Vorderflügeloberseite innerhalb der Mittelbinde bei den Rinnefallern *P. Erithonius* und *Demoleus* und in Spuren in der Vorderflügelzelle von *P. Xuthus* entgegentreten, obwohl ihr besonders in der *Erithonius*-Gruppe die Zeichnung der Unterseite nicht entspricht. Weiter tritt sie uns unter den Tagfaltern am Vorderrande der Vorderflügeloberseite bei vielen Arten von *Elymnias*, auf den in der Ruhestellung nicht gedeckten Theilen der Flügelunterseite aber bei zahlreichen *Satyriden*, *Nymphaliden* etc., besonders schön bei den dämmerungsliebenden *Caligiden*, entgegen.

Unter den *Uraniiden* treffen wir diese unregelmässige Strichelung besonders bei den nächtlichen grossen braunen Arten der Gattung *Nyctalemon* an, bei welcher sie sich ebenfalls am ganzen Vorderrande, im Basalwinkel und am Innenrande der Oberseite der Vorderflügel erhält, während sie auf der Unterseite, besonders an der Basis, eng gedrängt ist, über beide Flügel hinwegzieht und aussen zu grösseren zerstreuten Streifen wird, die aber meist innerhalb der Felder abgekürzt sind, also in Bezug auf Ausdehnung ungefähr der Anlage der Bänder in der *Papilio*-Puppe entsprechen.

Aus dieser regelmässigen Strichelung scheint eine Zeichnung mit zahlreichen randläufigen einfachen Zackenstreifen hervorzugehen, welche etwas weiter als die bei *Doritis* erwähnte, vorgeschritten wäre. Bei Tagfaltern ist mir solche „Wellenzeichnung“ nicht bekannt, dagegen ist sie bei Heteroceren häufiger anzutreffen (*Brahmaca*) und auch bei Uraniiden ausgebildet (*Sematura*).

Hieraus entwickeln sich endlich die Streifen und Binden, indem entweder die Grundfarbenreste oder die Zeichnungen sich zu Complexen vereinigen, die oft zusammengesetzter Natur sind und dann primäre oder sekundäre Bänder vorstellen (*Coronis*). Bei den abgeleitetesten Formen der tagliegenden Uraniiden (*Aleidis*) lässt sich noch am Costalrand der Vorder- und am Innenwinkel der Hinterflügel diese dichte Querbänderung erkennen, welche durch die Ausbildung des sekundären Kleides grossentheils auch auf der Unterseite unterdrückt wird.

Fassen wir nun kurz die Resultate der Entwicklung der Zeichnung, wie wir sie an den Arten der Papilioniden verfolgen konnten, zusammen, so stellte sich im Allgemeinen im Laufe der genealogisch fortschreitenden Entwicklung eine scheinbare Vereinfachung, in Wirklichkeit aber eher eine schwer entwirrbare Complication der Zeichnung heraus. Bewirkt wurde dieselbe:

1. durch Verschmelzen der ursprünglich getrennt von einander verlaufenden Bänder oder Binden;
2. durch sekundäre Zunahme der Zeichnung, welche in der Längsrichtung meist den Rippenzügen folgte und die Binden in Tüpfel zerschnitt;
3. durch eine zunehmende, oft von klimatischen Einflüssen bedingte Verdunkelung der Grundfarbe, welche die Bänder verschmolz und die Binden unterdrückte;
4. durch längs der Rippen zwischen oder in den Bändern verlaufende Aufhellung, welche die ursprüngliche Zeichnung verdrängte und auf den Vorderflügeln meist von hinten nach vorn, auf den Hinterflügeln umgekehrt verlief.

Umbildungen schritten im Allgemeinen von hinten nach vorn vor; Neubildungen traten nur in vereinzelten Fällen und wohl meist in Rückschlag auf frühere Zeichnungen auf.

Endlich gingen der mimetischen Umbildung in den meisten Fällen Rückschlagserscheinungen von Seiten der Weibchen voraus, die zuerst auf die Zeichnungsverhältnisse der zunächst stehenden, im weiteren Verlauf aber auf die früherer Vorläufer zurückgriffen und so das Material zur mimetischen Anpassung lieferten.

Systematische Uebersichten.

1. Uebersicht der Gattungen der Papilioniden.

A. Papilionini:

1. *Papilio* s. l. Latr. (p. 15):
 - a) *Papilio* s. str. (Rinnenfalter).
 - b) *Cosmodesmus* (Segelfalter).
 - c) *Pharmacophagus* (Aristolochienfalter).
2. *Teinopalpus* Hope (p. 102).
3. *Leptocircus* Swains (p. 103).
4. *Euryades* Feld. (p. 104).
5. *Euryas* Boisd. (p. 105).

B. Thaidini:

6. *Sericinus* Westw. (p. 106).
7. *Armandia* Blanch. (p. 107).
8. *Thais* L. (p. 108).
9. *Luchdorjia* Früg. (p. 109).

C. Parnassini:

10. *Doritis* F. (p. 110).
11. *Hypermaestra* Mén. (p. 110).
12. *Parnassius* Latr. (p. 111).

2. Die Untergattungen von *Papilio* und C. und R. Felder's Sectionen.

Die ausgezeichnete Monographie der Papilionen von C. und R. Felder¹⁾, welche als Grundlage für alle diese Familie betreffenden Arbeiten zu dienen hat und nach ihrem vollen Worth bisher noch nicht gewürdigt wurde, theilt die Gattungsrepräsentanten von *Papilio* Latr. in 75 Gruppen.

Von diesen gehören folgende zu den **Aristolochienfaltern**:

1. der amerikanischen Region: Sect. IV—VIII.
2. der indo-australischen Region: Sect. I—III und LXVI—LXXIV.²⁾
3. der afrikanischen Region: Sect. LXXV.

¹⁾ C. et R. Felder, Species Lepidopterorum. Fam. I. Papilionidae. (Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV, 1864, p. 259—378.)

²⁾ Mit Ausnahme von einigen Arten der Sect. LXIX, *P. Icarus* Westw., *P. Janaka* Moore und *P. Bontes* Westw., die zu den Rinnenfaltern gehören und C. und R. Felder persönlich nicht zur Untersuchung vorlagen.

An die Spitze (nicht den Anfang) der Sectionen treten bei C. und R. Felder somit, wie in allen bisher üblichen Eintheilungen, die gewaltigen hochentwickelten, früher als „*Ornithoptera* Boisd.“ zusammengefassten Endformen der indo-australischen Aristolochienfalter, die *Priamus*- (Sect. I), die *Pompeas*- (Sect. II) und die *Brookeanus*-Gruppe (Sect. III). Doch sind sie von den übrigen Aristolochienfaltern ihres Heimathsgebietes, welche in Sect. LXVI—LXXIV enthalten sind, noch durch die geschlossene Masse aller übrigen Papilionen mit Ausschluss der afrikanischen *Antenor*-Gruppe getrennt. So entging den ausgezeichneten Autoren der nahe Anschluss der *Pompeas*- an die *Priapus*-Gruppe und damit die Zugehörigkeit von Sect. II—III zur zweiten Cohorte der indo-australischen Aristolochienfalter. Von grossem Scharfsinn zeugt dagegen der Anschluss der schwierig zu beurtheilenden *Laertias*-Cohorte (Sect. VIII) an die übrigen amerikanischen Aristolochienfalter (der zweiten Cohorte) und die Stellung der *Antenor*-Gruppe, deren führende Art C. und R. Felder nicht einmal zur Untersuchung vorlag, neben die indische *Hector*-Gruppe.

Zu den **Segelfaltern** gehören folgende Felder'sche Sectionen

1. der paläarktischen Region: Sect. XXV,
2. der amerikanischen Region: Sect. X¹⁾—XIX und XXII—XXIII,
3. der indo-australischen Region: Sect. XX—XXI, XXIV, XXVII—XXIX, XXXIII—XXXIV und XXXVI,
4. der äthiopischen Region: Sect. XXVI, XXX—XXXI und XXXV.

Diese Sectionen bilden nun eine von Sect. X bis XXXVI fortlaufende Reihe, die nur durch Sect. XXXII mit dem *P. Antinachus* Dru. unterbrochen wird, welcher C. und R. Felder nicht vorlag und von mir auf Grund eigener Prüfung zu den Rinnenfaltern gerechnet wird. So wird es sehr wahrscheinlich, dass C. und R. Felder schon die Zusammengehörigkeit aller von uns zu *Cosmodesmus* gerechneten Gruppen vermuthet haben, ohne ihr jedoch besonderen Ausdruck zu geben.

Zu den **Rinnenfaltern** gehören vorerst die wenigen *Papilio*-Gruppen, welche weitere Verbreitung haben, so:

1. in der paläarktischen Region Sect. L, die *Alexanor*-Gruppe;
2. in der paläarktischen und nearktischen Region Sect. LI, die *Machaon*-Gruppe;
3. in der nearktischen und, wenn *P. Antinous* Don. hierher gehört, auch in der australischen Region Sect. XLIX, die *Dannus*-Gruppe;
4. in der indisch-australischen und äthiopischen Region Sect. XXXIX, die *Erdhonius*-Gruppe.

Weiter gehören dahin an continental beschränkten Gruppen

1. der amerikanischen Region: Sect. XL²⁾—XLVIII, LII—LIII und IX,
2. der indo-australischen Region: Sect. XXXVII—XXXVIII, LVIII—LXV,
3. der äthiopischen Region: Sect. XXXII, LIII—LVII.

So umfassen auch hier die Sectionen XXXVII—LXV nur Repräsentanten von Rinnenfaltern und wird die Annahme berechtigt, dass C. und R. Felder eine innere Zusammengehörigkeit auch dieser

¹⁾ Ausgenommen den als Weibchen zum Rinnenfalter *P. Erostratus* Westw. gehörigen *P. Rhetus* Gray., welchen C. und R. Felder nicht untersuchen konnten.

²⁾ Ausgenommen hiervon dürfte der zur Sect. XI gerechnete *P. Zetes* Westw. (St. Domingo) sein, welchen ich, obwohl ich wie C. und R. Felder auch nur die Abbildung kenne, der Untergattung *Pharmacoplagus* einreibe und zur *Phibon*-Gruppe der *Laertias*-Cohorte stelle.

Sectionen herausföhlten und auszudröcken versuchten. Zu diesen Sectionen käme dann noch der C. und R. Felder für Untersuchungs Zwecke nicht zugängliche gewesenere afrikanische *P. Antimachus* Dru., den Aurivillius gar zum Vertreter einer eigenen Gattung, *Draoyia*, gemacht hat, und *P. Hippason* Cr., Vertreter der Gruppe IX. Es ist die einzige der von C. und R. Felder selbst untersuchten Arten ¹⁾, in deren Auffassung ich den ausgezeichneten Beobachtern nicht Recht geben kann. In der That scheint die Stellung des *P. Hippason* Cr. zwischen Aristolochienfaltern und mimetischen Segelfaltern (als zu letzteren gehörige Form?) auf den ersten Blick richtig zu sein, aber die Resultate genauer und wiederholter Untersuchungen haben mich denn doch bewegt, *P. Hippason* als Endform der neotropischen Vertreter zu den Rinnenfaltern zu stellen. Endgöltigen Ausschlag darüber können nur erneute Beobachtungen über Form von Raupe und Puppe und die Futterpflanze der ersteren geben.

Aus Vorstehendem geht besonders hervor, dass man, in vollkommener Uebereinstimmung mit C. und R. Felder, den Werth der geographischen Verbreitung für die Gruppierung der verwandtschaftlich zusammengehörigen *Papilio*-Arten nicht hoch genug anschlagen kann, und dass Versuche der Gruppenbildung, wie sie Eimer z. B. zwischen amerikanischen und afrikanischen Segelfaltern etc. unternahm, entschieden zurückzuweisen sind.

Legen wir der Anordnung der Gruppen von *Papilio* dieselbe Tendenz zu Grunde wie der Reihenfolge der Gattungen der Papilioniden, so müssen wir ebenfalls mit den ursprünglichsten beginnen, und diese sind unströitig unter den Stammgruppen der Rinnenfalter zu suchen, welche zugleich die einzigen *Papilio*-Gruppen sind, deren Arten verschiedenen Continenten angehören können. Daher würde ich vorschlagen, die Anordnung der Gruppen mit der *Danaus*-, *Alexanor*-, *Machaoon*- und *Erithonius*-Gruppe zu beginnen und auf sie zuerst die amerikanischen und dann die indo-australischen und afrikanischen Rinnenfalter, nach ihren Gruppencomplexen zusammengefasst, folgen zu lassen.

Den Rinnenfaltern schliesse sich die erste Cohorte von *Cosmodemus* als die eigentlichen Segelfalter (mit Einschluss der von Eimer nicht berücksichtigten afrikanischen *Illyris*-Gruppe) an, welche in allen Welttheilen vertreten ist. Ihr folgten dann die Gruppen der zweiten Cohorte, welche auf die Tropen beschränkt sind.

Endlich kämen die Aristolochienfalter, deren Reihe wiederum von amerikanischen Formen der ersten (*Laertias*-)Cohorte (Sect. VIII) mit der *Philenor*-Gruppe eröffnet würde, denen sich die Abtheilungen der zweiten südamerikanischen (*Ascanides*-)Cohorte (Sect. IV—VII Feld.) anschliessen. Daran lehnte sich die afrikanische *Antenor*-Gruppe (Sect. LXXV), und schliesslich folgte die mit der *Hector*-Gruppe (Sect. LXXIV) beginnende und mit der *Pompeus*-Gruppe (Sect. II) endende zweite Cohorte indisch-australischer Aristolochienfalter, um in die farbenprächtige *Priamus*-Gruppe (Sect. I Feld.) der ersten Cohorte auszulaufer.

Wir erhielten damit folgende Anordnung:

I. subg. **Papilio s. str.**

A. Stammgruppen:

Danaus-Gruppe (p. 88) = Sect. XLIX C. und R. Felder.

Alexanor-Gruppe (p. 18) = Sect. L C. und R. Felder.

¹⁾ Alle übrigen von mir anders aufgetasteten Arten lagen ihnen nicht zur eigenen Prüfung vor.

Machaon-Gruppe (p. 17 u. 91) = Sect. LI C. und R. Felder.
Erithonius-Gruppe (p. 38 u. 65) = Sect. XXXIX C. und R. Felder.

B. Rein amerikanische Gruppenverbände:

- a. *Machaonides*-Gruppe (p. 95)¹⁾ = Sect. XLI C. und R. Felder.
Thoas-Gruppe (p. 96) = Sect. XLII C. und R. Felder.
Mentor-Gruppe (p. 96) = Sect. XLIV C. und R. Felder.
Torquatinus-Gruppe (p. 97) = Sect. XLIII²⁾ C. und R. Felder.
Caiquanabus-Gruppe (p. 98) = Sect. XI C. und R. Felder.
Pharnaces-Gruppe (p. 99) = Sect. XLV C. und R. Felder.
Chinsiades-Gruppe (p. 99). [C. und R. Felder noch unbekannt.]
Hippason-Gruppe (p. 99) = Sect. X C. und R. Felder.
b.³⁾ *Palamedes*-Gruppe (p. 90) = Sect. LII, subs. B, C. und R. Felder.
Troilus-Gruppe (p. 91) = Sect. LII, subs. A, C. und R. Felder.
Asclepius-Gruppe (p. 93) = Sect. XLVIII C. und R. Felder.
Eurymander-Gruppe (p. 93) = Sect. XLVII C. und R. Felder.
Zugreus-Gruppe (p. 94) = Sect. XLVI C. und R. Felder.

C. Rein indo-australische Gruppenverbände:

- a. *Gigon*-Gruppe (p. 39) = Sect. LIX, C. und R. Felder.
Euchnor-Gruppe (p. 40) = Sect. LX, subs. F, C. und R. Felder.
Capaneus-Gruppe (p. 45) = Sect. LX, subs. B ex p., C. und R. Felder.
Vollenboeii-Gruppe (p. 48) = Sect. LVIII C. und R. Felder.
Panmon-Gruppe (p. 48) = Sect. LX, subs. A ex p.⁴⁾ C. und R. Felder.
Castor-Gruppe (p. 46) = Sect. LX, subs. C⁵⁾ C. und R. Felder.
Panope-Gruppe (p. 46) = Sect. XXXVII C. und R. Felder.
b. *Amphiarus*-Gruppe (p. 40) = Sect. XI, subs. G, C. und R. Felder.
Godeffroyi-Gruppe (p. 41). [C. und R. Felder noch unbekannt.]
Hecataeus-Gruppe (p. 41). [C. und R. Felder noch unbekannt.]
Gambriusius-Gruppe (p. 41) = Sect. LX, subs. E—D, C. und R. Felder.
Anactus-Gruppe (p. 44) = Sect. LXI C. und R. Felder.
Alcidinus-Gruppe (p. 45). [C. und R. Felder noch unbekannt.]
c. *Ulysses*-Gruppe (p. 51) = Sect. LXII C. und R. Felder.
Pevandhus-Gruppe (p. 51) = Sect. LXIII C. und R. Felder.
Paris-Gruppe (p. 52) = Sect. LXIV C. und R. Felder.

¹⁾ Diese Gruppe lässt sich auch allenfalls unter die Stammgruppen aufnehmen.

²⁾ Mit Ausnahme des besser zur *Caiquanabus*-Gruppe gehörigen *P. Erostratus* Westw., dessen Weibchen der *P. Rhodus* Gray (der Sect. X C. und R. Felder's) ist.

³⁾ Die kleinen römischen Buchstaben bezeichnen genetisch zusammenhängende Gruppenverbände.

⁴⁾ Die von C. und R. Felder zu dieser Abteilung gerechneten monomorphen *P. Canopus* Westw. und *P. Hippaonius* Feld., rechne ich zur *Capaneus*-Gruppe, führe dagegen für die mir ebenfalls unbekannt gebliebene *Sakobata* Westw. eine eigene Gruppe ein.

⁵⁾ Der von C. und R. Felder zu dieser Gruppe gerechnete *P. Phostus* Guér. hat mir ebenfalls nie vorgelegen.

Demetrius-Gruppe (p. 53) = Sect. LXX, subs. D ex p., C. und R. Felder.
Protenor-Gruppe (p. 53) = Sect. LXX, subs. D ex p., C. und R. Felder.
Sakontala-Gruppe (p. 54) = Sect. LX, subs. A ex p., C. und R. Felder.
Elephenor-Gruppe (p. 52) = Sect. LXX, subs. D ex p., C. und R. Felder.
Janaka-Gruppe (p. 52) = Sect. LXIX ex p. C. und R. Felder.
Elewsii-Gruppe¹⁾ (p. 53). [C. und R. Felder noch unbekannt.]
Ornumans-Gruppe (p. 56) = Sect. XLV subs. C ex p., C. und R. Felder.
Ascalaphus-Gruppe (p. 54) = Sect. XLV, subs. A ex p., C. und R. Felder.
Lowii-Gruppe (p. 56) = Sect. XLV, subs. C ex p., C. und R. Felder.
Polymnestor-Gruppe (p. 58) = Sect. XLV, subs. A ex p., C. und R. Felder.

D. Rein afrikanische Gruppenverbände:

Menestheus-Gruppe (p. 66) = Sect. LIII C. und R. Felder.
Hesperus-Gruppe (p. 66) = Sect. LV, subs. B, C. und R. Felder.
Delalandei-Gruppe (p. 66) = Sect. LV, subs. A. ex p., C. und R. Felder.
Oribazus-Gruppe (p. 67) = Sect. LIV C. und R. Felder
Constantinus-Gruppe (p. 68). [C. und R. Felder noch unbekannt.]
Phorcus-Gruppe (p. 68) = Sect. LV, subs. A ex p., C. und R. Felder.
Merops-Gruppe (p. 68) = Sect. LV, subs. C, C. und R. Felder.
Zenobia-Gruppe (p. 70) = Sect. LVI ex p.²⁾ und LVII ex p. C. und R. Felder.
Zalmoxis-Gruppe (p. 71) = Sect. LVII, subs. B, C. und R. Felder.
Re-Gruppe (p. 72). [C. und R. Felder noch unbekannt.]
Antimachus-Gruppe (p. 72) = Sect. XXXII C. und R. Felder.

II. subg. **Cosmodesmus.**

A. Stammgruppen („eigentliche Segelfalter“; erste Cohorte):

a. Amerikanische Gruppen:

Ajax-Gruppe (p. 80) = Sect. XXIII, subs. B, E—F, C. und R. Felder.
Arcesilaus-Gruppe (p. 81) = Sect. XXIII, subs. A, C. und R. Felder.
Philolaus-Gruppe (p. 82) = Sect. XXIII, subs. B—D, C. und R. Felder.
Agesilaus-Gruppe (p. 83) = Sect. XIX, subs. B ex p., C. und R. Felder.
Protesilaus-Gruppe (p. 84) = Sect. XIX, subs. B ex p., C. und R. Felder.
Epidaurus-Gruppe (p. 84) = Sect. XXII C. und R. Felder.

b. Paläarktische Gruppe:

Podalirius-Gruppe (p. 19) = Sect. XXV C. und R. Felder.

¹⁾ *P. Elewsii* Leech ist besser als Vertreter einer besonderen Gruppe aufzufassen.

²⁾ Von den Arten dieser Section gehört *P. Cinea* Stoll wie ebenfalls *P. Hippocoon* und *P. Dionysos* Böd. von der Sect. LVII, subs. B. als Weibchen zu *P. Merops*.

e. Indo-australische Gruppen:

- Leosthenes*-Gruppe (p. 32) = Sect. XXIV C. und R. Felder.
Alecion-Glycerion-Gruppe (p. 31) = Sect. XX und XXI ex p. C. und R. Felder.
Anticrates-Gruppe (p. 32) = Sect. XXI, subs. D, C. und R. Felder.
Antiphates-Gruppe (p. 32) = Sect. XXI, subs. B und C, C. und R. Felder.

d. Afrikanische Gruppen:

- Colonna*-Gruppe (p. 61). [C. und R. Felder noch unbekannt.]
Policenes-Gruppe (p. 61) = Sect. XXVI C. und R. Felder.
Kirbyi-Gruppe (p. 62). [C. und R. Felder noch unbekannt.]

B. Rein neotropische abgeleitete Formen (zweite [*Iphiclidus*]-Cohorte):

- Thyastes*-Gruppe (p. 83) = Sect. XVII C. und R. Felder.
Dioxippus-Gruppe (p. 83) = Sect. XVI C. und R. Felder.
Columbus-Gruppe (p. 84) = Sect. XIV C. und R. Felder.
Servillei-Gruppe (p. 84) = Sect. XV C. und R. Felder.
Salvini-Gruppe (p. 85) = Sect. XVIII C. und R. Felder.
Asius-Gruppe (p. 85) = Sect. XIII C. und R. Felder.
Harrisianus-Gruppe (p. 85) = Sect. XII C. und R. Felder.
Thymbraeus-Gruppe (p. 86) = Sect. XI, subs. A, C. und R. Felder.
Xyrius-Gruppe (p. 86). [C. und R. Felder noch unbekannt.]
Harmodius-Gruppe (p. 86) = Sect. XI, subs. B—F, C. und R. Felder.
Ariarathes-Gruppe (p. 87) = Sect. X C. und R. Felder.

C. Rein indo-australische Gruppenverbände:

I. *Gyas*-Cohorte:

- Gyas*-Gruppe (p. 35) = Sect. XXIX C. und R. Felder.

II. *Zetides*-Cohorte:

- Agamemnon*-Gruppe (p. 33) = Sect. XXVII, subs. D—E, C. und R. Felder.
Cloanthus-Gruppe (p. 33) = Sect. XXVII, subs. A, C. und R. Felder.
Eurypylus-Gruppe (p. 34) = Sect. XXVII, subs. C, C. und R. Felder.
Sarpedon-Gruppe (p. 34) = Sect. XXVII, subs. B, C. und R. Felder.
Codrus-Gruppe (p. 34) = Sect. XXVII, subs. F, C. und R. Felder.
Macleayanus-Gruppe (p. 34) = Sect. XXVIII C. und R. Felder.
Macareus-Gruppe (p. 36) = Sect. XXXIII—XXXIV u. XXXVI C. und R. Felder.

D. Rein afrikanische abgeleitete Gruppen der zweiten (*Zetides*)-Cohorte:

- Tyndaracus*-Gruppe (p. 63) = Sect. XXXV ex p. C. und R. Felder.
Anopolus-Gruppe (p. 63) = Sect. XXX C. und R. Felder.
Leonidas-Gruppe (p. 64) = Sect. XXXI u. XXXV ex p. C. und R. Felder.

III. subg. **Pharmacophagus.**

A. Rein amerikanische Gruppenverbände:

a 1. (*Laertius*-)Cohorte:

- Philetor*-Gruppe ¹⁾ (p. 74) Sect. VIII, subs. A, C. und R. Felder.
- Polydamas*-Gruppe (p. 75) Sect. VIII, subs. B, C. und R. Felder.
- Protodamas*-Gruppe (p. 76) Sect. VIII, subs. C, C. und R. Felder.

b 2. (*Ascanides*-)Cohorte:

- Grandlachianus*-Gruppe (p. 77) Sect. VI C. und R. Felder.
- Phalaceus*-Gruppe (p. 77) = Sect. VI C. und R. Felder.
- Photinus*-Gruppe (p. 77) Sect. VI C. und R. Felder.
- Montezuma*-Gruppe (p. 78) Sect. VI C. und R. Felder.
- Triopas*-Gruppe (p. 79) = Sect. IV C. und R. Felder.
- Dardanus*-Gruppe (p. 78) = Sect. VII, subs. A, C. und R. Felder.
- Vertumnus*-Gruppe (p. 78) Sect. V ex p. C. und R. Felder.
- Aeneas*-Gruppe (p. 79) Sect. VII, subs. B ex p. C. und R. Felder.

B. Rein afrikanische Gruppe:

- Antenor*-Gruppe (p. 59) Sect. LXXV C. und R. Felder.

C. Rein indo-australische Gruppenverbände:

- a. *Hector*-Gruppe (p. 24) Sect. LXXIV C. und R. Felder.
- Jophon*-Gruppe (p. 25) = Sect. LXXIII C. und R. Felder.
- Alcinous*-Gruppe (p. 26) Sect. LXX C. und R. Felder.
- Latreillei*-Gruppe (p. 26) = Sect. LXIX ex p. C. und R. Felder.
- Doubledayi*-Gruppe (p. 26) Sect. LXXI—LXXII C. und R. Felder.
- Somperi*-Gruppe (p. 27) Sect. LXVI ex p. C. und R. Felder.
- Noe*-Gruppe (p. 28) Sect. LXVI ex p. bis LXXVII C. und R. Felder.
- Priapus*-Gruppe (p. 27) Sect. LXVIII C. und R. Felder.
- Pompeus*-Gruppe (p. 29) = Sect. II C. und R. Felder.
- Brookeanus*-Gruppe (p. 29) Sect. III C. und R. Felder.
- b. *Priamus*-Gruppe (p. 23) = Sect. I C. und R. Felder.

¹⁾ Hierher rechne ich noch den *P. Zetes* Westw. (st. Domingot) aus C. und R. Felder's Sect. XL, von dem ich ebenfalls nur die Abbildung kennen lernte.

Untersuchungen über die Mimicry
auf Grundlage eines
natürlichen Systems der Papilioniden.



Zweiter Theil:


Untersuchungen über die Mimicry

von

Dr. Erich Haase

Direktor des Kgl. Siamesischen Museums in Bangkok.

Mit 8 Tafeln.



Stuttgart.

Verlag von Erwin Nägele.

1893.

Das Recht der Uebersetzung vorbehalten!

Druck von A. Bonz' Erben in Stuttgart

Inhalt.

	Seite
Einleitung	1
Spezieller Theil	4
A. Mimetische Anpassung zwischen Blüthenpflanzen	4
B. Vertretern des Thierreiches	4
I. Mimetische Anpassung von Seiten der Arachniden	4
II. unter den Insecten	6
1) Orthopteren	6
2) Hemipteren	9
3) Hymenopteren	10
4) Neuropteren	11
5) Coleopteren	11
a) Als Modelle dienende Formen der Käfer	12
b) Mimetische Anpassungsformen der Käfer an Angehörige derselben Ordnung	13
6) Lepidopteren	19
a) Anpassungen unter Lepidopteren	19
1) Palaarktische Region	19
2) Indoaustralische Region	21
a) Als Modelle dienende Familien und Gattungen	21
1) Danaïnae	21
2) Palaeotropinae	25
3) Aeraeïnae	26
4) Morphinae	26
5) Pierinae	26
6) Papilioninae	27
b) Mimetische Anpassungsformen	29
1) Nymphalinae	29
2) Satyrinae	32
3) Pierinae	35
4) Papilioninae	36
5) Chalcostidae	37
3) Afrikanische Region	38
a) Als Modelle dienende Familien und Gattungen	39
1) Danaïnae	39
2) Aeraeïnae	40
3) Pierinae	41
4) Heterocera	41
b) Mimetische Anpassungsformen	42
1) Nymphalinae	42
2) Satyrinae	44
3) Lycaenidae	44
4) Papilionidae	45
4) Amerikanische Region	47
a) Nearktische Subregion	47
b) Neotropische Region	48
a) Innere Familien und Gattungen der Rhopaloceren	49
1) Danaïnae	49
2) Neotropinae	50

	Seite
3) Acraeinae	54
4) Heliconinae	54
5) Nymphalinae	58
6) Papilionidae	60
b) Als Modelle dienende Gattungen etc. der Heteroceren	61
c) Mimetische Anpassungsformen	61
1) Nymphalinae	61
2) Erycinidae	63
3) Pierinae	64
4) Papilioninae	68
5) Castniidae	70
6) Pericopidae	71
7) Melameridae	72
8) Chalcosiidae	72
9) Diopitidae	72
10) Geometrae	73
11) Pyralidina	73
12) Anpassungen von Schmetterlingen an immune Käfer	73
a) „ „ „ an stechende Hymenopteren	74
1) Palaeo- und nearktische Region	74
Sphingidae	74
Sesiidae	74
2) Indisch-australische Region	75
Sphingidae	75
Sesiidae	75
3) Neotropische Region	75
Dipteren	77
III. Mimetische Anpassungen unter Mollusken	78
IV. „ „ von Batrachiern an Reptilien	78
V. „ „ unter Reptilien	79
1) Indoaustralische Region	79
2) Afrikanische Region	79
3) Nearktische Region	80
4) Neotropische Region	80
VI. Mimetische Anpassungen unter Vögeln	80
VII. „ „ unter den Säugern	81
Allgemeiner Theil	82
Das natürliche System der Papilionen und seine Bedeutung für die Mimikry-Theorie	82
1) Historisches	82
2) Anpassungen unter den indo-australischen Papilionen	83
3) „ „ „ amerikanischen Papilionen	89
Entstehung der Mimikry zwischen nicht immunen und immunen Schmetterlingen	99
Entwicklung der Mimikry zwischen immunen Schmetterlingen	116
Eurwürfe gegen die Mimikry-Theorie	127
Die biologische Bedeutung der Mimikry im Thierreich	133
1) Anpassungen von Seiten der Angegriffenen	134
2) Mimetische Anpassungen seitens der Angreifer	138
Analogie, Convergenz und Mimikry	139
Die Mimikry eine Form der schützenden Anpassung an die Umgebung	150
Nachträge und Berichtigungen zu Theil I	156
I	159
II	159

Während Kirby und Spence¹⁾, welche zuerst den Ausdruck „Mimicry“ einführten, mit ihm noch alle diejenigen Fälle schützender Aehnlichkeit (protective resemblance) bezeichneten, in welchen ruhende Insecten an gewisse unorganische oder pflanzliche Gegenstände ihrer Umgebung erinnern, definierte erst H. W. Bates²⁾ in seiner classischen Monographie der Heliconier des Amazonas die „mimetic analogies“ als „resemblances in external appearance, shape, and colours between members of widely distinct families“. In derselben für jede Behandlung der Mimicry maassgebenden Arbeit setzte Bates auch zuerst die einzelnen Factoren des Begriffes auseinander, indem er „Modelle“ und „Nachahmer“ unterschied.

So hob er für die Modelle hervor, dass sie ihren Familienangehörigen im Habitus gleichen, in grossen Mengen vorkommen, langsam fliegen und ohne jede Scheu sind. Nun werden nach Bates diese langsam fliegenden Modelle weder im Fluge von insectenfressenden Vögeln oder Libellen noch in der Ruhe von Eidechsen oder Raubfliegen belästigt, während die Gattungen oder Familien, zu welchen die Nachahmer gehören, viel verfolgt werden. Die Ursache dieser verhältnissmässigen Sicherheit der Modelle vor den Nachstellungen ihrer natürlichen Feinde fand Bates in dem „Mangel an Schmackhaftigkeit“ (unpalatableness). Allerdings schrieb er letztere nicht ganz glücklich, z. B. bei *Lycorcia* und *Ithomia*, den vorstreckbaren Analbüscheln zu, welche später von Fr. Müller und mir als nur den Männchen eigenthümliche Reizdufteinrichtungen erkannt wurden.

Die mimetischen (imitating) Arten unterscheiden sich nach Bates durch Färbung und Zeichnung durchaus von ihren nächsten Verwandten, die das normale Kleid der Gattung tragen, und gleichen vielmehr den am selben Ort häufigen Modellen. Auch die Variationen der letzteren, welche die Resultate des Einflusses veränderter Localbedingungen sind, werden von den nachahmenden Arten mitgemacht. Zugleich wies Bates die relative Seltenheit der Individuen als charakteristisches Merkmal einer mimetischen Art im Gegensatz zu der Häufigkeit der Modelle nach und nahm zugleich diese relative Individuenzahl als eines der Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen Modell und Nachahmer an.³⁾ Daher fasste er auch Aehnlichkeiten zwischen einigen Gattungen der allgemein immunen Heliconier selbst nur in denjenigen verhältnissmässig beschränkten Fällen als Anpassung an häufigere Arten anderer Gattungen auf, wenn die nachahmenden Arten verhältnissmässig sehr selten waren (*Napeogenes*). Die bis in Einzelheiten genaue Wiedergabe des Modells erkannte er also nicht als blosses Product der Einwirkung gleicher Localbedingungen, sondern erst als Resultat der U m w a n d l u n g (Anpassung) dieses Productes an. Doch warnte Bates zugleich davor, alle Aehnlichkeiten (der Heliconier) untereinander einer Anpassung zuzuschreiben; vielmehr seien viele nur das Product der „similar adaption of all to the same local, probably

¹⁾ Kirby and Spence, Introductory Letters to Entomology, 1816, I, p. 5.

²⁾ H. W. Bates, Contributions to an Insect Fauna of the Amazon Valley. (Trans. Linn. Soc. XXIII, 1861, p. 502.)

³⁾ So kommt nach Bates z. B. auf ca. tausend Stück einer *Ithomia* erst eines der entsprechenden nachahmenden *Dismorphia* (*Leptalis*)-Art.

inorganic conditions“, zumal wenn die einzelnen Gattungen miteinander verwandt, in Farbe und Zeichnung sehr ähnlich und ausserdem in gleicher Weise gut vertreten wären.¹⁾ Das reiche Material an Mimicry unter den Schmetterlingen, das er selbst gebracht²⁾, ergänzte Bates ebentalls zuerst in seiner werthvollen Monographie der Longicornier des Amazonenstromes durch einige Beispiele aus der Ordnung der Käfer (s. u.).

Kurze Zeit nach Bates' classischer Arbeit erschien eine werthvolle Zusammenstellung von „Formanalogueen unter den Insecten“ aus der Feder A. Gerstäcker's³⁾, in welcher der scharfsinnige Autor eine verhältnissmässig erschöpfende Zusammenstellung analoger Formen gab. Ohne sich weiter in Erörterungen über das Wesen dieser Analogueen einzulassen, betonte Gerstäcker doch, dass, „sobald verschiedene Organisationstypen unter gleicher Maske auftreten, nur bei der einen dieser Typen der Habitus eigenthümlich, bei der anderen erborgt ist“. In den Fällen, in welchen „aussergewöhnliche Mittel in Anwendung gebracht sind“, um diese Aehnlichkeit hervorzurufen, sieht auch Gerstäcker sich „gezwungen, der Natur eine bestimmte Absicht unterzulegen, deren Zweck wohl kaum ein anderer sein könne als der der Täuschung“. Als Beweismittel führt er hierfür die Aehnlichkeit gewisser Parasiten mit den nesterbauenden Wirthen aus derselben Familie der Hymenopteren etc. an. Die wichtigsten von Gerstäcker gebrachten Beispiele einer Mimicry beziehen sich auf Anpassungen an Raubwespen, von denen *Scaphura* (Loeustid.) zuerst von Bates (l. c. p. 509) erwähnt worden war. Leider ist Gerstäcker's Arbeit fast unbeachtet geblieben.

Ungefähr zur selben Zeit erschien ein Aufsatz von A. R. Wallace in der Westminster Review, der später in desselben Verfassers „Beiträgen zur natürlichen Zuchtwahl“⁴⁾ wiederholt wurde und wohl als die bekannteste der Arbeiten über Mimicry anzusehen ist. Mit Benutzung der Beobachtungen von Bates ergänzte Wallace die bekannten Beispiele durch eine reiche Fülle des im indisch-malayischen Archipel von ihm beobachteten Materiales und zeigte zuerst, dass z. B. der Blauglanz auf den Flügeln des Weibchens von *Hypolimnas anomala* Wall. und der Polymorphismus desselben Geschlechtes bei *Papilio Pammen*, *Momon* L. etc. einer mimetischen Anpassung zuzuschreiben ist. Den Höhepunct seiner Anschauungen über die Mimicry nimmt Wallace's im Anschluss an seine früheren Arbeiten geschriebener Aufsatz im „Darwinism“⁵⁾ ein, weshalb wir denselben ausführlicher besprechen.

Wallace äussert sich darin zuerst über die Frage nach der Entstehung der Mimicry. So sind nach ihm die Heliconier eine alte Gruppe, die specialisirt und allmählig zur „dominant and aggressive race“ wurde. Die Feppegkeit der Entwicklung entstand als Product der Immunität durch die bestimmte

¹⁾ So bildet in der That die relative Seltenheit der nachahmenden Art für Bates oft den einzigen Maassstab für den Unterschied zwischen Anpassung und Analogie. Daher nahm er auch z. B. eine nachahmende, zufällig einmal häufige Art von *Stalacthis* als Modell für eine *Dismorphia* an. Es kann aber, wie unten erörtert werden soll, nur eine genetische Untersuchung über die Entstehung und Umbildung der einzelnen Gattungen und Arten uns der Entscheidung solcher Fragen näher führen, da die Voraussetzung, dass die Seltenheit der Art in allen Perioden constant war, unbeweisbar bleibt und unwahrscheinlich ist.

²⁾ Nach Bates dienen z. B. die Heliconier (in seinem weiteren Sinne) 15 Arten von Pieriden (*Lepalis* und *Euterpe*), 4 Arten von *Papilio*, 7 Eryciniden, 3 Castniiden und 14 tagfliegenden Heteroceriden als Modell.

³⁾ A. Gerstäcker, *Scipastus* und *Phylloscopus*, zwei käferähnliche Grylliden-Gattungen, nebst Bemerkungen über Formanalogueen unter den Insecten. (Stettin, Entomol. Zeitung, XXIV, 1863, p. 408 ff.)

⁴⁾ A. R. Wallace, Contributions to the Theory of Natural Selection. London 1870, Cap. III–IV.

⁵⁾ A. R. Wallace, Darwinism. London 1889, Cap. IX, p. 239–264.

„Nahrung der Larve“ etc., und allmählig bildeten sich dem auch aus unscheinbaren Zeichnungen die auffallenden „Trutzfarben“ (warning colours) der Falter aus. Die zufällige Ähnlichkeit einiger Nachahmer liess diese Individuen überleben, die gesteigerte Ähnlichkeit mit den Modellen endlich sicherte die Erhaltung der Art. Schliesslich führt Wallace (l. c. p. 264) folgende Gründe für die Berechtigung der Mimicrytheorie an:

1. Dass die Nachahmer dieselbe Verbreitung haben wie die Modelle;
2. dass erstere stets wehrloser sind als letztere;
3. dass erstere stets in geringerer Individuenzahl auftreten;
4. dass erstere von ihren Verwandten in der Tracht sehr verschieden sind;
5. dass die Nachahmung, so unbedeutend sie auch sei, nur eine äusserliche und von aussen sichtbare ist, und sich nie auf innere Charaktere ausdehnt.

Bald nach Wallace's classischer Arbeit über die indo-australischen Papilioniden (1865)¹⁾, in welcher er eine Reihe mimetischer Convergenzen bespricht, veröffentlichte R. Trimén seine werthvollen Beobachtungen über Mimicry unter afrikanischen Schmetterlingen²⁾, in denen er besonders auf die interessanten Fälle des Polymorphismus bei *Papilio Merope* und des Dimorphismus bei *P. Cyorta* und *Echerioides* aufmerksam machte. Eine dankenswerthe Ergänzung dazu gab er in seinen späteren (1889) „South African Butterflies“. Trimén hebt besonders die Lebensfähigkeit der immunen Modelle gegenüber den zarteren Nachahmern hervor.

Weitere werthvolle Beiträge zur Mimicry lieferte besonders Fr. Müller. Nachdem von Gegnern der Theorie als Einwurf gegen letztere hervorgehoben war, dass die Ähnlichkeit immer Arten verschiedener Familien (Danainen, Heliconinen) unmöglich durch natürliche Auslese entstandene Anpassung sei, da ja die einander entsprechenden Formen allgemein immunen Gruppen angehörten, führte Fr. Müller zunächst an³⁾, dass die jungen Vögel erst die immunen Arten ihrer Gegend durch Erfahrung als ungeniessbar kennen lernen müssten, und es daher auch für die widrigen Arten am vortheilhaftesten sei, ein gemeinsames Kleid zu tragen, da dann um so weniger Individuen der Unerfahrenheit ihrer jungen Feinde zum Opfer fielen. So betont auch Wallace (1889, l. c. p. 256), dass gleiche Orte ähnliche Artgruppen besitzen, und somit an ihnen bestimmte ungeniessbare wenige Formen einer Gattung vorkommen die von den Vögeln leichter als solche erkannt werden könnten.

¹⁾ A. R. Wallace, On the Phenomena of Variation and Geographical Distribution as illustrated by the Papilionidae of the Malayan Region (Trans. Linn. Soc. London Vol. 25, 1865 p. 1—71).

²⁾ R. Trimén, On some remarkable Mimetie Analogies among African Butterflies (Trans. Linn. Soc. London Vol. 26, 1869 p. 497—522).

³⁾ Fr. Müller, *Itana* und *Thyridia* etc. (Kosmos, herausgeg. von Krause, 1879, p. 199; übers. in Trans. Ent. Soc. 1880, p. XX—XXVIII.)

Specieller Theil.

A. Mimetische Anpassung zwischen Blütenpflanzen.

Da die Hauptfunction der Blüthe die Bildung des Samens ist, kann man ihre abenteuerliche Form bei manchen Orchideen, welche den geöffneten Rachen einer Schlange darstellen soll, kaum für ein Mittel zum Anlocken der Insecten und zur Erzielung der Kreuzbefruchtung halten.

Nach einer Angabe von Behrens, auf welche Herr Professor Dr. Ascherson mich aufmerksam machte, dürfte die Form v. *tetrandum* (Cust. Flora, 1878, Nr. 15) von *Cerastium semidodecandrum* L. eine mimetische Anpassung an eine von den Insecten stärker aufgesuchte Crucifere, *Cochlearia danica* L. sein. Natürlich hat die Beobachtung zu entscheiden, ob die vierstrahligen Blüten des *Cerastium* in der That von Insecten in höherem Grade aufgesucht werden als die normalen.

B. Mimetische Anpassungen zwischen Vertretern des Thierreiches.

Unter den niederen Thieren sind mir keine sicheren Fälle mimetischer Anpassung bekannt geworden und die zahlreichen nachgeprüften Analogieen in Form und Färbung, welche allerdings nur von einzelnen Autoren als „Mimicry“ bezeichnet wurden¹⁾, liessen stets eine einfachere Erklärung zu.

Ebensowenig sind bisher annehmbare Beispiele von Mimicry unter den Crustaceen bekannt geworden.²⁾

Dagegen entwickelt sich die schützende Anpassung an besondere, durch Waffen oder Immunität vor Verfolgungen geschützte Modelle von Seiten geniessbarer, stark verfolgter und wenig fruchtbarer Formen bei den Gliederthieren besonders unter den Classen der landbewohnenden Arachniden und Insecten. Alle diese nachahmenden Formen leben im Freien und im vollen Licht des Tages; so wird es wahrscheinlich, dass sich mimetische Anpassungen bei den Wasserthieren wegen der geringeren Durchsichtigkeit des Mediums, welches sie bewohnen, weniger entwickeln konnten, zumal die meisten Wasserthiere in hohem Maasse fruchtbar sind.

I. Mimetische Anpassung von Seiten der Arachniden.

Im Gegensatz zu der früher von vielen Seiten aufgestellten Behauptung, dass bestimmte Formen von Käfern, Raupen etc. eine schützende Anpassung an Spinnen darstellten, muss ich entschieden betonen,

¹⁾ Vergl. n. A. Sicard, Le Mimétisme. Paris 1888.

²⁾ Ann. d. Herausg. Unter dem Namen *Mimocetes* beschreibt C. Bovallius (*Mimocetes*, a remarkable genus of Amphipoda Hyperidea, Nova Acta Reg. Soc. Sc. Upsala 3, Ser. 1885) eine merkwürdig gestaltete kugelige Hyperide, von welcher eine mimetische Anpassung an eraspedote Medusen angenommen wird. Ob thatsächlich hier ein Fall wahrer Mimicry vorliegt, dürfte indessen um so fraglicher sein, als *Mimocetes*, wie aus der Rückbildung der Augen zu erschliessen ist, offenbar die dunklen Tiefenregionen bewohnt und nur gelegentlich an die Oberfläche gelangt.

dass es kaum Arthropoden giebt, welche in höherem Maasse als die meist zartleibigen Araneiden den Nachstellungen der Insectenfresser ausgesetzt sind. So lieben carnivore Kerfe und insectentressende Vögel (Kolibris) diese fetten Bissen ganz besonders, und eine grosse Menge von Mordwespen (*Pompilus*, *Proconemis*, *Agenia*, *Pelopocus*, *Trypoxylon* etc.) trägt fast ausschliesslich als Nahrung für die junge Brut Spinnen in ihre Nester ein. Der interessanten Arbeit von Elizabeth Peckham¹⁾ entnehme ich die weitere Angabe, dass nach Fabre (Nouv. Souv. Entomol. p. 206) die Spinnen die „champions toujours vaincus“ der Pompiliden sind. Nach Belt²⁾ jagt *Pompilus polistoides* Spinnen sogar aus dem Gewebe heraus, und Bates³⁾ erwähnt die mit gelähmten Gasteracanthien gefüllten Mordwespenester. Auch Herb. Smith schrieb an E. Peckham, dass die Hauptfeinde der Spinnen die stechenden Hymenopteren sind, und einige seiner besten Arten aus Wespennestern stammen. Wie Hentz ca. 20–40 Spinnen in je einem Neste von *Sphex* fand, beobachtete auch E. Peckham deren eine ähnliche hohe Zahl, meist aus Epeiren bestehend. Auch durch insectenfressende Vögel leiden die Spinnen sehr; die Kolibris fressen fast nur Spinnen; nach Gentry nimmt *Trochilus colubris* zehnmal so viel Spinnen als andere Insecten, und auch Belt (l. c. p. 315) fand die Kolibrinägen voll von kleinen saftigen Spinnen. In der That ist es von keiner Spinne bekannt, dass sie durch „some nauseous taste or odour“ geschützt sei; so werden auch keine Spinnen von anderen nachgeahmt, wie E. Peckham (l. c. p. 103) richtig bemerkt.

Besonders die Familie der **Attiden** liefert ein interessantes Material für die Mimicry. Ihre Angehörigen sind schon durch die auf den Boden etc. beschränkte freie Lebensweise und durch die langgestreckte Körpergestalt vorwiegend zu zufälligen Anpassungen an flügellose stechende Hymenopteren (Ameisen, Mutillen) befähigt. In der That leiden die Attiden auch besonders stark unter den Nachstellungen der Spinnenfeinde, und endlich tritt ein weiterer wichtiger, für die Erhaltung der Art ungünstiger Factor ein, welcher die Seltenheit der Individuen erklärt: die geringe Zahl der Eier. So liegt nach E. Peckham (l. c. p. 75) die kleine, ameisenähnliche *Synageles plicata* nur drei, dagegen der stärkste Attide, *Philippus morsitans*, ca. 180 Eier. „Die kleine *S. plicata* ist vertheidigungslos und nur durch ihre Ameisenähnlichkeit geschützt. Eine Form mit so niedriger Geburtsziffer (birth-rate) kann sich nur erhalten, wenn ihre Mortalität entsprechend gering ist.“ Ausser durch Gestalt und Färbung des Körpers zeigt sich bei *Synageles* nach E. Peckham die Ameisenähnlichkeit noch in der Zickzack-förmigen Bewegungsart, dem Aufgeben der Sprungfähigkeit und dem vorsichtigen Tasten des vorderen Beinpaares, welches den Fühlerbewegungen der Ameisen entspricht. So kommen für diese Spinnen nur die besonderen Feinde der Ameisen, besonders die am Boden sammelnden Erdspechte, in Betracht. Doch dürften gegen diese neuen Gefahren vor besonderen Feinden der Ameisen die Vortheile bedeutend überwiegen, welche die Ameisenähnlichkeit den Spinnen gegen die zahlreichen allgemeinen Feinde ihrer Ordnung und besonders Familie giebt, vor Allem gegen kleine Insectenfresser, gegen Attiden selbst, die nach E. Peckham nie Ameisen nehmen, vielleicht auch gegen gewisse Pompiliden, welche ihre Eier in die Leiber lebender Spinnen legen. Anscheinend wird *Synageles* im Freien von den Ameisen nicht belästigt. Auch J. M.

¹⁾ E. G. Peckham, Protective Resemblances in Spiders. (Occas. Papers of the Nat. Hist. of Wisconsin, Milwaukee, 1889, p. 60–112.)

²⁾ Th. Belt, The Naturalist in Nicaragua. London 1888, p. 133.

³⁾ H. W. Bates, The Naturalist on the River Amazonas etc., p. 186.

Weale erwähnt (Nature, 1871, III, p. 508) ameisenähnliche Springspinnen, deren eine Art an Krautpflanzen lebt und die Vorderbeine fühlertartig hochhält.¹⁾

II. Mimetische Anpassung unter den Insecten.

Während bei den Myriopoden keine Beispiele von Mimicry vorkommen, sind sie bei den Hexapoden im Allgemeinen desto häufiger, je geringeres Alter die betreffende Ordnung hat, und beziehen sich in allen von mir aufgenommenen Fällen auch nur auf Insecten als Modelle²⁾.

1. Mimetische Anpassung bei Orthopteren.

Obwohl manche Acridier, nach ihrer auffallenden Färbung zu urtheilen, in gewissem Grade vor den Angriffen insectenfressender Vögel etc. geschützt sein dürften (*Phrynateus*), und andere einen unangenehmen Widrigkeitsduft zu entwickeln vermögen (*Aularchus*)³⁾, so muss doch im Allgemeinen die Ordnung der Orthopteren zu denjenigen Kerfen gezählt werden, welche am meisten zur Nahrung der Insectenfresser dienen.

Unter den **Schaben** (*Blattina* Burm.) treffen wir einige wenig ausgebildete Fälle mimetischer Anpassung an immune Insecten anderer Ordnungen anscheinend nur bei solchen Gattungen, welche keine versteckte, sondern eine freie Lebensweise im Tageslicht und auf Blättern führen.

So erwähnt C. Brunner⁴⁾, dass in Amerika *Iscnoptera* und *Phoraspis* und in Indien *Corydia* tagsüber auf Pflanzen leben, während die grosse Masse der Schaben sich in der Dunkelheit unter trockenem Laube, unter Steinen, in morschem Holz etc. verborgen hält, und zahlreiche Arten sogar eine rein nächtliche Lebensweise führen. Die Hauptfeinde der Blattiden dürften Grabwespen (*Ampulex* etc.) sein, die ihre Beute auch in ihrem Versteck aufsuchen.⁵⁾ Während einzelne Arten der indisch-australischen Gattung *Corydia* Serv. ein düster braunes Kleid tragen⁶⁾, ist bei *Cor. Petiverana* eine bunte Färbung entwickelt, welche in *Cor. naptialis* Gerst. eine weitere Ausbildung erfährt. So erinnert letzterwähnte sehr seltene grössere Art (Bengalen) durch die vier orangenen Bänderreste auf den schwarzen Vorderflügeln und die dunkel orangenen, am Aussenrande schwarz gesäumten Hinterflügel besonders im Fluge etwas an gewisse Eusemien (Agaristiden), nach Mittheilung des Herrn Fr. Kohl etwa an *Ea. sodalis*.

¹⁾ Ueber die Ameisenähnlichkeit gewisser Spinnen vergleiche auch einen Aufsatz von Ph. Bertkau (Verh. Niederrh. Ges. f. Natur- u. Heilkunde, XLIII, 1886, p. 66).

²⁾ Das unter Andern auch von E. Krause und A. Seitz aufgenommene Beispiel von (gegenseitiger?) Mimicry zwischen *Macroglossa titan* und einem Kolibri dürfte nur als Product analoger Entwicklung unter gleichen Existenzbedingungen aufzufassen sein, da der Schwärmer das gewöhnliche Kleid der Macroglossen trägt, und es für den Kolibri kaum vorthellhaft sein kann, für einen so schmackhaften Bissen, wie die Schwärmer es sind, gehalten zu werden.

³⁾ Herr Fruhstorfer theilte mir auf meine Anfrage mit, dass *Au. militaris* L. (Ceylon), der sehr gemein ist, unangenehm duftet. Vergl. auch Proc. Ent. Soc. London, 1869, p. XIII.

⁴⁾ C. Brunner v. Wattenwyl, Nouveau Système des Blattifères, Vienne 1865, p. 18.

⁵⁾ Nur so lässt sich die Angabe von Lucas (Bull. Soc. Ent. France, 1879, p. CLIX) erklären, dass *A. compressus* die nächtliche *Blatta americana* einträgt, da die Grabwespe selbst ein Tagthier, die Schabe ein Nachtthier ist.

⁶⁾ Bei *Cor. carunculigera* Gerst. sind, wie ich nachwies, noch mächtige seitliche Stinkdrüsen entwickelt. (Zur Anatomie der Blattiden. Zool. Anzeiger, XII, 1889, p. 170.)

Die der neotropischen *Phoraspis* nahestehende Gattung *Cassidodes* Brunn. mit ebenfalls fast ungerippten und sich in der Ruhelage nur unbedeutend deckenden Elytren und einer einzigen Art. *C. ligata* Brunn. (Philippinen), gleicht, wie zuerst K. Semper¹⁾ hervorhob, in den hellen Randflecken des Halsschildes und dem Saum der Flügeldecken dort vorkommenden Coccinellen.

Ueber die Lebensweise der rein neotropischen Gattung *Paratropa* Sew. ist mir nichts bekannt. Unter den wenigen Arten tragen *P. elegans* Burm. (*lyras* de Sauss.) und *P. lycoides* Sew. eine abweichende Tracht. So besitzt *P. elegans* eine gelbe Binde am Vorderrande des dunklen Halsschildes und rothe Flügeldecken mit drei schwarzen Längsstreifen, die sich im letzten Viertel vereinigen. Dadurch erinnert diese seltene Art an einen immunen Spinner, die Arctide *Cissara decora* Walkk., von ungefähr gleicher Größe, doch bedarf diese merkwürdige Analogie noch der experimentellen Prüfung.

Weiter erinnert *P. lycoides* Serv. (Para) durch die orangegelbe Färbung, die von einem Halsschildfleck, einem über die Mitte verlaufenden Querbande und der apicalen Verdunkelung der Flügeldecken unterbrochen wird, an immune Malacodermen (Lyceiden) mit der charakteristischen Tracht des *Calopt. variabile* L.

In der nahestehenden neotropischen Schaben-Gattung *Phoraspis* Serv. erinnern die Formen mit heller Längsbinde der undeutlich gerippten Flügeldecken und glasig aufgehellten Halsschildseiten, zwischen welchen der Kopf durchscheint, etwas an Lampyriden. So ähnelt *Ph. leucogramma* Perty besonders der *Lucernula fenestrata* Germ., die jederseits eine helle Längsbinde neben dem Aussenrande der Flügeldecken trägt. Auf *Phoraspis* bezieht sich wohl auch die interessante Bemerkung von Belt²⁾, dass gewisse Lampyriden-ähnliche Blattiden ebenfalls „instead of hiding in crevices and under lodges like their brethren, rest during the day exposed on the surface of leaves, in the same manner as the fire-flies, they mimic.“

Die einzigen mir bekannten Gattungen der **Acridier**, bei welchen unvollkommene Anpassungen an andere Ordnungen (stechende Hymenopteren) vorkommen, sind *Mastax* Perty (Brasilien) und *Eruvus* Stal. (Indien), welche durch den stark vorgequollenen Kopf, den tailenartig eingegengten Hinterleib, die glasigen oder stark verdunkelten Vorderflügel, die kurzen Fühler, die Zeichnung des Hinterleibes an Raubwespen erinnern. Hier beruht die unvollkommene Anpassung der nach J. Westwood sehr seltenen Formen wohl hauptsächlich auf dem Schutzbedürfniss vor Verfolgungen durch Mordwespen.

Unter den **Grylliden** gleicht, wie K. Semper (l. c.) zuerst entdeckte und Gerstäcker genauer begründete³⁾, der merkwürdige einzige Vertreter der Gattung *Scopastus* Gerst., *Sc. pachyrrhynchoides* Gerst. (Philippinen), dem dortigen Rüsselkäfer *Pachyrrhynchus venustus* Waterh. Zu der bei den Geradflüglern schon so überaus seltenen metallischen Färbung tritt hier noch eine Unterbrechung durch scharf umgrenzte hellfarbige Tüpfel hinzu, „ein allen bekannten Orthopteren ganz fremdartiges Verhalten.“ Weiter ist das Halsschild stark halbkugelig gewölbt, sind die Flügeldecken „convex und nach hinten birnförmig erweitert“ und die vorderen Beinpaare „ganz käferartig gestaltet“. „Selbst das letzte Beinpaar, das bei den Gryllodeen sonst eine typische Gestaltung zeigt, ist zur Herstellung der Käfer-Aehnlichkeit gleichsam in seiner Form-Prägnanz sichtlich modificirt.“ Der Vortheil dieser Anpassung beruht wohl darauf, dass der zarte, weiche Geradflügler von seinen zahlreichen Feinden in dieser Maske nicht für den Leckerbissen erkannt wird, den er in der That abgeben dürfte, und so in dem Gewande des stahlharten

¹⁾ K. Semper, Die natürlichen Existenzbedingungen der Thiere, II. Leipzig 1880, p. 236.

²⁾ Th. Belt, The Naturalist in Nicaragua, London 1888, p. 318.

³⁾ A. Gerstäcker, *Scopastus* und *Phylloscopus* etc. (Entomol. Zeitung, Stettin, XXIV, 1864, p. 121 ff.)

und vielleicht auch immunen Rüsslers den Verfolgungen seitens der Insectenfresser weniger ausgesetzt ist.

Weiter erinnern nach Gerstäcker die Arten der neotropischen Gattung *Phylloscytus* Guér. durch ihren eigenartigen Habitus an Cicindelen, wie es schon bei dem südeuropäischen *Trigonidium cicindeloides* in geringem Grade angedeutet ist.

Der sehr seltene blasse, flügellose *Stenopelmatus monstrosus portentosus* Hbst.? (Cap) [Mus. Berlin] endlich mit einem ganz colossalen Kopf, der nur Maske und grossentheils hohl ist, erinnert etwas an die „Soldaten“ der Termiten. Ueber seine Lebensweise ist mir nichts bekannt.

Ob die eigenthümliche Körperform der **Proscopien**, welche in so hohem Grade an die der Phasmiden erinnert, als Anpassung an letztere oder als Resultat einer blossen durch die Gleichheit der Lebensweise etc. bedingten Convergenz aufzufassen ist, wage ich nicht zu entscheiden. Anscheinend sind die Proscopien viel seltener als Phasmiden und kommen nur an Orten vor, wo auch letztere sich finden. Ebenso besitzen die Phasmiden trotz ihres offenbar gegen Thierfresser schützenden Kleides vielleicht eine gewisse Immunität bestimmten Feinden gegenüber, die sie entweder einer bestimmten Blattnahrung, — sie sind sämmtlich phyllophag —, oder den grossen am Prothorax sich öffnenden Stinkdrüsen verdanken.¹⁾

Unter den **Locustinen** erinnert die eigenthümliche Gattung *Coulyglotera* Westw. mit verkümmerten Flügeln, vorgequollenem grossäugigem Kopf, zweimal eingeschnürtem, schmalem Prothorax, stummelförmig verkümmerten Flügeln, langen Beinen und Fühlern und himmelblauer Färbung nach J. O. Westwood²⁾ derart an *Tricodgla*, eine Gattung der räuberischen Sandlaufkäfer, dass selbst dieser ausgezeichnete Forscher seine lange Zeit in seiner Sammlung unter den Cicindelen stecken hatte. Sicher ist diese Aehnlichkeit des sehr seltenen zarten Geradflüglers mit einem der stärkst bewehrten und gepanzerten Rabinsecten für die Arterhaltung des ersteren von bedeutendem Nutzen, da besonders die Laubhenschrecken eine so gesuchte Kost bilden.

Die rein neotropische Gattung *Scaphura* Burm. zeichnet sich vor der verwandten *Gymnocera* Brullé besonders durch die Fühler aus, die eine Strecke hinter der Basis stark verdickt und behorset sind. Dadurch verschwindet der lange terminale Theil für das Auge und erscheinen die Fühler kurz wie bei Sandwespen. Besitzen bei *Sc. Vigorsii* Krby, beide Geschlechter braune Flügeldecken, einen blauen Hinterleib und weissgebänderte Schenkel, so trägt bei *Sc. nitida* Perty der Leib einen gelben Seitentüpfel, während ein Weibchen von *Sc. Kirbyi* Westw. gelbe Tüpfel auf dem ersten und einen breiten gelben Gürtel auf den fünf folgenden Ringen hat. Nach H. Burmeister fallen alle diese Formen vielleicht als Varietäten unter eine Art zusammen. Wie zuerst H. Bates³⁾ hervorhob, erinnern die Scaphuren auch in ihrem Benehmen durchaus an Angehörige der Mordwespen, so besonders an *Pepsis*-, *Priocnemis*- und *Pompilus*-Arten. Da letztere für ihre Brut oft ausschliesslich Henschrecken⁴⁾ eintragen, liegt hier der Schutz des verfolgten Thieres in der Aehnlichkeit nicht mit einem Familienangehörigen, sondern mit seinem Verfolger.

¹⁾ Vergl. E. Haas'o, Zur Anatomie der Blattiden. (Zool. Anz. iger. XII, 1889, p. 171.)

²⁾ J. O. Westwood, Illustrat. of Relationships etc. (Trans. Linn. Soc. 1837, p. 419.)

³⁾ H. W. Bates, Contributions to an Insect Fauna of the Amazon Valley. (Trans. Linn. Soc. London, XXIII, p. 509.)

⁴⁾ Nach A. Handlirsch (Zool. bot. Ges. XXXIX, 1889, Sitzungsber. p. 81) lebt *Sphex* besonders von Orthopteren; dasselbe gilt z. B. nach Kohl auch für unsere *Tachytes spoliata* und *obsolata*.

Eine interessante Anpassung an Ameisen bietet die kleine, zu den Phaneropteriden gehörige *Myrmecophana fallax* Brunn. aus Ambouarra im Sudan. Nach Brunner¹⁾ hat der breite Kopf des fast schwarzen Insects ziemlich die richtige Form des Ameisenkopfes; auch die Fühler erscheinen abgekürzt und von der Basis etwas verdickt, sodass die gebrochene Form (der Ameisenfühler) so gut als möglich nachgeahmt erscheint.* Das Pronotum ist sehr bucklig, und auch die Hinterschenkel haben ihre normale Stärke zu Gunsten der Ameisenform nach Thunlichkeit eingebüsst.* Durch Verdeckung der Abdominalbasis durch rein weisse Seitenbinden werden vollkommen scharf die Contouren des Ameisenleibes nachgeahmt und dadurch das Bild der letzteren dargestellt.* Auch hier dürfte der Schutz besonders gegen den Angriff von Grabwespen wirksam sein.

2. Mimetische Anpassung unter den Hemipteren.

Während bei einzelnen neotropischen **Heteropteren** (Coreoden) eine lycoide (blau-gelb-blaue) Färbung der Flügeldecken vorkommt (*Petalops cardinalis* Stål; *Paryphlaectus* F.; *P. flavicinctus* Stål), so macht doch diese allein die *Lygaeus*-Ähnlichkeit, welche wir bei den Käfern genauer besprechen werden, noch nicht aus. Aehnliches gilt für die etwas an Coccinellen erinnernden Arten der afrikanischen Gattung *Sphaerocoris* Burm. (*S. Argus* F., Cap) und *Pachycoris* Burm., Angehörige der Schildwanzen.

Von den zahlreichen Fällen mimetischer Anpassung von europäischen Wanzen, welche O. Reuter²⁾ in einer besonderen Arbeit auseinandersetzt, beschränke ich mich auf die Aufnahme derjenigen, welche ich entweder nachprüfen konnte oder nach dem Text für besser begründet ansehen muss. Von denjenigen Formen, welche nur im Larven- und Nymphenstadium Ameisen gleichen, lebt die Larve der Coreide *Alydus calcaratus* L. in der That an den meisten Orten mit Arbeiterameisen der *Formica rufa* L. zusammen, der sie auch in dem gewandten Laufe derart gleicht, dass es einiger Aufmerksamkeit bedarf, um sie zu unterscheiden. Hierzu trägt nicht nur die röthliche Farbe des Thorax bei, sondern auch die Form des Hinterleibes, denn letzterer ist an der Basis deutlich eingeschnürt und hinten etwas aufgeblasen. Auch sind die Beine noch verhältnissmässig kurz und dünn und denen der Ameise ähnlich gefärbt, und die Fühler sind wie bei letzterer an der Basis aufgehellt.

Von Capsiden erinnert bei *Mimocoris coarctatus* Muls. et Rey (Mittelmeerländer) nach Reuter nur das schwarzbraune Weibchen mit verkümmerten Flügeln, lebhaft rothbraunem Kopf und Pronotum, und an der Basis eingeschnürtem, hinten erweiterten Hinterleibe an Ameisen, in deren Gesellschaft es lebt. Gleiches gilt nach Reuter für das seltene Weibchen von *Systellonotus triguttatus* L., welches nur rudimentäre Flügeldecken besitzt und nach Douglas (l. c.) mit dem der *Formica fusca* zusammenlebt. Nach Flor (Die Rhynchoten Livlands, Dorpat 1860, I, p. 182) hat das Weibchen auch durch seine Behendigkeit grosse Aehnlichkeit mit einer Ameise.

Endlich findet sich nach Reuter in beiden Geschlechtern eine ausgesprochene Aehnlichkeit mit Ameisen, die dem Hemipterologen besonders auffallen mag, bei einzelnen kleineren, weichen Formen derselben Familie (Capsiden). So erinnern *Pilophorus bifasciatus* (*cinnamopterus* Kirschb.), der

¹⁾ C. Brunner v. Wattenwyl, Ueber hyperbische Nachahmungen bei den Orthopteren (Verh. zool.-bot. Ges., Wien 1883, p. 248, Taf. XV, Fig. 1, a, b).

²⁾ O. M. Reuter, Til Kämedomen om minnska Hemiptera etc. (Öfvers. Finska Vetenskaps Soc. Förbandl. XXI, 1879, p. 149—198).

auf Kiefern zusammen mit *Formica congerens* geklopft wird. *P. clavatus* L., der mit *Lasius fuliginosus* an Birken, Weiden und Erlen herumkriecht, *P. confusus* Kirschb., der mit *Lasius niger* oft an Weidenbüschen lebt, an Ameisen. Von der nordischen *Myrmecoris gracilis* Sahlb. erwähnt Reuter (l. c. p. 174—175), dass die var. *rufuscula* der *Formica rufa* und die var. *fusca* der *Formica fusca*, mit denen sie auf trockenen Wiesen leben, gleicht. Auch *Diplacus* und *Camponotiden* werden noch von Reuter als in beiden Geschlechtern ameisenähnlich angeführt.

Der durch die Ameisenähnlichkeit erreichte Schutz dient wohl hauptsächlich der grösseren Sicherheit vor den Angriffen solcher Insecten (Mordwespen etc.), welche sich hauptsächlich (z. B. *Tachytes*) von Wanzen nähren. Dafür spricht auch die ebenfalls von Wallace im „Darwinism“ übernommene Beobachtung von Belt (l. c. p. 319), dass *Spiniger luteicornis*, mit schwärzlichen Flügeln und gelben kurzen Antennen, „mit beiden genau wie eine Wespe (*Priocnemis*) vibriert“, welche Bewegung seinen Familiengenossen sonst fremd ist.

Wahrscheinlich sind unter den **Homopteren**, die ja stets des Schutzes der Stinkdrüsen entbehren müssen, welche gewisse Wanzen wahrscheinlich in hohem Grade widrig machen, mimetische Formen zahlreicher entwickelt, als uns anzuführen möglich ist.

So erwähne ich nur, dass manche neotropische Arten von *Heteronotus* Lap., einer Gattung der Buckelzirpen, durch die gelben Querringe des braunen Körpers an *Polistes*- und *Exoneues*-Arten erinnern.

Noch mehr ähnelt eine südamerikanische Tettigouien-Art des Mus. Berlin (Nr. 6584) mit an der Basis verengtem Leib und gelblichem Hinterrande der sonst gelbbraunen Ringe und mit glasigen, schwach verdunkelten Flügeln von über Leibeslänge, entsprechend gefärbten *Polistes*-Arten derselben Gegend.

Doherty und Hartert¹⁾ erwähnen, dass eine grosse Cicade einem indischen Tagfalter *Thaomantis Aliris* Westw. gleicht, der sich (s. u.) durch widrigen Geruch auszeichnet.

3. Mimetische Anpassungen unter den Hymenopteren.

So zahlreich die Fälle sind, in denen stechende Hymenopteren als Modell der Anpassung seitens wehrloser Insecten anderer Ordnungen dienen, so selten sind die Beispiele gegenseitiger Anpassung unter den Aderflüglern; Fälle der Anpassung an andere Ordnungen dagegen kenne ich nicht.

Nach A. Handlirsch²⁾ gleichen mehrere Arten von Grabwespen Vertretern anderer Familien (Vespiden, Scoliiden). So ist *Gorytes politus* Smith, der *Polybia chrysothorax* Web. (Brasilien, coll. Bescke), so *G. celatulus* Spm. der *Gayella eumenooides* Spm., so *G. robustus* Handl. dem *Odynerus Parredesii* Sauss., so *G. fuscus* Taschen, der *Nectarina Lecheguana* Latr. (Brasilien) ähnlich. Endlich erinnert der südeuropäische *Stizus tridentatus* an *Scolia hirta* Schreck auch in den Variationen der gelben Hinterleibsbinden. Nach Handlirsch sind in diesen Fällen die Arten von *Stizus* und *Gorytus* als Nachahmer anzusehen, da ihr Habitus von dem ihrer zahlreichen Gattungsverwandten abweicht und der der Vespiden- und *Scolia*-Art auch den Gattungstypus darstellt, und beruht der Vortheil dieser Anpassung vielleicht darauf, dass die mimetischen Arten in dem erborgten Kleide ihrer Hauptbeute, den Cicadinen, um so leichter sich annähern können, da letztere von Vespiden und Scolien nichts zu fürchten haben.³⁾

¹⁾ E. Hartert, Biologisches aus dem indischen Faunengebiet (Berliner entomol. Zeitschr. Bd. XXXIII, 1889 p. 29).

²⁾ Vergl. Sitzungsber. zool.-bot. Ges. Wien 1888.

³⁾ Wahrscheinlich sind Vespiden und Scolien auch im Besitze der gefährlicheren Verteidigungswaffen und deshalb von den Feinden der Hymenopteren mehr gefürchtet und weniger verfolgt.

Während sich die Goldwespen (*Chrysidae*) durch eigene kräftige Waffe und stahlharte Panzerung gegen die Angriffe der Bienen, Wespen und Grabwespen wehren, in deren Bauten sie ihre „Kuckuckseier“ unterbringen, und die buntfarbigen Heterogynen (Scolien und Mutillen) durch die Gefährlichkeit des Stachels in genügendem Grade geschützt sind, tragen schwächere Arten das Kleid ihrer Wirthe, um in das Nest derselben Zwecks der Eiablage sicherer einzudringen. So gleichen nach Gerstäcker (l. c. p. 411) die Schmarotzergattungen *Meloea* und *Collyris* im Habitus am meisten denjenigen nestbauenden Apiarien, deren Parasiten sie sind, nämlich *Anthophora* und *Megachile*. Noch höher ausgebildete Anpassungen an Vespiden kommen z. B. in den Tropen Südamerikas vor. So ist eine Chalcidide *Polistomorpha Surinamensis* Westw. nach Gerstäcker eine „in der That vollendete Nachbildung von *Polistes testacea* F. und *Chalcis emarginata* und *punctata* F. sind ebenso vollkommene Copieen von *Polybia Cayennensis* F“. Leider kennen wir bisher die Wirthe der betreffenden Chalcidier noch nicht und müssen uns daher hüten, aus der Aehnlichkeit einer schmarotzenden mit einer zellenbauenden Art schon auf ein Gegenseitigkeitsverhältniß beider zu schliessen. So erinnert z. B. *Sapyga repanda* Spin. (Heterogyna) an *Polistes gallica* F. und schmarotzt bei *Xylocopa violacea* L. Auf jeden Fall kann solche Aehnlichkeit mit einer gefürchteten räuberischen Art für das Freileben des geschlechtsreifen Parasiten und vielleicht auch für Eindringungsversuche in fremde Nester nur von Nutzen sein.

4. Mimetische Anpassung unter den Neuropteren.

Die lange bekannte Aehnlichkeit der schnakenartigen **Bittacus**-Arten dürfte auf eine mimetische Anpassung des Verfolgers an den Habitus seiner Opfer zurückzuführen sein¹⁾ und findet sich ebenfalls bei einer neotropischen Art des Mus. Berlin mit verdunkelten Flügeln ausgesprochen. Nach v. d. Osten-Sacken²⁾ lebt der californische *B. apterus* Mac. Lachl. auf offenen Grasplätzen und klettert mit grosser Behendigkeit an Halmen, Mäunern u. s. w. umher. An denselben Localitäten kommt auch eine im männlichen Geschlecht ungeflügelte *Tipula*-Art vor, welche er, nach den Beobachtungen Osten-Sacken's aussag, sodass Tipuliden vielleicht die gewöhnlichen Beutethiere jenes *Bittacus* sind.

Unser europäischer **Drepanopteryx phalaneoides** L. gleicht einem kleinen Spinner (*Drepana lucidinaria* L.), und Fr. Brauer³⁾ führt von ihm an, dass „die Imago sich von Lepidopteren nährt, deren Flügelschuppen man im Magen noch gut erkennen kann“.

5. Mimetische Anpassung unter den Coleopteren.

Die zahlreichen Fälle von Mimicry unter den Käfern lassen sich zerlegen in:

1. Anpassungen an durch Widrigkeit geschützte Angehörige derselben Ordnung;
2. solche an Vertreter anderer Insectenordnungen.

¹⁾ Vergl. die lebensgrösse Abbildung Fr. Brauer's von *Bittacus* (Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1855, Tab. II, Fig. 5—6).

²⁾ v. d. Osten-Sacken in Wiener entomol. Zeitung 1882, p. 123.

³⁾ Fr. Brauer, Beitr. zur Kenntn. d. Verwandl. d. Neuropteren (Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1855, p. 724).

a. Als Modelle dienende Formen der Käfer.¹⁾

Vielleicht sind alle Angehörige der **Malacoderma**, von denen keine Form eine besonders ausgebildete Schutzfärbung besitzt, in mehr oder minder hohem Grade vor den Angriffen der Insectenfresser sicher. So werden nach J. Weir Arten unseres europäischen *Telephorus* von allen Vögeln verschmäht.

Vergl. Tab. XIII
Fig. 103, 106
u. Tab. XIV
Fig. 108.

Eine besonders in den Tropen verbreitete Familie der Malacodermen, die **Lyciden**, tragen Flügeldecken, welche dem Körper meist nur flach aufliegen, ohne ihn zu umschliessen, vier starke Längsrippen besitzen und sich oft nach hinten erweitern. Die Fühlerglieder sind vom vierten Gliede an meist verbreitert und schwach gesägt. Wahrscheinlich hatten alle Vertreter dieser Familie ursprünglich die gleiche Färbung, ein helles, in der Mitte dunkler gefärbtes Halsschild und gelb- oder rothbraune Flügeldecken mit einem basalen und einem apicalen dunkleren Querbande. Die Endformen der Entwicklungsreihe sind oft einfacher gefärbt; so tragen Arten der australischen Gattung *Metricorymbus* ganz schwarzbraune Flügeldecken, und während einzelne Formen der specifisch neotropischen Gattung *Colopteron* einfarbig stahlblau sind, besitzen andere keine oder geringer ausgebildete dunkle Bänder.

Die Lyciden finden sich nach Lacordaire (l. c. IV, p. 291) auf Blumen und im Holz und stellen sich tod, wenn man sie berührt „en contractant leurs pattes et fléchissant leurs antennes“. Beim Kriechen über Blätter heben und senken sie nach Belt (l. c. p. 317) ihre Flügeldecken in charakteristischer Weise. Ihre Larven leben meist in faulenden Baumstämmen von animalischer Nahrung und einige von ihnen (*Homalidus* [Europa], *Lycostomus* [Indien]) leuchten.²⁾ Die Puppen hängen sich nach Bourgeois³⁾ frei wie die der Coccinellen auf. Die Lebensfähigkeit der Käfer ist trotz ihrer zarten Körperbedeckung ausserordentlich gross.

Unter den **Lampyriden**⁴⁾, deren Kopf oft unter dem breiten Thorax verborgen ist, sind es hauptsächlich grössere neotropische, am Tage meist auf Blättern ruhende Formen, welche in geringerer Masse als die Lyciden als Modelle der Nachahmung dienen, so *Aspidosoma* Lap.

Diejenigen **Melasomen**, welche als Modelle der Nachahmung seitens der Vertreter anderer Käferfamilien angesehen werden dürfen, „se plaisent à la lumière“ und sind gerade im Sonnenschein sehr beweglich. Zahlreiche Arten unter ihnen leben auch an Schwämmen und hauchen nach Lacordaire (l. c. V, p. 10) „une odeur particulière d'une nature ammoniacale“ aus. Andere Arten besitzen dagegen meist „une odeur fétide et qui persiste longtemps après qu'on les a touchés“. Die Lebensfähigkeit der Melasomen ist oft ausserordentlich gross. Unter den epigäischen Gattungen erwähne ich hier die Tentyrien Afrikas, „diurnes, courantes avec agilité à l'ardeur du soleil“, und die südamerikanischen flinken Nycteliden, zu denen auch *Callynthra* Sol. gehört.

Vergl. Tab. XIV
Fig. 117.

Zahlreiche **Curculioniden** besitzen so stahlharte Flügeldecken, dass der weiche Schnabel eines insectenfressenden Vogels ihnen nichts anhaben kann. Andere Arten, welche auf und von Blättern leben, dürften durch ihre bestimmte Nahrung ungeschmackhaft für ihre natürlichen Feinde geworden sein.

¹⁾ In der Reihenfolge der Familien und der Angabe der biologischen Notizen schliesse ich mich an das classische Hauptwerk von Th. Lacordaire, Genres des Coléoptères, an.

²⁾ Auch hier dürfte das Leuchten nur als Schutzmittel gegen Angriffe der Feinde dienen, wie bei den Geophiliden.

³⁾ Bourgeois, Monogr. des Lycides (L'Abbeille XX, 1882 pp).

⁴⁾ Die Lampyriden wurden nach Belt (l. c. p. 317) stets von seinem Affen verschmäht und auch seine jungen Hümer wollten sie nicht anrühren.

Manche der **Hispiden** („Stachelkäfer“) sind durch einen widrigen Duft ausgezeichnet, der nach Bates besonders bei einigen neotropischen Formen auffällt. Die Larven sind phytophag, und so werden auch wohl die Käfer durch bestimmte Pflanzennahrung immun.

Im Allgemeinen an Schwämmen lebend, kommen die **Erotyliden** nach Lacordaire (l. c. XII, p. 8) doch auch auf Blättern vor. „Tous les Erotyhens et surtout les grandes especes exhalent tout a fait le même odeur que les *Diaperis*, les *Allecula*, qui vivent également sur les bolets.“

Bei einigen Gattungen der **Coccinelliden** (*Epilachna* etc.) sind die Larven phytophag; meist aber leben sie von animalischer Kost. Die Käfer sondern einen unangenehm duftenden Saft aus. Auch wurde nach Poulton l. c. unsere *Coccinella septempunctata* von Fröschen ohne jede Berührung verschmäht, nach Miss Candeil jedoch im Winter von (hungrigen) Laubfröschen gefressen.

b. Mimetische Anpassungsformen der Käfer an Angehörige derselben Ordnung.

In einem inhaltsreichen Aufsatz über die „Analogieen im Habitus zwischen Coleopteren-species verschiedener Gattungen“ hat O. Thiemé¹⁾ zahlreiche Beispiele von Formähnlichkeit zusammengestellt, welche ich, nachdem die Sammlung des Herrn Autors von dem zoologischen Museum in Berlin erworben war, auch dort habe nachprüfen können. Ohne mich in eine Erörterung aller dieser manchmal etwas gesuchten Analogieen (z. B. *Pelonia trifasciata* — *Dictyoptera eximia*) einlassen zu wollen, werde ich nur diejenigen erwähnen, welche mir als mimetische Anpassungen erscheinen, bemerke jedoch, dass ich mich absichtlich in der Zahl der Beispiele beschränkt habe, da ich überzeugt bin, dass die Erfahrung der Sammler und Systematiker uns gerade in dieser so gut durchgearbeiteten Insectenordnung noch reiches biologisches Material bringen wird.²⁾

Die in der That vorhandenen Analogieen in Form, Sculptur und Färbung, welche O. Thiemé zwischen **Laufkäfern** (Carabiden) und Heteromeren gleichen Fundortes, so zwischen dem algerischen *Carabus cybellocephalus* Fairm. und der nächtlichen *Morica* Sol., zwischen dem californischen *Catostoma Wilkesii* Lee. und *Elowades*-Arten, zwischen *Cal. atrorivens* St. und *Pasinachus mexicanus* Gray erwähnt, sind nicht so entschieden und bestimmt ausgebildet, dass man sie nicht schon aus der blossen Wirkung gleicher Existenzbedingungen herleiten dürfte.

Dagegen möchte ich mit Thiemé in dem ebenfalls zu den Laufkäfern gehörigen *Agrilus fallaciosus* Chev. eine Anpassungsform an Arten von *Calliphora*, besonders *C. multivasta* Guér., sehen. Denn die Sculptur des hinten stark verschmälerten Halschildes und besonders der Flügeldecken besitzt bei beiden eine so auffällende Aehnlichkeit, dass der Artname des Laufkäfers darin seine unbedingte Erklärung findet. Der Rand der Flügeldecken ist abgesetzt und radial gefaltet, und die Scheibe trägt je drei scharfe Leisten. — Eine geringer ausgebildete Anpassung finden wir auch bei den capländischen *Polyrhina*-Arten an dortige *Trachypodus*-Formen. — Nach Bates erinnern die stark verschmälerten, metallfarbenen, schlanken *Agra*-Arten Brasiliens durch ihre langsamen, gemessenen, Bewegungen an die harten, gemeinen, den Rüsslern nahe stehenden *Brentidien* und leben ebenfalls auf Blättern.

¹⁾ Berliner entomol. Zeitschr. Band XXVIII, Heft 4.

²⁾ Als einen solchen neueren hervorragenden Beitrag zur Lösung biologischer Fragen erwähne ich Gahan und Saunders' „Biologia centrali-americana“, die allerdings noch nicht abgeschlossen ist.

Einige brasilianische Arten von *Lica* Esch., welche nach O. Thieme ebenfalls an Schwämmen (ob auch von ihnen?) leben, ähneln durch die weisslichen Binden auf leuchtartigem Grunde durchaus den Erytyliden; weiter ist auch die Streifung der Flügeldecken verschwunden, wie einige ursprünglichere Arten sie noch besitzen, und die Oberfläche derselben vollkommen glatt wie bei den Modellen. So erinnert *Lica scripta* Cast. mit zahlreichen, nahe der Basis quer angeordneten, hinten zerstreuten schwarzen Punkteflecken auf gelbbraunem Grunde an *Priotelus vigintipunctatus* F.; so ähnelt *L. elegans* dem *Megaprotus cypripium*, so *L. albosinuata* Putz. mit zwei weissen Querbinden auf den Flügeldecken dem *Iphicles flavosinuatus* Dej. auch durch die Haltung des Kopfes.

Unter den **Wasserkäfern**, den **Staphyliniden**, **Histeriden** etc., **Lamellicornien**, **Buprestiden** kommen keine Fälle mimetischer Anpassung vor.

Erst bei den **Elateriden** treten lycoid Färbungen auf, die bei einigen brasilianischen Arten, *Philodactyla brasiliensis* Cast. und *Cardiorhinus seminiger* Esch., auffallend genug sind, doch entspricht die Körperform nicht der des Modells in dem Masse, dass man schon an eine Anpassung an *Lycus* denken muss.

Wie bei den Schmetterlingen unter den Neotropinen und Heliconinen treffen wir auch unter den an und für sich wohl allgemein mehr oder minder immunen **Malacodermen** in den verschiedensten Gattungen lyeiforme Arten an, welche meist selten sind und zugleich der Masse ihrer Verwandten gegenüber offenbar abgeleitet erscheinen. So besitzt in der Gattung *Photuris* Lec. (Lampyriden) *Ph. lycoides* Cast. (Brasilien) ein breit gebroth gerandetes Halschild und dunkle Flügeldecken mit gelbbrauner Flügelbinde, welche nach hinten Lycus-artig erweitert sind.¹⁾ Auch in der zu den Telephoriden gehörigen Gattung *Chauliognathus* Hentz (*Callianthia* Dej.) treten, wie O. Thieme zuerst hervorhob, einzelne Arten auf, die als mimetische Anpassungen an die häufigeren und vielleicht auch mehr geschützten Lyciden erscheinen. Bei diesen Arten werden auch die Fühler breit und flach, sodass die Aehnlichkeit dadurch noch erhöht wird. Leider sind mir nur die Musealnamen der interessantesten dieser Formen der reichen Berliner Sammlung bekannt geworden, wie *vestitus* Mus. Dahin gehört auch der kleine bei Godman und Salvin abgebildete *Silis lycoides* Gorb.

Auch unter den **Melyriden** kommen lycoid Formen vor. So erinnert *Priocera dimidiata* Gerst. (Mombas) mit schwach verbreiterten, einseitig etwas gesägten Fühlern und dunklem Ende der Flügeldecken etwas an den ebenfalls afrikanischen *Lycus congener* Gerst.

Viele Formen der **Cleriden** besitzen nach Lacordaire keine härteren Flügeldecken als die Malacodermen. Daher wird es erklärlich, dass manche der Blumenbesucher, ausschliesslich seltene Arten, eine fremde Tracht angenommen haben, was wir wieder besonders bei neotropischen Formen ausgebildet sehen. Nach Gorbham (in der „Biologia centrali-americana“) ist die Gattung *Ichneua* „remarkable for the closeness with which its species mimic small Lycidae and Lampyridae“. Es gleicht z. B. nach den Abbildungen bei Godman und Salvin (ib.) die *Ichneua mexicana* Gorb. dem *Calopteron ichnoides* Gorb. und dem ähnlichen *Cal. mimicum* Gorb.; auch *I. histrio* Gorb., und die variable *I. disjuncta* Gorb. erinnert durch die hintere Verbreiterung der gelbbraunen, am Ende verdunkelten Flügeldecken und die Form der Fühler an *Calopteron*-Arten wie *Cal. affine* und *Cal. reticulatum* L. und an *Lygistopterus amabilis* Gorb. Diese Verbreiterung der Flügeldecken ist bei *Ichneua mexicana* im Weibchen (l. c. Taf. IX, Fig. 19) stärker ausgebildet. Ganz gelbbraune Formen von *Ichneua* erinnern an *Calopteron rufulum* Gorb.

¹⁾ Von lycoiden Lampyriden erwähne ich noch *Chalodes plumosa* und *Phaenolis laciniatus* als bei Godman und Salvin l. c. abgebildet.

Auch in der Gattung *Peloniium* Spin. giebt es einzelne gut ausgebildete Anpassungsformen. So erinnert das abgeflachte *P. Spinolae* St. (Caracas) mit hinten stark verbreiterten, leuchtend rothen, am Ende tiefblauen Flügeldecken und in der Mitte schwarzblauem, rothgerandetem Halsschild an *Dictyoptera eximia* Er. (Lyciden). Ebenso sind einzelne seltene Arten von *Platynopectera* Chevr. ausgezeichnete Copieen von *Calopteron*. So besitzt *Pl. lyciforme* Kl. gebrothe Halsschildränder und stark gerippte, hinten verbreiterte Flügeldecken mit rostgelber Mittelbinde, so erinnert auch *Pl. ampliatum* Kl. durch die lycopide Färbung seiner gerippten Elytren und die Form der breiten, innen stark gezähnten Fühler an *Calopteron*-Arten. Der südafrikanische *Placocerus dimidiatus* Kl. ähnelt durch Färbung und Fühlerform ebenfalls dortigen *Lycus*-Arten.

Unter den **Xylophagen** sind mir keine Fälle von Mimicry bekannt geworden.

Unter den **Melasomen** giebt es einzelne seltene neotropische Arten, welche trotz der fast allgemeinen Immunität der Familienangehörigen doch noch in dem Kleide der zahlreicheren oder verhältnissmässig besser geschützten Vertreter anderer Familien Schutz vor den Nachstellungen der Feinde ihrer Gattung suchen. So erinnert *Campsia irrorata* Dahm. (Brasilien) durch das schwarze Halsschild und die stark gewölbten, gelbbraunen, schwarz punctirten Flügeldecken an einen dem *E. giganteus* F. nahestehenden *Erotylus*. Auch der hochgebuckelte, mit schwarzer Querbinde der gelbbraunen, schwarz punctirten Flügeldecken versehene *Spheniscus erotglöides* kann nur als Anpassungsform an stark gebuckelte *Erotylus*-Arten, wie *E. annulatus* Lac., aufgefasst werden. Aehnlich erinnert *Pygaisia undata* F. mit ihren charakteristischen Zeichnungen auf rothbraunem Grunde an *Pselaphacus oblongus* und *Ischyrus brasiliensis*, und ähnelt, wie O. Thiemer ebenfalls hervorhebt, *P. hieroglyphica* Perty „mit der so eigenthümlichen Zeichnung von gereihten Kreisen“ und Zackenbinden an *Iphicles*-Arten, also ebenfalls an *Erotyliden*.

Unter den **Ripiphoriden** macht der seltene *Ancholaemus lyciformis* Gerst. mit hinten etwas erweiterten, im letzten Drittel schwärzlichen Flügeldecken (Brasilien) durch seine Färbung einen offenbar *Lycus*-artigen Eindruck.

Trotzdem nach Lacordaire manche Arten der Familie der **Vesicantien** „exhalent une odeur particuliere, pénétrante et analogue à celle des souris“, sich bei Berührung todt stellen und sehr lebenszäh sind, zeigen doch einzelne selteneren Formen von *Tetronyx* eine gewisse *Lycus*-Aehnlichkeit, und bei *T. depressa* Kl. (Brasilien) mit seitlich gelbbraunem Halsschild und solcher Mittelbinde der dunklen Flügeldecken tritt durch die hinten verbreiterte Form der letzteren eine grosse Aehnlichkeit mit *Calopteron reticulatum* F. auf.

Unter den **Oedemeriden** ist eine schöne *Ditylus*-Art des Mus. Berlin aus Queensland bis auf das dunkelstahlblane letzte Drittel der Flügeldecken vollkommen rothgelb, und Aehnliches gilt für die noch auffallendere *Asclera festiva* Mus. (Cuba): so erinnern beide an dort vorkommenden Lyciden. — Von der Gattung *Pseudolycus* Guér. erwähne ich nur von Vandiemensland *Ps. haemorrhoidalis* F. mit schwarzbraunen, hinten aufgehellten Flügeldecken, der an *Metricorhynchus marginatus* Er. erinnert, und *Ps. haemopterus* Er. mit rostbraunen Flügeldecken, der *Metr. erythropterus* Er. sehr ähnlich ist.

Unter den **Curculioniden** tragen nur gewisse Rhynchitiden das fremde Kleid der Lyciden. So erinnert der in seiner Färbung sehr veränderliche *Homalocerus lyciformis* Germ. (Brasilien) mit hinten erweiterten Flügeldecken, vorn stark verengtem Thorax, besonders am Weibchen in der Mitte erweiterten, und abgeflachten Fühlern an dunkle Varietäten von *Lycus reticulatus* L. Der ebenfalls neotropische *H. nigripennis* Hope gleicht dagegen ziemlich genau dem *Telephorus varians* Kl. (nec. Rosenh.) des Mus. Berlin.

Ähnlich erinnern die Arten von *Rhinotia* Kirby an die der fast ausschliesslich australischen Lyciden-Gattung *Metriorhynchus* Guér., so *Rh. haemoptera* Kirby mit deutlich von Längsleisten und Querrunzeln durchzogenen Flügeldecken an den *Metr. vaupeensis* F., und eine kleinere unbenannte Form des Mus. Berlin (Queensland) hat noch deutlichere Flügeldeckensulptur und viel breitere Fühler.

Unter den Bockkäfern, **Cerambyciden**, deren Larven allgemein im Holze leben, sind mimetische Anpassungsformen, analog denen der Sesien und Castnien unter den Schmetterlingen, weit verbreitet, in gewisser Zahl schon von Bates aufgeführt und auf seine Autorität hin von Wallace übernommen. Leider war es mir nur in wenigen Fällen möglich, diese Beispiele nachzuprüfen, ich erwähne daher die mir unzugänglich gebliebenen unter dem Namen ihres Begründers am Schluss der Familie. Sehr zahlreich sind die lycoiden Formen in der neotropischen Region vertreten, aber nur verhältnissmässig wenige und seltene Arten zeigen eine so ausgebildete mimetische Anpassung, dass sie von den zahlreichen Feinden der Cerambyciden für Lyciden gehalten werden dürften.¹⁾

Vergl. Tab. XII,
Fig. 101

Erst in der Gattung *Pteroplatys* Bug., die kleinere, weichhäutige Formen umfasst, bildet sich die Anpassung an *Calopteron*-Arten höher aus. So erinnert *Pt. radiatus* (Mus. Berlin) an *Cal. reticulatum* F., auch in der starken hinteren Erweiterung der Flügeldeckenform; so ähnelt *Pt. variabilis* Sallé (Venezuela) von leuchtend rother, hinten tief violblauer Färbung dem *Cal. bicolor* Ol. und ähnlichen Arten, so *Pt. lyciformis* Germ. mit etwas weisslicher Mittelbinde der Flügeldecken anderen *Calopteron*-Arten.

Vergl. Tab. XII,
Fig. 107 u. 108.

Ähnlich ist die Gattung *Eroschemia* Pascoe durch mimetische Anpassungen an die australische Lyciden-Gattung *Metriorhynchus* ausgezeichnet, die sich in der Verbreiterung der Fühler und den drei gleichmässigen Längsrippen und feinen Querrunzeln der Flügeldecken ausspricht. So erinnert das *E. Poucra* Pascoe mit schwarzem Halsschild und rostbraunen Flügeldecken an den etwas breiteren *Metriorhynchus erythropterus* Er. (N.-S.-Wales). Auch *Stenoteras*-Arten erinnern an Metriorhynchen.

Andere Bockkäfer erinnern an Curculioniden, welche sich durch die Härte ihres Chitinpanzers (oder Immunität?) auszeichnen.²⁾ Hierher gehören besonders die von K. S e m p e r auf den Philippinen entdeckten und l. c. p. 236 abgebildeten Beispiele, deren Namen ich nicht ergänzen kann. So gleicht der *Doliops curculionoides* Waterh. einem *Pachyrhynchus*, *Doliops* sp. dem *Pachyrhynchus orbifer*; auch einige *Halbryna*-Arten erinnern nach Gerstäcker durchaus an bestimmte Arten derselben Rüsselkäfergattung. Weiter gleicht auch *Aprophata nota* Newm. (Manila) Arten wie *Pachyrhynchus decussatus*. Dagegen erinnert der seltene *Stychus amycterooides* Pascoe (Australien) durch die Höckerreihen der Flügeldecken und die Körperform auffallend an eine der zahlreichen dortigen *Amycterus*-Arten, so an *A. Schönherri* Hope mit ausserordentlich hartem Panzer.

Vergl. Tab. XII,
Fig. 102 u. 103.

Bei den **Lamiinen** giebt es besonders in der neotropischen Region wieder einzelne lyciforme Arten. In der Gattung *Hemilophus* Serv. (*Spathoptera* Serv.), erinnert *H. amictus* Klug (Bahia) und *H. lyciformis* (Mus. Berlin) mit gelben Seitenrändern des Halsschildes und hinten schwach erweiterten Flügeldecken an *Calopteron reticulatum* F., so der weissbindige *H. togatus* Klug an das gleichgefärbte *Cal. fastidiosum* Dej. Auch *H. radiosus* Ahr., *H. pallidus* Kl., *H. amplidus* Kl. mit schmaler gelber Mittelbinde und schwacher axillarer Aufhellung der Flügeldecken erinnern an Lyciden. Weiter ähnelt auch eine indische Art, *Ephies dilatatorius* Pascoe (Borneo), nach der Abbildung dortigen *Lycus*-Arten.

¹⁾ Der Bockkäfer *Evander nobilis* Bates, welcher dem *Calopteron basale* Kl. ähnelt, ahmt nach B e l l (l. c. p. 317) auch die oben erwähnten Bewegungen der Lyciden nach.

²⁾ Ueber die Nahrungspflanze der Larven dieser Arten ist nichts bekannt.

An lyciformen neuen centralamerikanischen Arten, die Bates in der *Biologia centrali-americana* herausgab, erwähne ich noch *Tethlinea albica* Bates (Nicaragua), die an *Lygistopterus unabilis* Gorb., und den einfarbig rothgelben *Erythropleptus eros* Bates, der an *Calopteron rufulum* Gorb. erinnert. Ausgezeichnet durch die Abflachung und hintere Erweiterung der Flügeldecken ist besonders *Lycidola* Bates, deren eine Art, *L. Belli* Bates, dem stark verbreiterten *Calopteron corrugatum* Gorb. und anderen Arten sehr ähnlich ist.

Andere Bockkäferformen haben das Kleid der Lampyriden entliehen. So gleicht nach Bates, l. c. p. 219, die Gattung *Lampyris* Bates kleinen *Photinus*, und auch *Tyrinthia photurina* erinnert durch den hellen Seitenrand des Halsschildes an *Photuris*-Arten nahe *molliis* Gorb. So bildet sich in der Gattung *Tropidosoma* bei *Tr. Spencei* Krby, eine wegen des schmalen Körpers in der Form recht unvollständige, in der Färbung dagegen besser durchgeführte Aehnlichkeit mit der grossen Lampyride *Lampyris Latreillei* Krby. heraus. Hierher gehört auch der einzige mir bekannte Fall einer mimetischen Anpassung in der Abtheilung der *Prionini*, der *Otocethus melanurus* Bates (Chontales, Nicaragua).

Sehr selten sind Anpassungen der Böcke an andere Käferfamilien. So erinnert *Ctenodes miniata*^{Vergl. Taf. XIV, Fig. 120-121.} Klug (Pora) mit blutrothem Halsschild und einzelnen solchen Tüpfeln und Kielen auf den abgekürzten Flügeldecken durchaus an eine Hispide, *Cephalodonta spinipes* Baly, mit auf schwarzem Grunde vortretenden blutrothen Warzen, welche auf den Blättern einer Kletterpflanze (*Aristolochia*) in grösseren Mengen lebt. Ihr gleicht auch nach Bates der *Erythroplatys corallifer* White (Cat. Long. Brit. Mus. p. 202, Taf. V. 2) aus Santarem, der auf den Blumen eines Baumes vorkommt, und (Trans. Ent. Soc. p. 422 [1870]) weiter der *Streptolabis hispidus* Bates (Ega).

Noch seltener sind Anpassungen an Erotyliden. So gleicht der schöne *Pocillopeplus corallifer* St.^{Vergl. Taf. XIV, Fig. 122-123.} mit rothen Schulterecken und gelbbraunen, mit queren Zackenbändern gezierten Flügeldecken besonders in den breiteren Weibchen dem häufigen *Erotylus hostrio* L. (Brasilien).

Weiter erinnern nach Bates¹⁾ zahlreiche brasilianische Cerambyceiden, die ich nicht vergleichen konnte, an Curculioniden; so *Phacellocera dorsalis* White an *Heilipus* sp. und *Phacellocera Batesii* Pascoe (Ega), die mit gerade vorwärts gestreckten Antennen über die Stämme kriecht, an eine grüne Art von *Ptychoderes* (Anthribiden). So lässt *Gymnocerus eratosomoides* Bates an *Eratosomas*-Arten denken, denen er auch durch die grossen basalen Höcker der Flügeldecken gleicht: „the shortness and slenderness of the antennae rendering these organs almost invisible at a short distance, also assist in perfecting the disguise, which completely deceived me, when I saw the insect in situ.“

Trotzdem wir eine Hispide als Modell für Cerambyceiden kennen lernten, treten doch unter dieser Familie in Südamerika eigenthümliche Färbungen auf, die wir nur als mimetische Anpassungen der vielleicht selteneren Art an die Lyciden auffassen dürfen. So erinnern nach den Abbildungen bei Godman und Salvin, *Biologia centrali-americana*, wie mir Herr Custos Kolbe in Berlin gütigst mittheilte, *Cephalodonta Championi* und *Chalepus congener*, *Ch. contiguus*, *Ch. alienus* durch die längs der Mitte und hinten schwarze, seitlich gelbe Färbung der Flügeldecken und des Halsschildes an das *Calopteron imitator* Gorb. Weiter erinnert *Chalepus alienus* an *Calopteron reticulatum* F. (mit schwarzen, von gelber Schultermarkel und Querbinde unterbrochenen Flügeldecken), *Cephalodonta juveni* an *Calopteron tricastatum*, *Chalepus posticatus* an den *Lycostomus senicius* Cheor, und *Chalepus Waterhousei* an *Calopt. melanopteron* Luc.

Unter den **Chrysomeliden** finden sich in der südamerikanischen Gattung *Doryphora* Stål zahlreiche Arten,

¹⁾ Ann. Mag. Nat. hist. 3. ser. IX, p. 458-599.

welche durch hochgelbe Farbe und oft bis in's Détail hinein wiederholte Zeichnung durchaus an schwammfressende Erotyliden derselben Gegend erinnern, mit denen sie nach O. Thiemé¹⁾ zusammen leben. Es ist nun noch festzustellen, ob sie oder auch ihre Larven in der That wie die Erotyliden von Baumschwämmen leben und durch diese Nahrung ebenso immun werden wie die Schwammfresser. Sind die betreffenden *Doryphora*-Arten dagegen als Larven Blattfresser wie ihre Verwandten, so blieben sie wahrscheinlich auch als Imagines schmackhaft und nahmen als echte Nachahmer die Tracht der Erotyliden nur um des Schutzes vor Nachstellungen willen an. Als besonders bemerkenswerth sei hier noch die Aehnlichkeit der *Doryphora epilachnoides* Stål mit der *Epilachna radiata* Er. erwähnt; da es hier anscheinend die Solaneen-Nahrung der letzteren ist, welche sie immun macht und zur Anpassung von Seiten der kleinen *Doryphora*-Art führte.

C. Mimetische Anpassungsformen der Käfer an stechende Hymenopteren.

Zu diesen Anpassungsformen stellen nur zwei Familien ihr Contingent, welche durch schlanke und cylindrische Körperform und stärkere Behaarung dafür besonders geeignet erscheinen: die Cleriden und Cerambyciden. Unter den Cleriden gleichen die Arten von *Clerus* L. selbst grossentheils den in ihrem Verbreitungsbezirk häufigen flügellosen Weibchen heterogyner Hymenopteren, der Mutillen. Dazu trägt besonders die Haltung des Kopfes und das kurze, sammetartig behaarte Halschild bei, aber auch die Zeichnung der Flügeldecken gleicht oft der Körperzeichnung der Modelle. So lässt unser *Clerus mutilarius* mit an der Basis roth- und dahinter zweimal weissbindigen, deutlich behaarten Flügeldecken an die *Matilla europaea* L. mit rothem Halschild und zwei weissen Hinterleibshaarbinden denken, und dasselbe gilt in geringem Grade für andere europäische und nordamerikanische Arten. Ebenso gleichen die südamerikanischen Vertreter den dortigen zahlreichen Mutillen; so erinnert *Cl. Kirbyi* Syn. an Formen mit gelbem Halschilde und orangenen Abdominalflecken wie *M. quadrinotata* Kl. und *M. spinosa* Kl. (Mus. Berlin).

Die meist wenig vollkommenen Anpassungen der **Bockkäfer** an stechende Hymenopteren beschränken sich naturgemäss auf die eine Unterfamilie der Cerambyciden, welche einen langgestreckten Leib besitzt. Unter diesen ist es wieder die eine Gruppe der *Malorchus*-artigen Gattungen, welche durch die meist abgekürzten oder klaffenden Flügeldecken und die stark geneigte Stirn schon das beste Material für diese Umwandlung bietet.

Wahrscheinlich entstand diese Gruppe aus *Clytus*-artigen Formen mit bunten Querbinden auf den Flügeldecken und wurde diese Zeichnung von hinten nach vorn mit der zunehmenden Verkürzung der letzteren auf dem Leibe selbst ausgebildet. Leider ist es mir in fast allen Fällen unmöglich gewesen, die etwaigen Modelle zu diesen nachahmenden Böcken festzustellen. So begnüge ich mich dem mit einem kurzen Hinweise auf die merkwürdigsten Formen.

Von bemerkenswertheren Fällen aus der Literatur sei hier der eigenthümliche, auch von Wallace erwähnte *Coloborhombus fuscipennis* Pryer²⁾ (N. Borneo) erwähnt, wohl das schönste der hierher gehörigen Beispiele, da der Bock durch die Färbung der Hinterflügel diejenige der Vorderflügel einer Raubwespe, *Mygalea aculeus* Sauss., wiedergibt und sich von ihr eigentlich auf den ersten Blick nur durch die verschiedene Länge des Antennen unterscheidet. — Hierher gehört auch der von Fr. Müller berichtete Fall der Aehnlichkeit der *Charis malipona* (?) mit einer *Melipona*-Art und die von Bates er-

¹⁾ Wegen der Analogieen zwischen den einzelnen Arten verweise ich auf Thiemé's Arbeit, welche gerade diesen Punkt ausführlicher behandelt.

²⁾ H. J. S. Pryer. On two remarkable cases of mimicry from *Elopura* (Trans. Ent. Soc. 1885, p. 369, Taf. X).

wähnte grosse Ähnlichkeit der *Sphcomorpha chalybea* Newm. (Brasilien), die ein gestieltes Abdomen besitzt, mit einer stahlblauen Mordwespe (? *Pepsis*).

Schliesslich erwähne ich noch die Arten von *Estheris* Newm., welche auf Anstradien beschränkt sind. Bei *E. ferrugineus* ist Kopf und Halsschild goldiggelb behaart und die Naht der Flügeldecken ebenso gerandet. Auch die Brust ist scitlich gelb behaart; ebenso sind die ersten Rückenplatten gelb und werden hinten von einem zwei Segmente begreifenden Gürtel begrenzt, auf den wieder ein gelbes Hinterleibsende folgt. Auch die Bauchplatten sind am Hinterrande gelb behaart und die Hinterflügel glasig. So tritt bei dem fliegenden und sitzenden Thier eine auffallende Wespen-Ähnlichkeit hervor. — Bei der kleineren *E. variegata* F. erinnert auch die Zuspitzung des Hinterleibes an die für Vespiden eigenthümliche Form.

Hierher gehört vor Allem ein oft citirtes Beispiel aus unserer Fauna, die Ähnlichkeit des *Malorchus salicis* F. etc. mit „Schlupfwespen“. In der That ist die Ähnlichkeit des Bockkäfers mit Arten wie *Anomalou heros* Wsm. recht auffällig, doch fehlen hier alle biologischen Beziehungen beider Arten zu einander und der Ichneumon ist wohl ebenso wenig geschützt wie der Bockkäfer, da ja die Entomophagen keine Giftdrüsen besitzen. So ist vielleicht die besonders im Fluge auffallende Hymenopteren-Form unseres Bockkäfers eine Anpassung an Arten von *Annophila*, welche ebenfalls die ähnliche Färbung des Hinterleibes besitzen. Dem Anpassungen der Böcke, die vielleicht ihrem eigenen Schutze gegen Grabwespen dienen, an letztere sind nicht selten. So erinnert auch der sammetschwarze *Colobus hempherus* F. (Java) mit langen düster stahlblauen Hinterflügeln und sehr langen blauen Beinen an Sphegiden.

6. Mimetische Anpassungen von Seiten der Lepidopteren.

Wie das Problem der Mimiery von Bates nach seinen Beobachtungen an Schmetterlingen aufgeworfen wurde, wird es auch stets sein bestes Beweismaterial in den Vertretern dieser Insectenordnung finden. In der Gliederung des umfangreichen Materiales, welches wegen seiner Bedeutung für die Mimiery-Theorie eine besonders weite Berücksichtigung verdient, haben wir uns veranlasst gesehen, innerhalb der auch schon in der Papilioniden-Arbeit aufgestellten natürlichen Verbreitungsbezirke zuerst die Anpassungen von Lepidopteren an einander zu besprechen, weil sie das Beweismaterial für unsere Schlüsse bilden. Dann folgen die Anpassungen von Lepidopteren an andere Ordnungen der Insecten, deren Erörterung weniger Aufschluss geben konnte.

a. Anpassungen unter Lepidopteren.

Auch in dieser Abtheilung werden zuerst die immunen Arten, welche als Modelle der Anpassung dienen, behandelt werden, und wird die Besprechung der nachahmenden Formen sich anschliessen.

1. Paläarktische Region.

In der paläarktischen Region sind bisher keine unanfechtbaren Fälle gegenseitiger Nachahmung von Schmetterlingen bekannt. Es dürfte dies unter Anderem daran liegen, dass keine durchaus immunen

Schmetterlinge in ihr vorkommen dürften, weil der allgemeine Mangel an Nahrungsmaterial die insecten-fressenden Vögel veranlasst, oft auch die unschmackhafteren Formen zu nehmen. So liessen einige gefangen gehaltene Sperbergrasmücken die ihnen von mir vorgeworfenen Stücke von *Zygana trifolii* zwar zwei Tage lang am Leben, am dritten aber frassen sie, von Hunger getrieben, die offenbar wenig wohl-schmeckenden Thiere doch. Aehnlich beobachtete auch E. G. Poulton¹⁾, dass *Z. filipendulae* von Vögeln mit Widerstreben genommen wurde, während die Eidechsen nach Butler's Experiment sie verschmühten. Dagegen wurde nach J. Weis *Porthesia auriflua* von Eidechsen gefressen. Auch *Spilosoma menthastrii* wurde widerstrebend von Rothkehlchen und *Emberiza schoeniclus* gegessen, aber von allen anderen Vögeln verschmüht, und Stainton warf dasselbe Truthähnen vergeblich vor. Die ähnlich auffallend gefärbte ebenfalls weissflügelige *Spilosoma lubricipeda* mit gelbem Leib wurde nur ausnahmsweise genommen.

Diese Beobachtungen veranlassten A. R. Wallace noch in seinem „Darwinism“²⁾ *Diaphora mendica* als Beispiel wahrscheinlicher Mimicry anzugeben, da ihr Weibchen dem *Spilosoma menthastrii* gleich und nach Wallace diese Aehnlichkeit erworben hat, um dadurch grösseren Schutz zu geniessen. Es sind aber beide Formen nach den Strukturmerkmalen so nahe Verwandte, dass sie nur künstlich in zwei Gattungen gebracht, am besten aber wieder im Genus *Spilosoma* vereinigt werden. So giebt auch das Weibchen von *D. mendica* in seiner Färbung nur die seiner nächsten Verwandten wieder³⁾, und auch die Raupe gleicht derjenigen von *S. lubricipeda*.

Der weitere von Meldola angegebene Fall einer mimetischen Anpassung den Wallace, l. c. p. 279, ebenfalls wiedergiebt, dass *Arctalia subsericeata* die ebenfalls zu den Geometriden gehörige *Asthena candidata* nachahmen soll, ist einfach zu streichen, da weder besondere biologische Gegenseitigkeits-beziehungen zwischen beiden Arten vorliegen noch die Aehnlichkeit besonders in die Augen springt.

Auch gegen die von Dietze angeführten Beispiele der Mimicry unter deutschen Schmetterlingen muss ich Bedenken äussern. So gleicht *Storia dealbata* L. ein weisser, an Waldrändern „bei Tage im Sonnenschein fliegender und an Blüthen saugender“ Spanner „mit langem Hinterleibe des Männchens und für eine Geometride sonderbar gebauten Flügeln“ nach Dietze, l. c. p. 281, „einem Weisslinge, besonders *P. Napi*, dessen Unterseite der Hinterflügel ebenfalls dunkel geadert wird“. Auch nach A. Seitz⁴⁾ copirt der weisse Spanner „den verschmühten Kohlweissling“. Nun wird letzterer aber von Vögeln viel verfolgt, wie ich häufig beobachtete; so sah ich ihn auch vom Sperling nehmen, was frühere Angaben englischer Beobachter (Nature III, p. 166) und die von A. G. Butler und Poulton, l. c. p. 246 bestätigen. Wie diese Art wurde auch *P. brassicae* nach Poulton, l. c. p. 45, „schnell von allen Eidechsen, aber wegen der grossen Schuppenflügel nicht gern“ gefressen und R. Trimen⁵⁾ sah, wie eine Schwalbe ihn verfolgte. Auch mehrfache Beobachtungen von Ornithologen bestätigen diese Angaben.

Uebrigens ist eine weissliche Flügelfärbung auch bei Spannern weit verbreitet.

¹⁾ E. G. Poulton, The experimental proof of the protective value of colour and markings in insects in reference to their vertebrate enemies. Proc. zool. Soc. London 1887, p. 248.

²⁾ A. R. Wallace, Darwinism, an exposition of the theory of natural selection. London 1889, p. 248.

³⁾ Schon C. Dietze spricht sich in einem Aufsatz „über einige Beispiele von Nachahmung bei Insecten“, Stett. ent. Zeitg. XXXII, 1871, p. 279, für diese Ansicht aus.

⁴⁾ A. Seitz, Betrachtungen über die Schutzvorrichtungen der Thiere. Zoolog. Jahrbuch. Abth. I. Systematik etc. III, p. 87.

⁵⁾ Trans. Linn. Soc. XXVI, p. 499.

Das zweite der zu erörternden Beispiele betrifft ebenfalls Angehörige verschiedener Familien, einen Brepheiden, *Brepheos parthenius* L., und einen echten Spanner, *Ploeseria diversata* S. V. Nach A. Rössler hat der Spanner, vorzüglich das Weibchen, in „Lebensweise, Flug und Färbung so grosse Aehnlichkeit mit dem gleichzeitig fliegenden *Brepheos*, dass hier nur an eine Nachahmung zu denken ist“. Nach Dietze stimmen beide auch „in der Eigenschaft, sich in's welke Laub oder auf feuchte Waldwege zu setzen und aufgeschreckt fast senkrecht in die Höhe zu fliegen,“ überein. Vorläufig ist jedoch erst der Beweis zu erbringen, dass *Brepheos*, welcher in diesem Falle als Modell anzusehen wäre, in höherem Grade immun ist als der Spanner. Die Nahrung (Betula) der Raupe macht dies aber wenig wahrscheinlich, und ihre Form deutet sogar auf Verwandtschaft mit den Spannerraupen hin.

2. Indo-australische Region.

a. Als Modelle dienende Familien und Gattungen.

Als Modelle der Anpassung dienen in dieser Region nur die Vertreter bestimmter tagfliegender Familien, welche besonders den Rhopaloceren angehören; vor allem Danaiden, Acraeiden und Angehörige der die Palaetropinen darstellenden papuanischen Gattung *Hamaedryas*.

Weiter müssen wir unter den Tagfaltern noch die zu den Morphiden gehörige Gattung *Troaris* Hb. (*Drasilla* Swains.), welche besonders im östlichen Theil des Gebietes vorherrscht, und die Arten der Untergattung *Pharmacophaenus* von *Papilio* als Modelle der Nachahmung ansehen.

Dazu kommen endlich auch einzelne Formen von Heteroceren, welche am Tage fliegen und besonderen Schutz vor den Nachstellungen der Insectenfresser zu geniessen scheinen, so Angehörige der Agaristiden (*Eusemia*) und der ihnen nahe verwandten Uraniden (*Heides*).¹⁾

1. Familie der Danaiden.

Diese formenreiche, besonders über die Tropen verbreitete Familie zeigt die charakteristischen Eigenthümlichkeiten immerer Schmetterlinge ganz besonders deutlich. „They are so tenacious of life, as to be able to bear considerable pressure between the finger and thumb without being killed. Birds and other insectivorous animals do not appear to be partial to these butterflies as food; they are probably unpalatable to them owing to their possessing a peculiar odour.“²⁾

Nach Marshall und Nicéville³⁾ fliegen die Danaiden aufgestört in langsamen, klappenden Flüge davon und zeigen keine Scheu. Diese Furchtlosigkeit rührt offenbar daher, dass sie vor den Angriffen ihrer Hauptfeinde, insectenfressender Vögel und Reptilien, durch einen „pungent semiaromatic odour“ geschützt sind, der die „Säfte ihrer Körper“ durchdringt; „these juices, when exuded by pressure, stain the skin yellow and leave a distinct odour.“ Auch Marshall und Nicéville heben die grosse Lebenszähigkeit hervor und schliessen, „that any individual which might be accidentally seized and afterwards dropped by a bird, has a good chance of escaping with immunity, when more delicately framed insects would be killed or hopelessly maimed.“ Dass manchmal auch die in Gefangenschaft gehaltenen Vögel noch die wohl-

1) Für die Tagfalter vergleiche man Dr. O. Staudinger's trefflichen Atlas (Exot. Schmetterlinge, I. Ffirtli 1888).

2) Note von Dr. Thwaites bei Moore, Lep. Ceylon, I, p. 2.

3) Marshall and de Nicéville, Butterflies of India, Calcutta 1882—1886, I, p. 22.

schneckenden Falter von den widrigen zu unterscheiden wissen, ergibt sich aus der Angabe I. Newton's (Nature III, p. 165), dass ein gefangener Bullbuld gern *Charaxes*-Arten annahm, nie einen Danaiden berührte. Nach Meldola (Proc. Ent. Soc. 1877, p. 12) leiden selbst die trockenen Danaiden der Museen nicht von Milben und anderen Feinden der Sammlungen, was später von anderer Seite bestätigt wurde, nach meinen Beobachtungen aber nur im Allgemeinen gilt.

Gehen wir jetzt zur kurzen Schilderung des Totalhabitus und der Lebensweise der einzelnen Gattungen der indischen Danaiden über, in der wir uns in der Anordnung besonders an F. W. Kirby's „Catalog der Tagfalter“ halten. Die wenigen Arten der Gattung **Hestia** Hb. zeigen einen einheitlichen Habitus. Vor Allem sind sie sämtlich über Mittelgrösse und haben eine Flügelspannung von mindestens 12 cm. Die Flügel sind von milchglasartig durchscheinender weisser Farbe und ausser von den schwarzen Rippen noch von ebenso dunklen Zellfalten und am Aussenrande von kurzen Intercostalfalten durchzogen. Dazu treten oft noch besonders in der Mitte und gegen den Aussenrand der Vorderflügel grosse schwarze Flecke. Der lange Hinterleib ist meist rahmweiss.

Der grossen Breite und stumpfen Abrundung der Vorderflügel entspricht der langsam-schwebende Flug der Hestien, den Moore⁴⁾ so anschaulich schildert: „the delicate wings . . . bend and undulate in the act of flight. It has a very slow floating flight, often poising nearly motionless, and is very easily caught.“

Nach S. Skertchly⁵⁾ ist *Hestia* sehr lebenszäh, setzt sich selten bei Tage und fürchtet keine Vögel, denn sie fliegt nie schnell und sucht nie ein Versteck auf.

Die Arten der Gattung **Ideopsis** Boisd. spannen meist 8—10 cm und besitzen einen ähnlichen Färbungscharakter der Flügel wie der von *Hestia*, nur sind hier die Intercostalstreifen am Aussenrande durch schwarze Flecke ersetzt, wie solche auch am Ende der Zellen und der Aussenrandrippen liegen; auch ist die Hinterleibsfarbe mehr lederbraun. Manche der philippinischen Arten (so *I. anaspis* Feld.) sind durch eine citronengelbe Färbung der Flügelbasis charakterisirt.

Meist fliegt z. B. *Ideopsis daos* nach Mittheilung der Herren Hartert und Staudinger, welche sie in Sumatra beobachteten, sehr langsam, und nach S. Skertchly (l. c.) besitzt sie wie andere Danaer eine grosse Lebenszähigkeit. Die zahlreichen und vielgestaltigen Arten von **Danaus** L. kann man nach dem Bau der Dufteinrichtung der Männchen und nach der Färbung ihrer Flügel zugleich in mehreren anscheinend natürlichen Gruppen vereinigen. Die Arten der Untergattung *Ralena*⁶⁾ zeichnen sich durch die Beschränkung der mäusegrünen Duftschuppen auf die zwei oder drei innersten Rippen (zweite Dorsalis und erster bis zweiter Cubitalast) der Hinterflügel aus und tragen einen einheitlichen Färbungscharakter. Die Grundfarbe ist weisslich, höchstens etwas safrangelb oder grünlichweiss und erhält sich meist in einer grösseren basalen Anflügelung, die von den dunklen Rippen durchzogen wird. Gegen den Aussenrand vereinigt sich die Zeichnung durch queres Zusammenfliessen der Flecke oft derart, dass auch bei den Flügeln ein breiter dunkler Aussenbord entsteht, in dem meist eine oder zwei Reihen von hellen Doppeltüpfeln der Grundfarbe auftreten, die durch Zerspaltung der marginalen und postmarginalen Binden entstehen. Oft ist auf den Vorderflügeln durch vom Zellende ausgehende Verdunkelung noch eine helle Subapicalbinde abgeschnitten, die sich in

⁴⁾ Moore, The Lepidoptera of Ceylon, London 1880—81, p. 3.

⁵⁾ S. Skertchly, On butterfly-emies (Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol 3, Nr. 18, 1889).

⁶⁾ Vergl. E. H. Cress, Duftapparate indo-austral. Schmetterl. III (Corresp. ent. Verein Iris, Dresden, Nr. 5, 1888), p. 287—292.

die Reihe der Marginaltüpfel fortsetzt. Die Grösse der Arten schwankt in den unbedeutenden Grenzen von 6—8 cm Flügelspannung. Kopf und Thorax tragen oben stets zwei Reihen weisser Tüpfel, und ebensolche grössere finden sich auf den ebenfalls dunklen Brustseiten. Die Farbe des Hinterleibes ist meist lederbraun.

Nach der Verzweigung der Radialäste der Vorderflügel müssen wir die anscheinend einheitliche Untergattung *Radena* jedoch in zwei Gruppen trennen; denn nur bei der *Cleona*-Gruppe (*Racaleba* Moore) entspringen die bei den ersten Radialäste vor dem Zellende und verlaufen frei, während in der *Aglea*-Gruppe sich der erste Radialast wie bei *Idropsis* und *Hestia* mit der Subcostalis kreuzt. So müssen wir nach dem ursprünglichen Aderverlauf, dem Zeichnung und Bau der Dufteinrichtungen nicht widerspricht, die *Cleona*-Gruppe als der Stammform der Gattung am nächsten stehend annehmen, während Fr. Müller und Distant die Untergattung *Auosia* dafür hielten.

Hierher gehört als abgeleitete Zeichnungsform der besonders in Nordindien, China etc. verbreitete *Dan. Tyllius* Gray mit grünlichblau aufgehellten Vorderflügeln und lebhaft rostrother Färbung der Hinterflügel.

Eine geringe Modification des Typus der *Cleona*-Gruppe tritt uns in der Untergattung *Tirumala* Moore entgegen, bei welcher der zweite Radialast der Vorderflügel hinter dem Zellende entspringt und die Duftschuppen in eine tiefe und enge, auf der Unterseite nach aussen klappenartig vorspringende Tasche zwischen Dorsalis und Cubitalis der Hinterflügel eingesenkt sind. Die wenigen hierher gehörigen Formen tragen auf dunklem schwarzbraunen Grunde mehrere Reihen grüner, meist gedoppelter Tüpfel.

In der Untergattung *Auosia* Hb. mit brandmalartig eingesenktem schwarzen Duftschuppenmapf der Hinterflügel bildet sich ein starker Contrast der Flügelfärbung aus, indem die Subapicalbände der Vorderflügel in dunklem Grunde oft noch weiss leuchtend hervortritt, die bei *Dan. Cleona* Cr. gelbliche breite Mittelbände aber sich besonders auf den Hinterflügeln stärker ausdehnt und eine rostbraune Farbe annimmt. Zugleich treten die Postmarginal- und Marginaltüpfelreihen noch auf der Unterseite beider Flügel deutlich hervor und erhält sich die dunkle Färbung der Rippen. Bei einigen Vertretern dieser Untergattung aus dem papuanischen Archipel wird die Grundfarbe stark verdunkelt (*Dan. sobrina* Boisid).

Sodürten wir Formen der *Aglea*-Gruppe (*Dan. Aglea* Cr., *Dan. Melaneus* Cr.) als diejenigen Formen ansehen, welche durch die Kreuzung des Radialastes mit der Subcostalis zu *Idropsis* überführen, mit der sie auch noch die Ausbildung des Duftapparates theilen. Die Gattung *Hestia* endlich, ohne Dufteinrichtungen auf den Hinterflügeln, würde den Endpunkt der Entwicklungsreihe indischer Danaiden bilden, zumal auch ihre Zeichnung durch Aufhellung am stärksten modificirt ist.

Von den zahlreichen biologischen Beobachtungen über einzelne Arten von *Danaus* sei erwähnt, dass nach Hutchinson¹⁾ *Tirumala Lamiaee* Cr. und *Radena Aglea* Cr. var. *ceylonica* einen langsamen und

¹⁾ Auch ich kann nach meinen kurzen in Indien bisher gemachten Erfahrungen diese Angaben nur bestätigen. Nie sah ich einen Vogel nach einem der oft überaus häufigen schwertälligen und furchtlosen rotbraunen Danaer schnappen, während an Weislingen besonders die *Catopsilia* oft von den Vögeln weit verfolgt wurden. Ebenso gelang es mir nicht, in Singapore lebende Danaer an Hühner zu verfüttern, und auffällig war mir besonders der Contrast, mit dem diese Thiere einen *Dan. vulgaris* Butl. oder *Dan. chrysippus* L. voll Verachtung liegen liessen, nachdem ihn höchstens die jüngeren einmal vorsichtig angepickt, um ihn sofort fressen zu lassen, während um ein Männchen von *P. Pammene* erbitterte Kämpfe entstanden. Interessant war nur das Benehmen zweier erwachsen eingefangener Meerkatzen, welchen diese Schmetterlinge erst vorsichtig gezeigt und dann in die Hand gegeben wurden. Zuerst wurden die Danaer in'strauch berechnen, dann vorsichtig zerzipft und wieder berechnen und endlich fressen gelassen. — Besonders an frischen Stücken von

schweren Flug haben und letztere vielleicht das gemeinste Insect auf Ceylon ist. Nach S. Skertchly (l. c.) ist die Lebensfähigkeit von *Danaus* sehr gross.

Die im Gegensatz zu dem cosmopolitischen *Danaus* auf die indo-australische Region und einige ostafrikanische Inseln (Madagascar, Bourbon, Mauritius) beschränkte Gattung **Euploea** Latr. dürfte sich ursprünglich in der Zeichnung an die Danaer der Untergattung *Rudena* angeschlossen haben. So zeigt das Weibchen von *Eu. Linnaei* Moore¹⁾ (*Milamius* L.), das von Fabricius als *Claudia* unterschieden wurde, besonders durch die Aufhellungen der Zelle und der Randfelder der Hinterflügel, eine gewisse Aehnlichkeit mit *Dan. aglea* Cr. Auch hier bewahrte diejenige Untergattung, welche keine höher entwickelten Dufteinrichtungen besitzt, *Crastia* Hbn.²⁾ die einfachste und zugleich meist in beiden Geschlechtern gleiche Zeichnung; dieselbe besteht ursprünglich (*Eu. Core* Cr. etc.) in einer sich über beide Flügel hinziehenden, beiderseits deutlichen Marginal- und Postmarginalreihe gedoppelter weisser Tüpfel auf dunkelbraunem Grunde, zu denen noch tüpfelartige Reste der Mittelbinde um die Zellen herum treten können. Durch Verdunkelung besonders der Vorderflügel (*Eu. Eichhorni* Stögr.) oder der Hinterflügel (*Eu. Wallacei* Feld.) gehen hieraus fast einfarbig braune Formen hervor (*Eu. inaequalis* Butl.), deren Männchen manchmal einen Blauschiller der Vorderflügel entwickelten (*Eu. Tallioli* F., Philippinen).

Eine selbstständige Ausbildung der Zeichnung finden wir auch in der Untergattung *Salpinx* Hb.³⁾, welche sich durch den Besitz eines scharf begrenzten Duftschuppenspiegels auf der Oberseite der Hinterflügel auszeichnen, zu dessen Bedeckung sich der Innenrand der Vorderflügel der Männchen oft bedeutend nach hinten erweitert. Diese Gruppe besitzt ebenfalls noch einige Formen mit entwickelterer Zeichnung; so erinnert das Weibchen von *S. Ithamantus* F. durch die am Zellende der Vorderflügel gelegene weisse Binde und die breite Aufhellung des Innenrandes der Hinterflügel an Formen, welche ausser den tüpfelartig zerschnürten Marginal- und Postmarginalbinden noch eine breite Mittelbinde besaßen. Meist aber nimmt die Verdunkelung der Flügel von der Basis aus derart zu, dass sich nur am Aussenrande, und unten meist deutlicher als oben, kleine Bindentüpfel erhalten (*S. Treitschkei* Bois., Neu-Guinea). Weiter tritt oft ein schöner Blauglanz am Aussenrande auf, welcher die Binde Reste violett färbt (*S. semivirens* Butl., *S. viola* Butl., *S. Novarae* Feld.). Bei einigen Arten der Aru- und Keyinseln (*S. Hopfferi* Feld., *S. Eurypon* Hew.) entsteht endlich eine Aufhellung der Flügel um die dunklere Mitte herum, die sich zuletzt bei *S. Browni* Saly. und Godm. (Salomonsinseln) über die ganze Oberseite erstreckt und eine gleichmässige kreidige Färbung hervorruft, wie sie die *Tenaris*-Arten besitzen.

Bei der Untergattung *Trepsichrois* Moore mit der gemeinen *Eu. Linnaei* Moore treffen wir, wie erwähnt, ebenfalls noch eine ursprüngliche Zeichnung mit zahlreichen hellen Tüpfeln an. Erhält sich letztere auch noch auf der Unterseite des Männchens, so wird sie doch auf der Oberseite der Hinterflügel, die vor und ausserhalb des Spiegels einen grauen Duftschuppenpelz tragen, durch rauchbraune Verdunkelung überdeckt.

Vergl. Tab. VIII,
Fig. 38—50.

Dan. vulgaris bemerkte ich einen dumpfen, moderartigen Duft, der besonders bei Pressen des Thorax entsteht. — Die Lebensfähigkeit der Danaer ist ausserordentlich, mit stark zerdrücktem Thorax sind sie noch im Stande, fortzuliegen.

¹⁾ Citirt bei Moore, The Lepidoptera of Ceylon I, 1880—81. — Vielleicht tritt an Stelle dieses neuen Namens für eine alte, so bekannte Art aus Prioritätsrücksichten doch besser *Molitor* Cr.

²⁾ Derselben gehören auch die ostafrikanischen Arten an.

³⁾ Vergl. E. Harsee, Duftapp. etc. III, p. 292—301.

während sie auf den Vorderflügeln sich in violetten Tüpfeln innerhalb des prachtvoll dunkelblauen Schillers der Aussenhälfte wiederfindet.

Somit dürften alle drei Untergattungen sich von einem Stamme aus entwickelt haben, der, wie das Weibchen von *Ea. Linnaei* und *Ea. Euctemon* Hew. beweisen, noch *Radana*-ähnlich gezeichnet war.

Um noch einzelne biologische Beobachtungen zu erwähnen, so ist der Flug von *Ea. (Salp.) Elisa* Butl. etc. nach Hutchinson, l. c., langsam und schwer. — Die Euploeen fliegen nach Moore oft in sehr grossen Mengen. — Von dem feinen Vanilleduft der Analpinsel der Männchen ist der beiden Geschlechtern gemeinsame Widrigkeitsluft zu unterscheiden, der besonders hervortritt, wenn man die Thiere ergreift. So hebt L. de Nicéville¹⁾ besonders hervor, dass neben den Männchen, welche Duftapparate besitzen, auch die Weibchen einen ähnlichen Geruch verbreiten, „although they are unfurnished with the male disseminating organs.“ den Analpinsel.

Nach persönlicher Mittheilung des Herrn Hartert quillt bei jeder geringen Verletzung frisch gefangener Euploeen aus dem Nacken ein Flüssigkeitstropfen (? Blut) hervor, dessen unangenehmer Duft lange an den Fingern haftet.

Ueber die Futterpflanzen der anscheinend stets auffällig gefärbten²⁾, mit einzelnen langen Fleischfäden besetzten Raupen der Danaiden liegen wenige und noch dazu theilweise unsichere Angaben vor. So lebt die Raupe von *Hestia* nach H. Kühn³⁾ an „Lianen“, die von *Dau. Limniace* nach Horsfield und Moore, l. c., an Epibatherium (= *Cocculus* DC. [Menisperm.]); die von *Dau. phileae* Cr. an Cissus (Ampelid.), die von *Dau. (A.) Chrysippus* an *Asclepias gigantea*, die von *Ea. Linnaei* Moore an Ficus,⁴⁾ Nach G. Semper⁵⁾ lebte die Larve von *Dau. (A.) Chrysippus* an *Asclepias*, die von *Ea. megilla* Er. auf Oleanderblüthe.

Die Puppen der Danaiden sind durch ihre abgerundete Form und ihren Goldglanz bemerkenswerth.

2. Unterfamilie der **Palaeotropinae.**⁶⁾

Die Gattung *Hamadryas* Boisdl., welche F. W. Kirby nach den Danaiden, Schatz dagegen den Neotropiden zurechnete, besitzt in ihren wenigen Arten eine recht ursprüngliche, in beiden Geschlechtern und auf grossentheils beiden Flügelseiten gleiche Zeichnung, welche zugleich den Anschluss der Euploeen an die rein südamerikanischen Neotropiden (Schatz) vermittelt. Die Vorderflügel von *Hamadryas* führen noch in der Zelle eine basale längs gerichtete und eine hintere quere Aufhellung und tragen oben eine subapicale Binde und unten eine Randfleckreihe. Die Hinterflügel dagegen zeigen eine breite quere Mittelbinde und einen ebenfalls schwarzgrauen Randbord, in dem unten acht regelmässige Randmondtüpfel liegen. Das schwarze Abdomen trägt an seinem Vorderrande eine weisse Querbinde.

¹⁾ L. de Nicéville, List of the butterflies of Calcutta. Journ. As. Soc. Beng. LVI, 1885, p. 41.

²⁾ Die Raupen von *Hestia* und *Danaus* haben weisse Querringe auf schwarzem Grunde, die von Euploeen nach Semper viel Weiss oder Bläulichweiss.

³⁾ Corr. ent. Ver. Iris, Dresden, IV, 1887, p. 181.

⁴⁾ Diese Beobachtungen von Horsfield und Moore werden in Beziehung auf *Dau. Chrysippus* auch von anderer Seite (s. unter den afrikanischen Modellen) bestätigend ergänzt; dagegen sind die übrigen Angaben einer Prüfung bedürftig.

⁵⁾ G. Semper, Philippin. Schmetterlinge (in Fortsetzung), Wiesbaden, p. 17.

⁶⁾ Vergl. E. Haase, Zum System der Tagfalter (Deutsche ent. Zeitschr. Lepidopterol. Heft [Iris, Dresden, IV] 1891, p. 1—32.

Die kleinen Arten dieser Gattung gleichen sich in der Färbung ungemein, sind von Amboina bis Neu-Seeland verbreitet und anscheinend sehr häufige Schmetterlinge. Ueber Raupe etc. ist noch nichts bekannt.

3. Unterfamilie der **Acracinae**.

Obwohl mir kein sicherer Fall bekannt ist, in welchem eine der indischen *Acracinae* von einem anderen Schmetterling nachgeahmt wird, erwähne ich doch als hierher gehörig, dass nach L. de Nicéville¹⁾ unter sämtlichen Versuchsobjecten *Acr. violae* L. der einzige Schmetterling war, den alle Arten von *Mantis* — also selbst Vertreter von intellectuell relativ niedrig stehenden Raubinsecten — verschmähten. Nach Horstfeld und Moore (l. c.) frisst die Raupe von *Acr. Vista* Arten von *Urtica*, was noch der Bestätigung bedarf.

4. Unterfamilie der **Morphinen**.

Unzweifelhaft dienen Arten der von Java bis zu den australischen Inseln verbreiteten, hauptsächlich auf letzteren vertretenen Gattung **Tenaris** Dbl., Angehörigen anderer Familien als Modell der Anpassung. So sehr die Färbung der Flügel bei den einzelnen Arten dieser Gattung auch in engeren Grenzen variiert, stimmt sie doch in dem Gesamteindruck überein. So sind die Vorderflügel entweder wie bei **Hyantis Hodeva** Westw. am Vorder- und Aussenrande schmal braun gesäumt und sonst weiss oder stark und gleichmässig verdunkelt; so tritt in den vorn, aussen und oft noch innen breit und dunkel gerandeten Hinterflügeln meist je ein Augenfleck am Vorder- und ein weiterer am Hinterrande auf, der gewöhnlich eine gelbe Iris und eine weiss gesterate Pupille enthält. Bei einigen Arten treten am Innenrande der Hinterflügel sogar drei Augen auf, deren zwei innere meist von einem blauen Ringe eingezogen werden, und die auch auf der Oberseite durchscheinen.

Für die aus dem Vorkommen mimetischer Anpassung an ihren verschiedenen Vertretern geschlossene Annahme, dass die Arten der Gattung *Tenaris* durch bestimmte widrige Eigenschaften hervorragenden Schutz besitzen dürften, spricht auch die auffallende Färbung beider Flügelseiten; ebenso ist der Flug nach Herrn C. Ribbe schlapp und niedrig, meist nur ein Huschen über den Boden.

Wie J. Wood-Mason und L. de Nicéville bei einer anderen Morphide, *Stichophthalma Canadava*, ausser dem zarten angenehmen Parfüm der männlichen Duft Einrichtungen einen noch viel stärkeren beiden Geschlechtern gemeinsamen Geruch nach frischem Zobelpelz („sable fresh from the furrier's shop“) unterscheiden, dürfte auch bei den *Tenaris*-Arten solch' unangenehmer Gattungsduft sich vorfinden.

5. Familie der **Pieridae**.

Schon A. R. Wallace wies in seiner vortrefflichen Monographie der indischen Weisslinge²⁾ darauf hin, dass Angehörige der Gattung **Delias** Hb. (*Thya* Wall.) als Modell der Anpassung für andere Pieriden dienen. In der That sind die Arten von *Pelias* meist sehr individuenreich und tragen im Allgemeinen eine auffallend bunte Färbung der Hinterflügelunterseite, auch besitzen einige „a very slow and weak mode of flight“. Gegen die Immunität der *Pelias*-Arten in ihren Larvenstadium spricht anscheinend die Notiz bei F. Moore³⁾, dass die Raupen von *P. Eucharis* Dru. oft zu Tausenden vorkommen, aber

¹⁾ L. de Nicéville, Butterflies of India, Burmah and Ceylon, vol. I.

²⁾ A. R. Wallace, On Eastern Pieridae (Trans. Ent. Soc. London IV, 1865—68).

³⁾ E. Hartert, Biolog. aus d. ind. Faunengebiet (Berl. ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, Heft II), p. 292.

viel von Ichneumonem heimgesucht werden: über die Fütterpflanzen (? Cruciferae) habe ich keine Notiz gefunden. Dagegen scheinen die Imagines durch einen starken Duft in gewissem Grade geschützt zu sein. So erwähnen J. Wood-Mason und L. de Nicéville, l. c. p. 371, dass beide Geschlechter von *D. bircie* var. *indica* sich durch einen „strong grateful musk odour“ auszeichnen, und auch E. Hartert theilte mit, dass einige „*Delias*-Arten in Assam ungemein stark nach Moschus riechen“, jedoch unter vielen Exemplaren auch duftlose Formen beider Geschlechter vorkommen.

Würde die von Wallace nachgewiesene Ähnlichkeit gewisser Vertreter anderer Gattungen derselben Familie mit Arten von *Delias* vielleicht als Zeichen der Verwandtschaft angesehen werden dürfen, so muss man doch aus der unten zu besprechenden mimetischen Anpassung von Satyriden (*Elymnias*) und Chalcosiden an *Delias* letzterwähnte Gattung für relativ besser geschützt halten, als die mimetischen Arten es sind.

7. Familie der Papilionidae.

Wegen genauerer Angaben über die Zeichnung der Aristolochienfalter (Pharmacophagus) verweise ich auf p. 22–29 der vorangehenden Untersuchung über die Papilioniden. Es genüge hier, darauf hinzuweisen, dass alle nachgeahmten indisch-australischen Aristolochienfalter graubraune, intercostal verdunkelte Vorderflügel besitzen. Die Hinterflügel sind dagegen entweder mehr oder minder deutlich geschwänzt und dann meist mit einer abgekürzten Mittelbinde und einigen rothen Randbändern geziert oder ungeschwänzt und dann oft von einer gelblich-weißen Aussenzellbinde durchzogen, in welcher einzelne schwarze Flecke hervortreten; seltener sind die Hinterflügel durch zunehmende Verdunkelung der Bänder einfarbig. Wie die Kopfspitze tragen auch der Halskragen, die Brustseiten, die Flanken und die Spitze des Hinterleibes meist einen Besatz mit rothen, selten mit gelben oder weisslichen Haaren.

Die Hauptvertreter der indisch-australischen Aristolochienfalter sind, soweit sie als Modelle dienen, auf Taf. V–VI dargestellt.

Die erste Beobachtung über einen besonderen Wildrigkeitsduft der Aristolochienfalter machte J. Wood-Mason¹⁾, indem er die von uns zu den Rinnenfaltern gerechneten Nachahmer *P. Janala* und *P. Icarus* Westw. mit *P. Bootes* und *P. Rhetenor* Westw. als „geruchlose *Protenor*-Gruppe“ von der „strong-scented and nauseous *Philareus*-group“ unterschied. Weiter erwähnte L. de Nicéville den starken Geruch von *Pharm. aristolochiae* und *Ph. Hector*²⁾ und beobachtete J. Wood-Mason³⁾, dass das Weibchen von *Ph. Dasarada* Moore den „strong scent of caged porcupines with a touch of musky odour“ verbreitet, und dass das Weibchen von *Ph. Astorion* Westw. „emits a strong and disgustingly rank musky odour.“ Bei *Ph. Doubledayi* Wall. erwähnt derselbe den „musk scented body“ des Falters. -- Nach Distant und Pryer⁴⁾ ist *Ph. Antiphos* ein äusserst langsamer Flieger.

¹⁾ J. Wood-Mason, Description of two new species of *Papilio* from Northeastern India, with a preliminary indication of an apparently new and remarkable case of Mimicry between the two distinct groups which they represent (Ann. Mag. Nat. Hist. 5th Ser., Vol. IX, 1882), p. 101.

²⁾ L. de Nicéville, List of the butterflies of Calcutta (Journ. As. Soc., Vol. LIV, 1885), p. 52.

³⁾ J. Wood-Mason and L. de Nicéville, List of Lepid. Ins. coll. in Cachar, H. Bhopaloe (Journ. As. Soc., Vol. LV, 1886 [1887]), p. 374.

⁴⁾ W. L. Distant and W. B. Pryer, On the Bhopaloe, of North Borneo (Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1887), p. 2271.

Die von uns zu *Pharmacophagus* gerechneten Arten von **Ornithoptera** besitzen nach Skertchly eine grosse Lebenszähigkeit. Dass z. B. die Ornithopteren auch natürliche Feinde besitzen, die aber keine Tagvögel zu sein brauchen, beweist die Beobachtung von Forbes¹⁾, der „mehrmals auf Waldwegen die losen Flügel von *O. Priamus*“ fand.

Unter den **Heterocerern** sind es besonders Angehörige der Agaristiden, der ihnen verwandten Uraniiden und der Euschemiden, welche als Modelle benutzt werden.

Die Arten der zu den tagfliegenden Agaristiden gehörigen Gattung **Eusemia** sind oft durch grelle Contrastfarben ausgezeichnet. So tragen die schwarzen Vorderflügel z. B. an der Basis blaue, am Rande weisse und in der Mitte gelbe Tüpfelreihen oder Binden, während die Hinterflügel oft orange gefärbt und schwarz gesümt, manchmal aber vollkommen verdunkelt sind. Der Leib ist meist mit auffallenden gelbrothen Ringen geschmückt und auch Kopf und Thorax sind gelb oder orange gefärbt. Die Raupen von *Eusemia* leben nach Horsfield und Moore, l. c. II, p. 288—290, an *Dioscorea oppositifolia*, *Dillenia* (Caprifoliac.) und *Cissus* (Ampelid.).

Nach W. Doherty²⁾ ist der beiden Geschlechtern gemeinsame Duft „invariably bad“.

Die von J. Westwood bereits hervorgehobene Verwandtschaft der früheren Stände der **Uraniiden** mit denen der Agaristiden, welche eine Untersuchung des Geüders bestätigt, spricht dafür, dass auch die Angehörigen dieser Familie immun sein dürften. Der einzige Vertreter derselben, der einem Schmetterlinge einer anderen Familie als Modell dient, ist *Aleidis Arnus* Feld. (*Nyctalemon Agathyrus* Ksch.) aus dem Neu-Guinea-Archipel, eine grosse, auffallende dunkel stablgrüne, mit weiss-grüner durchgehender Mittelbinde gezierte tagfliegende Form, die recht häufig ist und nach Herrn C. Ribbe in kleinen Gesellschaften um die Wipfel der Eisenholzbäume fliegt.

Nach Dr. Hahnel (Entomolog. Erinnerungen aus Süd-Amerika, Iris, Dresden, III, Heft 2, 1890, p. 277) vermögen die Uraniiden an heissen Stellen sich dadurch vor der Sonne zu schützen, dass sie die Flügel wie die Tagfalter zusammenschliessen. In dieser Stellung würden sich also Modell und Nachahmer ebenso ähnlich sein wie im Fluge und der gelbe Inuentüpfel des *Papilio* die Flanken des *Nyctalemon* vortäuschen.

Trotzdem die Gattung **Euschema** Hübn. nach der Raupenform³⁾ zu den echten Spannern (Geometrae) zu rechnen ist, unter denen wüdrige Formen zu den Ausnahmen gehören, und obwohl die Raupennahrung aus *Carallia* (Rhizophor.) besteht, dienen die Formen dieser tagfliegenden, nach F. Moore, l. c., am Abend bis nach Sonnenuntergang herumschwärmenden Gattung doch unbestreitbar als Modelle. Die Arten sind meist sehr häufig und grosse Thiere von auffallender Färbung. Entweder tragen sie zahlreiche violettblaue Flecke und Bänder auf glasig weissem oder leuchtend goldgelbem Grunde, oder die violettblaue Zeichnung überwiegt derart, dass auf dem dunklen Grunde nur weisse oder gelbe Bindenreste erkennbar sind. Stets ist der Leib goldgelb und oft noch schwarz geringelt. Somit gehören diese schönen Thiere zu den auffälligsten Erscheinungen der indischen Tropen. — Ob sie ausser dem aus den Hinterschienenbüscheln strömenden Reizduft der Männchen, der bereits festgestellt wurde, noch einen besonderen Ekelduft besitzen, habe ich von ihren Beobachtern nicht erfahren können.

¹⁾ H. O. Forbes, Wanderungen eines Naturforschers im Malayischen Archipel; übersetzt von Dr. Teuschler Jena, 1886, II. Bd., p. 42.

²⁾ W. Doherty, Notes on Assam Butterflies (Journ. As. Soc., Vol. LVIII, 1889), p. 117—134.

³⁾ Vergl. F. Moore, Lep. Ceylon III, p. 422, und Dewitz, l. c., Nov. Act. Leop., Bd. 64, 1884.

b. **Mimetische Anpassungsformen.**

Die nachahmenden Arten der indo-australischen Tagfalter gehören ausschliesslich den Familien der Nymphaliden, Satyriden, Pieriden und Papilioniden an. Die nachahmenden Heteroeceren sind ausschliesslich durch Angehörige der Chalcostiden und Lipariden vertreten.

I. Unterfamilie der **Nymphalinae.**

Die Gattungen indo-australischer Nymphalinen, welche mimetische Arten enthalten, gehören nach E. Schatz der *Argynnis*-Gruppe (*Argynnis*), Diademen-Gruppe (*Hypolimnas*, *Hestina*, *Euripus* etc.) und der *Neptis*-Gruppe an. Nach Skertchly, l. c., ist die Lebenszähigkeit bei *Neptis* und *Athyma* so gering wie bei den Satyriden.

Um zuerst die indisch-australischen Angehörigen der *Argynnis*-Gruppe, soweit ihr sexueller Dimorphismus hier in Frage kommt, kurz zu charakterisieren, so besitzen die Männchen der typisch indischen **Cynthien** wie diejenigen der arktischen *Argynnis*-Arten auf der Oberseite der Flügel eine rostgelbe Querfarbe, welche von zahlreichen Flecken durchbrochen ist, die auf der Unterseite sich zu Streifen vereinigen. Dagegen tritt bei den Weibchen eine ursprünglichere Zeichnung auf, indem die breite Aufhellung ausserhalb der Zellen noch weitere Querbänder erkennen lässt, aus deren einem die Augenflecke hervorgingen.¹⁾ So dürfen wir wohl eine schwärzlich verdunkelte Form mit zahlreichen helleren Binden als Vorläufer auch von **Argynnis** selbst ansehen. Darn erklären sich die auch bei paläarktischen Arten beobachteten Melanismen (*Paphia*, v. *Valesina*) als Rückschlagformen. Zugleich ist das Weibchen stets durch die ursprünglichere, auf die regelmässige Querbänderung leichtere zurückführbare Zeichnungsform ausgezeichnet, während sich bei dem Männchen infolge zunehmender Aufhellung die Bänder in Flecke zerschnürten und eine rostrote Hauptfärbung auftrat.

Nur bei einzelnen Arten, deren Weibchen sich vor dem anderen Geschlecht durch grössere Seltenheit auszeichnen, tritt der theilweise oder ganz ausgebildete Melanismus durch Naturauslese in den Dienst der schützenden Anpassung.

So erinnert das im Verhältniss zum Männchen seltene Weibchen von *A. Argynnis* Sparrm. (Nordindien bis Japan), das als *Niphe* L. unterschieden wurde, durch die auch bei Cethosien vorkommende weisse Subapicalbinde der Vorderflügel in blauschwarzem Grunde oberflächlich an den überall gemeinen *Danaus Chrysippus* L. Nach A. G. Butler hat auch ein grosses Männchen aus Formosa schon theilweise erkennbare *Danaus*-Färbung²⁾, so wäre die vom Weibchen erworbene mimetische Anpassung schon zum Theil auf das andere Geschlecht übertragen. Dagegen tritt bei einzelnen Weibchen des Mus. Berlin aus Cashmir die Subapicalbinde der Vorderflügel wenig hervor; so gleicht auch die Färbung noch mehr derjenigen des Männchens. Endlich besitzt die var. *inconspans* Butl. (Australien) in beiden Geschlechtern die hellere Färbung. -- Des Weibchen von *J. Sagama*, *J. Paulina* Nordm., erinnert oberflächlich an *Dav. (Tirum.) Limniace* Cr., welche, wenn auch nicht an Amur, doch in China und Japan mit ihr zusammen vorkommt.

Die mimetischen Arten der **Diademen-Gruppe** gehören besonders den Gattungen *Hypolimnas*, *Hestina* und *Euripus* an.

¹⁾ An diese Zeichnung erinnert auch die der afrikanschen Gattung von *Lachnoptera* mit einer Art.

²⁾ Vergl. R. Meldol. Entomol. notes bearing on evolution (Ann. Mag. Nat. Hist., 5th Ser., I. 1878, p. 157.

Gattung **Hypolimnas** Hübn. (*Dialona* Boisl.)

Die in beiden Geschlechtern gleichen Grundformen dieser Gattung besaßen wohl auf beiden Flügeln drei nahe dem Rande gelegene Reihen von helleren Tüpfeln, eine entwickelte helle und breite Aussenzellbinde und die Reste einiger Zellbinden auf dunklerem Grunde.

An ähnliche Formen dürfte noch die Unterseite des Weibchens von *H. Bolina* L. erinnern, bei welcher die drei Binden des Randes auf beiden Flügeln gleichmässig entwickelt sind. Während die blau gerandeten Spiegel des Mannes durch Reduction der Aussenzellbinde entstehen, nimmt bei der als *Nerina* F. bezeichneten Varietät des Weibchens (Molucken) die ursprünglich wohl ebenfalls weissliche Mittelbinde der Vorderflügel eine rostrothe Färbung an, welche sich im Weibchen von *H. Missippus* L. auf die hintere Hälfte der Vorderflügel ausdehnt, bis in die Zelle hineinreicht und weiter sich auch auf die Hinterflügel fortsetzt. So entsteht eine Weibchenform mit schwarzer, von der weissen Aussenzellbinde durchzogener Vorderflügelspitze und sonst rostrother Flügelfarbe, die auf der Hinterflügelmittle nur durch drei schwarze Flecke, die Reste der ursprünglich durchgehenden Bänder, durchbrochen wird. Zugleich machen es die zahlreichen Varietäten des Weibchens von *H. Bolina* wahrscheinlich, dass bei dieser Art eine mimetische Anpassung erst im Entstehen begriffen ist, während dieselbe bei *H. Missippus* L. nur mehr in einer bekannten Form erhalten ist, deren kleinere Stücke selbst in der Hinterleibs-färbung dem immunen *Danaus Chrysippus* L. äusserst ähnlich sind und ebenfalls leuchtend weisse Basaltüpfel an der Unterseite der Flügel und der Brust besitzen.

Bei *H. Alimena* L. tragen die Männchen und nach O. Staudinger, l. c. p. 137, auch australische Weibchen eine grünblaue Submarginalbinde auf der Oberseite der Flügel; dagegen sind die Weibchen auf den Key-Inseln stets dunkel Rauchbraun und am Aussenrande licht weisslichbraun (var. *Polymena* Feld.) und erinnern so an die ebenfalls breit weiss gesäumte *Euploea* (*Salpinx*) *assimilata* Feld.

Aus der *H. Alimena* L. ähnlichen Formen gingen durch zunehmende Verdunkelung Arten wie *H. antilope* Cr. (Amboina, Ceram, Buru) hervor, bei denen das Männchen noch Reste der Zwischenbinde am Vorderrande der Vorderflügel erkennen lässt, welche bei dem Weibchen durch rauchbraune Verdunkelung fortfallen. So erinnert das Weibchen, bei dem die ursprünglichen Binden sehr unendlich werden, an die dunkelbraune *Euploea Cinnena* Cr. ebendaher. Hierher gehört auch *H. anomalus* Wall., eine dunklere Art von Malacca, den Sundainseln etc. Entgegen Dr. Staudinger's¹⁾ kann ich durch die Untersuchung der Vorderfüsse beider Geschlechter die Angabe von Wallace bestätigen, dass es bei dieser Art die selteneren Weibchen, nicht die Männchen sind, welche den schönen Blauschiller auf der Aussenhälfte der Vorderflügel besitzen und dadurch auffallend dem Männchen der gemeinen *Euploea Linnaei* Moore gleichen. Nach Forbes besitzt das britische Museum Männchen von *H. anomalus*, „die fast ebensoviel Blau haben als die Weibchen“. Unzweifelhafte Männchen von Malacca und Borneo haben grosse blaue Flecke am Rand der Vorderflügel. Die Weibchen von Java haben mehr Blau als die Weibchen von Borneo. Wir sehen also auch in dieser Art ähnliche Variationen in der mimetischen Umbildung wie bei *H. Missippus* L. Nach O. Staudinger sind ausserdem die Männchen von *H. antilope* denen von *H. anomalus* so ähnlich, dass man in der That beide Formen für Rassen einer Art und die Verschiedenheit des Weibchens für das Product der Anpassung an die am Aufenthaltsorte der Rasse gemeinste *Euploea* halten könnte.

¹⁾ Dr. O. Staudinger, Exotische Schmetterlinge etc., p. 137.

Eine papuanische Section, zu deren ursprünglicheren Formen *H. Pandarus* L. (Amboina, Ceram) gehört, besitzt auf den Hinterflügeln schwarze, blau gekernte Zwischenbandflecke in einer bei dem Weibchen (*Piplois* L.) breiteren hellbraunen Binde. Bei dem abzuleitenden stark dimorphen *H. Decois* Hew. (Aru, Waigiu) ist das Männchen schon durch die graue Verdunkelung der Spitze an der Unterseite der Vorderflügel und die im fünften Randfelde, in Verlängerung der Zelle, erfolgte vollkommene Aufhellung der blau gekernten Augenflecke an der Unterseite der Hinterflügel ausgezeichnet. Bei dem Weibchen der var. *Tydea* Feld. (Batjom) setzt sich die im fünften Randfelde beginnende Aufhellung der Hinterflügel bis in die Zellmitte fort und bildet sich auch auf den Vorderflügeln um das Zellende eine weissliche, vom Terminalbände durchbrochene Aufhellung. So erinnert dies sehr seltene Geschlecht durch die weissliche Mitte beider Flügel und die einzelnen blau gekernten Augen in orangem Grunde der Hinterflügel etwas an *Tenaris*-Arten, besonders *T. barulata* Guér. Noch grösser wird diese Aehnlichkeit bei dem Weibchen von *H. Decois* Hew. selbst (Neu-Guinea), bei welchem ein weiterer Augenfleck der Hinterflügel unterdrückt und die Flügelmitte noch stärker aufgehellt ist, so dass hier eine auffallende Aehnlichkeit mit der erwähnten *Tenaris*-Art entsteht.

Die sechs Arten von **Hestina** Westw. sind ausser der auf Java und Sumatra vorkommenden *H. mimetica* Btr. auf Nordindien und China beschränkt und durch mehr oder minder ausgebildete Aehnlichkeit mit hellgefärbten Danaern der Untergattung *Radena* ausgezeichnet. Während bei *H. assimilis* L. (China) die rothen Hinterflügelangen die Aehnlichkeit mit einer Danaide noch sehr stören, besitzt diese Art doch schon die unregelmässige Tüpfelung der Vorder- und Hinterflügel, welche für die erwähnten Danaer so charakteristisch ist. Die von Dr. Staudinger in seinem Exotenwerk, I. c. p. 138, erwähnte Varietät des Weibchens aus China gehört ebenfalls zu dieser Art, denn sie trägt noch im vorletzten Randfelde der Hinterflügel einen Rest der rothen Augenflecke.

Als vorgeschrittene Anpassungsformen an dunklere *Radena*-Arten erscheinen auch *H. persimilis* Westw. (Sikkim) und *H. mimetica* Stügr. (Java), welche *Dan. aglea* Cr. ähnlich sind. Weiter gleicht *H. Oberthüri* Leech (Centralchina) auf beiden Seiten und bis in Einzelheiten auf der Hinterflügeloberfläche dem häufigen Männchen von *Dan. aglea* Cr. Endlich erinnert nach Butler (Trans. Ent. Soc. 1869, p. 9) *Hestina zella* (India) auffallend an *Danaus juvena* Cr.; ebenso ähnelt die schöne *H. Nama* Dbl. (Sihet) durch die breit rostbraune Färbung der Hinterflügelrippen besonders im Weibchen dem dort häufigen *Dan. Tytus* L. An *Hestina* schliesst sich die früher zu den Papilioniden gerechnete seltene **Calinaga Buddha** Moore (Sikkim) an, deren Weibchen noch unbekannt ist, während das Männchen trotz seines rothbraunen Halskragens¹⁾ noch am ersten an helle *Danaus*-Arten erinnert. Hierher gehört auch die gewaltigere *Penthema Lisarda* Dbl. (Sikkim), die besonders in dem grossen seltenen Weibchen auf der Oberseite an weiss aufgehellte *Radena*-Arten, auf der Unterseite der Hinterflügel durch die rostbraune Färbung der Rippen eher an *Dan. Tytus* L. erinnert.

Die zahlreichen (11) von Kirby angeführten Formen der merkwürdigen Gattung **Euripus** Westw. werden sich wohl auf wenige Arten reduciren lassen, zumal schon mehrere der Formen (*Isa* Moore, *Euplacoides* Feld., *Nyctelius* Dbl., *Cybia* Feld., *Pteriferæ* Feld.) nur als Weibchen bekannt sind und Rassen des verbreiteten *E. Halitherses* Dbl. darstellen. Wie Dr. Staudinger, I. c. p. 139, erwähnt,

Calinaga Moore.

Penthema
Westw.

Verz. Lat. VI,
Pl. 18-30, und
Pl. VII,
Pl. 32

¹⁾ Dieser eigenthümlich leuchtende Halskragen erinnert an die gemeine *Arana Vista* L. Vielleicht ist das Weibchen ihr auch auf den Flügeln ähnlicher als das Männchen.

sind die Männchen von den verschiedensten Fundorten in der Zeichnungsanlage einander gleich und tragen anscheinend auf schwarzem Grunde mehrere Reihen weisser Tüpfel, die den bei *Nymphaliden* so zahlreichen weissen Binden der Grundfarbe entsprechen. Die Weibchen von *E. Halitherses* erinnern mit Ausnahme einer indischen Form, *E. consimilis* Nicéy., welche dem Männchen sehr ähnlich, aber grösser und breiter ist, an verschiedene Arten von *Euploca*. So gleicht die Weibchenform *Isa* Moore (= *Halartus* Feld.) und noch mehr *euplocales* Feld. (Malacca) dem Weibchen (*Diocletianus* Feld.) von *Euploca Rhodamanthus* Feld.; weiter gleicht die auf Taf. VII, Fig. 50, abgebildete Weibchenform var. *Rhodamanthinus* aus Perak ¹⁾ mit stärker verdunkelten blauglänzenden Vorderflügeln (im Besitz des Herrn Honratb) eher dem Männchen der *Eupl. Rhodamanthus* Feld.²⁾ Dagegen erinnert die dunkle Weibchenform var. *Nyctelius* Dblld. (Silhet) (Fig. 52) mit etwas weissblau gefärbten Vorderflügeln an die *Eupl. Godartii* Luc.

Nach G. Semper, l. c., sind die Männchen des *E. Nysus* Semp. denen von *E. Halitherses* ebenfalls ähnlich und unterscheiden sich nur durch den bräunlichen Ton der Aufhellungen. Von den gleichfalls polymorphen Weibchen erinnert die var. *danaica* (s. Semper, l. c. Taf. XV, Fig. 13) durch stärkere Aufhellung in den Feldern der Flügel und die abgerundeten Hinterflügel an *Danaus (Radenus) luzoncus* Moore ♀, während die dunkle Form des Weibchens var. *lucasioides* Semp. mit weissen feinen Tüpfeln am Flügelrand und einer Subapicalbinde der Vorderflügel dem Weibchen von *Eupl. Lucasii* Moore (Mindanao) ähnelt; meist fällt auch die Flugzeit der Nachahner mit derjenigen der Modelle zusammen oder folgt, was noch vorteilhafter sein dürfte, gleich nach derselben.

E. Holoternes Stögr. (Minahassa) erinnert in den Weibchen etwas an *Danaus Ismare* Cr., die dort typische Danaer-Form; weiter ähnelt *E. japonicus* Feld. (Japan) besonders durch die Aufhellung der Hinterflügelzelle der *Dan. (Tirana) Iematae* L. und *E. robustus* Wall. (Minahassa) wieder den ebendort vorkommenden gelblichen *Radenus*-Arten.

Nach Marshall und Nicéville spricht sich die Ähnlichkeit der Euploeen nachahmenden Weibchen von *Halitherses* nicht nur in Gestalt und Zeichnung der Flügel aus, sondern auch „in manner of flight and in the habit of resting in exposed positions“. Die Männchen haben einen ganz anderen Habitus, und ihr Flug ist reissend schnell statt matt wie der der Weibchen; auch ruhen sie mit geschlossenen statt wie letztere mit offenen Flügeln.

In der Gattung **Neptis** F. zeigt sich nach E. Schatz (l. c. p. 153) *N. Prastini* Boisld. durch die grosse Verkürzung der vorderen Discocellularis der Hinterflügel als abgeleitete Form. Damit hängt wohl auch ihre abweichende Zeichnung zusammen, welche besonders am Weibchen auffallend an die ebenfalls im nordöstlichen Australien (Cooktown) vorkommende häufigere *Hanaudryas Moorei* Mac Leay erinnert

Unterfamilie der Satyrinen.

Die ca. 30 Arten der für die Beurtheilung der Mimiery besonders wichtigen Gattung **Elymnias** Hb. kommen mit Ausnahme zweier afrikanischen Arten der indisch-australischen Region zu. Die Grundzeichnung der Gattung dürfte auf der Unterseite eine graue, dunkel gesperrbete Schutzfärbung gewesen sein. Ausserdem aber zog sich auf derselben längs des Aussenrandes eine Reihe weisser Tüpfel hin, die sich auf den Vorderflügeln zu einer Apicalbinde erweiterte. Auf der Oberseite trat eine dunkle, brann-

¹⁾ Die erwähnte var. *Rhodamanthinus* stimmt am Meisten überein mit *Euripus Halitherses* var. *Distant*. Rhop. Mal. 1882-86, p. 441, Tab. 43, Fig. 44.

²⁾ Die var. *borneensis* gleicht im Weibchen der Borneo-Rasse, *Eupl. Rhodamanthus*, der var. *Lowei* (Ann. Mag. Hist. XIX, 1857, p. 54).

schwarze Grundfarbe auf, von der sich meist nur die helle Apicalbinde, seltener die continuirliche Marginaltüpfelreihe abhob.

Von der bekanntesten Art, *El. undularis* Drn. (Sikkim, Java, Ceylon etc.), ist bei der var. *nigrescens* Bl. (Borneo) das Weibchen noch so gefärbt wie das Männchen, nur sind die Hinterflügel oben gleichmässiger graubraun. Dasselbe gilt für var. *discrepans* (Malacca, Singapore) und var. *Timorensis* Stödr. (Timor). So halte ich diese Weibchenformen nicht für Nachahmer von blauen Euploeen, wie Butler es thut, sondern für normal gefärbt, da sie noch am meisten an andere Satyriden (*Corades* Dbl.) erinnern. Dagegen ist das Weibchen von *El. undularis* in Siam, Vorderindien und Ceylon (*Prologenia* Cr.) eine ziemlich genaue Anpassungsform an kleine Stücke von *Dan. Plexippus* F. (*Genulia* Cr.). Dieselbe entstand dadurch, dass auf den Vorderflügeln die Marginalbinde sich in eine breite Apicalbinde erweiterte und auf der Oberseite in schwarzem Grunde leuchtend weiss hervortrat. Ausserdem nahm noch die hintere Mitte der Vorderflügel und die grössere basale Hälfte der Hinterflügel innerhalb der weissen Randtüpfel eine rostbraune Färbung an. Nach gütiger Mittheilung des Herrn L. de Nicéville in Calcutta gleicht das Weibchen in Birma der dort gemeinen Form des *Dan. Plexippus*, *D. Hegeppus* Cr., mit weisslich aufgehellten Flügeln.

Bei *El. Laïs* Cr. (Java, Borneo) mit weissgrüner kreidiger Aufhellung zwischen den Rippen auf der Oberseite der Flügel und ebenfalls noch ausgebildeter Sperberung ihrer Unterseite gleicht ein Weibchen des Mus. Berlin aus Malangan noch den Männchen, während die meisten Formen schon eine grössere Verdunkelung und zugleich einen bläulichen Glanz der Apicalbinde besitzen, der etwas an *Eupl. Linnaei* Moore erinnert.¹⁾ Bei *El. Casiphonae* Hb. (Java) besitzt das Männchen blauglänzende Vorderflügel und dunkle Hinterflügel, während das Weibchen die gesperrbete Zeichnung der Unterseite in graugelbem Ton auch oben vortreten lässt und durch den starken Blauschiller und die weissen Tüpfel der Vorderflügelspitze eher an das Weibchen von *Eupl. Linnaei* Moore erinnert.

Auch *El. Boruensis* Wall. trägt noch eine ausgebildete Sperberung der Unterseite. Während die Oberseite eine starke weissliche Aufhellung in der Mitte der Flügel besitzt, wird die Mittelbinde der Hinterflügelunterseite gelb, die Basis dagegen roth gefärbt. So erinnert die Unterseite an *Delias*-Arten, wie *D. Egiptea* Cr. Auch die nahe verwandte *El. Vasulera* Moore (Sikkim) gleicht nach Butler *Delias Descombesi* Boisl. oder *Hierte* Hb. var. *indica* Wall., und *El. Egiptea* Feld. (Luzon) erinnert an eine ähnliche *Delias*-Art, *D. Houmingia* Esch., besonders in der Ruhestellung.

Dagegen gleichen dunkler gefärbte Arten, wie *El. Fallia* Cr. (Amboina), besonders im Weibchen einer einfarbig braunen *Eupl. Cluena* Feld., doch ist die Sperberung der Unterseite noch erhalten; dagegen besitzen die in der Anpassung an Euploeen weiter fortgeschrittenen Arten die Schutzfärbung der Unterseite nicht mehr, sondern gleichen auch auf letzterer durchaus ihren Modellen. So erinnert *El. Beza* Hew. (Mindanao), die in beiden Geschlechtern auf schwarzbraunem Grunde blauschillernde Marginaltüpfel trägt, unten nur kleine blaue Randtüpfel zeigt und auch vollkommen abgerundete Hinterflügel besitzt wie die Euploeen, an *Eupl. latifixa* Butl. So ähnelt *El. Patna* Westw. (Nordindien) mit blauglänzenden Tüpfeln am Rande und in der Zelle der Vorderflügel und fünf Hinterflügeltüpfeln der *Eupl. Hopi* Feld.

¹⁾ Nach A. G. Butler, A Monograph of the Gen. *Elymnias* (Proc. zool. Soc. London, 1871, p. 548 sqq.) erinnert ausserdem noch u. A. *El. Melibba* Moore (Singapore) in die betreffenden Geschlechter von *Eupl. Linnaei*, *El. Casae* Boisl. ♀ (Java) an *Dan. albata* Zinck., *El. Melios* Feld. (Philippinen) an *Eupl. Sociasani* Godt., *El. Patna* Westw., ♀ Sikkim an *Eupl. callithoe* Boisl.

Auch erinnert *El. Malelas* Hew. (Indien) durch die blauglänzenden, mit vielen weissen Tüpfel gezierten Vorder- und die dunkelbraunen Hinterflügel durchaus an das Männchen von *Eupl. Linauei* Moore.

Einer dem Stamme der Gattung näher stehenden Gruppe von Arten, in welcher ausschliesslich die Weibchen mimetisch sind und die Hinterflügel noch Andeutungen von kurzen Zacken tragen, gehört *El. Agondas* Boisd. (Papua) an, dessen Männchen oben schwarzbraun und bläulich gesäumt ist und auf der Unterseite der Hinterflügel innerhalb eines gemeinsamen orangenen Ringes im siebenten Randfelde eine einfache, im achten eine doppelte blaue Pupille trägt, die in einer schwarzen Iris liegt. Bei den Weibchen (*bioculatus* Dblld.) hellen sich die Flügel bis auf eine schmale Einfassung des Vorder- und Aussenrandes fast vollkommen aus. Ebenso wird der gelbe Ring der Hinterflügel undeutlicher, schimmert oben lehmfarbig durch und trägt im siebenten bis achten Randfelde ein auch oben vortretendes Blauauge, während der Hinterleib lehmfarbig geworden ist. So gleicht dies Weibchen auffallend *Tenaris bioculatus* Guér. Hierher gehört auch *El. Melane* Hew. (Aru), dessen Weibchen auf den Flügeln ein reineres Weiss mit schmälere, schärfer begrenztem Aussenrande trägt. Die schönste und grösste Art ist die von Dr. Staudinger, l. c., p. 223, als *Zethera* erwähnte *El. Kunstleri* Honrath (Perak, Malacca), von bedeutenderer Grösse und luggestreckter Flügelform. Am Vorderrande der weisslichen Vorderflügel liegen noch ca. 20 Strichel der ursprünglich wohl über die ganze Fläche verlaufenden Sperberung. Aus letzterer geht auch die Bildung von Querfleckenreihen hervor, welche auf den Hinterflügeln, besonders gegen das Zellende und in drei parallelen Reihen nahe dem Aussenrande, auftreten. So entsteht eine grosse Ähnlichkeit der bisher nur in einem Weibchen (in Herrn Honrath's Besitz) vorhandenen schönen Art mit dem Danaiden *Idropsis Duos* Boisd.

Um noch einige biologische Beobachtungen über *Elymnias* anzufügen, so fliegen nach Mittheilung des Herrn Wernicke in Dresden die Arten von *Elymnias* immer nur kurze Zeit und setzen sich bald im Gebüsch nieder; nach Herrn C. Ribbe ruhen sie besonders gern im Schatten an Baumstämmen aus. Nach brieflicher Mittheilung von Herrn L. de Nicéville fliegt *El. undularis* besonders in der Nähe von Büschen herum, fehlt im ganz offenen Lande und ist oft in Gesellschaft des Modells *Dan. Genatia* Cr. anzutreffen. Meist ruht das Weibchen von *El. undularis* am Ende eines trockenen Zweiges aus, wo es durch seine Unterseite an ein trockenes Blatt erinnert. Nach J. Wood-Mason verbreiten die Weibchen keinen Duft, während die Männchen Duftorgane auf den Hinterflügeln besitzen, von deren herrlichem Vanilleduft auch ich mich in Singapore überzeugt habe.

Im Anschluss an E. Schatz (l. c., p. 223) glauben auch wir, die eigenthümliche, auf die Philippinen und Celebes beschränkte Gattung *Zethera* Feld. in die Nähe von *Elymnias* stellen und wie erstere als einen Ausläufer des Satyriden-Stammes ansehen zu müssen. Bei einigen Arten lässt nur das Weibchen eine mimetische Anpassung, und zwar an Danaiden, erkennen. So besitzt das Männchen von *Z. Pimpleu* Er. (Philippinen) auf der Oberseite eine von den schwarzen Flügeln grell abstechende weisse, blau gesäumte Mittelbinde und auf der Unterseite ausserhalb dieser Binde zwei Reihen heller Randtüpfel. Dagegen treten dreierlei Formen von Weibchen auf, die alle dem Männchen unähnlich sind. Die var. ♀ *Aganippe* Feld. mit einer dem Männchen fehlenden Reihe von hellen Submarginaltüpfeln und bis zur Basis erweiterter, am Zellende unterbrochener Mittelbinde auf den Vorderflügeln erinnert durch den hinten grünen Ton der Vorderflügelmitte und die gelbliche Farbe der bis zur Basis erweiterten Mittelbinde der Hinterflügel durchaus an *Danaus Lotis* Cr. Eine zweite Varietät des Weibchens, var. *Tobleriana*, welche Semper (Philippin, Schmetterlinge, Taf. VII, Fig. 4) abgebildet hat, besitzt ebenfalls aufgehellte Hinter-

flügel, aber stärker in der Innenhälfte verdunkelte Vorderflügel mit leuchtend weisser Subapicalbinde; somit erinnert sie an die *Euploea Tollerii* Semp. Die dunkelste Form, var. ♀ *Parnassia* Feld., mit ganz schwarzbraunen Vorderflügeln, die nur einzelne leuchtend weisse Apicalflecke tragen, erinnert etwas an *Eupl. Swainsonii* God. ♀ und *Eupl. similima* Moore.

Bei *Z. Musa* Feld. trägt das Männchen auf der Oberseite ausser hellen Randflecken in schwarzgrünem Grunde der Vorderflügel nur eine in Tüpfel zerschnürte Mittelbinde, welche auf den hinteren breiter und gelblichgrün ist. Die Unterseite, auf der diese Binde in schwarzbraunem Grund als weisse Tüpfelreihe auftritt, erinnert somit schon an diejenige gewisser Euploeen. Das dunkle Weibchen aus Ostindonesien ähnelt besonders *Euploea (Crastia) Suellemi* Moore ♀, doch fehlt letzterer die Aufhellung um die Zelle, auch besitzt sie statt drei nur zwei Tüpfelreihen. Andere Weibchenformen sind heller gefärbt und der *Z. Pimplea* ♀ var. *Aganippe* ähnlicher, also variiert das Weibchen auch hier noch bedeutend.

Endlich sind in beiden Geschlechtern mimetisch die weisslichen, schwarzgefleckten Arten, welche als Untergattung *Amechania* Hew. abgetrennt wurden, *Z. incerta* Hew. und *Z. Hestioides* Feld. Bei denselben ist das Weibchen grösser, hat gestrecktere, mehr an Danaiden (*Idopsis*) erinnernde Flügelform und geringere schwarze Aussenrandzeichnungen. In der gelblichen Färbung seiner Vorderflügelbasis erinnert besonders ein Weibchen *Z. Hestioides* Feld. an *Idopsis Glaphyra* Semp. (Philippinen), während *Z. incerta* Hew. (Celebes) reiner weissen *Idopsis*-Arten (*vitrea* Blanch.) ähnlich ist.

Vergl. Tab. VII.
Fig. 45.

Die eigenthümliche seltene *Orinoma Damaris* Gray, erinnert ebenfalls in beiden Geschlechtern an gelbliche, mit ihr zusammen vorkommende Danaer, wie *Dan. crocea* Zinck., *Dan. Philomela* Zinck., *Dan. Cleona* Cr. (Birma, Nepal).

Familie der Pieriden.

Die Grundzeichnung der *Pieriden* dürfte aus einer dunklen queren Bänderung bestanden haben, welche eine helle marginale, eine submarginale und eine Mittelbinde erkennen liess. Mimetische Anpassungen an Angehörige anderer Familien treffen wir, wie A. R. Wallace¹⁾ bereits hervorhob, besonders in der Gattung *Eronia*. Hier besitzen die Weibchen meist eine stärkere Verdunkelung der Rippen, die sich auch in unregelmässigen Querbändern ausspricht und auf den Vorderflügeln zwei bis drei, auf den Hinterflügeln nur die äusserste Tüpfelreihe abschneidet. Auch bei *Eronia* ist die mimetische Anpassung selbst bei den Weibchen nur unvollkommen, obwohl sie so leicht entstehen konnte. So erinnert das Weibchen von *Er. Valeria* Cr. in der var. *Ceylonica* an dunkle *Danaus*-Arten (*Dan. Aglea* Cr. var. *Ceylonicus* Feld.), in der var. *lutescens* Butl. (Malacca, Sumatra, Borneo) durch die gelbe Basalfärbung der Flügel an *Dan. Philomela* Zinck. (Java, Sumatra) und *Dan. crocea* (Malacca, Sumatra). Einzelne Stücke des Weibchens der var. *Boebera* Esch. erhalten statt der grünen weisse und glasige Aufhellungen mit gelblichem Hauch und erinnern dadurch an die gelblichen *Idopsis*-Arten (Philippinen). Weiter erinnert eine Weibchenform von *Tritaea* Feld. (Celebes) an den dortigen *Dan. Ismare* Cr.

Nach Wallace gleichen die Weibchen von *Er. Argolis* Feld. (Batjan, Gilolo) und von *Er. Johaea* Böisd. (Seram, Papua) den dunklen *Danaus sobrinus* Böisd. und *Dan. Megaira* Godt.

¹⁾ A. R. Wallace, Pierid. Ind.-Austr. Regions (Trans. Ent. Soc., London, 1866, p. 309): „The particular circumstance that makes it probable that this is a true case of mimicry is that in several species a variety of the female occurs with the base of the hindwings bright yellow, exactly corresponding to the colour of other species of *Danaus*.“

Mehrere Arten von **Prionereis** Wall. führt Wallace dagegen als Nachahmer von *Delias*-Arten an: so gleicht besonders das Weibchen von *Pr. Thestylis* Dblld. auf beiden Seiten der *Delias Belladonna* F. (Darjeeling) mit schwarzer, grob gelbgefleckter Hinterflügelunterseite. Weiter gleicht *Pr. Sita* Feld. (Ceylon) unten genau der gemeinen *D. Eucharis* Dru. mit gelber, aussen von einer Reihe rother Aussenrandringe eingefasster Unterseite der Hinterflügel. Weiter gleicht *Pr. Cornelia* Voll. (Borneo) genau der *D. Singapura* mit gelber Unterseite der Hinterflügel, die in der dunklen Aussenrandseinfassung weisse Randmonde trägt.

Familie der **Papilioniden.**

Wegen genauerer Angaben über die Zeichnung der nachahmenden Arten von **Cosmodesmus** verweise ich auf die erste Arbeit dieses Bandes, p. 36—37; hier genüge eine kurze Aufzählung.

Die Modelle sind ausschliesslich Danaiden. Arten von *Hestia* werden nur in *H. Ideca* Cl. (Philippinen) durch *P. (Cosm.) Ideoides* Hew., Arten von *Ideopsis* Horst. in *Id. Daos* Boisd. nur durch *P. (C.) Laodocus* De Haan, besonders im Weibchen, copirt, bei dem das gelbe Analauge unendlich wird.

Die Nachahmungen von *Danaus*-Arten beschränken sich auf solche der Untergattung *Radenia*. So ähnelt *P. (C.) Macareus* Feld. (Java, Nordindien Borneo) in beiden Geschlechtern der *Dan. Aglea* Cr., so *P. var. Stratoctes* Feld. ♀ (Mindanao) der *Dan. vitrina* Feld., so *P. (C.) Xenocles* Westw., besonders im Weibchen durch die verwaschen rostbraune Farbe der Hinterflügel der *Dan. Tylia* L. (Sikkim), so *P. Euryclades* Hew., weniger *P. Dewallion* Hew., der *Dan. Ismarc* Cr. (Celebes). Endlich erinnert *P. (C.) Luciothoe* Westw. (Nordindien) an braune Euploeen (*Crastia* sp.).

Zahlreicher und mannigfaltiger sind die Modelle, welchen vorerst die Weibchen der nachahmenden **Rinnenfalter (Papilio s. str.)** sich anpassen, wofür ich auf p. 41 p. p. verweise.

So erinnert das Weibchen von *P. Erechtheus* Don. (Australien) oberflächlich an den kleineren *Euryus cressida*, das von *P. Gumbrius* Cr. (Amboina) an *Tenaris* sp., die von *P. Ormenus* Guér. und *P. Pondion* Wall. (Papua) an *Tenaris bioculatus* Guér. resp. *Papilio (Pharm.) Polydorus* L., das von *P. Tydeus* Feld. (Batjan) an *Ten. bioculatus* Guér., das von *P. Abrastus* Feld. (Banda), von *P. inopinatus* Butl. (Timorlauti), *P. Ambrar* Boisd. (Papua) wieder an *Pap. (Ph.) Polydorus* L. Dagegen ist in beiden Geschlechtern *P. Anactus* MacLey der *Euryus cressida* F. und *P. Alvidius* Oberth. und *P. Laghazei* Dep. der Uranide *Alidis Orantes* Feld. (Papua) ähnlich.

In einem anderen Gruppencomplex erinnert das Weibchen von *P. Ascalaphus* Boisd. (Celebes) an *Ph. Polyphontes* Boisd., das von *P. Deiphobus* L. (Amboina) an *Ph. Polydorus* L. Die Weibchenform *Ramanzoria* Esch. des *P. Emalthion* Hb. (Philippinen) erinnert an *Papilio (Pharm.) Phegeus* Hopffr., die zweite Form *Semperiana* n. an *P. (Ph.) Semperi* Feld. Das Weibchen von *P. Mayo* Atk. (Andamanen) gleicht *P. (Ph.) Rhodifer* Butl., das von *P. Lowii* Druce ähnlichen Aristolochienfaltern, das von *P. Oenomaus* Godt. (Timor) dem *P. (Ph.) Loris* Godt. Von den vielen Weibchenformen des *P. Memnon* s. l. entspricht *Agaur* dem *Ph. Zedemus* Hew. (Malacca), die var. *Esperi* Butl. dem *Ph. Astorion* Westw., die var. *Achates* Cr. dem *Ph. Doubledayi* Wall. (Nordindien), die var. *Alcazar* Cr. dem *Ph. Aristolochiae* F., die var. *Laomedon* Cr. dem *Ph. Priapus* Boisd., die var. *Erbina* dem *Ph. Erabus* de Haan (Borneo), die var. *Aeneus* dem *Ph. Syarax* Dist., endlich die var. *Achatiades* Esp. dem *Ph. Coon* F.

In einem dritten Gruppencomplex erinnern die mimetischen Weibchen von *P. Pantheon* L. in var. *Polytes* L. (Indien) an *P. (Ph.) Aristolochiae* F., in var. *Romulus* L. an *P. (Ph.) Hector* L.; die

Weibchen von *P. Theseus* Cr. in ihren verschiedenen mimetischen Formen an *P. (Ph.) diphilus* Esp., *P. Antiphus* F., *P. Liris* Godt., die von *P. Ledebourius* Esch. an *P. (Ph.) Polydorus* L., *P. Antiphus* F. und *P. Polyphontes* Boisd.

In einem vierten Gruppencomplex schwanzloser Arten sind vorerst die Weibchen denen von Danaiden ähnlich. So erinnert das Weibchen von *P. Castor* Westw. an *Danaus Limniace* Cr., dagegen ist in beiden Geschlechtern *P. Dracidarum* Wood.-Mas. demselben *Danaus*, *P. dissimilis* L. dem *Dan. Melissa* Cr., *P. Panope* L. der *Euploca Core* L.¹⁾, *P. Hewitsonii* Westw. (Borneo) der *Eupl. Ménétriesii* Feld., *P. Slateri* Hew. (Java) der *Eupl. Linnaei* Moore, *P. Astina* Horsf. (Java) einer *Crasia* sp., *P. Caurus* Westw. (Malacca etc.) der *Eupl. Ithalamantus* F. ähnlich. Die Varietäten von *P. Paradoxaus* Vergl. Taf. VII, Fig. 51. Taf. VIII, Fig. 53. Zinck.²⁾ gleichen oft den entsprechenden Geschlechtern brauner oder blauer Euploeen, und *P. Epygides* Hew. (Sikkim) erinnert wieder in beiden Geschlechtern an helle *Danaus*-Arten, *P. Fecoris* Hew. (Celebes) Vergl. Taf. VII, Fig. 46. 47. an *Dan. Ismare* Cr., *P. Agestor* Gray (Sikkim) auffallend an *Dan. Tytius* L.

Familie der **Chalcosiiden.**

Da die häufigsten und grössten Formen dieser unseren Zygaenen verwandten Familie oft eine metallisch blaue oder grüne, mit Roth gemischte, auffällige Färbung besitzen, wird es wahrscheinlich, dass Chalcosiiden in gewissem Grade vor Angriffen insectenfressender Vögel geschützt sein dürften, zumal ihr Flug im Allgemeinen sehr langsam und schwertätig und ihr Fang sehr leicht ist. So sind es vielleicht nur ursprünglich seltener vorkommende Formen gewesen, welche gewissen Modellen ihrer Heimath schon durch den Einfluss gleicher Localbedingungen etwas ähnlich geworden waren, und von deren Variationen nun unter dem Einfluss der Naturauslese die am meisten dem Modell angepassten sich erhielten und als vortheilhaft vererbten.

Eine *Chalcosia* (Coll. Staudinger) mit unten gelben Hinterflügeln gleicht *Delias Themis* Hew. ♀ (Timor); eine Art aus der Minahassa gleicht der *Eupl. Eupator* Hew., einer schwarzen Form mit weissen Submarginaltupfeln auf beiden Flügeln. — Die bekannte *Cylosia Midamus* Boisd. (Sikkim) erinnert besonders in dem Weibchen an dasselbe Geschlecht der *Eupl. Linnaei* Moore, doch ist die Aehnlichkeit nur unbedeutend.

Höher steigt die Anpassung an Euploeen in der danach benannten Gattung *Mimnaploca* Butl. So ähnelt *M. Rhodamante* Butl. (Malacca) der gleich benannten Euploeen-Art, und zwar besonders den Weibchen mit stärker verdunkelten Hinterflügeln, und eine andere Art derselben Gattung erinnert an die dunkle *Eupl. Ménétriesii* Feld. (Malacca). Formen wie die Arten von *Gynandocera* führen uns zur merkwürdigen Gattung **Epicopeia** Westw. über, welche nur aus mimetischen Formen zu bestehen scheint, die sich an schwarzweissrothe Aristolochienfalter (Pharmacophagus)³⁾ anpassen.

¹⁾ Nach A. Seitz, Die Schmetterlingswelt des Monte Carovado (estet. entomol. Zeits., 1889, p. 97, t. 1) *P. Panope*, wie dies ähnlich von *P. Paradoxaus* berichtet wird, ich bei einiger Vorsicht von den Blüthen wognehmen.

²⁾ Vergl. die Abbildungen von Hewitson in Proc. Zool. Soc. Lond., 1859, Taf. 66—67.

³⁾ In der That verbrütete eine frisch gebogene *Chalcos. papilionaris* Pr., die ich bei Bangkok, Ung. Bern. 1887, auf den Thorax einen geraden unangenehmen Dorn, an Lebensfähigkeit übertrat, das gespinnste Thoraxsegment aber den bekannten Schmetterlinge.

⁴⁾ Vielleicht folgt sogar die Rame von *A. sticticus*.

Wie bei den Modellen ist hier Kopf, Brust und Hinterleib oft rose-roth gefärbt; ebenso tragen die Vorderflügel eine gleichmässig schwarz- oder braungraue Grundfarbe, welche von dunkleren Inter-costalfalten durchzogen ist; dagegen sind die Hinterflügel recht verschiedenartig gefärbt. So sind sie bei *E. Philenora* Westw. (Indien) abgerundet und einfarbig bronze-grün. Dadurch erinnert diese Art an *P. (Ph.) Astorion* Westw.

Bei *E. Diphilata* Moore tritt ein Theil der Mittelbinde der Hinterflügel als weisser Spiegel oben vor; auch besitzt diese Art drei rothe Hinterflügel-flecke und ist so dem *P. (Ph.) Latreillei* Godt. etwas ähnlich. Bei *E. Polydora* Westw. sind die Hinterflügel sogar in einen stumpfen Schwanz ausgezogen und tragen einen weissen Binde-rest und oben fünf rothe Ringe; so erinnert diese Art an *Ph. Dasarada* Moore ♀ (Sikkim). Das Weibchen von *E. Varunaca* Moore gleicht endlich einer weissbindigen, länger geschwänzten Form von *Ph. Latreillei* Godt., und *E. Menca* Leach, eine kleinere Art mit etwas durchsichtigem grauen Vorderflügel und kurzem Hinterflügelschwanz, der nördlichste Ausläufer der Gattung, erinnert etwas an kleine Stücke von *Ph. Alcinous* Kl. var. *Mencias* Feld. (Japan) ohne Weiss auf den Hinterflügeln. Nach Mittheilung des Herrn Mewes in Darjeeling sind die Epicopeien viel seltener als die Pharmacophagus-Arten, besuchen ebenfalls Blumen und fliegen etwas später im Jahre (September bis October).

Von mimetischen Angehörigen anderer Gattungen der Chalcosiden erwähne ich noch **Epyrgis pyroides** Hew.-Schäffl., welche auf den Vorderflügeln vier, auf den hinteren einen grossen schwarzen Fleck auf weissem Grunde besitzt und somit *Ideopsis Daos* Boisd. gleicht.

Einige Arten von **Erasmia** gleichen Agaristiden; so erinnert *Er. Eusemioides* F. et Rog. (Borneo) mit schwarzen, von einer schmalen weiss-gelben Diagonalbinde durchzogenen Vorderflügeln und orangenen, breit schwarz gesäumten Hinterflügeln an eine *Eusemia* von dort.

Auch Arten von **Eterusia** Walek. erinnern an Eusemien, so *Et. latirittata* Moore an *Eusemia rufica* Westw., *Et. tricolor* Hope und *Et. scindillans* H. S. (Darjeeling) an *Ea. dives* Btl.

In der Gattung **Canerkes** Walk. finden wir endlich ausgezeichnete Anpassungsformen an die meist sehr individuenreichen, bei Tage fliegenden Eusemiden. So ist bei *C. eusemioides* Moore (Cherri, Pugi, Coll. Standinger) wie bei dem gemeinen *Euschema (Hasis) militare* L. die Farbe des Leibes und der Hinterflügel gelb mit blauen Flecken, die Innenhälfte der Vorderflügel gelb, die Aussenhälfte glasig und veilchenblau gefleckt. Auch *C. semiplena* Walek. (Minahassa) gleicht einer verwandten Art von *Euschema* der Coll. Standinger ebendaher.

Als bekanntes¹⁾ Beispiel einer mimetischen Anpassung an die Agaristide *Ophthalmis Linca* Cr. mit schwarzen, an der Spitze orange-gelben Vorderflügeln und breit orange-gelb gesäumtem Aussenrande der Hinterflügel (Amboina) sei hier die **Liparide** *Artaxa simulans* erwähnt.

Afrikanische Region.

Die Modelle für mimetische Anpassung unter den afrikanischen Tagfaltern gehören den auch in Indien vertretenen Gattungen *Danaus*, *Euploca* und besonders *Acraea* an, zu welchen noch die reine afrikanische Danaiden-Gattung *Amphis* Hb. hinzutritt. Unter den Heterocereren dienen *Eusemia*, *Nyctanera* und die rein afrikanische *Abtis* als Modelle.

¹⁾ Vergl. Challengier, Report, Narrative of the Cruise, Vol. 1, Pl. 2, p. 589, Fig. 191; Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 5, Vol. XIII, 1881, p. 299; A. R. Wallace, Darwinism, 1889, p. 246—247, Fig. 24.

a. Als Modelle dienende Familien und Gattungen.

1. Unterfamilie der **Danainen**.

Von den drei in Afrika vorkommenden Formen von **Danaus** L. ist der besonders in Zanzibar und an der Goldküste häufige *Dan. Petiveranus* Dbl. wohl nur eine vicariirende Form des *Dan. (Tirumala) Limniace* Cr. Aehnlich bildet der auch in Afrika weit verbreitete *Dan. Chrysippus* L. die diesem Continent eigenthümliche var. *Altippus* Cr. mit weisslicher Aufhellung der Hinterflügelmitte und die auch in Indien vorkommende var. *Dorippus* Klug ohne weisse Subapicalbinde der Vorderflügel. Eine dritte Afrika eigenthümliche local beschränkte Art aus Centralafrika (Mombas), *Dan. formosus* Godm., ist stark verdunkelt und in der Anordnung der zahlreichen unregelmässigen Bidentüpfel der *Dan. Limniace* Cr. ähnlich, doch unterscheidet sie sich durch eine grosse rostbraune Basalaufhellung der Vorderflügel.

Vergl. Taf. III,
Fig. 23

Nach R. Trimén¹⁾ sind die afrikanischen Danaiden (und Acraeiden) „malodorous and unpalatable as food . . . evidently recognised as uncatable by insectivorous birds“. *D. Chrysippus* (ib., p. 54) fliegt gewöhnlich ziemlich langsam und besucht besonders offene Niederungen und Gärten. Die Raupe frisst Asclepiadeen (*Gomphocarpus fruticosus*, *Ceropegia Barberae*, *Stapelia* sp. (Bowker) und *Calotropis procera*. Nach Trimén ist die Verbreitung dieser Art deshalb so ausgedehnt, weil die Asclepiadeen von herbivoren Säugern fast garnicht angerührt werden.

Die Formen der Gattung **Amauris** Hb. stehen in der Ausbildung der Dufteinrichtung, die am Ende des ersten Dorsalastes der Hinterflügel liegt, und in dem selbstständigen Verlauf des zweiten Radialastes vom Zellende den indischen Arten des subg. *Rudena* Moore näher. Von den häufigeren Arten, welche allein Gegenstand mimetischer Anpassung werden, besitzt *A. Egialea* Cr. (Westküste) in der Mitte der schwarzbraunen Vorderflügel zwei grössere und aussen mehrere kleinere halbdurchsichtige weisse Tüpfel, während die Hinterflügel leicht grau- und gegen die Basis aufgehellt sind. Bei *A. Echeria* Stoll (Südafrika) mit etwas kleineren, oft lehngelben Tüpfeln der Vorderflügel verläuft über die Mitte der dunkel schwarzbraunen Hinterflügel eine breite lehngelbe Binde. Bei *A. Niaria* L., welcher sich am nächsten an die Zeichnung der indischen *Cleona*-Untergruppen anschliesst, treten auf den Vorderflügeln einzelne Marginaltüpfel, ein Zellbindenrest und eine weisse Subapicalbinde auf, während die nur bis zur Zelle reichende Mittelbinde sich breit bis an die Basis der aussen schwarz gesäumten Hinterflügel fortsetzt. Bei der südlichen Varietät var. *Dominicana* Trim. sind die weissen Aufhellungen grösser und reiner, die Verdunkelungen schmaler und tiefer und so der Farbencontrast erhöht.

Vergl. Taf. II,
Fig. 12 u. 14,
u. Taf. IV,
Fig. 25.

Der Flug der *Amauris*-Arten ist nach Trimén „deliberate, floating, much about one spot“, auch sind sie leicht zu fangen. Mit Ausnahme von *A. Phaedon* Luc., der auf Mauritius in Gärten lebt, halten sie sich besonders in Wäldern auf. Wie viele indische *Danaus*-Arten setzt sich auch *A. Echeria* auf Zweige, an denen sie still mit geschlossenen Flügeln hängen bleibt. — Auch die Raupe von *Amauris* hat fünf Paar Subdorsalfäden wie andere Danaiden. Ihre Futterpflanze war Trimén noch unbekannt.

Von einer der wenigen auf die ostafrikanischen Inseln (Madagascar, Mauritius, Bourbon) beschränkten Arten von *Euploea* L., *Eu. Euphone*, erwähnt Trimén²⁾, dass sie ebenfalls „when handled“ einen starken Duft ausströmt.³⁾

¹⁾ R. Trimén and Bowker, South African Butterflies, 3 Vols. I, 1887, p. 35.

²⁾ Trans. Linn., Soc. XXVI, 1869, p. 498.

³⁾ Nach Trimén (Trans. Ent. Soc. 1867, p. 332) fliegt mit der *Euploea* zugleich die *Neolycaena* (Linn.)

Unterfamilie der **Acraeinen**.

Die zahlreichen afrikanischen Arten der Gattung **Acraea** L. werden von Schatz im Anschluss an Doubleday in mehrere Untergattungen unterschieden, *Hyalites*, *Gnecsis*, *Telchinia* und *Planema*, von denen wir die ersten drei mit Trimen besser zusammenfassen. In dieser Untergattung *Hyalites* Dbld., deren Arten durch zahlreiche schwarze Flecke auf beiden, oft theilweise durchsichtigen Flügeln, eine Reihe von Marginalmonden auf den hinteren und häufig noch durch ein besonders an frischen Stücken lebhaft leuchtendes „Acräenroth“, das im Leben nach Trimen einen Stich in's Carminrothe hat, ausgezeichnet sind, ist besonders die schöne *A. Egina* Cr. (tropisches Westafrika) mit breit rother, über die Hinterflügel und das hinterste Drittel der vorderen ziehender Mittelbinde und schwarzer Spitze der Vorderflügel im männlichen Geschlecht und blasseren, eine weisse Subapicalbinde tragenden Flügeln im weiblichen Geschlecht Gegenstand der Nachahmung von Seiten Angehöriger anderer Familien. In noch höherem Maasse dienen die Arten der Untergattung *Planema* als Modelle mimetischer Anpassung. Ihre Männchen tragen meist eine breit röthlichgelbe, ihre Weibchen eine weissliche, bis fast zur Zelle der Vorderflügel gehende Mittelbinde und ausserdem auf letzteren eine Apicalbinde. Auf der Unterseite der Hinterflügel treten statt der Marginalmonde zahlreiche Intercostalstreifen am Aussenrande auf und liegen einige schwarze Flecke in der röthlichgelben Basis. Die Arten variiren oft ausserordentlich; so genüge es hier, auf die zahlreichen Varietäten der *A. Euryta* E. (Gabun, Congo, Angola) hinzuweisen, von denen z. B. var. *Vestalis* F. fast ganz rauchbraune, var. *Alcinoe* F. dagegen mit Ausnahme der Spitze hell rostbraune Vorderflügel besitzt. Die nahe stehende, mehr constante *A. Gaeta* F. (Guinea, Camerun) unterscheidet sich besonders durch die geringere Fleckenmenge auf der Oberseite der Hinterflügel. Die von dem Innenwinkel der letzteren beginnende Mittelbinde zieht sich, bei dem Männchen breiter und rostgelb, bei dem Weibchen schmaler und weiss aufgehellt, bis fast zur Zelle auch über die sonst nur noch eine scharfe Subapicalbinde tragenden Vorderflügel. Auf der Unterseite der Hinterflügel trägt das Weibchen, welches besonders als Modell dient, an der röthlichbraunen Basis einzelne schwarze Flecke, denen eine weissliche Binde und ein breiter grauer Saum folgt, der durch die dunkleren Intercostalstreifen durchbrochen ist.

Die Acraeen sind nach Trimen ausserordentlich lebenszäh. „No pressure of the thorax, short or absolute crushing of the tissues, suffices to kill or even paralyze these butterflies.“ Wie bei den Danaern entquillt ihrem Körper schon bei leichtem Druck eine klare Flüssigkeit, die dem Secret der Coccinellen entsprechen und auch die hauptsächlichliche Trägerin des „peculiar scent“ sein soll.¹⁾ Wie Trimen ebenfalls beobachtete²⁾, wurde ein Saft lassender Acazienbaum, der Tummelplatz der saugenden Insecten, auch von räuberischen Mantiden besucht, welche hier zahlreiche Opfer fanden. Unter den am Fusse des Baumes niedergefallenen Flügeln der letzteren fand Trimen niemals die von *Acraea* oder *Danaus*.

Nach Trimen treten die Acraeen meist in grösseren Mengen auf, fliegen sehr langsam und sitzen auf niedrigen Blumen mit ausgebreiteten Flügeln. Ihr Benehmen zeichnete sich durch „complete

¹⁾ „The peculiar odour seems to reside chiefly in a bright yellow liquid secretion, which, on pressure of the thorax, exudes somewhat copiously.“ (R. Trimen and Bowker, l. c. I, p. 139.)

²⁾ R. Trimen, On some remarkable Mimetic Analogies among African Butterflies (Trans. Linn. Soc. XXVI, 1859, p. 500).

disregard of concealment“ aus. Die Larven leben in grossen Mengen vollkommen frei und haben dieselbe, wenn auch nicht so starke Ausdünstung wie die Falter.

Trimen führt folgende Futterpflanzen der oft sehr auffälligen (z. B. indigoblau gefleckten) Raupen an: *Aer. Horta* L. auf *Kigellaria africana* (Erythrospermeae), auf *Passiflora coerulea* und *Tacsonia magnifica* (Passiflor.); *Aer. Aeara* Hew. und *Aer. (Pha.) Gea* L. auf Passifloren; *Aer. Eusebria* Hew. auf *Fleurya* (Urticac.) und *Aer. Buxtoni* Butl. auf *Hermannia* (Buettneriac.); die Arten der Untergattung *Planema* leben besonders in Wäldern.

Familie der Pieriden.

Der Vollständigkeit wegen erwähne ich die erst in seinem grossen Werke über die südafrikanischen Falter gemachte Angabe Trimen's, dass die langsam fliegende *Mylothris Agathina* Cr. durch beide Geschlechter von *Pieris Thysa* Hopfr. und das Weibchen von *Eronia Argia* copirt werde, während sich in Westafrika *P. Rhodope* F. der *M. Poppra* Cr. anpasse. Dies Beispiel bedarf noch der experimentellen Prüfung am Falter von *Mylothris*, da die Nahrung der Raupe von *M. Agathina* (*Loranthus*) nicht gerade für die Widrigkeit der Imago anzuführen wäre. Jedenfalls ist aber *Mylothris* der Verzweigung der Radialis der Vorderflügel nach die abgeleitete Form von *Pieris* und ihre Vertreter sind relativ häufiger. Auch ist die Aehnlichkeit z. B. zwischen *M. Poppra* Cr. und *P. Rhodope* F. geradezu auffallend. Weiter neigen die sehr seltenen Weibchen der Eronien, welche nach der Futterpflanze der Raupe (*Capparis*) recht wohlschmeckend sein dürften, auch in Inchen stark zur mimetischen Anpassung an widrige Modelle und sind ebenso schwache als die Männchen vortreffliche Flieger.

Angehörige der Heteroceren.

Von den von R. Trimen¹⁾ angeführten, anscheinend immunen Heteroceren, *Pais decora*, *Eusemia euphemia*, *Glaucopis formosa*, die alle „a strong and offensive odour“ besitzen, Tropfen einer weissen oder gelben Flüssigkeit absondern sollen und langsame Flieger und dabei auffallend gefärbte, sehr häufige Thiere sind, ist nur die *Eusemia*-Art als Modell einer mimetischen Anpassung bekannt geworden. Dieselbe besitzt schwarze Vorderflügel, welche mehrere dem Hinterrande parallele gelbweisse Bänderreste tragen, und gelbe, innen rosenroth angehauchte, aussen breit schwarz gesäumte Hinterflügel.

Eine charakteristische und zugleich typisch afrikanische Widrigkeitsfärbung treffen wir bei mehreren afrikanischen Heteroceren an, die alle bei Tage fliegen und widrigen Familien angehören. Als Typus derselben möchte ich die häufigste Art, die zu den Lithosiiden gerechnete *Aletis Helcita* Cr., ansehen, welche einen schwarzen, mit drei leuchtend weissen Tüpfelreihen besetzten Leib und fast mennigrothe Flügel besitzt, die in dem breiten schwarzen Aussensaum leuchtend weisse Tüpfel tragen. Dieser Art gleichen nun auch durchaus zwei Vertreter der Agaristiden, die *Phaeogorista Helcitooides* Dew. und die *Eusemia Falkensteinii* Dew., anscheinend seltener Arten. Spätere Untersuchungen werden zu entscheiden haben, ob *Aletis* in der That den Agaristiden zum Modell diene.²⁾

Vergl. Taf. IV,
Fig. 29. 3. 32.

¹⁾ Trans. Linn. Soc. XXVI, 1869, l. c. p. 394.

²⁾ Dazu bedarf es der Untersuchungen über den Grad der Häufigkeit, die ursprüngliche Gattungstracht, die Raupennahrung, den Grad der Immunität der einzelnen Formen.

b. **Mimetische Anpassungsformen.**

Die afrikanischen Nachahmer gehören meist nur den Tagfaltern und zwar den Familien der Nymphalinen, der Satyriden (*Elymnius*), der Lycaeniden, der Pieriden und endlich der Gattung *Papilio* an. Unter den Nymphalinen kommen mimetische Arten nur in der Diademen-Gruppe (*Hypolimnas* mit der Untergattung *Euralia*) und der *Limnitis*-Gruppe (*Pseudacraea* Westw. und *Euphaedra* Hb. = *Romalucosoma* Blanch.) vor.

Unterfamilie der **Nymphalinen.**

Auch in Afrika tritt uns in der Gattung **Hypolimnas** Hübn. *Hyp. Bolivia* L. in einer Varietät entgegen, var. *Inaria* Cr., die sich durch das Fehlen der weissen Subapicalbinde der Vorderflügel kennzeichnet und auch in Indien vorkommt. Nun findet sich zwar die der *Inaria* gleichfarbige und als Modell anzusehende var. *Dorippus* Kl. des *Dan. Chrysippus* L. in Querimba, Ambakol, Witu, Userama, Usagara, Zanzibar, Abessinien, die var. *Inaria* des *Hypolimnas* dagegen nur in Angola, Chinchoxo (Mus. Berlin), Loko, Gabun, Transvaal (Coll. Staudinger) vor. Auch die Exemplare der beiden Formen aus dem Brit. Museum stammten noch vor drei Jahren aus verschiedenen Localitäten. Dagegen führt Trimen (Trans. Linn. Soc. XXVI, p. 504) beide aus d'Urban und Natal an: so treten sie doch vereinzelt zusammen auf.

Die ausschliesslich auf Afrika beschränkte Varietät mit weisslich aufgetheilten Hinterflügeln, var. *Alciippoides* Butl., kommt mit dem gleichgefärbten *Dan. Chrysippus* var. *Alciippus* Kl. zusammen in der Sierra Leone und nach der Coll. Staudinger auch in Natal vor. Nach Swinhoe (Proc. Zool. Soc. 1884, p. 501) ist in Kurrachee die var. *Inaria* des *Misippus*-Weibchens häufiger als die Stammform. Die dunkle, bedornete Raupe frisst *Portulaca oleracea* und *P. quadrifida*.

Für die in beiden Geschlechtern mimetischen Arten der Gattung *Hypolimnas* nimmt Trimen die Untergattung **Euralia** Westw. (Sect. B, Subsect. a, von Doubleday) an, deren Arten sich durch weiss gefleckten Leib und die vollkommen offene Hinterflügelzelle als abgeleitet erweisen. Auch diese Formen dürften, wie die indischen Euploeen-Nachahmer der Gattung *Hypolimnas*, von Arten mit blauen Randtüpfeln, mit Subapicalbinde der eckigen Vorderflügel und damit ursprünglich in Verbindung stehender bläulicher Mittelbinde der Hinterflügel entstanden sein, welchen *Hyp. Salmacis* Dru. noch nahe steht. Weitere Formen, bei welchen sich die weisse Mittelbinde beider Flügel gegen die Basis erweiterte, wie *Hyp. imperialis* Stgr. (Zanzibar) erinnern besonders im Weibchen schon oberflächlich an *Amauris*-Formen der *Nivius*-Gruppe, sind aber viel grösser als letztere. Endlich bildet sich bei kleineren Arten (subg. **Euralia** s. Trimen) eine vollkommene Anpassung an *Amauris*-Arten aus, die sich auf beide Geschlechter ausdehnt. So ist *Hyp. Anthedon* Dbl. (Natal, Angola, Gabun) der *Amauris Nivaria* L. sehr ähnlich, und ebenso passt sich ihre südliche Form, var. *Hyp. Wahlbergi* Trim., der dortigen Rasse var. *Dominicana* dieser *Amauris*-Art an. Ebenso gleicht *Hyp. dubius* Beauv. (Goldküste, Camerun, Fernandopo, Gabun, Natal) der *Am. Egiptea* Cr.; *Hyp. deceptor* Trim. der an *Am. Nivius* L. erinnernden *Am. Ochlea* Tr. (Natal) und endlich der *Hyp. mimus* Tr. der *Am. Echeria* var. *albimaculata* Butl. Einige der mimetischen Arten von *Hypolimnas* variiren häufig; so kommen bei *Hyp. Anthedon* einzelne Stücke mit fast ganz weissen Vorderflügeln, bei *Hyp. dubius* Beauv. solche mit ganz schwarzen Hinterflügeln vor (Coll. Staudinger), also Formen, welche den Modellen weniger gleichen.

Vergl. Tat. II,
Fig. 13.

Vergl. Tat. IV,
Fig. 24.

Vergl. Tat. II,
Fig. 11.

Modelle und Nachahmer fliegen an denselben Fangplätzen und sind meist einander so ähnlich, dass selbst Trimen den *Hyp. Wahlbergi* zuerst für eine *Am. Echeria* hielt, bis er seinen „more active flight“ erkannte.

Ueber grünbindige Arten der Gattung **Pseudacraea** Westw. (*Panopaea* Hbr.), wie *Ps. Lucretia* Cr. und *Ps. Semire* Cr. (Westküste) ist durch Erblassen der Färbung, besonders der Hinterflügel, *Ps. Torquinia* Fr. (Natal) abzuleiten. Erinert dieselbe auf der Oberseite unbedeutend an *Amauris Echeria* Tr., so besitzt sie doch an der Unterseite der Hinterflügel in der rostbraunen Basalfärbung die schwarzen Flecke, welche die erste Bedingung der Anpassung an den acraïoiden Typus sind. Dadurch führt sie zu den derselben Gattung angehörigen *Planema*-Nachahmern über, welche in zahlreichen Formen vorkommen, deren Artrechte erst durch die Zucht der Falter entschieden werden können. Von denselben gleicht *Ps. Dolomene* Hew. (Mus. Berlin) durchaus der *Acr. Euryta* L. var. *Alcinoe* Feld.¹⁾; so *Ps. Känöri* Dew. mit orangener, über die Zelle gehender Vorderflügel- und weisser Hinterflügelbinde einer anderen Varietät (Guinea) des Mus. Berlin. So erinnert *Ps. Gottbergi* Dew. mit gelber Querbinde der Vorderflügel und gelbbraunen Hinterflügel mit starken Intercoastalstreifen an Formen von *Acr. elongata* Butl. (Coll. Ständerger) und *Ps. Hirc* L. genau an die entsprechenden Geschlechter von *Acr. Gea* L. Weiter gleicht *Ps. striata* Butl. ^{Vergl. Taf. III, Fig. 15.} (Sierra Leone) mit verdunkelten Vorderflügeln genau der *Acr. Euryta* var. *Vestalis* Feld. und *Ps. Metaplanema* Butl. (Camerun) der *Acr. Euryta* var. *Umbra* Cr. mit schmaler gelblicher Vorderflügelbinde und rostbraunen Hinterflügeln, wie *Ps. fulcaria* Butl. mit weisser Vorderflügelbinde (Isaba) dem dazu gehörigen Weibchen.²⁾

Einen selbstständigen, durch die Erhaltung der Marginalmonde der Hinterflügel dem Stamme näher stehenden Zweig bildet die *Boisdavidii*-Gruppe. Dieselbe besteht aus zweierlei Formen, von denen *Ps. Boisdavidii* Tr. den beiden Geschlechtern von *Acr. Egina* Cr. und die var. *Trimeni* Butl. (= *Boisdavidii* ^{Vergl. Taf. IV, Fig. 28.} Trimen 1868 [Congo, Natal]) genau *Acr. Acara* Hew. mit gelbbrauner Subapicalbinde und mehr Roth am Innenrande der Vorderflügel gleicht.

Ueber die Aehnlichkeit der Acraeen und Pseudacraeen äussert sich Colonel Bowker³⁾, dass es ganz unmöglich ist, Modelle und Nachahmer im Fluge oder sitzend zu unterscheiden; „and the first notice you get is the bristle crunch between finger and thumb“ der *Pseudacraea* oder „the soft leathery feel“ der *Acraea*, infolge dessen die erstere sofort stirbt, „while you may squeeze“ die *Acraea* „as long and as hard as you like without effect; nothing but the poison bottle will settle him.“ Auch hier fliegen die Modelle vor den Nachahmern und sind besonders im Februar und April häufig, während die Nachahmer erst im März bis Juni folgen.

Besondere Beachtung verdient noch die interessante, von Dewitz seiner Zeit als *Hypolimnas* beschriebene *Pseudacraea Poggei* Dew. (Westafrika), welche dem Weibchen von *Hypolimnas Bolina* L., ^{Vergl. Taf. III, Fig. 22.} *Missippus* L. analog, eine ausgezeichnete Anpassungsform an den *Danaus Chrysippus* L. in beiden Geschlechtern bildet. Die zahlreichen Arten der Gattung *Euphaedra* Hübn. (*Romaleosoma* Blanch.) besitzen meist in beiden Geschlechtern grünschwärze Flügel mit heller Subapicalbinde auf den vorderen und abgekürzter

¹⁾ Der einzige deutliche Unterschied zwischen Modell und Nachahmer liegt in der bei den Acraeen auch oben convex geschlossenen Mittelzelle der Hinterflügel.

²⁾ Nach Trimen und Bowker, South African Butterflies, gleicht die mir unbekanntes *Ps. imitator* Tr. (Natal, Delagoabay) in beiden Geschlechtern genau der *Acr. (Pl.) Anacis* Hew.

³⁾ Vergl. Trimen und Bowker, South African Butterflies, Vol. III.

breiter Mittelbinde auf den Hinterflügeln. Bei der seltenen *E. Zampa* Westw. entsteht nun bei dem Männchen auf der Unterseite beider Flügel und oben an der Basis der hinteren eine rostrothe Färbung, welche bei dem Weibchen auf der Oberseite sich verstärkt. So erinnert das Weibchen in geringem Grade an die immense Heterocere *Aletis Helcita* Cr. Ueber Formen wie *E. Eleus* Dru., bei welchen die Vorderflügelspitze der Männchen noch oben einen grünlichen Ton zeigt und die Unterseitenzeichnung noch an die der typischen Arten erinnert, aber der Leib schon weisse Tüpfelreihen erkennen lässt, finden wir einen Anschluss an *E. Raspina* Hew. (Alt-Calabar, Camerun, Gabun, Congo), die in beiden Geschlechtern der ziegelrothen *Aletis* gleicht.¹⁾ Der weitere Fortschritt in der mimetischen Anpassung besteht vor Allem darin, dass die Vorderflügelspitze und der Aussenrand der Hinterflügel sich auch auf der Unterseite schwärzen. So tragen die ziegelrothen, an der Spitze etwas abgerundeten Vorderflügel auf beiden Seiten wie bei dem Modell in der tief und breit verdunkelten Spitze den leuchtend weissen Rest der Subapicalbinde und auch die ebenfalls ziegelrothen Hinterflügel führen in der breiten Aussenrandseinfassung eine regelmässige Reihe weisser Marginaltüpfel.

Vergl. Taf. IV,
Fig. 31

Eine unvollkommene Anpassung an braune Aeraeen der *Euryta*-Gruppe bietet *Pratinas* Dbl. (Goldküste, Guinea).

Erinnert schon *E. Perscis* Dru. (Westafrika)²⁾ oberflächlich an Eusemien, so gleicht die ihr sehr nahe stehende *E. Zaddachi* Dew. (Mus. Berlin) schon der *Eusemia Euphemia* Cr. in so hohem Grade, dass wir hier wiederum nur eine mimetische Anpassung an das widrige Modell annehmen dürfen.

Untertamilie der **Satyriuen.**

Die einzige Art, welche von der durch die mimetische Anpassung des Weibchens so bedeutungsvollen Gattung **Elymnias** Hübn. auf dem Continent Afrikas vorkommt, *E. Phegea* L. bildet auch zugleich das einzige Beispiel einer solchen für die afrikanischen Vertreter der Familie. Die Oberseite der *E. Phegea* L. erinnert in beiden Geschlechtern an die Färbung des entsprechenden Sexus der *Acræa (Planena) Gea* L., so dass die Flügelbinden bei den Männchen rostgelb, bei den Weibchen weisslich sind. Dagegen bewahren die Nachahmer am Vorderrande der Oberseite der Vorderflügel und auf der ganzen Unterseite noch die ursprüngliche dunklere Strichelung auf hellem Grunde, welche einer Schutzfärbung entsprechen dürfte.

Vergl. Taf. III,
Fig. 16

Die madagassische *E. Masoura* Hew. (1875) ist mir vollkommen unbekannt geblieben.

Familie der **Lycaenidae.**

Nur in Afrika kommen in dieser Familie überhaupt Nachahmer vor.

Erinnert **Sithon** sp. aus Camerun (Coll. Standinger) durch die weissen Tüpfel im dunklen Aussenrande der ziegelrothen Flügel wenigstens in der Färbung etwas an *Aletis Helcita*, so besitzt er doch noch die zwei langen Hintertflügelschwänzchen seiner Gattungsgenossen. Ausgebildete Mimicry dagegen finden wir in der auf Afrika beschränkten Gattung **Liptena** Dbl. So gleicht *L. Aneckeï* Dew. und in höherem Maasse die grössere *L. sanguinea* Ploetz (*Hienulmayri* Dew.) durch die weissen Tüpfel

Vergl. Taf. IV,
Fig. 39.

¹⁾ Dieses ausgezeichnete Beispiel der Mimicry wurde erst von Trimen und Bowker (South African Butterflies II, p. 304) als solches anerkannt.

²⁾ Ich kenne von dieser seltenen Art nur die Abbildung Druy's.

im schwarzen Rande der ziegelrothen Flügel einer kleinen *Aletis Helcita* Cr. So erinnert *L. Darwiniana* Krby. an rothbraune Acraeen überhaupt und *L. Acraca* Dbld. besonders auf der Oberseite an *Acr. Perenna* Dbld. Weiter erinnert *L. Krausei* Dew. (Guinea) mit gelblichem Subapicalfleck der Vorderflügel und weissröthlicher Mittelbinde der hinteren durchaus an *Acr. Eponina* Cr. auch auf der Unterseite. Eine Art der Coll. Staudinger mit lebhaft rother, die Hinterflügel fast erfüllender, auf den vorderen stark verschmälterter Mittelbinde ist ebenfalls auch auf der Unterseite der Hinterflügel durchaus der *Acr. Alciops* Hew. ähnlich. So haben diese beiden letzterwähnten Arten den höchsten Grad der Anpassung an Acraeen unter den Lycaeniden erreicht.

Familie der Papilioniden.

In der Untergattung **Cosmodesmus** erinnert die ganze *Agamedes*-Gruppe (vergl. p. 65) auf der Oberseite der Flügel oberflächlich an gewisse Acraeen, an der Unterseite dagegen eher an kleinere *Amauris*-Formen. Bei anderen Arten verwandter Gruppen bildet sich die mimetische Anpassung an widrige Modelle schärfer aus.

So erinnert *P. Leonidas* F. auf der Oberseite der Flügel an die ebenfalls grüngetüpfelte *Dan. (Tiramaul.) Limniace* var. *Pelicerana* Dbld. (Mittelafrika), auf der Unterseite dagegen, wie die Formen der *Agamedes*-Gruppe, eher an eine *Amauris*-Art. In der That bildet sich mit seinem Fortschreiten nach Süden auch letzterwähnte mimetische Anpassungseinrichtung derart aus, dass die capländische var. *Pelopidas* Feld. durchaus der *Am. Echeria* ähnlich wird. Nun setzt sich auch der Nachahmer wie die *Amauris*-Art gern auf vorstehende Blätter und Zweige, mit geschlossenen Flügeln abwärts hängend, so dass Trimen ihn (l. c. III, p. 216) mehrmals für eine *Am. Echeria* hielt.

Eine weitere mimetische Art der Untergattung ist *P. Tidleyanus* White (Congo etc.) der in beiden Geschlechtern der *Acr. Euryta* L. sehr ähnlich ist.

Vergl. Taf. IX
Fig. 27

Viel interessanter sind die mimetischen Formen aus der Untergattung der Rinnenfalter **Papilio** (vergl. p. 68—72). So erinnert bei dem der *Nireus*-Gruppe nächstehenden *P. disparilis* (Mauritius etc.) das seltene Weibchen, von dem nach Maillard eines auf ca. zwanzig Männchen kommt, etwas an die gemeine *Euploea Euphone* F. Die geringe Acraeen-Ähnlichkeit, welche wir an der Unterseite der Hinterflügel des prächtigen *P. Zalmois* Hew. (Alt-Calabar) erkannten, ist in der *Mechowi*-Gruppe stärker ausgebildet und zugleich durch die gelbe, schwarz gefleckte Basis, die weisse Mittelbinde, den breit ranchgrauen, von Intercoastalstreifen durchgezogenen Randsaum der Hinterflügel zu einer täuschend ähnlichen Anpassung an das ruhende Weibchen der gemeinen *Acr. (Plan.) Gea* L. (*Jodatta* F.) entwickelt. Bei zwei kleineren Arten jedoch genügte dieser Schutz noch nicht für die Erhaltung der Art, und so passten sich die Weibchen in der Oberseitenfärbung durchaus den zwei gemeinsten Modellen an: das Weibchen des *P. Cynorta* F. (*Boisdualianus* [Ashanti, Sierra Leone]) dem Weibchen der *Acr. (Planonia) Gea* L. und das des südlicheren *P. Echerioides* Tr. (Cap) der *Am. Echeria* Stoll. Nach Bowker streicht das Männchen des *P. Echerioides* Tr. gerade durch den Wald, auf demselben Wege zurückkehrend, während das Weibchen sich am Platze hält und nur niedrig fliegt.

Vergl. Taf. III
Fig. 18

Vergl. Taf. III
Fig. 19—21
Vergl. Taf. II
Fig. 9, 10

Bei *P. Merope* treffen wir die höchste unter den afrikanischen Lepidopteren überhaupt vorkommende Variation der Weibchen. So treten in Madagascar, wo die Art sehr gemein ist, nur männchenfärbige, wie die Männchen geschwänzte Weibchen (*Merionus* Feld.) auf. In Abessinien dagegen finden sich ausser

Vergl. Taf. I
Fig. 1

letzteren ebenfalls noch geschwänzte, aber schon in der Färbung abweichende Weibchenformen, deren eine, var. *Niavina* Kheil, durch die schneeweisse Mittelbinde der *Anauris Niavia* L. ähnelt, während eine andere, var. *Raspinae* Kheil, durch die ziegelrothe Färbung derselben Binde an *Dan. Chrysippus* erinnert.

Endlich treten schon in Mittelafrika (Westküste) überhaupt nur mehr vollkommen schwanzlose Weibchen auf, ohne dass Uebergänge zu den geschwänzten Formen bekannt wären. Diese mimetischen Weibchen, var. ♀ *Hippocoön* (*Westermanni* Boisd.) gleichen nun meist der an der Westküste (Sierra Leone, Camerun) häufigen immunen Danaide *Am. Niavia* L. In Guinea scheint bisher nur diese eine Weibchenform gefunden zu sein, welche sehr selten sein muss, da ich unter fünfzehn Stücken von *P. Merope* aus Acera kein Weibchen fand. An der südlicheren Ostküste des Continents (Zanzibar) kommen schon merkwürdige Aberrationen des Weibchens vor, die vielleicht als Versuche einer Anpassung an Acraea anzusehen sind. Erinnern sie in der That manchmal an *Acr. Gea* L., so lehnen sie sich doch in var. *Dionysos* Dbld. trotz auffälligster Färbung (Vorderflügel schneeweiss, Hinterflügel safrangelb) offenbar an kein lebendes Modell an. Zugleich findet sich hier die var. ♀ *Trophonius* Westw., die wir als ebenfalls schwanzlose Fortbildung der geschwänzten abessinischen var. *Raspinae* Kheil anzusehen haben, eine mimetische, bis zum Cap verbreitete Anpassung an *Danaus Chrysippus* L.

Weiter treten stärkere Verdunkelungen der Vorderflügel auf, die zahlreichere helle Tüpfel abschneiden (var. *Cyphonius* Hopffr.), und endlich entsteht die südafrikanische Weibchenform var. *Cenea* Stoll, die ein getreues Abbild der *Anauris Echeria* Stoll ist. Zugleich bildete sich aus der var. ♀ *Hippocoön* in Anlehnung an die Umwandlung der *Am. Niavia* in die var. *Dominicana* Tr. die verhältnissmässig sehr seltene entsprechende Varietät der südlichen Weibchenform, var. *Hippocoönides*, heraus.¹⁾

Schon 1873 zog J. P. M. Wheale im Caplande (Trans. Ent. Soc. 1877, p. 269) unter 49 *P. Merope* sechs ♀ *Trophonius*, eine Mittelform zwischen *Hippocoön* und *Cenea*, drei ♀ *Hippocoönides*, ein ♀ zwischen diesen und *Cenea*, zwanzig ♀ *Cenea* mit weissen Vorderflügeltüpfeln, die der dortigen *Anauris Echeria* Stoll var. *albomaculata* Tr. gleichen. Wie var. *Am. Dominicana* nicht zahlreich vorkommt, ist die var. *Hippocoönides* sehr selten, und auch von *Trophonius* ist das Modell viel seltener als die gemeine *Anauris Echeria* Stoll.²⁾ Nach demselben Autor (ibid. 1874, p. 131) fliegt die var. ♀ *Cenea* Vormittags schwer und langsam, ganz wie eine *Anauris*, das Männchen Nachmittags schnell und gewandt. Zu den Feinden der Art gehört *Tchitrea cristata*, welche nach Beobachtungen das Männchen fing und überhaupt ein grosser Schmetterlingsfeind ist. — Schon die Färbung der Unterseite des Männchens dient als schützende Anpassung an vergilbtes Laub, und Trimen³⁾ beobachtete dementsprechend, dass der Falter sich auf einem Strauch niederliess, dessen gelb und brauner Samen und dessen Blüthe genau in der Farbe mit der Unterseite seiner Flügel übereinstimmte. Als weitere mimetische Rinnenfalter erwähne ich noch *P. Rex* Oberthür (Mombas) welcher durchaus der grün und rostbraun getüpfelten *Dan. formosa* Godm. et Saly. gleicht.

¹⁾ Wegen der zahlreichen Varietäten vergl. die übersichtliche Zusammenstellung derselben bei Trimen und Bowker, South African Butterflies III, 1889, p. 248—249.

²⁾ Aehnlich fing Miss Newdigate in Forest Hall, Plettenberg Bay, nach Bowker und Trimen zwölf ♀ *Cenea*, eine ♀ *Hippocoönides* und zwei ♀ *Trophonius*.

³⁾ Abgedruckt in „Stett. entomol. Zeitung“, 1885, p. 293.

Amerikanische Region.

a. Nearktische Subregion.

Die beiden einzigen Formen der Schmetterlingswelt Nordamerikas, welche als Modelle dienen, sind Arten der Gattungen *Danaus* und *Papilio*.

Der *Danaus Erippus* Cr. mit den übrigen amerikanischen Arten neuerdings als „*Tasitia*“ abgetrennt, darf nach der Lage der männlichen Duftorgane nur zur Untergattung *Anosia* Hb. gerechnet werden, zu der ihm auch die Färbung stellt, denn die lebhaft rostbraunen Flügel führen besonders in dem schwarzen Aussenborde zwei Reihen getheilter weisser Tüpfel, zu denen noch einzelne grössere nahe der Vorderflügelspitze treten.

Nach S. Scudder¹⁾ hat diese Art, wie Prof. Riley ihm schrieb, „a rank but not very strong smell, . . . all the scales have a carrotty odour.“²⁾ So schliesst Scudder, dass dieser Duft „or some nauseous taste or both“ das Thier widrig machen.

Ein Beispiel für die ausserordentliche Lebensfähigkeit des Falter ist die Beobachtung von W. T. Davis, citirt bei Scudder (l. c. p. 746), nach welcher der Falter noch aus einer mit einer Nadel durchstochenen Puppe schlüpfte. J. Meyer erzählt sogar (Bull. Brooklyn. ent. Soc. II, p. 74), dass ein Falter einen Colibri von einer *Asclepias*-Blüthe, unter der er übernachtet wollte, wegjagte und nach der Verfolgung seinen Platz wieder einnahm.

Doch hat diese Art ihre gefährlichen Feinde, denn die Raupe leidet nicht unbedeutend an Parasiten und die Made eines Dipters, *Masicera archippivora*, vernichtet nach Prof. Riley oft ganze Bruten derselben.

Das zweite Modell der Nachahmung ist *Papilio (Pharm.) Philenor* L.³⁾, ein Angehöriger der Aristolochienfalter. Derselbe hat nach Edwards „a strong and disagreeable scent“, was Scudder (l. c. p. 1251) nicht zu bestätigen vermochte. In der That aber verbreitet der frisch ausgeschlüpfte Falter, wie ich in Königsberg feststellen konnte und von Anderen prüfen liess, einen unangenehmen „muffigen“ Modergeruch⁴⁾, und lässt leicht klare Flüssigkeitstropfen bei Druck austreten, welche die Haut gelb färbten.

In der Raupe und Puppe sind noch keine Parasiten bisher beobachtet worden; auch meine Puppen ergaben ohne Ausnahme den Falter.

P. Philenor ist besonders in Florida gemein und erscheint im März in grossen Massen. Sein Flug ist langsam. Für seine Lebensfähigkeit führt Scudder (l. c. p. 1251) an, dass ein Stück, welches eine halbe Stunde im Cyankaliglas gesteckt hatte und dann gespannt wurde, noch drei Tage lang lebte. Einen Falter, dessen Thorax ich durch länger fortgesetzten Druck vollkommen gesprengt hatte, sah ich nach einiger Zeit wieder herumfliegen.

¹⁾ S. Scudder, The Butterflies of the Eastern United States and Canada, Cambridge 1889, p. 745.

²⁾ Der Duft der Duftschuppen aus der Hinterflügeltasche des Männchens wird präcise unterschieden und als stärker „with a slightly honied character“ bezeichnet.

³⁾ Nach Gosse (Lett. Alabama, citirt bei Scudder) „these gorgeous swallow-tails seem to be of royal blood, to have a presence that distinguishes them from the meaner herd“.

⁴⁾ Der deutlich unterscheidbare Duft der männlichen Dufteinrichtungen im Analfelde der Hinterflügel ist angenehm und etwas moschusartig.

Mimetische Anpassungsformen an beide Modelle recrutiren sich aus der **Limenitis**-Gruppe der **Nymphalinen**.

So bildet der eigenartige rostbraune **Limenitis Archippus** eine so ausgezeichnete Copie des *Danaus Erippus* Cr., dass einer von beiden von einem amerikanischen Professor der Entomologie in einem seiner Lehrbücher mit unrichtiger Bezeichnung abgebildet werden konnte. Nach Scudder gleicht in Florida die nahe verwandte *Lim. (Basilarchia) Eros* dem dort vorkommenden *Dan. Gilippus* Cr. var. *Berenice* Cr.

Dagegen erinnert der blaugrüne *Lim. (Basilarchia) Astyanax* F. in Färbung und Blauglanz bis auf die fehlenden Schwänze an *Papilio Philenor* L. Wie wir oben sahen, ist nun *P. Philenor* L. eine ganz ausserordentlich gut geschützte Art: so mag es uns denn auch nicht wundern, wenn sie in hervorragendem Maasse als Modell mimetischer Anpassung dient und schon ein relativ geringer Ausbildungsgrad der letzteren genügen wird, um das Leben des Nachahmers verhältnissmässig zu sichern.

Vor Allem erinnert das atavistisch dunkle Weibchen der grossen **Argynnis (Semnopsyche) Diana** F. durch den eigenthümlich grünblauen Schimmer über Hinterflügel und Innenrand der Vorderflügel, wie schon Edwards erkannte, besonders in Formen, wie R. Felder eine in der Novara-Reise abgebildet hat, etwas an den Aristolochienfalter. Mit der geographischen Verbreitung des *P. Philenor* stimmt nicht nur die des *Limenitis Astyanax* F. und *P. Troilus* L. (Alaska, ein Theil von Kansas, Iowa und Pennsylvania), sondern auch die der var. **Glaucus** von **P. Turnus** L. überein, deren Nordgrenze sich mit der des *P. Philenor* deckt, während letzterer sich nur westwärts weiter ausdehnt. Schon hieraus können wir entnehmen, dass der eigenthümliche Melanismus des Weibchens von *P. Turnus* im Süden des Verbreitungsgebietes der Art entstanden sein kann. Nach Edwards erscheint bei *P. Turnus* das schwarze Weibchen (*Glaucus* L.) erst, wo die Form zweibrütig ist, um in allen Generationen im Süden zu prävaliren, wo die Art dreibrütig ist. Schon in Nord-Illinois fing Walsh die schwarzen Weibchen fünf- bis sechsmal so häufig als die gelben: in Süd-Illinois fing er 78 gelbe *Turnus*, die alle Männchen waren.

Alle meine Puppen von *P. Turnus* ergaben grosse rothleibige Ichneumonen mit blauschwarzen Flügeln: daraus erhellt, wie gross die Sterblichkeit in den früheren Ständen und wie nützlich die mimetische Anpassung für die südlicheren Weibchen ist.

Auch die Puppe von *P. Troilus* L. leidet viel an Ichneumonen: ebenso wurde der Falter nach Scudder (l. c. p. 1236) von einem Vogel genommen, der die „uneatable wings“ abbiss und den Körper verschlang.

b. Neotropische Region.

In der feuchtwarmen Luft des neotropischen Urwaldes herrscht neben der üppigsten Gestaltungskraft zugleich der rücksichtsloseste Kampf um die Existenz. Darum treten uns hier auch die mannigfaltigsten mimetischen Anpassungen von so vielen Seiten entgegen, dass die klare Uebersicht getrübt wird und es oft überaus schwierig zu entscheiden ist, welche der zwei ähnlichen Formen der anderen als Modell gedient hat. Dies gilt besonders für die Angehörigen der immunen Gattungen der Danainen, Neotropinen und Heliconinen, welche wir geschlossen behandeln müssen, um ihrem natürlichen Zusammenhange Rechnung zu tragen.

Immune Familien und Gattungen der Rhopaloceren.

1. Unterfamilie der Danainen.¹⁾

Den Geäder der Vorderflügel nach müssen wir *Lycorea* Dbld. als die ursprünglichere der beiden Vergl. Tab. XII, Fig. 89. rein neotropischen Gattungen ansehen, denn es gehen bei ihr noch die zwei ersten Radialäste vor dem Ende der Zelle ab, wie wir dies in der ganzen Abtheilung der Danainen nur noch in der indischen *Cleona*-Gruppe von *Danaus* subg. *Rudena* antrafen. Auch springt die Mittelzelle der Hinterflügel gegen den zweiten Medianast aussen convex vor, wie bei *Euploea*, *Idropsis* etc. Die Zeichnung der Flügel ist bei *Lycorea* Dbld. sehr charakteristisch und zugleich bei allen vier Arten im Grunde dieselbe. Auch lässt sie sich auf diejenige von indischen Danainen zurückführen, während die Färbung den ausgesprochenen neotropischen Ton angenommen hat. Die Bänder der Vorderflügel sind meist in Flecke aufgelöst, die sich einem basalen, einem Mittelzell- und dem Terminalbände zurechnen lassen; auch das Submarginalband ist nur nahe der Spitze continuirlich. So überwiegt die Grundfarbe, welche in der Aussenhälfte noch bindenartig entwickelt und oft lebhaft safran- oder schwefelgelb, in der Innenhälfte dagegen rothbraun ist. Auf den rothbraunen Hinterflügeln liegt eine Reihe weisser Doppeltüpfel, in der dunklen Aussenrandeinfassung und um die Zelle herum ein innen offenes hufeisennörmiges Band, welches für den *Melinaea*-Typus (s. u.) charakteristisch ist, sich wohl secundär um die Zelle concentrirt hat und von uns als Schleifenband bezeichnet wird. — Manche der von Mexico bis zum mittleren Südamerika verbreiteten Arten bilden in letzterem dunklere Varietäten durch Ausdehnung der braunrothen Basalfärbung der Vorderflügel, so var. *cinnamomea* Weym. (Amazonenstrom). Ebenso kann die Mittelbinde der Hinterflügel eine strohgelbe Farbe annehmen oder die Hinterhälfte derselben sich so stark verdunkeln, dass auch die Marginaltüpfel verdeckt werden.

Bei *Ituna* Dbld. entspringt nur der erste Radialast der Vorderflügel vor dem Zellende, ist der Vergl. Tab. XI, Fig. 77. erste Medianast der Hinterflügel weniger selbstständig und die Zelle derselben stark verkürzt. Dieser Modification des Geäders entspricht auch eine solche der Zeichnung, welche sich ebenfalls auf den *Lycorea*-Typus zurückführen lässt. So sind bei *I. Lanora* Latr. (Mexico, Columbien) durch Schuppenverlust die Bänderreste der Vorderflügel — bis auf die in der Zellbasis gelegene Längsbinde — glasig aufgehellt. Auf den hell rostbraunen Hinterflügeln ist der hintere Theil des Schleifenbandes fortgefallen, während der äussere sich nur unten erhält und in den Aussenrand verläuft.

Eine davon ganz abweichende Tracht besitzen *I. Phenarete* Dbld. (Peru) und die kleinere *I. Hione* Cr. (Brasilien), bei welchen der Schuppenverlust und die Verschmelzung der hellen Binden noch weiter fortschreitet, so dass auf den Vorderflügeln das Submarginalband fast ganz erlischt und in schwarzem Rahmen eine basale, eine mittlere und eine subapicale glasige Aufhellung entstehen. Zu dem bei *I. Lanora* erwähnten äusseren, auch oben scharf auftretenden Bande tritt auf den breit gesäumten, wie bei *Lycorea* noch stark gezaekten Hinterflügeln noch eine dunkle Markirung des Zellendes. Während bei *I. Lanora* das hintere Discocellulare noch in den Bug des ersten Medianastes der Hinterflügel mündet, verläuft es bei *I. Phenarete* in seinen Ursprung, bei *I. Hione* sogar innerhalb des letzteren. So sind *I. Hione* und *I. Phenarete* durchaus abgeleitete Formen dieser schon stark modificirten Gattung.

¹⁾ Die südamerikanischen Arten von *Danaus* selbst, dem subg. *Asia* angehörig, scheinen erst in späterer Zeit von Norden eingewandert zu sein, denn es kommen in der neotropischen Region keine mimetischen Anpassungen an dieselben vor.

In der That scheint auch die typisch südamerikanische Tracht von ihnen erst in der neuen Heimath erworben zu sein, vielleicht durch Anpassung an dort schon lebende immune Gattungen der Neotropinen.

So entspricht die Tracht von *I. Lamira* dem Habitus der Gattung *Olyras*, die von *I. Hione* und *I. Phenarete* sogar bis auf die weisse Fühlerspitze demjenigen der Gattung *Methona*. Dadurch wird es auch wahrscheinlich, dass auch die Tracht der *Lycorea*-Arten ursprünglich derjenigen der paläotropischen *Danaus*-Arten noch mehr entsprach. So entstand zuerst, als die Einwanderer noch selten waren, unter dem Einfluss der neuen Existenzbedingungen eine Anpassung an einen schon verbreiteten Habitus, den der Melinaeen, welche sich zuerst auf die Farbe der Binden, später auch auf die Zeichnung ausdehnte, denn das erwähnte Schleifenband der Hinterflügel ist eine nur im tropischen Südamerika vorkommende, dort aber weit verbreitete Zeichnungsform.¹⁾

Somit gingen diese Arten wohl aus schwarzbraunen, mit weissen Querbinden gezierten Formen hervor, wie sie sich ausser bei Danaern der alten Welt auch bei einigen Neotropinen Columbiens (*Tithorea*, *Rhonia*) erhielten.

Allmählig nahm, durch günstige Ernährungsbedingungen und starke Fortpflanzung gehoben, der Individuenreichtum der fremden Einwanderer (*Lycorea*) derart zu, dass er den der autochthonen Formen an manchen Orten weit übertraf, zumal die eingewanderten Arten ja an und für sich kräftigere Formen sind als die Neotropinen und ausserdem ja immun blieben. So ist es zu erklären, dass schliesslich der strenge *Lycorea*-Typus selbst Gegenstand der Nachahmung von Seiten grösserer Vertreter verschiedener nicht widriger Familien (Castniiden, Pieriden, Papilioniden) werden konnte.

Dasselbe gilt, wenn auch in geringerem Grade, für die Tracht der nicht ganz so gemeinen *Junia*-Arten.

2. Unterfamilie der **Neotropinae**.

Einer Untersuchung der merkwürdigen Färbungsconvergenzen in dieser aus 19 Gattungen mit mehreren hundert Arten bestehenden Familie muss zuerst eine Feststellung der genetischen Beziehungen der einzelnen Gattungen vorausgehen. Dieselbe stützt sich natürlich nur auf die wichtigeren Structurmerkmale, um deren Erkenntniss sich Bates, Goldman und Salvin und Schatz so verdient gemacht haben. Da das Geäder der Vorderflügel in der Regel gleichmässig gebildet ist, das der Hinterflügel dagegen in den Geschlechtern meist stark variiert, war es vor Allem die Gliederung der Tarsen der Vorderfüsse, welche einige Anhaltspuncte für eine naturgemässe Gruppierung abgab.

Wir gehen von denjenigen Abtheilungen aus, bei welchen die Weibchen fünf Tarsalglieder und die Männchen noch entwickelte Tibia und Tarsus an den Vorderfüssen besitzen. Hierher gehören die Gattungen *Tithorea*, *Melinaea*, *Athytis*, *Eutresis*, *Olyras*, *Athesis* und *Methona*.

Von ihnen steht *Tithorea* Dblld. noch dem alten Danaer-Stamme am nächsten; denn allein bei ihr ist wie bei den Danaiden das Flügelgeäder in beiden Geschlechtern noch gleich entwickelt. Diese Gattung enthält aber nicht nur die schönsten und grössten Formen der ganzen Familie, sondern

¹⁾ Auch Bates spricht sich, i. e. für eine Umwandlung der von Norden her eingewanderten Tagfalterform aus.

auch einzelne Arten, welche in Zeichnung, kräftiger Beschuppung und Färbung noch an die australische Gattung *Hamadryas* erinnern; auch sind ihre Arten durch schärfere Zuspitzung und grössere Breite der Vorderflügel von den übrigen *Neotropinen* unterschieden.

Den ursprünglichsten Habitus unter den ca. 18 Arten besitzt *T. Bonplandii* Guér. (Neu-Granada), deren stark verdunkelte Vorderflügel nur einzelne Reste der bei *Lycorea* erwähnten Binden in Gestalt kleiner weisser Tüpfel tragen. Dagegen führen die Hinterflügel eine breite gelbweisse Mittelbinde, eine nur unten deutliche braune Submarginalbinde und oben eine, unten zwei Aussenrandtüpfelreihen. Wir bezeichnen diesen schwarzen, weissgetüpfelten Habitus, welchen wir auch an *T. Humboldtii* Latr. (Neu-Granada), *T. Bonplandii* Guér. (Bogota), *T. Paroni* Butl. (Bolivia) etc. beobachten, als **Bonplandii-Tracht**.

Die Vertreterin des zweiten Färbungstypus, *T. Irene* Dru. (Central-Amerika), ist durch die stark verdunkelten Vorderflügel gekennzeichnet, welche oben in schwarzbraunem Grunde nur einzelne kleine gelbe Tüpfel in der Aussenhälfte führen, während die einfach rostbraunen Hinterflügel, von vorn nach hinten abnehmend, schwarzbraun gerandet sind und oft noch einen Rest des äusseren Schleifenbandtheiles tragen. Hierher gehören noch *T. Turraquina* Hew. (Neu-Granada), *T. Ducuma* Bates (Mexico), *T. Pintias* Godm. et Salv. (Mexico).

Wir bezeichnen diese Färbung als **Irene-Tracht**.

Der dritte Zeichnungstypus erinnert durch die apicale und subapicale gelbe Binde und die basale rostbraune Anhellung der Vorderflügel und die rostbraunen, mit hinterem Schleifenbandtheil versehenen Hinterflügel an die *Melinaea*-Tracht. Hierher gehört *T. Harmonia* Cr. etc. Eine Modification dieser Färbung tritt uns in *T. Pseudethra* Butl. (Surinam) entgegen, bei der die helle Subapicalbinde der Vorder- und die breite Mittelbinde der Hinterflügel eine lebhaft gelbe Farbe annehmen.

Bei *Melinaea* Hb. (ca. 25 Arten) treten schon Unterschiede im Hinterflügelgeäder beider Geschlechter auf. Die Tracht der Arten erinnert an den *Lycorea*-Typus, und wie die Vorderflügelbasis sind auch die schwarz gefleckten oder so gebänderten Hinterflügel meist rostroth gefärbt. Bei *M. Ethra* Enc. (Mus. Berlin) und *M. Thera* Feld. tragen letztere noch eine leuchtend gelbe Mittelbinde wie bei *Tithorea Pseudethra* Butl.; bei *M. Muene* L. ist dagegen ihre Hinterhälfte schwärzlich verdunkelt. Wir bezeichnen den Habitus der Gattung als **Melinaeen-Tracht**.

Die wenigen seltenen Arten der nahe verwandten Gattung **Athyrtis** Feld. tragen ein ähnliches Kleid.

Dagegen tritt uns in den Arten von **Eutresis** Dblld. eine analoge Trachtverschiedenheit wie in der Gattung *Itana* entgegen: während *E. Hypercia* Dblld. (Venezuela) das Kleid von *I. Lamira* trägt, erinnert *E. imitatrix* Stögr. (Peru) wieder an *I. Ilione* (*Methona*-Tracht).

Ähnlich treffen wir bei **Athesis** Dblld. in *A. Clearista* Dblld. (Venezuela, Columbien) resp. *A. Acrisane* Hew. (Ecuador) Vertreter dieser beiden so verschiedenen Typen.

Die vier Arten der Gattung **Olyras** Dblld. besitzen dagegen eine einheitliche Tracht, welche der des *I. Lamira* entspricht und von uns als **Olyras-Tracht** bezeichnet wird. Zur Zeit ist die weiter verbreitete *Itana*-Art allerdings viel häufiger als z. B. der gleich gefärbte *O. Theon* Bates (Guatemala) und die übrigen kleineren, ebenfalls local meist auf Gebirge beschränkten Arten.

Ebenso dürfte die nahe verwandte, mehr im tropischen Brasilien vorherrschende Gattung **Methona** Dblld. als Modell für die eigenartige Zeichnung der *Itana Ilione*, der *Athesis Acrisane* Hew. etc. anzusehen sein. Bei der weit verbreiteten, sehr gemeinen *M. Psidi* Cr. zeigen die schwarzgerandeten Vorder-

Vergl. Tab. XI
Fig. 78

flügel eine basale, eine mittlere und eine subapicale grössere glasige Aufhellung, zwischen denen zwei schwarze Bänder liegen; längs des Zellendes wird auch der glasige Hinterflügel von einem Bande durchzogen.

Die zweite Gruppe der Gattungen umfasst sehr schwierig zu unterscheidende Formen, an deren Vorderfüssen Tibia und Tarsus der Männchen knopfartig verkümmert sind. Da nur bei *Ithomia* Hb. die Weibchen noch fünfgliedrige Vordertarsen besitzen und in beiden Geschlechtern das untere Discocellulare in spitzem oder rechtem Winkel an den dritten Medianast der Hinterflügel herantritt, wie bei *Tithorea* etc., dürften wir diese Gattung wohl als die ursprünglichste ihrer Abtheilung ansehen. Von den weit über 200 Arten zeigen nur verhältnissmässig wenige eine ausgebildete Beschuppung. Da es nun nicht wahrscheinlich ist, dass letztere eine Anpassung an Modelle derselben Familie ist, dürfen wir die allerdings minder zahlreichen bunten Formen in dieser Gruppe als letzte Reste der ursprünglichen Gattungsrepräsentanten auffassen. Hierher gehört *I. Susana* Feld. mit schwarzweisser Färbung beider Flügel (Columbien), welche etwas an den *Bonplandii*-Typus von *Tithorea* mahnt, während *I. fallax* Stögr. (Südpern) an die *Melinaca Methone* Hew., *I. Virginiana* (Neu-Granada) an die *M. Messatis* Hew. erinnert. So darf man wohl annehmen, dass diese seltenen Arten doch vielleicht in ihrer Färbung in gewisser Weise den grösseren und häufigen mit ihnen zusammenfliegenden Melinaeen sich anpassten, während wir doch die reichere Beschuppung selbst für eine von den Stammformen ererbte Eigenthümlichkeit ansehen müssen.

Die form- und individuenreichsten Gruppen der Ithomien bestehen aus den eher glasig durchscheinenden Arten und treten zugleich als charakteristische Modelle mimetischer Anpassung seitens anderer Gattungs- und Familienvertreter auf. Durch Vereinfachung der Zeichnung und Zusammenfliessen der Binden entstanden zuerst die kleinen schwarzen, gelbbindigen Arten der *Eurimedia*-Gruppe, welche der Untergattung *Aeira* Hb. angehören.

Aus anderen schwarzweissen Formen, deren Binden allmähig durch Schuppenverlust glasig wurden, bildeten sich die zahlreichen Arten des *Omega*-Typus heraus, die schmale, dunkel gesäumte Flügel besitzen, deren vorderes Paar meist nur ein Subapical-, seltener noch den Rest eines Zellbandes führt.

Schliesslich färbten sich die Marginalmonde der Hinterflügel, die bei *I. Omega* Hew. unten roth sind, auch auf der Oberseite, breiteten sich aus und bildeten die Formen der *Orolina*-Gruppe (oberer Amazonenstrom) mit rothem, schwarz eingefasstem Flügelsaum.

Endlich treten auch zahlreiche fast ganz durchsichtige Arten auf, welche statt der Schuppen eigenthümliche gefiederte Haare auf den Flügeln tragen.

Von den Gattungen, welche sich durch nur viergliedrige Tarsen des Weibchens auszeichnen, schliesst sich *Dircenna* Dbld. (mit ca. 20 Arten) durch die spitzwinkelige Eimmündung des hinteren Discocellulare in den dritten Medianast der Hinterflügel näher an *Ithomia* an. In dieser Gattung treffen wir meist kleinere oder mittelgrosse Arten mit oft stark durchsichtigen Flügeln, welche theils an den *Olyras*-Typus erinnern, wie *D. Klugii* Hb. (Centralamerika) und *D. Olyras* Feld. (Columbien), theils die *Melinaca*-Tracht führen, wie *D. Callipero* Bates (Columbien), während *D. Epitero* Bates (Amazonenstrom) an kleinere Methonen erinnert und *D. Steinhelli* Stögr. (Columbien) den glasflügeligen Ithomien gleicht.

Die übrigen Gattungen der Gruppe mit stumpf ausspringendem hinterem Discocellulare der Hinterflügel zeigen ebenfalls oft dieselben Färbungsformen wie die nach den Structurmerkmalen als ursprünglicher anzusehenden Genera.

So entsprechen die Arten von **Mechanitis** F. meist denen von *Melinaca* Hb. Bei *M. Lysinnia* F. (Südbrasilien) trägt die schwarze Vorderflügelspitze einen weissen Tüpfel und tritt auf den Hinterflügeln wie bei *Tithorea Pseudethra* Butl. eine gelbe Mittelbinde auf. Die Arten von *Mechanitis* variiren sehr stark und meist den mit ihnen vorkommenden *Melinaca*-Arten entsprechend nach den verschiedenen Aufenthaltsorten, wie schon Bates nachwies. Meist sind sie überaus häufig, so dass man dadurch versucht werden konnte, die oft so ausgesprochene grosse Aehnlichkeit mit den Melinaeen für ein Zeichen nach denselben „immanenten Gesetzen“ stattfindender Entwicklung anzusehen. Doch lässt sich noch ein Beweis für die Anpassungsfähigkeit dieser Arten darin finden, dass das Weibchen von *M. Macrinus* Hew., welches selbst Bates für eine davon verschiedene Art hielt und *Isthmia* benannte, durch den Ausfall des hinteren Theiles des Schleifenbandes auf den Hinterflügeln auffallend¹⁾ an die mit ihm vorkommende *Melinaca Seylar* Saly. erinnert. Daher dürften wir auch hier wie bei *Lycorea* und *Ituna* annehmen, dass die Trachten von *Mechanitis* ursprünglich entliehen wurden, als die Arten erst im Entstehen begriffen und noch seltener waren, und dass erst besonders günstige Verhältnisse (Freiheit von jeder Verfolgung, Nahrungsüberfluss, Fertilität) diese zarten, schwachen Formen zu so häufigen Erscheinungen des brasilianischen Urwaldes machten.

Von den Arten von **Thyridia** Hb. (*Apostropas* Krby.) erinnerte *Th. Melantho* Bates (Columbien, Costarica) etwas an den *Irene*-Typus, *Th. Acolisia* Dbld. (Venezuela) mehr an die *Olyras*-, *Th. Pytho* Feld. und *Th. Ivo* Feld. (Brasilien) mehr an die *Methona*-Tracht.

Bei einzelnen Gattungen mit besonders schwächlichen, zarten und seltenen Formen, die eine auffällige, bis in's Kleinste gehende Aehnlichkeit mit grösseren und häufigeren Arten verwandter Genera besitzen, dürfen wir eine mimetische Anpassung mit Hilfe der Naturlause schon mit grösserer Wahrscheinlichkeit vermuthen. So erinnern zwar die häufigeren Arten von **Ceratinia** Dbld. nur im Allgemeinen entweder an den *Melinaca*-Typus, wie *C. Niouia* Hb. mit ihren zahlreichen Varietäten, oder an die glasigen Ithomien, wie *C. Eupompe* Hb. (Südbrasilien). Seltenerer Arten dagegen gleichen oft genau den Angehörigen von *Melinaca*, so *C. Dacta* Boisj. der *M. Lysinnia* F. (Rio), *C. Pardalina* Hopftr. der *M. Pardalis* Bates (Peru), *C. Apollinis* Stögr. der *M. Maene* L. (Equator).

Dasselbe gilt für einige der anscheinend sämmtlich selteneren Arten von **Callithomia** Bates: so gleicht *C. Hezia* Hew. (Centralamerika) der *Tithorea Irene* Dru.

Auch die selteneren Arten von **Napeogenes** Bates finden sich nach Bates oft in den Schwärmen ihnen ähnlicher Ithomien. So erinnert *N. Cornea* Hew. (St. Paulo) an die rothgerandete *Orolina*-Gruppe; *N. Pharo* Feld. an die gelbbindige kleine *I. (Aeria) Aqua* (Amazonenstrom), *N. Hypsaea* Stögr. an *I. paradora* (Caucathal); so gleicht die grösste Art, *N. celsa* Feld., durchaus dem kräftigen *Olyras Montagnei* Feld. (Caucathal).

Mithin dürfen wir denn unter den Neotropinen besonders *Methona*, *Melinaca*, *Olyras* und einige Gruppen der Ithomien für Modelle der Anpassung seitens ihrer ursprünglich oder noch selteneren Verwandten ansehen.

Soviel bekannt, leben die Arten der Neotropinen ausschliesslich an den giftigen Solanen.

¹⁾ Vergl. O. Staudinger, Exot. Schmetterlinge, Tab. 28.

Unterfamilie der **Acraeinen**.

Die neotropischen Arten von **Acraea** F. bilden nach Doubleday die sehr berechnete Untergattung **Actinote** und sind wie die südamerikanischen Danaiden durch die in einzelnen Fällen ausserordentlich weit vorgeschrittene Verkümmernng der Vorderfüsse der Männchen ausgezeichnet.

Vergl. Taf. XI
Fig. 91

In letzterer Hinsicht steht nach Schatz, l. c. p. 103, die **Thalia**-Gruppe noch dem Stamme und damit den afrikanischen und indischen Arten näher, indem Tibia und Tarsus zusammen noch fast die Länge des Schenkels erreichen. Dasselbe gilt für die Zeichnung, die ebenfalls noch an afrikanische Formen (Varietäten von *Euryta* L.) erinnert. Auf den Vorderflügeln liegt am Zellende ein breites, gegen den Innenwinkel sich mit dem abgekürzten Submarginalbände vereinigendes Terminalband; weiter findet sich ein mittleres Zellband und ist die Spitze breit verdunkelt. Die Hinterflügel tragen einen breiten Rand, eine schwache Verdunkelung um die Zelle als den Rest eines Terminalbandes und starke Inter-costalstreifen, die bis fast zur Zelle reichen. Auch die Leibfarbe zeigt das Lehmgelb der Seitenbinden wie bei den afrikanischen Arten. Während auch die breite Subapicalbinde noch gelblich ist, tragen die basale Aufhellung der Vorderflügel und die ganze Scheibe der Hinterflügel eine rostrothe Färbung, die wie die Ausdehnung und Färbung der Vorderflügelbinden stark variiert. Hierher gehört *Thalia* L. und *Adeus* Dbld. (Brasilien).

Den abgeleiteteren Typus stellt die **Callianira**-Gruppe dar, bei der Schiene und Tarsus der männlichen Vorderfüsse zusammen kürzer als der Schenkel sind. Zugleich bildet sich eine Vertiefung der hellen Grundfarbe zu einer dunkelrothen Färbung aus. Trägt *A. Nicylla* Hopffr. (Peru) noch eine breite rotbraune Hinterflügelbinde, so treten durch fortgesetzte Zunahme der Deckfarbe auf den Hinterflügeln die hellen Binden ganz zurück und nehmen erstere eine einfarbig blaue Färbung an (*Callianira* Hb.). Hierher gehört noch *Amida* Hew. (Peru), *Lacerna* Dbld. (Venezuela), *Trinacria* Feld. (Bogota).

Bei *A. Nox* Bates ♂ (Bolivia) wird endlich die ganze Oberseite tief stahlblau, während das Weibchen (*Leuomelas* Bates) noch eine weissliche Vorderflügelbinde auf der Oberseite besitzt. Endlich tritt bei manchen dieser dunklen Formen eine leuchtend rothe Hinterleibsfarbe auf, so bei *Nela* Latr. (Bolivia).

Nach A. Seitz¹⁾ sind die Acraeen „sehr gut beschützt“. Bei ihrer ungeheueren Menge und Unbeholfenheit wären sie „eine wahre Mast für die insectenfressenden Vögel, an denen in den Tropen ein grosser Ueberfluss ist“. Auch sah Seitz nie einen Vogel eine *Acraea* verfolgen und fand nie einzelne Flügel derselben am Boden, doch vermochte er an ihnen weder einen besonderen Geruch noch eine Absonderung festzustellen.

Nach W. Müller lebt die Raupe besonders an *Mikania* (Adenostyleen), einer durch widrigen Duft der Blätter ausgezeichneten Compositae.

Unterfamilie der **Heliconinen**.

Wie bei den Acraeinen ist auch bei den Heliconinen der zweite Dorsalast der Vorderflügel, welcher bei den Danaomorphen zwar mit dem Stamme verwachsen, aber, wie C. Felder nachwies, constant erhalten ist, im vollkommenen Flügel ausgefallen. Somit unterscheiden sie sich von den Acraeinen

¹⁾ A. Seitz, Lepidopteren-Studien im Auslande (Zool. Jahrb., Abth. 1, Systematik etc.), Bd. IV, p. 778—779.

nur durch feinere Unterschiede in der Palpenform und durch den nach innen statt nach aussen gerichteten Subcostalast der hinteren und den ausgebildeteren Cubitalsporn der Vorderflügel. Auch die Form der Raupe und Puppe stimmt mit derjenigen der Acraeae überein. Die beiden Gattungen *Heliconius* und *Eucides* scheinen als selbstständige Ausläufer eines Stammes entstanden zu sein, von denen *Eucides* Hb. durch das deutlich keulenförmige Fühlerende mehr an *Acraea* erinnert. Dagegen können wir die Zeichnung der *Eucides*-Arten nur im Anschluss an die Besprechung der ca. 120 Arten von *Heliconius* behandeln, welche E. Schatz. (l. c. p. 106) in mehrere Gruppen zerlegte, die durch ihren Habitus bestimmt wurden.

Zur *Sylvanus*-Gruppe von **Heliconius** zählt er Formen von braunrother Grundfarbe mit schwarzer, schwefelgelbe Tüpfel tragender Flügelspitze, welche an die „*Molinaea*- oder *Mechanitis*-Form“ erinnern. Diesen schliesst er als weitere „Nachahmer“ den centralamerikanischen Vertreter der *Irene*-Tracht und die columbischen des *Bouplandii*-Habitus an, also Arten, welche Formen von *Tithorea* gleichen. Die *Antiochus*-Gruppe umfasst die Arten mit einfach schwarzer Grundfärbung und zwei weissen Schrägbinden über die Vorderflügel. Hierher rechnet er auch den *H. Charitonius* L. und schliesst die Formen mit weisser oder gelber Randbinde der Hinterflügel (*Cydo* Dbld. etc.) an. Formen wie *H. Clysonymus* Latr. lässt er den Uebergang zur *Erato*-Gruppe bilden, deren Hinterflügel strahlenförmig meist roth gezeichnet sind. Von *Thelxiope* Hb. endlich findet er ebenfalls wie Bates den Uebergang zur *Melpomene*-Gruppe mit rother Vorderflügelbinde, der er die *Phyllis*-Gruppe mit feuriggelber Hinterflügelbinde anfügt.

Da wir durch Bates zahlreiche Uebergänge zwischen zwei anscheinend so streng geschiedenen Arten wie *Thelxiope* und *Melpomene* kennen, wird eine morphologische Untersuchung der Zeichnung wieder durch das auch bei den Papilioniden nachgewiesene Princip der Umbildung zahlreicher Zeichnungs- in einzelne oft contrastirende Färbungselemente bedingt.

Die einfachsten Zeichnungsformen nun treffen wir bei *H. Charitonius* F. und *H. Peruvianus* Feld. Es sind dies zugleich Arten, welche dem Norden der neotropischen Region angehören, auf beiden Seiten der Flügel fast gleich gezeichnet und nicht als mimetisch anzusehen sind, weil keine ihnen ähnlichen Modelle vorkommen. Während bei *H. Peruvianus* Feld. nur die Mittelbinde gelb und die übrigen Binden noch weiss sind, haben bei *H. Charitonius* F. alle die gelbe Farbe angenommen. Bei beiden Arten tragen die Vorderflügel drei bis zum Aussenrande verlaufende Binden, eine apicale, eine Aussenzell- und eine längs des Cubitalstammes verlaufende Basalbinde. Aehnlich tragen auch die Hinterflügel eine Vorderrands-, eine über das Zellende laufende breite Mittel-, eine in Doppeltüpfel zerfallende Marginal- und eine Postmarginalbinde. Jederseits der Mittelbinde liegen am Innenrande noch einzelne rothe Reste weiterer Binden, wie sie dort bei Nymphalinen häufig sind.

Von *H. Peruvianus* ähnlichen Formen ist auch die **Thelxiope**-Gruppe abzuleiten, bei welcher auf der Vorderflügel wie bei *H. Hahuli* Stdgr. eine abgekürzte Zell- und eine Aussenzellbinde, auf den Hinterflügel noch die Mittelbinde und das Submarginalband erhalten sind, während die Marginalbinde sich zu rothen, gegen die Zelle gerichteten Pfeilstrichen verlängert haben, wie der Vergleich mit *H. Cassandra* Feld. zeigt.

Aus ähnlichen Formen ging endlich durch Erlöschen des Submarginalbandes die **Erato**-Gruppe hervor, deren häufigste Art, *H. Davis* L., auf den Vorderflügel zwei gelbe Querbindenreste und auf der Oberseite der Hinterflügel eine ursprünglich rothe, dann grüne oder blaue, gegen den Rand ausstrahlende

Basalfärbung besitzt. Eine verwandte Form ist *H. Lindigii* Feld. (Columbien) mit auf die Basis beschränkten rothen Hinterflügelstrahlen.

Endlich ging über Varietäten, die in umgekehrter Reihenfolge zu zählen sind, als Bates sie (l. c. XXIII, p. 558—559) aufführt, durch zunehmende Verdunkelung *H. Melpomene* L. über Varietäten wie *H. Cybele* Cr., *H. Valerica* Cr., *H. Lucia* Cr. hervor.

Aus einem *H. Charitonius* ähnlichen Stamme entstand durch allmähige Verdunkelung zuerst der Randbinden der Hinterflügel eine weitere Reihe meist durch schmale Flügel ausgezeichneter Arten, bei denen sich nur ausnahmsweise die Apicalbinde (*H. Telesiphe* Dbl., *H. Rivini* F., *H. Apsaetes* Hb. etc.) und die basale Längsbinde (*H. Phyllis* F., *H. Rivini* F. etc.) der Vorderflügel, häufiger dagegen die Mittelbinde der Hinterflügel erhielt, die meist ihre gelbe Färbung behält, dagegen bei *H. Telesiphe* Dbl. eine bläulichweisse, bei *H. Clysonomus* Latr. und *H. Rivini* F. stark erweitert, eine rothe Färbung annimmt.

Auch aus dieser Gruppe gehen endlich stärker verdunkelte Arten hervor, von denen *H. Chesteronii* Hew. ganz stahlblaue Vorderflügel, *H. Apsaetes* Hb. solche Hinterflügel besitzt.

Eine weitere Entwicklungsreihe des Stammes geht von *H. Hahneli* Stögr. aus, welcher auf den Vorderflügeln noch die Reste von vier Binden trägt und die weissen Marginaltüpfel der Hinterflügel auf der Oberseite noch deutlich hervortreten lässt. An diese Form schliessen sich die von Schatz erwähnten Arten mit weisser Marginalbinde der Hinterflügeloberseite an (*H. Cydno* Dbl., *H. Chioneus* Bates), auf welche endlich Formen mit vollkommen verdunkelten Hinterflügeln, wie *H. Aranea* F., *H. Eleusinus* Stögr., *H. Antiochus* L. zurückzuführen sind.

Auf der *Peruvianus*-Gruppe näher stehende Stammformen haben wir endlich auch die zahlreichen mimetischen Formen der *Heliconier*, welche meist seltener sind als ihre Modelle, zurückzuführen.

Den Grundformen am nächsten steht wohl die *Atthis*-Gruppe, deren oben schwarzweisse Arten ausnahmslos selten sind und an die für das nördliche Südamerika typischen Arten der *Bouplandii*-Gruppe von *Tithorea* (Neotropinen) erinnern. So gleicht der seltene *H. Hecuba* Hew. (Bogota) der weissgetüpfelten *T. Bouplandii* Guér., der ebenso seltene *H. crispus* Stögr. der gelbgetüpfelten *T. var. Decandollei* Stögr. (Caucathal), der seltene *H. Atthis* Hew. der *T. Paronii* Butl. (Ecuador) auch in Grösse und Flügelform auf beiden Seiten. Von demselben *Peruvianus*-ähnlichen Stamme ging auch der seltene *H. formosus* Bates aus, welcher durch die charakteristische dreieckige Flügelform und durch die Färbung und Zeichnung auffallend der *Tithorea Pinthias* Godm. et Salv. (Centralamerika) gleicht und so den *Irene*-Typus vertritt.

Von einem weiteren dem *H. Charitonius* ähnlichen Stamme aus entstand durch Anslehnung der Aussenzellbinde der Vorderflügel und der Mittelbinde der Hinterflügel der seltene *H. Nattereri* Feld. (Mittelbrasilien), der etwas Ithomien der *Agua*-Gruppe gleicht.

Eines Ursprungs mit *H. Charitonius* dürften auch die Arten der *Sylvanus*-Gruppe sein, bei welchen oft die Marginalbinde der Hinterflügel zu einer Binde verfliessen und gegen die Mittelbinde vorrückend eine an das Schleifenband der Melinaen erinnernde Zeichnung hervorrufen, die aber nicht aus dem Submarginalband allein besteht. In dieser Gruppe treffen wir Formen an, welche auffallend gewissen *Melinaea*-Arten gleichen und nur ausnahmsweise (*H. Eurate* Hb.) häufig sind.

So gleicht *H. Aristiona* Hew. der schönen *Mel. Messalina* Feld., mit tiefschwarzer Flügelbasis, welcher auch die seltenen *Mechanitis Methone* Hew. und *Ithomia fallax* Stögr. (♀), (alle Chanchamayo, Peru) sich anschliessen. So gleicht der seltene *H. Aurora* Bates (oberer Amazonas) der *Mel. Lucifer* Bates, so *H. Metabilis* Butl. (Venezuela) der *Mel. Lilis* Dbl., so *H. Pardalinius* Bates (oberer Amazonas)

und noch mehr der seltenere *H. Acrotome* Feld. (Rionegro) der *Mel. Pardalis*, so *H. Ismenius* Latr., der nach Dr. Standinger, l. c. p. 75, in der schwarzen Aussenhülle der Vorderflügel drei Reihen weisser Tüpfel führt, „wie keine andere Art“ der *Mel. Messatis* Hew. (Columbien, Panama). Ebenso findet sich der leuchtend weisse Tüpfel in der schwarzen Vorderflügelspitze wie bei *H. polychrous* Feld. (Südbrasilien) und den häufigeren *H. Eucrate* Hb. bei *Tithorea Pseudethra* Butl. und *Mel. Ethra* Godt. und der gemeinen *Mech. Lysimnia* F. (ebendort). Es ist nun sehr wahrscheinlich, dass auch *H. Eucrate* anfangs so selten war, dass er die schützende Tracht der Neotropinen im Interesse der Arterhaltung übernahm und erst durch günstige Bedingungen so zahlreich werden konnte, wie er es heute ist.

In noch höherem Grade als *Heliconius* tragen die ca. 20 Arten von **Eueides** Hb. einen durchaus verschiedenartigen Habitus. So führen manche die Melinaeen-Tracht wie die seltene ¹⁾ *Eu. Hübneri* Mén., die gemeine ²⁾ *Eu. Isabella* Cr. (Nordbrasilien), die *Eu. Dianasa* Hb. (Brasilien) und die seltene *Eu. Lampeto* Bates. ³⁾ Andere Arten, wie die gemeine *Eu. Lybia* F., die weit verbreitete *Eu. Aliphera* Godt., haben rostrothe, dunkel gesäumte Flügel, deren vorderes Paar nur ein Terminalband trägt, und erinnern einigermaßen an die Arten von *Colaenis*, einer Gattung der Nymphalinen.

Dagegen gleicht der nach Bates ebenfalls häufige *Eu. Thales* Cr. den charakteristischen „rothen“ *Heliconius*-Arten; *Eu. Aoede* Hb. (Mus. Berlin) mit gelben Vorderflügeltüpfeln und rothen Strahlstrichen der Hinterflügel ist so auffällig, dass wir auch hier nur an eine mimetische Anpassung denken dürfen. Nach Bates erinnert auch *Eu. Eanes* an *H. Vesta* Cr., eine der *H. Thelxiope* Hb. nahe stehende Art.

Ebenso entspricht die Tracht des *Eu. Xenophanes* Feld. (Bogota) dem des grösseren *H. Lindigii* Feld. auf der Oberseite, während der seltene *Eu. Heliconides* Feld. (Ecuador) mit einem weissen Bindenrest am das Ende der Vorderflügelzelle und sonst tief-schwarzen Flügeln dem *H. Timareta* Hew. ähnelt. Wie der kleinere *Eu. vulgiformis* Butl. (Costarica) an *Tithorea Irene* Dru., erinnert *Eu. Elias* Hew. (Neu-Granada, Columbien) an *Olyras Montagnei* Butl.

Einige Arten gleichen auch Acræen, so *Eu. Parana* Mén. der gemeinen *Acræa Thalia* L. (Brasilien).

Nach Fr. Müller ⁴⁾ sind manche *Eueides*-Arten selten. Alle besitzen einen sehr starken und widrigen Duft. In manchen Fällen scheint das gegenseitige Verhältnis der Individuenmenge gewisser, manchmal recht häufiger Arten stark zu variiren; so war nach Fr. Müller bei Sao Bento *Eu. aliphera* ganz gemein und *Col. Julia* sehr selten. Umgekehrt war es am Itajahy, so dass ein Beobachter an letzterem Ort *Col. Julia*, am ersteren *Eu. aliphera* für das Modell gehalten hätte.

Nach A. Seitz ⁵⁾ haben unter den echten Heliconinen weder *Heliconius Eucrates* noch *Eueides Dianasa* einen unangenehmen Geruch, dagegen sind *H. Besekei* und *Eu. alistera* mit einem solchen ausgestattet. „Der Geruch des *H. Besekei* ist ein äusserst starker und jedem Brasilianer hinlänglich bekannt. Gegenwärtig habe ich eine Anzahl vor mir stecken, die ich vor sechs Tagen gefangen habe, und trotzdem haftet ihnen der widrige Geruch (der dem mancher europäischen *Pompilus* gleicht) noch immer an, er überläßt sogar den Geruch des untergestreuten Naphthalins.“ A. Seitz beobachtete auch eine ver-

¹⁾ Die Angaben über die Häufigkeit der *Eueides*-Arten sind Bates (Helicon, Amazon Valley) entlehnt.

²⁾ Bates giebt *Eueides Lampeto*, l. c. p. 563, als Nachahmer von *Stabathis Calliope*, einer Erycinide, an, die selbst als Nachahmer feststellen werden.

³⁾ Fr. Müller, Notes on Brazilian Entomology, (Trans. Ent. Soc., London 1878), p. 222-223.

⁴⁾ A. Seitz, Lepidopteren-Studien etc. (Zool. Jahrb. IV.), p. 777.

schiedene Stärke dieses Geruchs. „Während einzelne Stücke des *H. Besckei* auf mehrere Schritte weit ihren Geruch ausstrahlen und alle Gegenstände damit inficiren, so ist bei einigen Ausnahmen keine Spur davon zu finden. — Bei *Eucides aliphera* sind die geruchführenden Stücke sogar in der Minderzahl.“

Nach demselben¹⁾ entströmt der Coactor den eigenthümlichen (von Fr. Müller als Stinkköllchen beschriebenen) Organen der Aftergegend und „zwar nur bei Gefahr oder directem Insult. Ich nahte mich den Thieren, während sie sich begatteten, und beroch sie, wobei ich nichts wahrnehmen konnte. Drückt man aber dem Thier die Brust zusammen, so strömt ein so starker Geruch aus, dass man ihn im Winde auf 10—20 Schritte weit deutlich wahrnehmen kann.“

Um noch die Beobachtungen von Bates anzuführen, so halten sich die „Heliconiden“, unter welchen er noch Danainen, Neotropinen, Heliconinen und Acraeinen begreift (l. c. XXIV, p. 499), nahe dem Grunde, haben einen sehr langsamen, unregelmässigen Flug und setzen sich oft. Sie leben in Schaaren, die nicht nur aus Individuen einer Species, sondern auch aus den einander ähnlichen Arten verschiedener Gattungen bestehen. Ueber die Immunität der Falter bemerkt derselbe (l. c. p. 510), dass frisch getödtete Thiere, die er trocken liess, immer weniger als andere Insecten durch den Frass der Raubinsecten litten. Ebenso beobachtete Bates an den lebenden Faltern, dass sie im Fluge nie von Vögeln oder Libellen verfolgt wurden und auch, wenn sie ruhten, nie von Eidechsen und Raubfliegen (*Asilidae*) belästigt wurden, die sehr oft Schmetterlinge anderer Familien ergriffen. Besonders die Pieriden wurden stark verfolgt.

Th. Belt beobachtete²⁾, „dass einige, wenn nicht alle Vögel“ die Heliconier³⁾ verschmähten. „I observed a pair of birds that were bringing butterflies and dragonflies to their young, and although the Heliconii swarmed in the neighbourhood and are of weak flight so as to be easily caught, the birds never brought one to their nest.“ Ein zahmer Affe, den Belt hielt, nahm aus Artigkeit zwar die angebotenen Heliconier an, dann aber beroch er sie, „invariably rolled them up in his hand and dropped them quietly again after a few moments“. Auch eine grosse *Nephila* liess sie aus ihrem Nest fallen.

Unterfamilie der **Nymphalinen.**

Die sonst immer zur *Argynnis*-Gruppe gerechneten Gattungen *Colacnis*, *Metamorpha* und *Dione* zeigen, wie zuerst Fritz Müller hervorhob und sein Bruder Wilhelm bestätigte, so viele Punkte der Uebereinstimmung⁴⁾ mit den Heliconinen, dass Fr. Müller vorschlug, sie mit letzteren in eine Unterfamilie, die Heliconinen, zu vereinigen (der W. Müller⁵⁾ noch die indische *Cethosia* und die übrigen Gattungen der *Argynnis*-Gruppe beigefügt wissen wollte).

¹⁾ A. Seitz, Die Schmetterlingswelt des Monte Corcovado (Stett. ent. Zeitung 1890, p. 92).

²⁾ Th. Belt, The Naturalist in Nicaragua (London 1888), p. 316.

³⁾ Für Belt's Fassung dieses Begriffes gilt wohl dasselbe wie für Bates' Angabe.

⁴⁾ F. Müller, Die Duftschuppen der männlichen Maracujälfalter (Kosmos I, 1877, p. 388—396). — Ders., Die Maracujälfalter (Stett. ent. Zeitung, XXXVII, 1877, p. 492—496). — Ders., Beobachtungen an brasilianischen Schmetterlingen (Kosmos II, 1878, p. 38—41). — Ders., Die Stinkköllchen der weiblichen Maracujälfalter (Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie, XXX, 1878, p. 167—170, mit Tat. IX).

⁵⁾ W. Müller, Südamerikanische Nymphalidenraupen etc. (Zool. Jahrb. I, 1886, p. 16—18).

In der That stimmen die Form des Eies, die Bedornung der Raupen, die Futterpflanze der letzteren, die Puppenform, die Lebensweise der Falter, die Dufteinrichtung am Vorderrande der Hinterflügel der Männchen und die Stinkkölbchen am Hinterleibsende der Weibchen bis in Einzelheiten dermaassen überein, dass dagegen der von der Systematik allein betonte Unterschied des Geäders der Hinterflügel nicht zu sehr in's Gewicht zu fallen scheint. Letzterer besteht darin, dass bei *Heliconius* und *Eueides* wie bei den *Acraeae* ein röhriges hinteres Discocellulare vom zweiten in den Bug des dritten Medianastes geht und so die Mittelzelle jederseits abschliesst, während bei allen Nymphalinen solcher Schluss nur bei *Clothilda* nach Schatz vorkommt, aber wie die entsprechende Concavrippe der übrigen Gattungen an den vordersten Cubitalast geht.

Es sei mir vorerst gestattet, einige der von den Fritz Müller gegen die Zugehörigkeit von *Colaenis* und *Dione* zu den Nymphalinen vorgeführten Einwände wenigstens für die *Argynnis*-Gruppe zu widerlegen. Mit Bezug auf seinen Aufsatz über „die Maracujälfalter“ wende ich gegen den ersten Punkt, dass keine Nymphalinenraupe auf Passifloren lebt, ein, dass die bisher bekannten Raupen der indischen Gattung *Cethosia* (*Argynnis*-Gruppe), soviel bekannt, an Passifloren (*Passiflora*, *Madecca*) leben.

Gegen den dritten Punkt weise ich ebenfalls auf die Raupenform der *Argynnis*-Gruppe hin, welche nach W. Müller mit der der *Acraeae* übereinstimmt. Auch die Hauptfutterpflanze von *Argynnis*, *Viola*, steht den Passifloren nahe.¹⁾

4) Wie die Maracujälfalter saugen auch die *Argynnis*-Arten ausschliesslich Nectar, keine Art den ausfliessenden Saft der Bäume.

5) Bei *Didonis* (Nymphalinae) hat Fr. Müller später selbst Stinkwülste beschrieben. Solche Vertheidigungsmittel bilden sich in den Tropen eben kräftiger aus.

7) Auch bei Nymphalinen kommen Duftschuppen nahe dem Vorderrande der Hinterflügeloberseite vor (*Neptis* sp., *Argynnis Cybele* Cr.).

9) Der „Mediansporn“ (Cubitalsporn) ist für zahlreiche Gattungen der *Argynnis*-Gruppe nachgewiesen. Die „Praecostalis“ ist ursprünglich zweispaltig und erhält sich so noch bei *Clothilda* und (entgegen Schatz) auch bei *Cynthia*; erst aus dieser auch bei vielen afrikanischen *Acraeae* vorkommenden Form entwickelte sich die nach innen vorspringende, wie die nach aussen gebogene Form durch einseitige Verkümmernng.

Als Gründe gegen die Zugehörigkeit der Gattungen *Metamorpha*, *Colaenis* und *Dione* zu den Heliconinen vermag ich bei dem geringen mir zur Verfügung stehenden Museumsmaterial nur anzuführen, dass bei *Col. Phaerusa* L. die Dufteinrichtungen auf den Hinterflügeln, wie dies Fr. Müller selbst auch für *Dione Juno* angiebt, nicht entwickelt sind. Dagegen sind die auf den Vorderflügelrippen stehenden schwärzlichen, am Ende gefransten Duftschuppen, wie sie Fr. Müller selbst bei *Dione Vanillae* etc. beschreibt, auch bei *Argynnis*-Arten vorhanden.

Endlich lässt sich das Geäder und die Zeichnung von *Dione* über Arten wie *D. Vanillae* nur auf *Argynnis*-Formen zurückführen, auf welche schon die Färbung und die Perihuntertüpfel an der Unterseite der *Dione* hindeuten. So dürfen wir denn die Arten von *Colaenis* und *Metamorpha* wohl eher als ab-

¹⁾ In Ergänzung der Angaben W. Müller's bemerke ich über die Puppe von *Argynnis*, von denen nur *A. Aglaja*, *Paphia Leodice* vorliegen, dass letztgenannte Art, welche die meisten Hocker besitzt, zwei kurze Kopfhocker, deutliche Subdorsalhocker auf 1—11, keine Suprastigmalhocker auf 5—9(10) und Infrastigmalhocker auf 7—10 und keine Podala trägt, also besonders an die Sculptur der Vanessen-Puppe erinnert.

geleitete Formen der *Argynnis*-Gruppe der Nymphalinen ansehen, welche den höchsten Grad der Convergenz mit den Heliconieru, besonders *Eueides*, zeigen.

Wie die Bemalung der Raupen nach W. Müller die auch für die *Argynnis*-Gruppe typische Anordnung zeigt, hat die Puppe von *Cethosia* nach demselben auch grosse Aehnlichkeit mit der der Heliconier. Auch dürften, wenn die Raupenmahrung in diesem Falle die Falter immun macht, sowohl *Cethosia* als *Metamorpha*, *Colaenis*, *Dione*, welche, wie die Heliconier, von Passifloren leben, zu den immunen Gattungen gehören.

So lässt sich die ähnliche Färbung von *C. Julia* und der kleineren *Eueides aliphera* nicht nur als Convergenz ansehen, was wir immer noch können, nachdem die Theorie der Mimicry gefallen, sondern als mimetische Anpassung an die immune *Colaenis*-Art.

Im Falle der experimentell erst noch zu beweisenden Immunität von *Metamorpha*, *Colaenis* und *Dione* wird es sehr wahrscheinlich, dass diese Gattungen unschmackhaft wurden, indem sie von verwandten Pflanzengattungen (? Violaceen) auf die Passifloren übergingen, auf eine Familie, welche in Südafrika die Nahrung von *Acraea*-, in Südamerika die von Heliconier-Raupen bilden. Es kann natürlich hier nur meine Aufgabe sein, solche Fragen, deren Beantwortung allein Sache des Experiments ist, anzuregen, damit sie der Prüfung unterworfen werden: hoffentlich ist es mir auch vergönnt, an letzterer mitzuarbeiten.

Familie der Papilioniden.

Die widrigen Modelle unter den Papilioniden gehören, wofür ich auf p. 74—80 dieser Arbeit verweise, grösstentheils der Untergattung *Pharmacophagus* an.¹⁾ Um einen kurzen Ueberblick über ihren Habitus zu geben, sei nur hervorgehoben, dass in der ausschliesslich amerikanischen *Laertias*-Cohorte, deren nördlichere Formen noch geschwänzt sind, auf der Oberseite der Flügel ein glänzendes Stahlgrün herrscht, das nur von schwach kreideartigen Bindenresten unterbrochen ist. Bei den südlicheren ungeschwänzten Formen entstehen entweder breitere, continuirliche Binden (*Polydamas*-Gruppe) oder gehen ihre Reste in der gleichmässig grünen Färbung ganz unter (*Lycidas*-Gruppe).

Vergl. Taf. IX,
Fig. 62.

In Mexico herrscht die **Photinus**-Gruppe mit schwarzen, bläulich schimmernden Flügeln und einer Doppelreihe rother Täpkel auf den hinteren und ähnliche Arten als Modelle der Anpassung vor.

Vergl. Taf. X,
Fig. 69.

Gegen Süden zu findet sich die widrige **Agavus**-Gruppe mit tief schwarzen, von einer weissen Mittelbinde durchzogenen Flügeln, rothen Hals- und Brustflecken und einer rothen Randmondreihe auf den geschwänzten Hinterflügeln.

Vergl. Taf. IX,
Fig. 65,
und Taf. X,
Fig. 72 u. 74.

Der geschwänzte *P. Dardanus* F. endlich eröffnet die Reihe der zahlreichen Formen der **Vertumnus**- etc. Gruppen, deren Männchen auf den tief schwarzen Vorderflügeln einen grünen Spiegel tragen, während die Weibchen oft einen abgekürzten gelblichen oder weisslichen Bindenrest führen; die Hinterflügel sind meist, wie bei *P. Dardanus*, von einer rothen, selten gelben Binde durchzogen, aber besitzen keinen Schwanz mehr. Aus Formen mit stark entwickelten Dufteinrichtungen der Männchen gingen

¹⁾ Nach Dr. Hahnel werden (l. c. p. 161) auch die Segelfalter der *Protesilaus*-Gruppe „ihres Geruches wegen“ von Hühnern verschmäht, was doch noch einer Nachprüfung bedürftig erscheint. Denn auch die von Dr. Hahnel erwähnte „schwelligsaure Ausdünstung“ dürfte vielleicht nur von den mit Dufteinrichtungen ausgerüsteten Männchen ausgehen.

solche mit verkümmerten, analog dem Entwicklungsgange einiger indischen Aristolochienfalter, hervor.

Nach H. W. Bates¹⁾ leben die Formen der *Vertumnus*- etc. Gruppe vor Allem im Schatten der Wälder; ihr Flug ist langsam und niedrig, besonders der der anscheinend häufigeren Weibchen, welche vorwiegend als Modelle dienen. Dagegen sind die Arten der ungeschwänzten *Laetias*-Cohorte, wie *P. Crassus* Cr. und *P. Belus* Cr., nach Bates gute Flieger.

Auch die Arten der auf die La-Plata-Staaten beschränkten Gattung **Euryodes** Feld., deren Raupen ebenfalls Aristolochien fressen, dienen als Modell mimetischer Anpassung.

b. Als Modelle dienende Gattungen etc. der Heteroceren.

Unter dieser gewaltigen Abtheilung sind es wiederum nur einzelne tagfliegende Gattungen mit auffälliger Färbung, welche als Modelle der Nachahmung zu dienen scheinen. Da die Entwicklung der zahlreichen Formen fast vollkommen unerforscht ist und über ihre Lebensweise nur einzelne dürftige Angaben vorliegen, müssen wir uns auf die Erwähnung einzelner Formen beschränken.

So erwähnen wir nur die auffällige und typische Josien-Tracht, bei welcher die schmalen schwarz gerandeten Flügel eine grell dottergelbe oder orangene Färbung tragen, zu der nur selten noch ein Vorderflügelband hinzutritt. Hierher gehören die vielen kleinen, aber individuenreichen Arten von **Josia** Walk. (*Melaneridae*) und verwandten Gattungen.

c. Mimetische Anpassungsformen.

Die mimetischen Arten unter den Tagfaltern gehören den Abtheilungen der Nymphalinen, Eryciniden, Pieriden und Papilioniden, und diejenigen unter den Heteroceren besonders den Castniiden, Pericopinen und Dioptiden an.

Unterfamilie der **Nymphalinen**.

In der Gattung **Phyciodes** Hb. treffen wir die hinsichtlich der Zeichnung ursprünglichsten, in mancher Hinsicht den arktischen Melitacoen-Typus wiederholenden Formen bei den an unsere *Araschnia Prorsa* L. erinnernden Arten, wie *Ph. Hera* Hb. mit vielen weisen Tüpfeln und breiter Mittelbinde der Hinterflügel, an.

Aus Formen, bei welchen zuerst die typisch neotropische längs verlaufende basale Aufhellung der Vorderflügel eintrat, entstanden zunächst zahlreiche Arten (subg. *Eresia* Boisld.), welche sich nur unvollkommen den verschiedenen Gruppen innummer Tagfalter anpassen. Auch hier steigt die Aehnlichkeit meist mit der Grössenzunahme der nachahmenden Form; doch wird in keinem Falle die Grösse des Modells selbst erreicht. Immerhin sind die Anpassungen in manchen Fällen so bestimmt gerichtet, dass wir auch hier sie für mimetisch ansehen dürfen.

¹⁾ H. W. Bates, Contributions to the Insect Fauna of the Amazon Valley (Trans. Ent. Soc. A. [1851-1864] p. 223 etc.).

Um zuerst die Arten mit reicherer Zeichnung und erhaltener Mittelbinde der Hinterflügel zu besprechen, so erinnert *Ph. drypetis* Godm. et Salv. (Guatemala, Panama) an *Mechanitis waerinas* Hew. und *Ph. Mechanitis* Godm. et Salv. (Nicaragua, Costarica) an *Melinaea doryssus* Bates var. und *Heliconius Telchinia* Dbl., so *Ph. Eunice* Hb. (Brasilien) an *Mechanitis Polynnia* L., *Ph. Esora* Samml. an *Mech. Nesaea* Hb., *Ph. Erysize* Hb. (wie vorige Bahia, Mus. Berlin) an *Tithorea Harmonia* Cr. var. *Coparina* Bates. Von verwandten Arten mit meist breiten, aufgehellten Hinterflügeln erinnert *Ph. Acyrone* Bates (Costarica, Panama) an *Eucides Aliphora* Hb., *Ph. nigripennis* Salv. an *Eucides vulgiformis* Dru., *Ph. pocilina* Bates an eine kleine *Tith. Irone* Dru., *E. prisca* Hopffr. (Mexico) an kleine *Olyras*-Arten und *Eucides Elias* Hew., und *Ph. Emerantia* Hew. (Rio St. Juan) gleicht der *Eucides Olympia* F.

Weitere Arten ähneln *Heliconius*-Arten so *Ph. Langsdorfi* Godt., nach A. Seitz auch im Fluge besonders in abgeflogenen Stücken (? befruchteten Weibchen) *Hel. Besekei* L. (Brasilien). Weiter erinnert *Ph. Perilla* Hew. (Chanchamayo, Jurimaguas) an *Hel. Erato* L., *Ph. Minas* Stdgr. (Rio St. Juan) an *Hel. Faunus* Stdgr. und *Ph. Murena* Stdgr. an *Hel. Aristionia* Hew. (Chanchamayo).

Dagegen ähneln andere stärker verdunkelte und zugleich wohl die am meisten von der Stammzeichnung abgewichenen Arten bestimmten *Acracae*; so erinnert die kleine *Ph. Acracina* Hew. (Peru) mit gelbrother Subapicalbinde und tieferer Flügelbasis an *Acraea Diccus* Latr., *Ph. fallax* Salv., *Ph. Acraea* Hopffr. und *Ph. Actinote* Salv. an *Acr. Nicglla* Hopffr. und verwandte Arten (Chanchamayo). Weiter ist ganz stahlblau *Ph. atrata* Dew. (Columbien); sie ist der *Acraea Carbonaria* Hopffr. sehr ähnlich, und der rothe Innensaum der Hinterflügel der *Ph. Steinii* Dew.¹⁾ (Mus. Berlin) täuscht den rothen Hinterleib der *Acr. Nelea* Latr. (Columbien) vor.

Die einzige Vertreterin der in Indien dominirenden Diademen-Gruppe ist die rein neotropische Gattung **Victorina** Dbl. Während die schwarze, weissbindige *V. Sulpitia* Cr. noch etwas an die Grundzeichnung von *Hypolimnas* erinnert, sind bei *V. Sthenes* die Mittelbinde beider, die Subapicalbinde der Vorder- und die Randmonde der Hinterflügel stärker erweitert und zart smaragdgrün gefärbt. Auf der Unterseite sind die oben schwarzen Querbänder innen silberweiss aufgehellt und aussen rostgelb gesäumt, die grünlichen Bänder fast glasig und sehr schuppenarm. So erinnert diese Art an *Colacnis Dido* L., welche ihr an Häufigkeit gleichsteht, auf beiden Seiten in Färbung und Zeichnung, nicht aber in der Flügelform. Doch ist immerhin die Aehnlichkeit beider und zugleich die Verschiedenheit der *V. Sthenes* von den übrigen Arten der Gattungen gross genug, um auch die Umbildung der Art aus mimetischer Anpassung an die eigenartige *Colacnis*-Art wahrscheinlich zu machen.

In der *Limnitis*-Gruppe, deren mimetische Anpassungsformen an *Donax Eriippus* und *Papilio Philenor* wir bereits in der nearktischen Subregion erwähnten, findet sich in der Gattung **Adelpha** Hübn. eine anscheinend seltene Art, *A. Lara* Hew. (Venezuela, Columbien, Chanchamayo), welche besonders auf der Oberseite in beiden Geschlechtern an *Hel. Melpomene* L. erinnert. Auch hier dürfte sich die mimetische Anpassung erst secundär auf das Männchen erstreckt haben und der Individuenreichtum der Art, deren Verbreitung mit der des *Heliconius* noch zusammenfällt, erst allmählig entstanden sein. Der *A. Lara* gingen wohl Arten wie *A. Mephistopheles* Butl. und dieser die häufigen *Cytherca*-Formen voraus, welche den *Limnitis*-Typus beibehalten haben.

¹⁾ Dieselbe wurde von H. Dewitz in der That auch als *Acraea* beschrieben (Mitth. Münch. ent. Ver. 1877, p. 88) und entspricht wohl der *Epiene* Godm. et Salv.

Nach Godman und Salvin (Biol. centralamer.) tritt in der *Anaea*-Gruppe bei einzelnen **Anaea**-Arten ein Dimorphismus der Geschlechter ein. So trägt bei *A. nobilis* das Männchen eine stark purpurrothe Oberseite der Vorderflügel, während dieselbe bei dem ursprünglicheren Weibchen (*Bertha* Drnce) an der Basis rostbraun aufgehellt ist und in dunklerem Grunde zwei Tüpfelreihen trägt. Bei *A. Jansoni* Salv. (Nicaragua, Panama) trägt das Männchen mehrere weissliche Tüpfelreihen in der dunklen Aussenhälfte der Vorderflügel. Dagegen erinnert das Weibchen etwas an den *Lycorea*-Typus, denn es trägt eine gelbe Apical-, eine breite gelbe Subapical- und eine orangene Inneurandsbinde der Vorderflügel.

Diese Art führt auch durch die Flügelform schon zu *Protogonius* über, dessen Arten in beiden Geschlechtern auf der Oberseite meist den *Lycorea*-Habitus tragen, auf der Unterseite der Flügel aber noch eine ausgebildete Schutzfärbung besitzen, wie wir dies bei einigen Arten von *Elymnias* fanden. Durch den weissen Apicaltüpfel der Vorderflügel erinnert *P. Druryi* Butl. auch an *Heliconius Eucrate* und kommt ebenfalls nur in Südbrasilien vor. Andere Arten erinnern an den *Leue*-Typus.

Familie der **Erycinidae**.

Unter dem vielfarbigen und vielgestaltigen, artenreichen Heer der Eryciniden, welches in der neotropischen Region sich zur höchsten Blüthe entfaltet, giebt es natürlich auch die verschiedensten Anpassungen an die von uns besprochenen Modelle. Allerdings sind es auch hier meist seltene und nicht ganz kleine Arten, welche ihre Tracht einer mimetischen Umbildung verdanken. So erinnert, wofür ich auf die zahlreichen Abbildungen aus dieser Familie in Standinger's Exotenwerk, Taf. 87—93, verweise, die gelbe Subapicalbinde und die rostrothe Basis der Vorderflügel bei dem Weibchen der grösseren, sehr seltenen *Catagrammina tapaja* Saund. etwas an Melinaeen mit verdunkelten Hinterflügeln; ähnlich besitzt das Weibchen von **Aricoris** *Epitus* Cr. (Para) auf den abgerundeten Vorderflügeln eine gelblichweisse Subapicalbinde und eine rostbraune Basis beider Flügel, während das Männchen langgestreckte, zugespitzte, dunkle, bläulich glänzende Flügel trägt. Dagegen gleichen die Weibchen von *A. Gelasine* Bates und *A. Butleri* Bates (gewissen Josien und Flavinen¹⁾), während die Männchen wieder eine bläulich schillernde Oberseite mit einem weissen Vorderflügeltüpfel besitzen.

Von der schönen *A. Flammaria* Bates besitzen die Männchen schwarze Vorderflügel mit schmaler weisser Subapicalbinde und abgekürzten Innenrandstreifen und hochrothe, schwarz gesäumte Hinterflügel, dagegen erinnern die Weibchen wie das von *A. Epitus* Cr. unvollkommen an den Melinaeen-Habitus.

Zahlreich sind besonders Anpassungsformen an die glasigen, durch *I. Omega* Hew. vertretenen Ithomien mit weisslicher Subapicalbinde der Vorderflügel, von denen ich hier nur *Phelus incerta* Stdgr. und *Ph. heliconides* H.-S., *Metaphelus Dinora* Bates, *Tmetoglene Esthema* Feld., *Esthemopsis lithosina* Bates erwähne, die in beiden Geschlechtern den Modellen ähnlich sind.

Eine höhere Stufe der Anpassung an die *Chrysodonia*- (*Orolina*)-Gruppe von *Ithomia* treffen wir in beiden Geschlechtern bei **Ithomeis** *heliconina* Bates, *I. Corinna* Stdgr. (oberer Amazonenstrom) und *I. Corena* Feld. (Bogota). Noch andere Arten dieser kleinen Gattung, die ich wegen ihrer Seltenheit nicht

¹⁾ Mit schwarzgerandeten, innen gelbbündigen Flügeln.

alle prüfen konnte, erinnern an Ithomien, so *Ithomeis Astrea* Feld. an die *Oregea*-Gruppe, *Ithomeis aurantivora* Bates an *Ithomia Ithissa* Hew. (Amazonas) und *Ithomeis minica* Bates an die kleine schwarzgelbe *Ithomia Eurimedia* Cr.

Während bei **Kenandra helius** (Surinam) nur das Weibchen (*Phereclus* Cr.) durch die gelbe Subapicalbinde der sonst schwarzen Flügel an *Centronia*-Arten erinnert, sind mehrere kleinere Formen in beiden Geschlechtern den Josien auffallend ähnlich, so **Lymnas melanochloros** Godm. et Saly. der *Josia ligula* Walck.

Besondere Berücksichtigung verdient, weil sie uns einen gewissen Aufschluss über die mimetische Anpassung der Eryciniden giebt, noch die Gattung **Stalachtis** Hb. Während Bates, l. c. p. 504, den *Stalachtis Duvallii* Perty als immunes Modell ansieht, muss ich in Berücksichtigung des Verhaltens der Eryciniden überhaupt und der untereinander durchaus verschiedenen Tracht der Arten dieser Gattung, auch die nach Bates' Angabe häufige Art für einen Ithomien-Nachahmer halten, deren Modell der *Orolina*-Gruppe angehörte und wohl nicht mehr flog, als Bates in Ega die zufällig einmal besonders zahlreiche — sonst aber seltene — *Stalachtis* sammelte.

Die häufigsten Formen von *Stalachtis* sind die Melitaceen-artig auf schwarzem Grund mit weissen Tüpfeln und rostrother Basal- und Randbinde gezeichneten Arten, welche den reinen Typus der Gattungsfärbung darstellen, wie *St. Phlegia* Cr., *St. Sasanna* F. Schon seltener ist *St. Calliope* L., welche durch die Zeichnung und Färbung der Flügel durchaus an den Melitaceen-Typus erinnert. Bei der var. *Bicolor* Stögr. (oberer Amazonas) sind die weissen Flecke in der breiteren schwarzen Vorderflügelspitze ebenfalls rostbraun. So erinnert diese Art an die dortigen, ebenfalls dunkleren Formen ihrer Modelle. Ueber Arten wie *St. Sasanna* F. ging auch die schon seltene, stark variirende *St. Euterpe* L. (Amazonengebiet) hervor und entstanden die Nachahmer der Ithomien. Von diesen gleicht *St. Phaedusa* Hb., zu der auch *St. Duvallii* Perty als Varietät gehört, durch die breite orangerothe, schwarz eingefasste Randbinde beider Flügel und das Terminalband der vorderen, Ithomien der *Orolina*-Gruppe (Amazonas); dagegen hat *St. lineata* Guér. (unterer Amazonas) mit stark verdunkelten Rippen eine breite orangerothe, schwarz gesäumte Vorderflügelspitze und gleicht so eher der *Ithomia Aureliana* Bates. So glaube ich nachgewiesen zu haben, dass die *Stalachtis*-Arten keine Modelle, sondern Nachahmer sind.

Familie der **Pieriden (Dismorphiinae, Pieridinae).**

Die Dismorphiinen, welche kurze Palpen und eine normal fünfästige Radialis der Vorderflügel besitzen, deren kurze Aeste in gleichem Abstände vom Stamme abgehen, werden in der paläarktischen Region nur durch die Gattung *Leucophasia* Steph. und in der neotropischen Region durch die ihnen für letztere charakteristische Gattung *Dismorphia* Hb. (*Leptalis* Dalm.) vertreten.

So wird es wahrscheinlich, dass diejenigen Arten von *Dismorphia*, welche den Typus der *Leucophasia* tragen, die Urtracht der Gattung am besten bewahrt haben, zumal nach Schatz, l. c. p. 57, noch eine Varietät der *Leuc. sinapis* die für die meisten Dismorphiinen so charakteristische sichelförmig umgebogene Flügelspitze besitzt. Weitere Anhaltspuncte für die natürliche Gruppierung der **Dismorphia**-(*Leptalis*-)Arten erhalten wir durch den Grad der mimetischen Anpassung, welche bei dem Weibchen beginnt und sich endlich auf das Männchen ausdehnt, und durch die Ausbildung der Dufteinrichtungen auf den Hinterflügeln der letzteren.

Die am meisten an *Leucophasia* erinnernde Art ohne besonders localisirte Duft-einrichtung ist *Dismorphia Nehemia* Boisd., welche angeblich einen gewöhnlichen Weissling nachahmen soll. Hier ist die Aehnlichkeit aber ein Zeichen der Verwandtschaft und eher schädlich als nützlich, denn nach Dr. Hahnel ¹⁾ wurden gerade die weissen Pieriden lebhaft von den neotropischen insectenfressenden Vögeln verfolgt.

Mit der zunehmenden Ausbildung der männlichen Duft-einrichtungen schreitet auch die der Zeichnungselemente fort. So finden wir eine nur geringe Modification der Vorderflügel bei den sich dem Stamme noch näher anschliessenden Formen mit weissen, fortlaufend schwarz gerandeten Flügeln wie *D. Psamathe* F. und *D. Kollari* Luc. Von ihnen aus bilden Formen mit unregelmässig zerstreuter brauner Bespritzung der Hinterflügel, die eine unvollkommene Schutzfärbung hervorruft, wie *D. Lewyi* Luc., einen Uebergang zu den Arten mit differenzirter Zeichnung der Hinterflügelunterseite, welche schon eine mittlere helle, über die Zelle verlaufende Binde freilässt. Dahin gehören *D. Nemesis* Latr. und *D. Critomedia* Hb. mit zugespitzten, weniger verschmälerten Vorderflügeln und sehr breiten Hinterflügeln mit complicirter Duft-einrichtung, welche die Erweiterung des Hinterrandes der Vorderflügel bedingt.

Aus ähnlichen Formen gingen nun in weiterer Ausbildung, die zuerst im Weibchen beginnt, die mimetischen Arten hervor.

So gleicht bei *D. Melia* Godt., deren Männchen drei gelbe Bänderreste auf den schwarzen schmalen Vorderflügeln und schwefelgelbe, schwarz gesäumte Hinterflügel trägt, das Weibchen (*D. acraeoides* Hew.) der *Acraea Thalia* L., und in noch höherem Maasse ist dies bei *D. mimetica* Stdr. (Cayenne) der Fall, deren Männchen einer ähnlichen, schon beschriebenen Form angehören dürfte. Diese Aehnlichkeit erstreckt sich auch auf die Unterseite: so tragen die Hinterflügel ebenfalls die für jene *Acraea* so charakteristischen Intercoastalstreifen. Noch näher stehen der Grundform einige kleinere Formen, so *D. Eumelia* Cr., welche den gelb und schwarz gebänderten Ithomien der *Arria*-Gruppe (*L. Ellara* Hew., *L. Eurimedia* Cr.) nicht nur auf der Oberseite ähnlich ist, sondern auf der Unterseite auch die orangerothe, schwarz gesäumte Hinterflügelrandbinde ihrer Modelle trägt. Bei dem Weibchen tritt bei dem Fehlen der Duft-einrichtung auch der Vorderrandsstreif auf der Oberseite der Hinterflügel durch und dadurch wird die Aehnlichkeit noch erhöht.

Die zarte *D. Methymna* Godt. (Amazonas) gleicht auch in dem breiten aufgehellten Subapicalbindenrest der Vorderflügel der *Scada Beckia* Hb., und die kleine *D. Aronia* Hew. (Columbien) erinnert an die *Ithomia (Arria) Agna* Godm. et Salv.

Von Formen mit weisser Subapicalbinde der Vorderflügel, die *D. Critomedia* F. näher standen, ist auch *D. fortunata* Luc. abzuleiten, deren Weibchen auf den Vorderflügeln viel stärker aufgehellte ist als das Männchen und am Aussenrande der fast glasigen Hinterflügel wieder die rothe, schwarz gesäumte Randbinde trägt, wie sie für viele Ithomien charakteristisch ist. Diese Art lebt nach Godman und Salvin ²⁾ „in the lower forest regions in company with *Ithomia victorina*“, der das Weibchen äusserst ähnlich ist.

¹⁾ „Keiner anderen Gattung von Schmetterlingen wurde von Vögeln so nachgestellt wie den Pieriden, und oft schnappten mir diese Freilüfter die hübschesten, frischesten Stücke dicht aus meiner Nähe weg, wobei die unthätbare Sicherheit ihres Fluges mich jedesmal in Verwunderung setzte“ (l. c. p. 193).

²⁾ Biolog. central-america. Lepidopt. I. Rhopaloc. p. 177 (1890).

Hierher gehören auch diejenigen Arten von *Dismorphia*, welche durch die scharfsinnigen Beobachtungen von Bates zu den Grundsteinen für die Mimicry-Theorie wurden. Wegen der näheren Angaben darf ich auf Bates' Arbeit selbst, p. 504—506, verweisen und begnüge mich, hier zu erwähnen, dass nach Bates *D. Theonoe* Hew. (Cupari) der *Ithomia Flora* Cr., dass *D. Theonoe* var. *Melanoe* (St. Paulo) der *Ith. Omega* Hew., dass die var. *Lysimoe* (mit rother Hinterflügelsaumbinde) einer Zwischenform zwischen *Ith. Omega* und *Hilissa* gleicht.

Weiter ähneln die bei Bates, l. c. Taf. LV, Fig. 4—9, abgebildeten Varietäten ¹⁾ (Ega u. St. Paulo) mehr oder minder der *Ith. Hilissa* Hew. und die *D.* var. *Erythroë* (Taf. LVI, Fig. 1—3) der *Ith. Chrysolonia* Bates (St. Paulo), die var. *Leuconoe* (St. Paulo) der *Ith. Herdina* Hew., die var. *Argophloe* (Taf. LVI, Fig. 6) der *Ith. Virginia* Hew. (St. Paulo).

Dieser Gruppe stehen auch einige Formen nahe, welche sich besonders im Weibchen den grösseren Formen der Neotropinen angepasst haben und als Männchen stark entwickelte Dufteinrichtungen besitzen. So gleicht das Weibchen von *D. Orise* Boisdu, der gemeinen *Methona contusa* Butl. (Cayenne) und zugleich der *Itana Phaearete* Dblld. (Chanchamayo) bis auf die schlanke, am Ende verdickte Hinterleibstorn und die weissgelbe Spitze der langen, steifen Fühler.

Vergl. Taf. XI,
Fig. 79.

Aus einem weiteren, an das Weibchen von *D. Nemesis* Latr. erinnernden Stamm gingen durch Buntfärbung der Binden zuerst Formen mit nur auf der Oberseite ausgebildeter *Melinaca*-Tracht hervor, wie *D. Spio* Godt., *D. Eunoë* Dblld., aus denen sich Formen mit specieller Anpassung an Arten der bunten Neotropinen entwickelten. Hierher gehört *P. Astygnoe* Cr. (Blumenau), welche an *Mechanitis Lysimnia* L. und *Heliconius Eucrate* L., hierher *D. Deione* Hew. (Chiriqui), welche an *Tithorea Iene* Dru. und ihre Varietäten, und *D. Arsinoë* Feld. (= *Beroë* Luc.), welche an *Mech. Macrinus* Hew. (Colorado) erinnert. Die schöne *D. Corhillera* Feld. (Chiriqui) gleicht durchaus der *Olyras Montagai* Butl. var. *sororna* Butl., während eine zweite Weibchenform mit vielen gelben Vorderflügelstüpfeln der *Tithorea Pinthias* Godm. et Saly. ähneln. So ist auch hier die mimetische Anpassung der grösseren und meist seltenen Arten besonders ausgebildet.

In der Unterfamilie der **Pieridinen**, welche sich durch meist den Kopf überragende Palpen und eine nur drei- bis vierstige Radialis der Vorderflügel als abgeleitet erweist, treffen wir mimetische Formen sowohl unter den Gattungen mit vierstiger (*Archonias*) als unter denen mit dreistiger Radialis (*Perente*, *Pieris*) an.

Unter den ca. 50 Arten der ausschliesslich neotropischen Gattung **Archonias** Hb. (*Euterpe* Swains.), bei welcher keine Formen mit verlängertem Hinterleibe und Flügeln vorkommen wie bei *Dismorphia*, tritt auch die Anpassung an Neotropinen gegen die an andere immune Familien zurück.

Zugleich haben einige Arten eine so zweifellos ursprünglich hoch entwickelte Zeichnung, dass uns dadurch die sichere Ableitung der nachahmenden Formen von ersteren ermöglicht wird.

Zahlreiche Arten tragen in beiden Geschlechtern auf den Vorderflügeln eine Innenbinde, die vor dem Ende der Mittelzelle verläuft, eine in letztere hinten übergehende Aussenzellbinde, welche mit ihr als Mittelbinde über die Hinterflügel zieht, eine meist in Tüpfel aufgelöste, über beide Flügel verlaufende Marginal- und eine in Intercostalstüpfel zerschnürte Limbalbinde.

¹⁾ Bates bildet auch die Modelle gleichzeitig ab; somit dürfen wir nur auf die Tafeln dieser werthvollen Arbeit verweisen.

Aus Formen, welche *E. Pitana* Feld. und *E. Tomaris* Feld. auch in der Unterseitenzeichnung verwandt waren, dürften die mimetischen Arten wieder dadurch entstanden sein, dass sich zuerst das Weibchen dem Modell anpasste und dann diesen vortheilhaften Erwerb auf das Männchen übertrug, wie wir es bei *A. Potamea* Butl. und *A. Tenthamis* Hew. noch sehen.

Ersterwähnte Art (Panama) gleicht im Männchen durchaus den monomorphen Grundformen der Gattung; das Weibchen dagegen ist nur auf der Unterseite dem Männchen gleich und erinnert auf der Oberseite auffallend an das mit ihm zusammen vorkommende Weibchen von *Aeraca nax* Bates (*leucomelas*).

Aus einer weiteren Entwicklungsreihe schwärzlicher, weissbindiger Stammformen gingen die in beiden Geschlechtern bereits mimetischen Arten der **Tereas**-Gruppe hervor. So erinnert *A. Tereas* Godt. (Brasilien) mit kleinem weissen Spiegeltüpfel ausserhalb oder am Hinterrande der Vorderflügelzelle und violetter Binde vom fünften bis achten Randfelde der sonst ebenfalls schwarzen Hinterflügel an die Weibchen einer schwanzlosen Aristolochienfalter-Gruppe (*Zacrythus* F., *Anchises* L.). Da die Weisslinge das Innenteld der Hinterflügel im Fluge von dem Leibe verdeckt tragen, tritt auch eine ähnliche Ausdehnung der Hinterflügelbinde wie bei den Modellen auf. Varietäten aus Bahia erinnern an die grösseren Weibchen von *Ph. Nephelion* Godt. ebenda. Aehnlich erinnert *A. Critias* Feld. (la Guayra) an *Ph. Zeuxis* ♀ *Erithalion* ebendaher; so ist die Vorderflügelbinde grösser, in die Zelle verlängert und etwas gelblich, die innen erloschene Hinterflügelbinde etwas lackroth gefärbt.

Aus der *Tereas*-Gruppe ähnlichen Formen entstanden durch Verlängerung der gelben Marginalmonde die Formen der **Bellona**-Gruppe, welche ein bis zwei grosse gelbe Tüpfel ¹⁾ auf den schwarzen Vorderflügeln und auf der Unterseite der Hinterflügel in und um die Zelle rothe Strahlstriche führen. Da die rothe Hinterflügel färbung besonders bei dem Weibchen der Stammform *Bellona* Cr., *Erycinia* Cr., auf der Oberseite hervortritt, erinnert dies Geschlecht wie in der var. *Negrina* Feld. (Rio negro) durchaus an den schönen *Hel. Erato* L.

Auf *Theano*-ähnliche Formen dürften diejenigen Arten zurückzuführen sein, welche in Färbung und Zeichnung Neotropinen ähneln. Selten gleichen diese Formen durch die langgestreckte Flügelform den Melinaeen, so *A. Eurytele* Hew. (Columbien) der *Mel. Messatis* Hew. Dagegen erinnert *A. dismorphites* Butl. (Costarica) an *Tithorea Irene* var. *Helicaon* Godm. et Salv., *A. Eurytele* Hew. (Mexico) an kleine Stücke der *Tithorea Irene* Dru. selbst und *A. nigrescens* Godm. et Salv. (Guatemala) an *Tithorea Daena* Bates.

In einer vierten Art-Gruppe lässt das Männchen, *Tenthamis* Hew., wieder den gewöhnlichen Habitus der monomorphen Arten erkennen. Dagegen ist das seltene, stark verdunkelte Weibchen (*Epimene* Hew.), welches auf schwarzem Grunde eine leuchtend rothe Vorderflügelbinde trägt, dem ebendort (Columbien, Peru) gemeinen *Hel. Melpomene* L. ähnlich.

Wohl die Hälfte der Arten von **Pereute** Herr.-Schäff. ²⁾, welche das subg. *Leodonta* Butl. bildet, *P. Dysoni* Dblld., *P. Zenobia* Feld., *P. Tellau* Hew., *P. Chiriquensis* Stögr. etc. bewahren den bei *Archonias Pitana* Feld. erwähnten ursprünglichen Habitus meist in beiden Geschlechtern. Dagegen tritt bei *P. Charops* Boisd. einer von Mexico bis Venezuela und Columbien verbreiteten Art, zuerst bei zentralkamerikanischen Ex-

Vergl. Taf. XI,
Fig. 81—82

¹⁾ Es kommen bei dieser Art auch auf den Vorderflügeln stark verdunkelte Varietäten vor, die ohne Nutzen für die Arterhaltung sind und wohl hauptsächlich Männchen angehören.

²⁾ Nach Dr. Hahnfeld (l. c. p. 196) lebt die grünlich braune „schmerige“ Raupe von *P. Leodonta* an Phytolacca.

emplaren nur im seltneren Weibchen, bei Stücken der Coll. Staudinger aus Venezuela aber schon im Männchen eine rothe (statt der gelben) Vorderflügelbinde auf dem schwarzen Grunde der Unterseite auf, welche bei allen Weibchen auch auf der Oberseite sich ausbildet und dadurch diesem Geschlecht auch im Fluge eine gewisse Aehnlichkeit mit dem *Hel. Melpomene* L. giebt. Letztere entwickelte sich also bei dem Weibchen zuerst und nahm mit der Verbreitung nach Süden an Intensität zu. Bei *P. Leucodrosime* Koll. (Columbien) endlich hat nach Staudinger, l. c. p. 23, auch das Männchen die breite rothe Binde auf der Oberseite der Vorderflügel.

Der Dimorphismus von *Pereute Tenthamis* Hew. bildet den Beweis dafür, dass die abweichende Färbung der Weibchen der sehr häufigen *P. Charops* eine mimetische Anpassung an den *Heliconius* ist und der heutige Individuenreichtum der Art wohl erst infolge besonders günstiger Existenzbedingungen eintrat.

Weibliche Formen von **Pieris** Schrk. (subg. *Perryhybris* Hübn.), wie *P. Demophile* L. ♀, eine häufige Form mit weisser Subapicalbinde und Basalaufhellung der schwärzlichen Vorderflügel und einer hellen Mittelbinde der dunkel gerandeten Hinterflügel, führten über Arten wie *P. Viardi* Boisf. ♀ zu den ausgebildeten mimetischen Weibchenformen über, wie sie uns in *P. Lorena* Hew. und *P. Malenka* Cr. erhalten sind. Zeigen die Männchen letzterwähnter Arten, welche viel häufiger als die Weibchen sind und sich in Massen an feuchtem Sande von Flussbetten zusammenfinden, auch oben noch das weisse Pieridenkleid mit schwarzer Vorderflügelspitze, so ist die Unterseite doch schon durch Vererbung von Seiten des Weibchens in der durch schwarze Binden vorn und hinten begrenzten Mittelbinde der Hinterflügel orangebraun gefärbt. Bei den Weibchen ist dagegen die Subapicalbinde der Vorderflügel wie einzelne Marginaltupfel gelb gefärbt, während die Basal- und Innenbinde wie die drei Hinterflügelbinden eine rostbraune und der Aussenrand der Hinterflügel eine stark verdunkelte Färbung tragen. So erinnert das mit schmaler, scharf begrenzter Subapicalbinde der Vorderflügel gezierte Weibchen von *P. Lorena* Hew. und das mit breiterer, mit der Basalaufhellung verfließender Binde geschmückte, auf den Hinterflügel stärker aufgehellte Weibchen von *P. Pyrrha* F. an Lycorcen.

Vergl. *Taf. N^o 11*
Fig. 85—86

Damit steht auch die Lebensweise der Weibchen in Verbindung, welche nie weite Strecken zurücklegen, sondern wenig exponirt, in niedrigem Fluge das Dickicht durchflattern und höchstens die Waldränder besuchen, an denen auch ihre Modelle auf Blumen saugen.¹⁾

Bei der kleinen *P. Pisonis* Hew. besitzt die Unterseite der Hinterflügel eine orangene, gelb gerandete Aussenbinde; so tritt hier die erste unvollkommene Anpassung des ruhenden Thieres an gewisse Ithomien uns entgegen.

Familie der **Papilioniden** (*Papilio* s. str., *Cosmodesmus*).

Indem ich für die genauere Schilderung der hierher gehörigen Formen auf den ersten Theil meiner Arbeit verweise, begnüge ich mich damit, hier eine nach der systematischen Stellung ihrer Modelle geordnete Aufzählung der wichtigeren nachahmenden Formen zu geben.

In der Untergattung *Cosmodesmus* treffen (vergl. p. 85—87) wir nur Formen, welche an Arten von *Pharmacopagus* sich anlehnen, aber alle Gruppen derselben vertreten.

¹⁾ Nach Dr. Hahnel (l. c. p. 158) haben beide Geschlechter von *P. Lorena* einen angenehmen, auffällig starken Honiggeruch.

P. Xanthicles Bates bildete von den monomorphen Segelfaltern durch seine zweite sekundär verdunkelte Weibchenform, welche der erste Beginn der Anpassung an *Ph. Philemor* L. zu sein scheint, einen Übergang zu den meist in beiden Geschlechtern dieselbe Modellform nachahmenden Arten. Die südbrasilianische *Harrisianus*-Gruppe der Segelfalter mit langen Schwänzen gleicht den einzelnen Arten der *Ascanius*-Gruppe der Aristolochienfalter, so *C. Harrisianus* selbst dem *Ph. Ascanius*, *C. Lysithous* Hb. dem *Ph. Agarus*, *C. Rurikia* Esch. und *C. Lajus* Rog. dem *Ph. Perrhebus*. Aehnlich erinnerte die mexicanische *Thymbraeus*-Gruppe an die *Photinus*-Gruppe von *Pharmacophagus* und verwandte Arten der ersten an andere der letzterwähnten.

Vergl. Tab. X,
Pl. 70.
Vergl. Tab. IX,
Pl. 64.

Weiter erinnert die schwanzlose *Hyperion*-Gruppe an die ungeschwänzte *Polydamas*-Gruppe der *Laertias*-Cohorte und zwar *C. Choridamus* Boisd. an *Ph. Crassus* Cr. (Brasilien), *C. Phaon* Boisd. (Honduras) an *Ph. Protodamas* Godt., so *C. Therodamas* Feld. (Neu-Granada) an *Ph. Xenodamas* Hb., so *C. Hyperion* Hb. (Brasilien) an *Ph. Polydamas* L. Dagegen ähnelt der nahe verwandte *C. Pausanias* Hew. einem gemeinen kleineren *Heliconius*¹⁾, *H. Apscales* Hb. (Brasilien), und dem nahe verwandten *H. Clytus* L.

Kleinere, feingeschwänzte mimetische Formen wie *C. Xyrius* Hew. führen zu den ungeschwänzten Formen über, welche in beiden Geschlechtern den dimorphen Modellen gleichen. So erinnert *C. Cyamon* Gray (Para) an *Ph. Anchises* L., *C. Erayoras* Gray (Venezuela) an *Ph. Vertumnus* Cr., *C. Aristagoras* Feld. (Neu-Granada) an *Ph. Cyphotes* Gray, *C. Euryteon* Hew. (Neu-Granada) an *Ph. Erithalion* Boisd., *C. Harmodius* Dblld. (Bolivia) an *Ph. Callicles* Bates, *C. Hostilius* Feld. (Venezuela) an *Ph. Scarpis* Boisd. var. *Osyris* Feld., *C. Branchus* Dblld. (Mexico) an *Ph. Polyzelus* Feld. etc.

Vergl. Tab. IX,
Fig. 66.
Vergl. Tab. X,
Pl. 71.

Die Analogie unter diesen Formen ist so hoch ausgebildet, dass selbst Bates nicht erkannte, dass hier Nachahmer und Modelle vorliegen.²⁾

Nach Bates, l. c. ist der Flug dieser Formen kräftig, auch fliegen sie meist nicht im Schatten der Wälder, sondern auf „sunny skirts of the woods“.³⁾

In der Untergattung (vergl. p. 93—100) der Rinnenfalter (*Papilio* s. str.) vermittelte die mimetische Anpassung des Weibchens von *P. Asclepius* Hb. an den *Ph. Photinus* Dblld. (Mexico) die Anknüpfung an mehrere in ihren ursprünglicheren Formen an die *Protodamas*-Gruppe sich anpassende Arten. Von diesen erinnert z. B. *P. Bitias* an *Ph. Crassus*, *P. Menatius* Hb. an *Ph. Protodamas* Godt., *P. Xanthopleura* Saly. an *Ph. Lycidas* Cr. Das Weibchen von *P. Caricus* Hew. führte zu dem Nachahmer des *Heliconius Melpomene*, dem *P. Euterpinus* Hew., über, während die *Zagreus*-Gruppe sich in beiden Geschlechtern den *Lycorea*-Arten (Danaiden) anpasste.

Von einem anderen Stamme gelber, monomorpher Formen aus entstand ebenfalls zuerst eine mimetische Anpassung der Weibchen an Aristolochienfalter. So erinnert dies Geschlecht bei *P. Torqua-*

¹⁾ Meist wird als Modell der *Heliconius Erato* var. *coralba* angegeben, welcher aber keine glänzende stahlblaue Interferenzfarbe wie die Modelle und *H. Apscales* Hb., sondern eine hellblaue, strahlig auslaufende Stofffarbe nur auf den Hinterflügeln trägt.

²⁾ So sagt Bates bei *C. Euryteon* (Contributions to an Ins. Fauna of the Amazon Valley (Trans. Ent. Soc. A., 1851—1861), p. 325): „here commences the style of coloration, viz. black ground colour with crimson and white or green belts and spots, which characterizes the main body of Neo-Tropical Papilio“. Erst C. und R. Felder erkannten die Aehnlichkeit als Analogie, ohne natürlich an Mimicry zu denken.

³⁾ Dasselbe erwähnt Bates für die *Torquatus*- und *Anchistatus*-Gruppe der Rinnenfalter.

Vergl. Taf. X
Fig. 67—68.

tinus Esp. an den *Ph. Agaveas* L., bei *P. Torquatus* Cr. an Weibchen der *Aeneas*-Gruppe und in der var. *flavus* Oberth. an *Ph. Bolivar* Hew. ♀. Dagegen ähnelt von *P. Polycaon* Cr. (Surinam) die Weibchenform *Piranthus* Cr. dem Männchen, die Form *Androgeos* Cr. dem Weibchen (*Varus* Koll.) des *Ph. Belus* Cr.

Vergl. Taf. IX
Fig. 60—61

In einer anderen Entwicklungsreihe passte sich das Weibchen von *P. Pclaus* F. an *Ph. Villiersii* Godt. (Cuba), das von *P. Tolus* Godm. et Salv. und *P. Erostratus* Westw. an die *Photinus*-Gruppe an.

Vergl. Taf. X
Fig. 74.

Endlich bildeten sich allmählig die Formen ohne Hinterflügelschwänze aus, welche in der *Isidorus*-Gruppe etwas an Weibchen der *Aeneas*-Gruppe, in *P. Hippason*¹⁾ Cr. durchaus an *Ph. Archises* L. erinnern.

Familie der **Castniiden**.

Unter den Arten von **Castnia** Hb., welche J. Westwood wegen der mehr breiten und dreieckigen Vorderflügel als typische Gattungsrepräsentanten bezeichnete, tritt z. B. bei *C. Chremes* Fabr. ein ausgebildeter Dimorphismus ein: das Männchen besitzt blaue und nur am Rande rothe, das Weibchen aber ganz rothorangene, von zwei Bändern und einer Randfleckenreihe durchzogene Hinterflügel.

Auf ähnliche Formen, in denen sich das ursprünglich gebliebene oder durch Rückschlag in den Besitz einer ausgebildeten Bänderung gelangte Weibchen durch gleichgerichtete Variationen den grossen Danaiden und Neotropinen (*Lycorca*, *Tithorea*) anpasste, sind auch die mimetischen Formen der Untergattung **Gazera** Boisd.²⁾ zurückzuführen, welche sich durch die langovalen Vorderflügel auszeichnen.

Vergl. Taf. XIII
Fig. 87.

Von den wenigen, meist sehr seltenen Arten dieser Gruppe, welche ich vergleichen konnte, erinnern die meisten an die verschiedenen Formen von *Lycorca* Dblld.: so gleicht *C. simulans* Boisd. der *Lycorca Ceres* Cr. (Columbien); so erinnern *C. Cratina* Westw. (Amazonas) an *Lycorca Pasinuntia* Cr. und *C. Cononia* Westw. (Ecuador) ebenfalls an Lycoreen, die kleinere, schmalgeflügelte *C. Euadoria* Westw. (Ecuador) mit breiter weisslicher Mittelbinde und schwarzbrauner Spitze der Vorderflügel erinnert dagegen mehr an Melinaeen. Die schöne grosse *C. Salrina* mit vielen weissen Tüpfeln in den schwarzen und an der Basis in und hinter der Zelle etwas rostbraunen Vorderflügeln und rostbraunen Hinterflügeln mit scharfem schwarzen, weissgetüpfelten Rande (Veragua) ähnelt weissgetüpfelten Varietäten der *Tithorea Irene* Dru., während *C. Cyant* Westw. mit gelben Vorderflügelbinden und bis auf den schmalen Rand innen orangeroth, aussen gelb strahlig aufgehellten Hinterflügeln (Columbien) an *Heliconius Syleanus* Cr. erinnert.

Während bei den drei erwähnten Arten meist eine weniger genau und scharf ausgedrückte Aehnlichkeit mit dem *Lycorca*- oder *Irene*-Typus sich fand, die bei *C. Zagrava* Feld. (Panama) nach Godman und Salvin (Biolog. centr.-amer. Heterocera. Taf. IV, Fig. 1 u. 2) sogar zwei verschiedene Formen entstehen lassen kann, erinnert *C. Truavilla* Feld. (Columbien) mit ganz schwarzen, an der Basis

¹⁾ Nach Bates, l. c. fliegt *P. Hippason* an Waldrändern sehr schnell, aber ist nicht sehr schwer zu fangen „on account of the fearlessness with which it allows itself to be approached when settled on the foliage“. So wird ihn das erborgte Kleid vor allen Nachstellungen schützen.

²⁾ Vergl. J. O. Westwood, On the Lepidopterous Genus *Castnia* etc. (Trans. Linn. Soc. Ser. 2, Zool. Vol. 1), p. 187—193, Taf. XXXII.

einzelne schmale rothe Striche und eine breite gelbweisse Mittelbinde tragenden Vorder- und ganz schwarzen und innen roth gesäumten Hinterflügeln an *Heliconius Eleusinus* Stdgr. var. Dagegen gleicht *C. aceracoides* Boisld.¹⁾ (*actinophorus* Koll.) ausserordentlich der an ihren Flugorten gemeinen *Acræa* *Thalia* L. Weiter gleicht die variable *C. Linus* Cr., welche nach Westwood mit *C. heliconioides* Herr.-Schäff. zu einer Art gehört und in Brasilien, Surinam, Cayenne, Guatemala vorkommt, besonders der *Itana Ilione* Cr. und den *Methona*-Arten.²⁾ Schliesslich dürfte die merkwürdige *C. mimica* Feld. mit rothen Tüpfeln am Nacken und den Hinterleibsseiten und schwarzen Flügeln, deren hinteres Paar einen länglichen gelbweissen Randbindenrest trägt (Amazonas), eine Anpassung an das Weibchen des Aristolochienfalters *P. (Ph.) Bolivar* Hew. sein.

Vergl. Tab. XII,
Fig. 30
Vergl. Tab. XI,
Fig. 75.

Unterfamilie der **Pericopidinen.**

Wahrscheinlich sind die Arten dieser Unterfamilie der **Arctiiden** durch Vertheidigungsmittel gegen bestimmte Feinde geschützt, also in gewissen geringerem Grade immun. Dafür spricht auch die interessante, von Dr. Seitz wiederholte Beobachtung des Dr. Hahnel über *Pericopsis Lycorea* und *Esthema bicoloria*, dass die gefangenen Thiere aus Brust und Nacken unter vernehmbarem Zischen einen gelben Schaum hervorquellen lassen, „denn der ihnen damit entströmende Geruch, obgleich nur schwach für uns wahrnehmbar, hält Vögel und andere Insectenfeinde ab, ihnen nachzujagen, oder nöthigt sie doch, wenn sie ein solches Thier erfasst haben, dasselbe alsbald wieder als ungeniessbar fallen zu lassen.“

Die Arten von **Esthema** Hübn. sind sämmtlich einander ähnlich und zeichnen sich durch eine subapicale und eine weisse Mittelbinde und bläuliche Beschuppung des Innenrandes der Vorderflügel aus. Die Hinterflügel sind schwarz gerandet, alle ihre Rippen sind verdunkelt und besitzen oben einen violetten Glanz. So tritt eine geringe Aehnlichkeit der Arten mit Ithomien der *Onega*-Gruppe ein, doch ist diese Anpassung nicht ausgebildet und die Arten anscheinend meist häufig.

Höher ist die Anpassung bei der Gattung **Pericopsis** Hb. ausgebildet und hier zeigt auch der sexuelle Dimorphismus von *Amphissa* Hb., *P. veridis* Salv. et Godm., dass die mimetische Anpassung vom Weibchen ausging, indem letzteres sich vorerst tiefer färbte.

Die mimetischen Arten sind meist in beiden Geschlechtern gleich gefärbt, verhältnissmässig selten und ähneln gewöhnlich kleinen Neotropinen. So erinnert *P. Ithomia* Feld. (*Lycorea* Stdgr.) (Centralamerika) an *Tithorea Pinthias* Godm. et Salv., so *P. histrio* Feld. (ebenda) an Melinaeen und die weniger gebänderte grössere *P. Salvini* Feld. (ebenda) mit zwei gelben Vorderflügelbinden wie die eher weissbindige *P. Felderi* Godm. et Salv. an Lycoreen; so *P. Hestus* an die bunte *Ceratinia Ninonia* Hb.

Vergl. Tab. XII,
Fig. 84
Vergl. Tab. XII,
Fig. 88

Die schöne seltene *P. Phoebæ* Stdgr., deren Weibchen mehrere rothe Striche auf den Vorderflügeln und mehr Roth auf den Hinterflügeln trägt, gleicht besonders in diesem Geschlecht dem *Heliconius*

¹⁾ Ihre Larve lebt nach Boisduval auf Bromeliaceen.

²⁾ Nach Dr. Hahnel, l. c. p. 257, ist dagegen der Flug der eifrig flatternden *C. Linus* ganz verschieden von dem der langsam dahinziehenden *Methona*. Dagegen ist nach gütiger Mittheilung von Fritz Müller (Blumenau) *C. aceracoides* im Fluge von den *Acræen* kaum zu unterscheiden, doch sofort, wenn sie sich setzt, da sie dann die Flügel nachig zusammenlegt. Wie andere Arten fliegt diese *Ceratinia* im hellen Sonnenschein.

Doris L. var. *rabra* und *Thelcype* L. und trägt auch einen grossen mittleren Bindenrest und mehrere kleine gelbe Aussenrandtüpfel wie die Modelle.

Die stärker verdunkelte *P. mimica* Feld. mit blutrothen Basalstrahlen, fast ganz verdunkelten Hinterflügeln und leuchtend gelbem Mittelbindenrest der Vorderflügel (Bogota) erinnert an *Heliconius Lindigii* Feld.

Erwähnen möchte ich noch das Weibchen von *P. turbida* Hb. (*Tricolora* Salv.) mit schwarzen Hinterflügeln, die vorn einen gelben, hinten einen blutrothen Spiegel haben und wie die Vorderflügel an der Basis roth gezeichnet sind. Es erinnert diese Farbenzusammenstellung an die Weibchen der *Nephalion*-Gruppe der Aristolochienfalter, nur sitzt bei letzteren der helle Spiegel auf den Vorderflügeln. Es scheint aber im Fluge der gelbe Spiegel dadurch auf den Vorderflügeln zu liegen, dass letztere hinten durchsichtig sind und ihn undeutlich durchschimmern lassen.

Eine interessante Analogieform zu der *Castalia Linus* Cr. bildet die einzige Vertreterin der *Pericopis* sehr nahe stehenden Gattung **Hyelosia** Hb. Während bei der Grundform *H. Tiresia* Cr. die Aufhellungen der Flügel noch etwas gelblich erscheinen, werden sie bei der *H. Heliconoides* fast durchsichtig glasiq: so erinnert der tagstliegende Spinner (Brasilien) an *Methona Psidii* L.

Vergl. Tab. VI.
Fig. 56.

Familie der **Melameriden.**

Die früher zu den Spannern, neuerdings aber ebenfalls zu den Melameriden gestellte, bei Tage fliegende Gattung **Sangala** Walck. erinnert in einigen Arten durch die stahlblauen Flügel, deren vorderes Paar eine rothe Querbinde trägt, an Acraeen der *Neylla*-Gruppe, während das nahe verwandte *Melanoplodon costale* Stögr. mit rothen Radialstrichen der Hinter- und grossem rothen Bindenrest der braunen Vorderflügel der *Acr. Euryome* Feld. (Chanchamayo, Peru) ähnelt.

Familie der **Chalcosiiden.**

Die mir unbekannt gebliebene **Gingla josiatis** Godm. et Salv. gleicht nach Godman und Salvin (Biolog. centrali-american.) der *Josia ligata* Walck. (Mexico, Guatemala).

Familie der **Dioptiden.**

Die nach Angabe von Godman und Salvin sehr seltenen Arten von **Dioptis** Hb. erinnern wie *Phaenoptis cyanocephala* Feld. durch ihre glasiqe Aufhellung meist an Ithomien der *Ouega*-Gruppe.

Nur in vereinzelten Fällen tritt eine orangene Färbung an der Spitze der Vorder- und dem Hinterrande der Hinterflügel auf; so erinnert *D. Cyma* Hb. (Para) an *Ith. Flora* Cr. und ähnliche Arten; so hat *D. Batesii* Druce eine oben breit orangerothe Vorderflügelspitze und gleicht somit der *Ithomia Aureliana* Bates; so erinnert *D. Hazara* Butl. (Pebas) an die bunte *Ceratinia Ninonia* Hb.

Bei **Gonora heliconiata** Walck. (Peru) und **Epilais aequatorialis** Feld. (Chanchamayo) erreicht die Aufhellung der Flügel ihren höchsten Grad; so gleichen diese Arten Ithomien mit glasiqartig durchsichtigen Flugwerkzeugen.

Unterordnung der **Geometrae**.

Unter den Spannern erwähne ich die im Allgemeinen in der Zeichnung ihrer Arten an *Dioplis* erinnernde Gattung **Genussa** Walk., deren Arten sämtlich an verschiedene Arten der *Onega*-Gruppe von *Ithomia* erinnern. *G. Dioplis* Feld. et Rog. ♀ (Veragua) ist so stark glasig aufgehellt, dass sie ebenfalls wie *Epilais* glasigen Ithomien gleicht.

Auch mehrere **Erateina**-Arten, wie *E. Poblata* Feld. et Rog. (Bogota) und *E. Thyridiata* Feld. et Rog. (Guatemala), haben sich einigermaassen den schwarzweissen Ithomien angepasst und tragen eine orangene Randbinde auf der Unterseite der Hinterflügel, welche aus derjenigen der normalen langgeschwänzten Arten sich umbildet.

Unterordnung der **Pyralidina**.

Selbst unter den Kleinschmetterlingen kommt in Südamerika (Amazonas, Guatemala) eine mimetische Gattung vor, **Eriusa** Walk., welche ebenfalls an die schwarzweissen Ithomien der *Onega*-Gruppe erinnert. Ihre Arten fliegen bei Tage, wenn aufgeschreckt, oft weite Strecken, wie Herr Dr. A. Seitz in Santos beobachtete und mir gütigst mittheilte.¹⁾

b. Anpassungen von Schmetterlingen an immune Käfer.

Vereinzelte Heteroceren der neotropischen Region haben sich Vertretern der Familie der Lyciden in einem hohen Maasse angepasst.

Diese mimetischen Arten gehören den immunen Familien der Zygaeniden (*Lycomorpha*) und Arctiden (*Pionia*) an.

Die Arten von **Lycomorpha** Harr. scheinen sämtlich selten zu sein und alle bestimmten *Calopteron*-Arten zu gleichen. Natürlich kann diese Ähnlichkeit nur zur Geltung kommen, wenn sie z. B. auf Blumen kriechen oder ruhen, da ihre Hinterflügel gelbbraun beschuppt und die des *Calopteron* dunkel oder glasig sind.

Bei *L. Pholus* F. ist die Mitte des Halsschildes schwarz und die grössere hintere Hälfte der Flügeldecken schwarz mit etwas bläulichem Glanz. So setzt sie sich scharf gegen die orangegelbe Farbe der Schulterdecken und des ersten Flügeldrittels ab. Diese Ähnlichkeit mit einem *Lycus* wird noch dadurch erhöht, dass der Stamm der Subcostalis, der Radialis, der Cubitalis und der Dorsalis stark kantig hervortreten, wie dies für die Lyciden charakteristisch ist, und dass die blauschwarzen Fühler seitlich zusammengedrückt sind. Auch *L. centralis* Walk. mit ganz orangegelbem Prothorax und *L. calcoptera* Walk. (Tapajós) mit jederseits dunkel gebändertem Thorax und mittlerer gelbbrauner zackiger Vorderflügelbinde, welche ich nur aus der Beschreibung kenne, entsprechen *Calopteron*-Arten.

¹⁾ Ein neuerdings (Sitzungsber. der Dorpater Naturf.-Ges., 1891, p. 513—518) von J. v. Kennel veröffentlichtes Beispiel der mimetischen Anpassung einer Tineide (*Lycantia clerckella* L.) an eine Cicadelline (*Typhlocyba stellulata* Fall.) kann ich deshalb nicht als begründet ansehen, weil 1) die Cicadellinen selbst sonst nur als Nachahmer, nie als Modelle auftreten; 2) beide in Rede stehende Formen sehr klein sind und ich gerade unter den Tausenden von *wingwegen* ebenfalls geprüften Insectenarten durchaus keine mimetischen Anpassungen antraf. Es bedingt eben den Vortheil der mimetischen Anpassung, dass sie auffällig ist.

Ausserdem haben noch mehrere Arten von **Pionia** Walk. reine *Lycaus*-Färbung. So besitzt *P. undulata* Godm. et Salv. (Guatemala) ein mittleres und ein apicales braunschwarzes Band auf den sonst gelbbraunen Vorderflügeln und erinnert an das gemeine *Calopteron reticulatum* L. Die seltene Vergl. Taf. XIII, Fig. 101. *P. lycoides* Butl. (Chiriqui) hat ebenfalls zwei gelbe Vorderflügelbinden, und der gelbe Kopf und Thorax sind seitlich schwarz gerandet.

Nach Ch. Oberthür ahmt die ganz stahlblaue *Mimica lycoides* Oberth. bis in Einzelheiten das einfarbige *Calopteron cyanum* Er. nach.

c. Anpassungen von Schmetterlingen an stechende Hymenopteren.

1. Arktische Fauna.

Wie die übrigen den Hymenopteren angepassten Formen gehören auch die europäischen Vertreter nur gewissen Gruppen der Heteroceran an.

Familie der Sphingiden.

Die *Macroglossa*-Arten mit glasigen, schmal gerandeten Flügeln muss man für mimetische Anpassungen an *Bombus*-Arten halten. Denn sicher sind sie von Formen mit starker Beschuppung und dunklen Flügeln abgeleitet, wie solche uns in *M. stellatarum* und *M. croatica* und den meisten Arten verwandter Gattungen vorliegen; auch kommen sie nur da vor, wo gleichzeitig Vertreter von *Bombus* leben. Frisch ausgeschlüpfte Formen von *M. fuciformis* L. besitzen noch zahlreiche zerstreute dunkle Schuppen, welche so lose sitzen, dass sie bald grossentheils verloren gehen. In viel höherem Maasse als *M. fuciformis* erinnert *M. Bombyliiformis* F. mit stärker aufgehelltem Rande und grösserer Durchsichtigkeit der bläulich schimmernden Flügel an Hummeln. Dazu kommt noch, dass der Körper sich verkürzte und auch die Behaarung des Hinterleibes sich den Modellen anpasste, indem der schwarze Hinterleibsgürtel sich verbreiterte und der hinter ihm gelegene Pelz eine median rostbraune, seitlich gelbliche Färbung entwickelte; so erinnert der Schwärmer etwas an abgeriebene (also weibliche) *Bombus silvarum* F.

Nach gefälliger Mittheilung des Herrn Dr. M. Pabst (Chemnitz) schwirren diese Macroglossen nur wie die grösseren Sphingiden, auch ist die Art des Fluges und der Nahrungseinsaugung mit dem langen Rüssel vollkommen anders als bei den Hummeln. So wird ihnen ihre Aehnlichkeit hauptsächlich wohl von Nutzen sein, wenn sie, wie Dr. Pabst beobachtete, auf den Blüthenköpfen der Wiesenspflanzen übernachten. Auch in Nordamerika kommen ähnliche Arten (*M. dipjini* Boisd. etc.) vor.

Familie der Sesiidae (*Aegeriidae*).

Alle unsere Sesiien machen, sobald sie auf Blumen mit anthophilen Hymenopteren zusammen gefunden werden, durch ihre unruhigen lebhaften Bewegungen und ihre Tracht den Eindruck der letzteren, wenn auch der aufmerksame Beobachter sie schon auf einige Fuss Entfernung unterscheidet. Doch passirte es mir selbst, trotzdem ich wusste, dass ich eine Sesiie im Netz hatte, dass ich sie mit den kleinen Wespen als solche durchgehen liess. Diese Aehnlichkeit mit stechenden Hymenopteren beruht besonders auf der hellen, meist gelben Ringelung des Leibes und den meist glasigen Flügeln.

Alle Sesiën sind verhältnissmässig selten, am häufigsten noch die grösseren Trochilien, welche durch die gelben Nackenflecke und Leibsringel an Arten von *Vespa* erinnern. So gleicht besonders *Trochilium sphaeriforme* Esp. einer kleinen *V. crabro* auch in Farbe und Form der Fühler und Beine.

Die Aehnlichkeit des *Tr. apiforme* L. im Fluge mit *Vespa media* wird noch dadurch verstärkt, dass die unschädliche Sesië nach Pabst auch „genau wie eine Hornisse brummt“, wenn sie um die Pappelstämme herumfliegt.

Wie schon A. Seitz hervorhob, copiren sämmtliche Sesiën nur gut geschützte Insecten aus der Wespenfamilie: so ähnelt nach ihm *Sciapteron tabaniforme* Rott. einem *Odynerus*, *Sesië asiliformis* Rott. einer *Cerceris* etc.¹⁾ Allerdings sind die Aehnlichkeiten mit bestimmten Arten nur gering, doch genügt die eigenartige Tracht vollständig, um den Eindruck von Wespen überhaupt hervorzurufen, und damit sind die seltenen Arten vor den Nachstellungen zahlreicher Feinde geschützt.

Auch in Nordamerika kommen ähnliche, oft noch stärker an Wespen erinnernde Arten vor. So gleicht *Trochilium polistiforme* durchaus (Amer. Naturalist, LXIV, p. 600) dem gemeinen *Polistes fuscus*, so dass „auch ein Vogel sich täuschen würde“.

2. Indisch-australische Region.

Obwohl bei der von Australien bis Natal verbreiteten häufigen *Macroglossa Hylas* L. die Vorderflügel ganz schmal gerandet sind, gleicht doch diese Art in ihrer Leibesform mehr den verwandten dunkelgeflogelten Formen. Immerhin wird auch ihr die geringe Hymenopteren-Aehnlichkeit von Nutzen gegen gewisse Feinde sein: mehrmals fing ich sie in Bangkok in Gesellschaft mit einer gelbgrünen, dichtbehaarten *Xylocopa* sp.

Unter den **Sesiën** treffen wir schon entwickeltere Fälle mimetischer Anpassung. So besitzen die Arten von *Melittia* Hb. weit abstehend behorste, gespreizt getragene Hinterschenkel, so dass sie an die mit Pollen beladenen Bürstensammler (*Scopulipedes*), eine Abtheilung der Bienen (*Anthophila* Latr.) erinnern, welche vielleicht dieselben Blüten besuchen.

Diese Aehnlichkeit mit stechenden *Hymenopteren* ist in dem schönen von Pryer²⁾ entdeckten, auch von Wallace in seinem „Darwinism“ abgebildeten Beispiel besonders hoch entwickelt, in welchem *Scolionima insignis* Pryer einer Scolie, der *Triscolia patricialis* Burm., in der auffällenden Färbung der Flügel und des Leibes gleicht. Nach Pryer sind beide auf sechs Fuss Entfernung nicht zu unterscheiden; die Wespe ist sehr gemein, dagegen fing Pryer nur eine Sesië.

3. Neotropische Region.

In dieser Region haben die Anpassungen von Schmetterlingen aus der Familie der Aegeriiden, vor Allem aber der *Zygaeniden* die weiteste Verbreitung und zugleich den höchsten Grad der Ausbildung erreicht.

So erinnert die grosse gelbgeringelte, nach Godman und Salvin sehr seltene *Sphexia Campioni* (Guatemala) an Vespiden.

Noch viel wunderbarer aber sind die Anpassungen aus der Familie der **Zygaeniden**. Leider bin ich für die meisten Parallelfälle nicht im Stande, die Namen der Modelle anzugeben; vielleicht wird

¹⁾ Mehrere Arten (*S. cynipiformis*, *S. hylaciformis*) erinnern an *Odynerus*-Formen.

²⁾ H. Pryer, On two remark. cases of mimicry from Elopura (Trans. Ent. Soc. 1885, p. 369—374, Tab. XI).
10*

sich Jemand, dem die Schätze des British Museum zur Verfügung stehen, einmal mit Erfolg dieser Arbeit unterziehen können, da der vortreffliche Bates in seinen gewaltigen Sammlungen alle Insectenordnungen in gleicher Weise berücksichtigte. Auch wird in den nächsten Jahren die Fortsetzung der ausgezeichneten „Biologia centrali-americana“ manches dieser Anpassungsverhältnisse begründen.

Durch ihren schweren, plumpen Körper und die schmalen Flügel, die langen, kräftig bedornen Beine und die kurzen Fühler waren die Zygæiden besonders befähigt, sich unter verhältnissmässig geringen Modificationen des Baues¹⁾ stechenden Hymenopteren anzupassen. Wie unsere europäischen Arten sind auch die neotropischen ursprünglich sehr bunte Formen, deren meist stahlblaue Vorderflügel gelbe, rothe oder weisse Tüpfel führen, deren Hinterflügel roth oder gelb, deren Leib schwarzblau und roth oder gelb geringelt ist. Diese auffallende Färbung macht es wahrscheinlich, dass auch die Zygæiden als eine nicht allzusehr begehrte Nahrung in gewissem Grade vor den Nachstellungen insectenfressender Vögel gesichert sind.²⁾ Auch die wenigen an unseren europäischen Zygæen gemachten Erfahrungen sprechen für diese Annahme.

In Südamerika treten zuerst zahlreiche Arten mit glasigen Flügeln und breit gelb- oder roth-bündigem Hinterleibe auf (*Haemeterion* H.-Sch., *Cosmosoma* Hb.), welche schon eine geringe Aehnlichkeit mit Hymenopteren besitzen und fast allgemein recht häufig sind.

Zunächst nun bildete sich eine wespenartige Zeichnung und Färbung des Hinterleibes aus (*Isanthrene* Hb.). So besitzt zunächst *I. incudiaris* Hb. (Rio) gelbe Fleckreihen auf dem Abdominalrücken, so sind bei *I. crabroniformis* Stögr. Beine und Fühler auffällig roth, die Flügel gelblich glasig, der Leib mit grossen gelben Tüpfeln besetzt, endlich sind bei *I. Melas* Cr. die Fühler ebenfalls roth und der Rücken des Hinterleibes vom zweiten bis vierten Segment mit queren gelben Binden versehen wie bei gewissen Vespiden.

Bei anderen Formen liegt die Hauptanpassung wieder in der Flügelfarbe; so haben *Anytes anthracina* H.-Sch. (Para) und *Pterygopterus superbus* Godm. et Salv. schwärzliche Vorderflügel mit weisser Spitze und erinnern dadurch an gewisse dunkelflüglige *Chartergus*-Arten (*Ch. ater* Lep.).

Bei anderen Arten entwickelte sich allmählig die Hymenopteren-Form des Hinterleibes. Zuerst wird die charakteristische Verengering der Hinterleibsbasis, die „Wespentaille“, oft dadurch vorgetäuscht, dass die schwarze Grundfarbe durch leuchtend weisse Flanken verdeckt wird und dass durch diese „Uebermalung“ der Leib verengt erscheint. Bei *Pseudosphex semihyalina* (Walek.) mit blauschillernden Flügeln erinnert auch der Leib an den Habitus von Sphegiden.

In der eigenthümlichen Gattung **Macroceme** treten uns den Melittien analoge Formen entgegen, welche auffallend lange Hinterbeine besitzen, die am Hinterende der Tibia und am Tarsaltheil lang abstehende dichte, federartig angeordnete Borsten tragen und selbst meist auffällige Flügel von blauer, stahlgrüner oder brauner Farbe besitzen. Bei *M. creolina* Godm. et Salv. sind die dunklen Vorderflügel an der Spitze aufgehellt; so erinnert sie an *Polobia atra* Sauss.

¹⁾ Wir müssen hier von Umwandlung der Localfärbung zu mimetischer Anpassung absehen, wie wir sie in *Procris centralis* Walek. und *Pycnomorpha dimidiata* H.-Sch. für die Icyoide Anpassung annehmen dürfen.

²⁾ So erwähnt Dr. H. Huel (l. c. p. 161) eine „Neuroptere“ (wohl eine Libelle!), die eine Glaucopeide gefangen hatte und mit ihr auf ein Astchen flog, um sie in Ruhe zu verspeisen; kaum aber hatte sie ihre Mundtheile näher an das Thier gebracht, als sie, ihren Irrthum erkennend, auch sogleich dasselbe wieder liess, das nun ohne Weiteres, wenn auch flügellos, seinen Flug fortsetzte.

Bei der sehr seltenen **Mastigocera Oedipus** Boisj. sind die Hinterschienen breit behaart, die Flügel dunkelbraun und der Leib gelb mit schwarzen Ringeln.

Auch die seltsame **Horama Pretus** Cr. mit gelben, am Schienenende schwarz beborsteten Beinen, lohbraunen Flügeln, gelbem Hals- und zweiten Abdominalringe (St. Thomas) dürfte Polybien gleichen.

Bei den sehr seltenen Arten von **Trichura** Hb. tritt zu dieser Verdeckung der Hinterleibsbasis noch oft (*T. caudata* H.-Sch., *T. coarctata* Dm.) ein langer Schwanz, der abstehend behaart ist und nach Seitz den Eindruck eines Legestachels macht.

Endlich bildet sich wirklich eine Wespentaille aus, indem der Hinterleib sich hinter der Basis stielartig verdünnt. Bei diesen Formen ist der Schmetterlingshabitus vollkommen verwischt und kann nur eine genauere Untersuchung die Ordnungszugehörigkeit erweisen.

Hierher gehört die Gattung **Sphecosoma** Butl., deren Arten solchen von Polybien sehr ähnlich sind, so das *Sph. testaceum* Godm. et Salv. der *Polyb. brasiliensis* Sauss.¹⁾, das *Sph. fasciatum* mit gelben Hinterleibsringen wie *Pseudosphex polistes* Hb. (s. u.) der *Polyb. fasciata* Ol. Auch **Argyroides Menephron** Godm. et Salv. (Panama) gleicht letzterwähnter Art.

Vergl. Taf. XIV,
Fig. 94-97

Dasselbe gilt für **Myrmecopsis** Hübn.: so ist *Myrm. crabronis* Godm. et Salv. der *Polybia angulata* F. täuschend ähnlich. Ebenso gleicht nach gütiger Mittheilung des Herrn Kohl *Myrm. vespa* H.-Sch. mit stahlblauen Flügeln (Para) der *Synocca cyanea* F. (Brasilien)²⁾ derart, „dass sich genannter Schmetterling unter dem von Natterer gesammelten und zusammengesteckten *Synocca*-Material vorfand und sich der Sammler Hetschko in derselben Weise täuschen liess“. Eine noch unbestimmte *Myrmecopsis*-Art aus Bogota (Mus. Wien) ähnelt der *Polistes atrichalca* Ol.

Vergl. Taf. XIV
Fig. 98-99

Amphes albomargineatus Godm. et Salv. mit an der Spitze weissen, sonst schwarzbraunen Flügeln gleicht wie *Macrocneme crelina* Godm. et Salv. (Panama) der *Polybia atra* Sauss.

7. Mimetische Anpassungen von Seiten der Dipteren.

Obwohl ich die Sammlung des königl. Museums in Berlin durcharbeitete, wage ich doch nur wenige der notirten Fälle mimetischer Anpassung unter den Fliegen mitzutheilen, auf welche andere Autoren noch nicht hinwiesen, da es nur selten möglich war, das spezifische Modell festzustellen. Ich bin überzeugt, dass erfahrene Entomologen diese Lücke bald ausfüllen werden.

Vereinzelten Anpassungen innerhalb der Ordnung dienen als Modelle vor Allem die räuberischen **Asiliden**, starke kosmopolitische, besonders in den Tropen der neuen Welt kräftig entwickelte Formen. So erinnert nach Fr. Brauer³⁾ die Xylophagide *Heterostomus curvipalpis* (Chile) an mehrere gleichgefärbte *Seglataeus*-Arten (*Sc. tricolor* Phil., *Sc. fulvicornis* Phil., *Sc. Philippii* Schin.); so erinnert *Arctophila flagrans* O.-S. (Syrphid.) an die Asilide *Laphria lasipis* Wied. (Nordamerika).

Viel häufiger dagegen sind Anpassungen an stechende Hymenopteren. So erinnern Asiliden selbst wie die Mydare *Mydas rapiaper* Wied. (Mexico) und ein *Asilus* nach Fr. Brauer an die grossen **Pepsis**-Arten, welche dieselbe Färbung des Körpers besitzen.

¹⁾ Die Angaben dieser Hymenopteren-Namen verdanke ich Herrn Fr. Kohl in Wien.

²⁾ Ant diese Analogie von *Myrm.* (*Pseudosphex*) *vespa* H.-Sch. und die von *Sphecosoma* (*Pseudosphex*) *polistes* Hb. machte zuerst Gersäcker (Stett. ent. Zeitung, 1863, p. 43) aufmerksam.

³⁾ Fr. Brauer, Systematisch-zoologische Studien. 3. Betrachtungen über täuschende und wahre systematische Aehnlichkeiten etc. (Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien, 1855, I, Bd. XCI, p. 385-392, not. Tafel.)

Andere Raubfliegen (*Dolichogaster brevicornis*) erinnern an **Scolien**. Wie schon Brauer hervorhob, sind jedoch „viele solcher Fälle nur in unserer Vorstellung begründet und entbehren jeder Beziehung zu einander, . . . worüber sicher nur durch Beobachtung lebender Thiere zu entscheiden ist“.

Viele Arten erinnern an Hummeln (**Bombus**), so von Asiliden *Mallophorus bomboides* Wied. etc. (Georgien), *Dasyllis haemorrhoidalis* Löw (Bahia), von europäischen Arten die Syrphiden *Criorhina aptiformis* Schrk. an *Bombus terrestris* L. und *Mallota faciformis* F. an *Bombus lapidarius* L.

An neotropische **Polistes**-Arten erinnern nach Gerstäcker *Plesiomma fuliginosa* Wied. und *P. testacea* Macq. an **Polybia** Arten von *Rhopalogaster*; weiter gleicht *Conops aurcorufus* Macq. (Neu-Holland) mehreren dortigen **Odynerus**-Arten, *Ceria Jarana* Wied. dem **Eumenes arcuatus** F.

Weitere Fälle ähnlicher Anpassung zählt F. Smith¹⁾ auf; so erinnert nach ihm *Dasyllis haemorrhoidalis* (Asilid.) an **Euglossa dimidiata**, *Mallophora tibialis* an eine andere ebenfalls neotropische Art; so *Lachites* (Neu-Holland) an **Abispa splendida** (Vespid.) und *Mallophora calida* Wied. an **Megachile** sp.

III. Mimetische Anpassungen unter Mollusken.

Nach C. Semper, l. c., entgeht die rein philippinische Heliciden-Gattung **Helicarion**, die meist in grossen Mengen auf Blättern vorkommt, den Angriffen besonders der schneckenfressenden Vögel dadurch, dass sie im Stande ist, das Hinterende ihres Fusses, an dem sie wohl am meisten gepackt wird, abzuschleudern. Nun findet sich in Gesellschaft des *Helicarion tigrinus* eine *Xesta Cumingi*, welche von ihren Gattungsverwandten durch die sehr dünne Schale abweicht, die wie bei *Helicarion* im Leben von Körperduplicationen eingefasst ist und von C. Semper als mimetische Anpassungsform angesehen wird.²⁾

Wahrscheinlich sind auch gewisse Arten von Heliciden wegen widrigen Geschmacks (infolge bestimmter Pflanzennahrung?) vor den Angriffen von schneckenfressenden Vögeln sicher und werden von Angehörigen wohlschmeckender Gattungen nachgeahmt.

IV. Mimetische Anpassungen von Batrachiern an Reptilien.

Für diese Kategorie theilt uns O. Boettger einen Fall mit, den er als besonders beachtenswerth bezeichnet. „Er fand in einer Batrachiensendung aus Costa Rica *Phrynoscus varius* Stana., eine sehr schlanke Engystomatidenform von entfernt krötenähnlichem Aussehen, die auf tietschwarzem Grunde abwechselnd mit lebhaft rothen und leuchtend gelben queren Fleckenbinden gezeichnet war und ganz auffallend in Zeichnung und Färbung der Giftschlangengattung *Elaps* gleich. Noch grösser war die Täuschung, wenn zwei im Beginne des Begattungsaktes gestörte *Phrynoscus*-Kröten in ihrer Umklammerung auf- und theilweise hintereinander zu liegen kamen, wobei dann die rothen und gelben Farbenringsel in grösserer Anzahl und auf längere Erstreckung hin in ganz regelmässiger Anordnung grell hervortraten.“

¹⁾ F. Smith, Resembl. of certain species of Hymenopt. to species of Dipt. (Proc. Ent. Soc. London, 1873, p. VII.) Vergl. noch Osten-Sacken, Mimetic resemblances between Dipt. and Hymenopt. (Psyche I, 1875, Nr. 96.)

²⁾ O. Fr. von Moellendorff will (Ber. Senckenberg. nat. Ges., 1890, p. 197—199) diese Deutung nicht gelten lassen. Boettger theilt uns mit, dass er sich dieser Ansicht, soweit er mit seinem Schalenmaterial die Frage verfolgen könne, nur anschliesse.

V. Mimetische Anpassungen unter Reptilien.

Die wenigen ausgebildeteren Fälle von Mimicry unter Gliedern dieser Wirbelthierklasse sind auf die Ordnung der Ophidier beschränkt und stellen mimetische Anpassungen an häufigere und wegen ihres starken Giftes gefürchtete Vertreter derselben Ordnung dar. Die nachahmenden Formen sind hier entweder vollkommen unschädlich oder in geringerem Grade giftig und in letzterem Falle stets verhältnissmässig seltener.

1. Indo-australische Region.

Xenopeltis unicolor Reinh., mit schwarzer oder brauner Oberseite und hellen Schuppenspitzen, ist der sehr giftigen *Naja bungarus* Schleg. ähnlich.

In diesem Falle dürfte der Schutz, welchen die nachahmende Art geniesst, ihr besonders gegen die Nachstellungen von Angehörigen ihrer Ordnung von Nutzen sein. So wird auf Autorität Cantor's (Brehm's „Thierleben“, Band VII, p. 375) erwähnt, dass diese Art sich besonders von kleineren Schlangen ernährt. Vielleicht gilt dasselbe auch für die Arten der Gattung *Adeniophis* Pet. Nachdem A. B. Meyer¹⁾ bereits 1869 darauf hingewiesen, dass in der zu den Elapinen gehörigen Gattung *Callophis* Gray Arten vorkommen (*C. intestinalis* Laur. und *C. bivarigatus* Boie), welche sich von den übrigen scheinbaren Angehörigen derselben Familie durch die gewaltige Entwicklung der fast die halbe Körperlänge erreichenden Giftdrüsen unterscheiden, gründete W. Peters²⁾ für diese offenbar in höherem Grade giftigen Elapinen die Gattung *Adeniophis* und trennte von dem Rest von *Callophis* (mit kleiner Giftdrüse) noch *Hemibungarus* ab. Später wies A. B. Meyer³⁾ diese grossen Visceraldrüsen noch bei *C. philippinus* Gthr. (Philippinen), *C. nigrotacniatus* Pet. (Sumatra, Nias) und *C. flaviceps* Cant. nach, die aber jetzt sämtlich als blosse Farbenspielarten der beiden für die Gattung *Adeniophis* typischen Species betrachtet werden. Nun sind einzelne Arten von *Callophis* denen von *Adeniophis* in der Färbung so ausserordentlich ähnlich, „dass sie selbst geübteren Untersuchern auf den ersten Blick als identisch imponiren können“. So sprach denn A. B. Meyer 1870 die Vermuthung aus (Proc. Zool. Soc., 1870, p. 368), „dass hier ein Fall von Mimicry vorliegen könne“. In der That spricht dafür die Notiz von F. Stoliczka (Journ. As. Soc. Beng., Vol. XXXIX, 1870, p. 213) über *A. intestinalis*, „that this little snake is more dreaded by the natives of Burma and of Java on account of its bite, than the comparatively gigantic *Ophiophagus* *claps* Schleg.“

Nach Meyer (l. c., 1887, p. 614) ähneln nun

- 1) der *Adeniophis philippinus* Gthr. (Philippinen) dem *Hemibungarus calligaster* Wiegman (Philippinen),
- 2) der *Adeniophis nigrotacniatus* Pet. (Sumatra, Banka, Nias, Borneo) und der *A. malayanus* Gthr. (Central- und Hinterindien, Pulo Pinang?, Singapore) der *Callophis gracilis* Gray (Pinang, Singapore, Sumatra),
- 3) der *Adeniophis bivarigatus* Schleg. (Java), der *A. tetratacnia* Bleek. (Borneo) und der *A. flaviceps* Cant. (Nias, Sumatra, Hinterindien) dem *Megarophis flaviceps* (Reinh.) (Borneo, Java, Sumatra),

¹⁾ A. B. Meyer, Ueber den Giftapparat der Schlangen, insbesondere über den der Gattung *Callophis* Gray (Arch. f. Naturg., XXXV, 1869, p. 224—246; mit Tafel 12—13.)

²⁾ Monatsber. der königl. Akad. der Wiss. in Berlin, 1871, p. 578.

³⁾ A. B. Meyer, Die Giftdrüsen bei der Gattung *Adeniophis* Pet. (ibid., 1887, p. 612.)

2. Afrikanische Region.

Der ungiftige, zu den Dipsadinen gehörige „Eierfresser“, *Dasyplettis scabra* L.¹⁾, mit gelben Kopfbändern und dunklen unregelmässigen Sattelflecken des Körpers erinnert oberflächlich an junge Stücke von *Vipera arcticus* und noch mehr an *V. superciliosus* Pet. (Südafrika) des Mus. Berlin.

3. Nearktische Region.

Wie Cope²⁾ hervorhob, erinnert *Nothopsis rugosa* Cope auffallend an *Bothrops atrox*.

4. Neotropische Region.

Zahlreiche Arten der formenreichen Gattung **Elaps** Dum. tragen in Südamerika ein charakteristisches Kleid; die helle Grundfarbe des Körpers ist lebhaft corallenroth und von schmäleren oder breiteren schwarzen Gürteln durchbrochen, die oft noch von weissgrünen, weissen oder gelben Säumen eingefasst werden.

Es giebt nun zahlreiche Angehörige giftloser Familien, welche ebenfalls die auffällige *Elaps*-Tracht zeigen, die sich besonders auch in der hellen Querringelung des dunklen, zeichnungslosen Kopfes zeigt.

Noch neuerdings führt Werner³⁾ als an *Elaps* erinnernd *Coronella* (*Ophibolus*) *doliatus*, *Pliocercus elapoides*, *Oxyrrhopus trigeminus*, *Procinara aemula*, *Tortrix segetale*, *Rhinaspis Rhodci*, *Oscocla elapsoides*, *Hydrops Martii* an.

Es sei hier zuerst auf einige specielle Analogien hingewiesen, welche von früheren Autoren angegeben wurden. So erwähnte zuerst A. R. Wallace, dass *Elaps fulvius* (Guatemala) von *Pliocercus aequalis*, dass *E. corallinus* (Mexico) von *Hondalocerauanum semicinctum*, dass *E. lemniscatus* (Brasilien) von *Oxyrrhopus trigeminus* nachgeahmt werde. Nach Werner, l. c. p. 76, erinnert weiter *Pliocercus elapoides* an *Elaps Borouati*. Endlich erwähne ich noch einige dahin gehörige, den Sammlungen des Mus. Berlin entnommene Fälle grösserer Aehnlichkeit.

So erinnert von Calamariinen *Geophis semidoliatus* D. B. an *Elaps circinalis* D. B. und *G. latifrons* Günth. an *E. Dumerili* Jan. Weiter ist unter den Colubriden *Coronella trivincta* Jan (Mexico) dem *Elaps fulvius* (Texas), *Erythrolamprus Aesculapii* (Surinam) dem *Elaps Henrichi* ähnlich, und auch die Varietäten der ebenso häutigen *Cor. doliata* erinnern an roth und schwarz geringelte *Elaps*-Arten.

Um nachzuweisen, dass diese Fälle von Analogie nur das Product der natürlichen Auslese sind, bedarf es vor Allem des Experiments, denn nur letzteres kann beweisen, dass gewisse Feinde der harmlosen Colubriden die *Elaps*-Arten unbehelligt lassen, so dass die Nachahmer dadurch vor ihren Gattungsgenossen einen höheren Grad der Sicherheit erlangen.

¹⁾ Vergl. noch Wallace, Darwinism, 1859, p. 269, und Nature, vol. XXXIV, p. 547.

²⁾ Proc. Am. Philos. Soc., 1871, p. 220.

³⁾ Werner, Untersuchungen über die Zeichnung der Schlangen, Wien 1890, p. 8.

V. Mimetische Anpassungen unter Vögeln.

Nach Wallace¹⁾ bilden die Tropicorhynchen (*Philemon*) des indo-malayischen Archipels kleine Gesellschaften, die sich gut gegen Raubvögel vertheidigen. In der Gesellschaft dieser „Friar-birds“ kommen nun nach demselben Arten von Piroten (*Mimeta*) vor, welche stets den Tropicorhynchen ihres Gebietes gleichen. Nach Wallace haben letztere alle einen schwarzen Augenring und „a ruff of curious pale recurved feathers on the nape“ und zeigen die Pirole dieselbe Eigenthümlichkeit: ebenso ist die Farbe beider einander entsprechender Gattungsvertreter auf Borneo erdbraun, in Ceram „washed with yellow ochre“, in Timorlaut „unten blass und an der Kehle fast weiss“ etc. Diese Angaben wurden von H. O. Forbes bestätigt, der die einzelne *Mimeta Oriolus decipiens* Sclater von Timorlaut in Schwärmen der kräftigen und in Schaaren lebenden Honigfresser *Philemon timorlaensis* Meyer beobachtete. Nach ihm finden sich *Mimeta*-Arten nur auf gewissen südmalayischen Inseln und fehlen auf solchen der benachbarten Region, auf denen es Pirole in Menge giebt.²⁾ Aehnlich entspricht die *Mimeta pleochromus* (malayische Inseln) dem *Phil. fuscicapillus*, die *Mim. buruensis* (Buru) dem *Phil. buruensis*, die *Mim. Forsteri* (Ceram) dem *Phil. subcornutus* und in geringerem Maasse die *Mim. virescens* (Timor) dem *Phil. Timoriensis*.

Es war mir leider nicht möglich, mehrere Arten von *Mimeta* mit den entsprechenden von *Philemon* zu vergleichen. Nach den wenigen Exemplaren dieser seltenen Formen, welche ich im Berliner Museum sah, scheint mir vor Allem die Aehnlichkeit nicht derart specialisirt, dass man eine mimetische Anpassung an letztere annehmen muss: auch entsprechen die schwarzen Fleckenreihen des Bauches der *Mimeta* der Drosselzeichnung des Jugendkleides des Orioliden und fehlen bei *Philemon*.

Auch gegen die von Wallace erwähnte Annahme, dass der Kuckuck (*Cuculus canorus* L.) eine mimetische Anpassung an den Sperber (*Astur nisus*) sei, kann ich einige Bedenken nicht unterdrücken. Diese Aehnlichkeit ist allerdings vorhanden und beruht besonders auf der Sperberung des Gefieders, doch gestattet letztere auch vielleicht eine andere Erklärung, insofern sie dem Jugendkleide und somit wohl der Grundzeichnung der Familie entspricht. Dasselbe möchte ich für *Harpagus diodon*, einen Raubvogel, anführen, welcher nur Insecten frisst, und dem auch der *Accipiter pileatus* (Timor) auf der Unterseite gleicht.

VI. Mimetische Anpassungen unter den Säugern.

Der einzige hierher gezogene Fall, dass *Cladobates javanicus*, das zu der Insectivoren-Familie der *Tapajac* gehörige Spitzhörnchen, sich den Eichhörnchen angepasst habe, um so im Kleide der letzteren besser die zu seiner Nahrung dienenden Insecten beschleichen zu können, welche von einem Phytophagen nichts zu befürchten hätten, dürfte wohl auf einer blossen Analogie in der Entwicklungsrichtung beruhen und der Analogie von *Sorex* mit den Mäusen zu vergleichen sein. Denn wie die Eichhörnchen lebt auch *Cladobates* auf Bäumen, ist gerade von vorn gesehen durch die lange spitze Schnauze von ersteren verschieden und würde in der kerfreien indischen Inselwelt auch ohne diesen Eichhörnchen-Habitus, der sich besonders in der Behaarung und der Schwanzform ausspricht, seine Nahrung finden.

¹⁾ A. R. Wallace, Darwinism, 1859, p. 263.

²⁾ H. O. Forbes, Wanderungen eines Naturforschers im malayischen Archipel, Uebersetzt von Dr. Tenschler, Jena 1886, II, p. 641.

Das natürliche System der Papilionen und seine Bedeutung für die Mimicry-Theorie.

1. Historisches.

Die oft so überraschenden adaptiven Ähnlichkeiten zwischen Angehörigen verschiedener natürlichen Gruppen von *Papilio* wurden, wie dies am nächsten liegt, zuerst für Zeichen allernächster Blutsverwandtschaft gehalten. So sah noch 1840 ein W. de Haan, bestoehen durch die in der That ziemlich auffällige Uebereinstimmung in der Form und Färbung der Flügel, den als *P. Romulus* L. längst bekannten Falter, von dem er nur das Weibchen kannte, für das Weibchen von *P. (Pharmacophagus) Hector* L. an. Weiter deutete er zwei ersterwähnter Form in der That nahe verwandte ebenfalls weibliche Rinnenfalter als das andere Geschlecht der Aristolochienfalter *Ph. Polyphontes* Boisd. und *Ph. Antiphus* F.

Da wies A. R. Wallace 1865 in seiner bekannten „Monographie der Papilioniden der malayischen Region“ überzeugend nach, dass *P. Romulus* L. eine weibliche Varietät des *P. Pammon* L. und zugleich eine Anpassungsform an den einer anderen Gruppe angehörenden *P. (Ph.) Hector* L. bilde. Ebenso zeigte er, dass die von de Haan als Weibchen von *P. (Ph.) Polyphontes* Boisd. und *P. (Ph.) Antiphus* F. abgebildeten Falter das weibliche Geschlecht des (Rinnenfalters) *P. Theeus* repräsentiren und als Anpassungsformen an die beiden genannten Arten (der Aristolochienfalter) anzusehen sind. Weiter stellte Wallace auch den Polymorphismus der Weibchen von *P. Memnon* L. endgültig fest und erkannte zugleich wenigstens für die extremen, von den Männchen am meisten abweichenden, mit spathelförmigen Hinterflügelschwänzen ausgezeichneten Varietäten der Weibchen, dass die insulare var. *Achatiades* Esp. eine Anpassungsform an den mit *P. Hector*, *P. Polyphontes* und *P. Antiphus* zu einer Gruppe gehörenden *P. (Ph.) Coon* F. und dass die continentale var. *Achates* Cr. eine solche an den verwandten *P. (Ph.) Doubledayi* Wall. darstelle. Endlich wies Wallace noch darauf hin, dass die vom Männchen abweichende Färbung des Weibchens von *P. Oenomaus* Godt. auf einer Anpassung an *P. (Ph.) Liris* Godt. (Timor) beruhe und ebenso die abweichenden weiblichen Varietäten der *Erechtheus*-Gruppe (der Rinnenfalter) zum Theil auf eine Nachahmung des im östlichen Archipel dominirenden *P. (Ph.) Polydorus* L. zurückzuführen seien.

Eine weitere Förderung der Erkenntnis solcher mimetischen Beziehungen zwischen indischen Papilionen verdanken wir J. Wood-Mason. Derselbe wies nach, dass der bisher zur *Latreillei*-Gruppe gestellte und als selbstständige Art angesehene *P. Icarus* Westw. das Weibchen des (Rinnenfalters) *P. Rhetenor* Westw. und eine Anpassungsform an den in der That zu jener Gruppe gehörenden *P. (Ph.)*

Dasarath Moore darstelle, und zeigte ferner, dass *P. Janaka* Moore und *P. Bootes* Westw. in beiden Geschlechtern der immunen *Lutreillei*-Gruppe angepasst und selbst Nachahmer wären.

Wurden somit die allerdings einfacheren und leichter übersehbaren mimetischen Beziehungen unter den indisch-australischen Papilionen verhältnissmässig früh in ihren Grundzügen erkannt, so mussten doch einem so feinen Beobachter, wie dem Entdecker der Mimicry, C. W. Bates, die geradezu wunderbaren Anpassungserscheinungen unter den neotropischen Papilionen entgehen. Und nachdem C. und R. Felder schon 1864 in ihrer classischen Monographie der Papilioniden auf viele der hierher gehörigen Fälle als „Analogien“ hingewiesen, erwähnt auch Wallace in seinem „Darwinism“ nur, dass die in der That als Modell bezeichnete *Aeneas*-Gruppe (von *Pharmacophagus* von „Pieriden, Castnien und *Pericopis*“ nachgeahmt werde. Somit beschränken sich die mir bekannten Angaben auf eine kleine Notiz von A. Seitz¹⁾, welcher die schon von C. und R. Felder hervorgehobene Analogie von *P. Hectorides* ♀ mit der *Agacis*-Gruppe und diejenige des Weibchens *Androgeus* Cr. von *P. Polycaon* mit Arten der *Crossus*-, *Belas*- und *Pausanias*-Gruppe“ als „Mimicry“ erklärt.

Nach dem Rückblick auf diese allmähliche Entwicklung der Erkenntniss von mimetischen Beziehungen unter Angehörigen der Gattung *Papilio* wird es zunächst unsere Aufgabe sein, eine vergleichende Skizze des Entwicklungsganges derjenigen Formen zu geben, welche wir als „Modelle“, und derjenigen, welche wir als „Nachahmer“ ansehen, um damit der Frage näher zu treten, ob wir nicht in der Ähnlichkeit der immerhin generisch mit einander verwandten Formen mit Einem die Resultate eines durch innere Dispositionen bestimmten, immanenten Entwicklungsgesetzes erblicken müssen, welches diese „Convergenzen“ ohne Einfluss der natürlichen Auslese selbstständig schuf.

2. Anpassungen unter den indo-australischen Papilionen.

Die als Modelle der Anpassung anzusehenden Arten der indo-australischen Aristolochienfalter gehören ohne Ausnahme zu Gruppen der zweiten Cohorte, an deren Ausgangspunct wir auf p. 29 die *Hector*-Gruppe stellten. Um hier nur diejenigen Eigenthümlichkeiten zu erwähnen, welche für die Erscheinungsform des Modells charakteristisch sind, so besitzt *Ph. Hector* L. (Ceylon, Indien) eine erloschene weisse Querbinde auf den vorderen, zwei Reihen rother Tüpfel auf den mit einem Schwänzchen versehenen Hinterflügeln und eine lebhaft rothe Färbung an den Körperseiten, wie sie für die meisten Aristolochienfalter typisch ist.

In der zunächst an ihn sich anschliessenden *Jopthon*-Gruppe, von deren Arten besonders *Ph. Aristolochiae* F. (Indien) mit var. *Diphilus* Esp. (Indochina), *Ph. Antiphus* F. (Philippinen), *Ph. Polyphantès* Boisj. (Celebes), *Ph. Polydorus* L. (Molukken) und der zur *Hector*-Gruppe übertführende *Ph. Liris* Godt. (Timor) als Modell dienen, tritt die Vorderflügelbinde mehr zurück und zeigt sich auf den Hinterflügeln, welche nur bei *Ph. Polydorus* L. ungeschwänzt sind, statt der inneren Reihe rother Tüpfel ein weisser Mittelbindenrest.

1) A. Seitz, Die Schmetterlingswelt des Monte Corovado. (Stett. ent. Zeitg., 1890, p. 97.)

Während somit in dieser Gruppe die Endform abgerundete Hinterflügel besitzt, bilden sich in einer zweiten Gruppenreihe breitgeschwänzte Formen mit verdunkelten Vorderflügeln aus, die einerseits die düstere, langgeschwänzte chino-japanische *Alcinous*-Gruppe, andererseits die nordindische contrastierend gefärbte *Latreillei*-Gruppe (mit *Ph. Latreillei* Godt. und *Ph. Dasarada* Moore) hervorgehen liessen. Einen anderen sich an die *Jophon*-Gruppe ebenfalls näher anschliessenden Zweig bildet die *Doubledayi*-Gruppe mit verlängerten Vorderflügeln und an der Basis stark eingeschnürtem Hinterflügelschwanz, von der wir die führende Art (Nordindien), *Ph. Coon* F. (Birma, Borneo, Java), und *Ph. rhodifer* Butl. (Andamanen) als Modelle erwähnen.

Vergl. Taf. V,
Fig. 35 und 37.

Vergl. Taf. VI,
Fig. 40.

Eine weitere sich eher an die *Hector*-Gruppe anlehrende Entwicklungsreihe eröffnet der auf die Philippinen beschränkte, nur in Schwarz und Roth prangende *Ph. Semperi* Feld. mit gezackten Hinterflügeln, an den sich die Endformen mit vollkommen abgerundeten Hinterflügeln anschliessen. Wie bei *Ph. Semperi* Feld. sind hier die Männchen oft stärker verdunkelt als die Weibchen. Nur vereinzelte Arten, von denen wir hier *Ph. Priapus* Boisd. (Borneo, Java, Sumatra) und *Ph. Zaleucus* Hew. (Birma) als Modelle anführen, besitzen noch die gezackte, allerdings erblasste Hinterflügelbinde der *Semperi*-Gruppe; bei der Mehrzahl jedoch, von denen hier als Angehörige der *Nor*-Gruppe *Ph. Astorion* Westw. (Assam) und *Ph. Erebus* Wall. (Malacca etc.) erwähnt werden mögen, sind die Hinterflügel einfach stahlblau oder schwarz.

Vergl. Taf. VI,
Fig. 42.

Um nun im Anschluss an die auf p. 29 gegebene Darstellung des angenommenen Entwicklungsganges die einzelnen Gruppen der Modelle in eine genealogisch aufsteigende Reihe zu bringen, können wir die ursprüngliche *Hector*-Gruppe mit I., die sich anschliessende *Jophon*-Gruppe mit II. bezeichnen und ihnen die *Alcinous*-Gruppe als III., die *Doubledayi*-Gruppe als IV., die *Latreillei*-Gruppe als V., die *Semperi*-Gruppe als VI., die *Priapus*-Gruppe als VII., die mathematischen Vorläufer der *Pompeus*-Gruppe (vergl. p. 28) als VIII. und endlich die *Nor*-Gruppe als IX. folgen lassen.

Die Anpassungsformen an diese Aristolochienfalter beschränken sich im indo-australischen Faunengebiet auf Angehörige der Untergattung *Papilio*.

Betrachten wir die auf p. 59 gegebene Darstellung des hypothetischen Entwicklungsganges der Rinnenfalter, so finden wir, dass unter den fünf Endreihen, welche durch die *Alcidinus*-, die *Panope*-, die *Pannon*-, die *Janaka*- und die *Polymnestor*-Gruppe bezeichnet sind, die hier in Betracht kommende erste und die drei letzten Gruppen sich auf zwei verschiedene Hauptstämme zurückführen lassen, deren erster mit der *Godeffroyi*-Gruppe und deren zweiter mit der *Ulysses*-Gruppe beginnt. In allen diesen Anfangsgruppen sind beide Geschlechter im Ganzen monomorph. Dasselbe gilt noch für die höheren Stufen der ersten Reihe (*Amphiarctus*-Gruppe resp. *Vollenhorii*- und *Hipponeus*-Gruppe) und der zweiten Reihe (*Perantlas*-, *Paris*-, *Elephenor*- und *Demetrius*-Gruppe).

Dagegen tritt, um zur ersten Entwicklungsreihe, die sich an die *Godeffroyi*-Gruppe anschliesst, zurückzukehren, in der *Heptaerus*-Gruppe schon ein Rückschlag der Weibchen¹⁾ auf eine ursprünglichere Zeichnungsform ein, ohne jedoch sich einem bestimmten Modelle anzupassen. Auch in der *Gambrius*-Gruppe, welche durch das zahnröhrige Schwänzchen sich näher an die *Godeffroyi*-Gruppe anschliesst, treffen wir kein durchaus männchenfarbiges Weibchen mehr, sondern letztere sind in Beziehung auf die Zeichnung entweder minder (*P. ornatus* Guér., Wallace, l. c. Taf. III, Fig. 1) oder mehr (*P. Adrastus*

¹⁾ Wir sind gezwungen, hier von abgeduldeten Weibchenformen und einem Rückschlag derselben auf eine Vortorm zu sprechen, weil ja alle Arten der Grundgruppen in beiden Geschlechtern einander durchaus gleichen.

Feld. *ibid.* Taf. IV, Fig. 1) rückgreifende Rückschlagformen auf einen der Vorläufer der Art oder aus diesen entstandene Umbildungen, d. h. mehr oder minder gelungene Anpassungsformen an als Modell dienende Tagfalter der australischen Inselwelt: die *Tenaris*-Arten, *Eurycus Cressida* oder *P. (Ph.) Polydorus*. Von diesen wollen wir hier nur die Anpassungsformen an den Aristolochienfalter erwähnen.

Ist, entsprechend der viel bedeutenderen Grösse der Nachahmer, die Anpassung z. B. der ♀ var. *Polydorus* des *P. Ormenus* Guér., noch sehr unvollkommen, so bildet sie sich doch bei der Endform der Gruppe, dem kleinen *P. Ambrax* Boisl., mit fast vollkommen abgerundeten Hinterflügeln, schon weiter aus und macht sogar die localen Variationen des Modells mit.

Die andere, sich an die *Capaneus*-Gruppe anschliessende Entwicklungsreihe mimetischer Formen haben wir schon nach der geringen Erhaltung der Bindenreste auf den Flügeln als eine im Vergleiche zu der *Godeffroyi*-Gruppe neuere Schöpfung anzusehen. In der terminalen *Panamon*-Gruppe treten nun bei der Stammform, dem lang geschwänzten *P. Panamon* L. selbst, einige Weibchenformen auf, welche sich wiederum vor den einfacheren monomorphen Gruppenvertretern dadurch auszeichnen, dass sie eine ursprünglichere, reichere Zeichnungsform mit auch oben deutlicher Unterseitenzeichnung in mehr oder minder weit zurückgreifendem Rückschlage wiederholen. Aus diesen Formen entstand nun durch Umbildung zunächst in Anlehnung an die als Modell dienenden Arten der *Jophon*-Gruppe die an *Ph. Aristolochiae* L. erinnernde var. *Polytes* L. (Indien bis Siam) und durch weiteren Rückschlag, der die in der *Godeffroyi*-Gruppe noch deutliche Mittelbinde der Vorderflügel wieder auftreten lässt, die rein indische, an *Ph. Hector* L. erinnernde var. *Romulus* L. — Bei den abgeleiteteren Subspecies von *P. Panamon* tritt, worauf schon Wallace aufmerksam machte, mit der Verbreitung nach Osten das Hinterflügelchwänzchen mehr und mehr zurück. So trägt der auf Java, Sumatra, Borneo und Timor vorkommende *P. Thesius* Cr. als Männchen nur einen zahnförmigen Vorsprung, während die diesem Geschlecht ähnlichste weibliche Varietät den entsprechenden Formen von *P. Panamon* L. gleicht. Ausser der gewöhnlichen an *P. Aristolochiae* F. var. *Diphilus* Esp. erinnernden weiblichen Varietät entstehen auf Java und Sumatra noch besondere Anpassungsformen ohne Weiss auf den Hinterflügeln, welche durchaus dem *Ph. Antiphos* F. ähneln. Eine Localvarietät von Timor, var. *Timorensis* Feld., erinnert sogar an den *Ph. Liris* Godt. Auch bei dem im Männchen ungeschwänzten *P. Ledebourianus* Esch. stellt das „männchenfarbige“ Weibchen sich durch den deutlichen Hinterflügelzahn und durch die auch oben vortretenden Marginalbinde als Rückschlagsform dar, während die mimetische Weibchenform *Elgros* Gray durch Färbung und längere Schwänze an *Ph. Antiphos* F. (Palawan, Philippinen) und die über Celebes, Amboina, Ceram verbreitete var. *Alphonor* Cr. mit kurzen Schwanzzahn und heller Vorderflügelbinde durchaus an *Ph. Polydorus* L. erinnert. Eine andere nur celebensische Varietät mit auffällig langen und plumpen Schwänzen der Hinterflügel und bräunlich verdunkelter Vorderflügelbinde, *Aleudor* Oberth., gleicht dagegen dem ebenfalls nur celebensischen *Ph. Polyplontes* Boisl. Bei der auf Batjan beschränkten kleinen Subspecies *Nicanor* Feld. endlich scheint bisher nur die mimetische, an *Ph. Polydorus* L. angepasste Weibchenform bekannt zu sein.

In der zweiten grossen, sich an die *Ulysses*-Gruppe anschliessenden Entwicklungsreihe kommen wir über Gruppen mit monomorphen und schwanztragenden Arten endlich zur *Protenor*-Gruppe, deren führende Art keine Hinterflügelchwänze und Vorderflügelbinden mehr besitzt. An diese Gruppe schliesst sich eng der eine eigene Untergruppe vertretende *P. Rhetenor* Westw. (Assam) an, dessen Männchen (vergl. Taf. V, Fig. 34) längliche, abgerundete grünblau Hinterflügel trägt, während diejenigen des mimetischen Weibchens, der einzigen bisher bekannten Form dieses Geschlechts, *Acraea* Westw.

schon durch die charakteristische Färbung durchaus an das Modell der Anpassung, *Ph. Dasaraba* Moore, erinnern. Auch hier ist die Umbildungsform dadurch entstanden zu denken, dass ihr eine noch nicht angepasste Rückschlagsform vorausging, bei welcher zuerst die Marginalmonde und die Mittelbinde auf der Oberseite der Flügel hervortraten.

Hierher gehört auch *P. Elvési* Leech, der besser eine besondere Gruppe vertritt und sich durch die plumpe Verlängerung der Hinterflügel auszeichnet, in welche ausser dem dritten Medianast auch noch der vorderste Cubitalast hineintritt, wie wir dies ähnlich auf einem jüngeren Stadium des Puppenflügels von *P. Machaon* L. beobachteten. Durch diese auffällige Form der Hinterflügel wie durch seine düstere Färbung erinnert *P. Elvési* durchaus an den Aristolochienfalter *Ph. Alcinoas* Kl., mit dem er das Verbreitungsgebiet theilt.

Als terminale Endformen eines weiteren, dem *Paris*-Stamme durch die *Elephenor*-Gruppe nahe stehenden Anslüfters sehe ich die Arten der *Janaka*-Gruppe an, welche wie *P. Elvési* Leech in beiden Geschlechtern nicht nur in Form und Zeichnung der Flügel die vollkommenste Anpassung an die *Latreillei*-Gruppe von *Pharmacophagus* erkennen lassen, sondern sogar die röthliche Färbung des Körpers selbst, welche sonst nur die Modelle auszeichnet, angenommen haben. Wahrscheinlich ging auch ihnen eine dimorphe Form voraus, bei welcher sich zuerst im Weibchen, wie bei *P. Bhetenor* Westw., die Anpassung anbildete, um sich endlich, als vorthellhaft, auch auf das Männchen der seltenen Art zu übertragen.

Auf eine der *Demetrius*-Gruppe näher stehende Urform dürfen wir die *Ascalaphus*-Gruppe zurückführen, die nur in ihren ursprünglichsten Arten noch im männlichen Geschlecht deutliche Hinterflügel-schwänze führt. Wie in der *Pammon*-Gruppe werden auch hier die ersten Abweichungen des Weibchens von dem anderen Geschlecht durch Rückschlagsformen gebildet, bei denen nicht nur die Marginalmonde, sondern auch Reste der Mittelbinde auf der Oberseite der Hinterflügel auftreten. Bei den grossen Formen ist, wie in der *Gambrisius*-Gruppe, der Grad der mimetischen Anpassung relativ unentwickelt. So ist die Aehnlichkeit des Weibchens von *P. Ascalaphus* Boisid. mit *Ph. Polyphontes* Boisid. (Celebes) und die des Weibchens von *P. Deiphobus* L. (Amboina, Ceram) mit *Ph. Polydoras* L. auch nur gering. Bei dem auf die Philippinen beschränkten *P. Ewaldthion* Hb. mit kurzem Hinterflügelzahn erinnert eine Weibchenform, *Ramanzovius* Esch., noch an den im Ursprungslande der Gruppe vorherrschenden *Ph. Polydoras* L., während die schöne, sicherlich erst auf den Philippinen entstandene Varietät *Semperinus* auffallend in Ruhe und Bewegung dem *Ph. Semperi* Feld. ähnlich sein muss. Bei dem auf die Andamanen beschränkten *P. Mayo* Atk. tritt wieder eine lang spatheiförmig geschwänzte Weibchenform auf, welche dem dortigen *Ph. rhodifer* Butl. angepasst ist.

Den Stammformen der *Ascalaphus*-Gruppe dürfte auch der in beiden Geschlechtern noch kräftig geschwänzte Vertreter der *Oenomaus*-Gruppe näher stehen, dessen Weibchen sich ebenfalls über Rückschlagserscheinungen durch Umbildung dem *Ph. Liris* Godt. (Timor) anpasste.

Hierher gehört auch die in beiden Geschlechtern noch Hinterflügelschwänze tragende und ursprünglichste Art der *Lowii*-Gruppe, *P. Lowii* Druce (Borneo, Palawan), bei welcher sich mehrere Varietäten von Weibchen entwickeln, deren Endformen etwas an Aristolochienfalter der *Jophon*-Gruppe erinnern. Zu dieser Gruppe gehört auch als abgeleitete Form der durch den Polymorphismus seiner Weibchen berühmt gewordene *P. Manon* L., der im männlichen, dem nach Eimer den Fortschritt in der Artbildung anbahnenden Geschlecht, stets ungeschwänzt ist. Um zuerst die jüngeren ungeschwänzten, aber doch mimetischen Weibchenformen zu besprechen, so sind sie Anpassungen an ebenfalls jüngere

Vergl. Tab. V
Fig. 36.

Vergl. Tab. VI
Fig. 38—39.

Aristolochienfalter der *Nox*-Gruppe. So erinnert bei der Festlandsrasse *Androgeus* Cr. die weibliche var. *Agenor* Cr. etwas an *Ph. Zuleucus* Hew. und die var. *Esperi* Butl. und *Mestor* Hb. an *Ph. Astorion* Westw. Aehnlich ähneln bei der Inselrasse die weibliche var. *Erebinus* (Borneo) etwas dem *Ph. Erebus* Wall., die var. *Auceus* Cr. dem *Ph. Sycorax* Grose-Smith.

Die terminalen weiblichen Varietäten, welche durch einen spathelförmigen Hinterflügelschwanz ausgezeichnet sind, tragen in Form und Zeichnung, deren erste Anlage offenbar durch Rückschlag auf ursprünglichere Vorläufer entstand, doch daneben auch Zeichen unverkennbarer secundärer Anpassung an gewisse Aristolochienfalter. So erinnert die geschwänzte Varietät der Continentalrasse, var. *Achates* Cr., an *Ph. Doubledayi* (nach Wallace) und an *Ph. Aristolochiae* var. *Diphilus* Esp., während die entsprechende Endform der Inselrasse, var. *Achatiades* Esp., sogar bis auf die gelben Rückenseiten sich dem Modelle, *Ph. Coon* F., anpasste.⁴⁾

Als Endausläufer eines mit der *Lowii*-Gruppe genetisch zusammenhängenden Stammes dürfen wir endlich die in beiden Geschlechtern fast monomorphen Formen mit abgerundeten Hinterflügeln ansehen, welche die *Polymaestor*-Gruppe bilden. Ihre kleinste Art, *P. Lampsacus* Boisid., erinnert in Färbung und Zeichnung noch durchaus an den *Ph. Priapus* Boisid. (Java), der ihr als Modell dient. Dagegen kennen wir keine Aristolochienfalter mehr, welche dem *P. Polymaestor* Cr. (Nordindien, Ceylon) als Vorbild dienen können. So müssen wir denn annehmen, dass die Modelle dieser grossen Art entweder von dem Nachahmer überlebt wurden oder ihre Erscheinungsform in verhältnissmässig junger Zeit änderten. Wir entscheiden uns für letztere Annahme und sehen in dem auf p. 58 erwähnten Weibchen von *P. Polymaestor* aus Ceylon eine Form des Nachahmers, welche uns Aufschluss über den früheren, *Ph. Priapus* Boisid. ähnlichen Habitus seiner Modelle giebt, die sich später in die heutige *Pompeus*-Gruppe verwandelten, welche keine Nachahmer mehr gefunden hat.

Eine vergleichende Zusammenstellung der Entwicklungsstufen der mimetischen Rinnenfalter mit der auf p. 84 entworfenen aufsteigenden Reihe ihrer Modelle ergibt folgendes Schema:

Modelle (<i>Pharmacophagus</i>):		Nachahmer (<i>Papilio</i> s. str.):	
IX. <i>Nox</i> -Gr.	<i>Zuleucus</i> Hew. (Birma)	<i>Monon</i> ♀	<i>Agenor</i> Cr.
	<i>Astorion</i> Westw. (Malacca)	-	♀ <i>Esperi</i> Butl. ♀ <i>Mestor</i> Hb.
	<i>Erebus</i> Wall. (Borneo)	-	♀ <i>Erebinus</i>
VII. <i>Priapus</i> -Gr.	<i>Priapus</i> Boisid. (Java etc.)	<i>Lampsacus</i> Boisid. ♂ ♀	VII. <i>Polymaestor</i> -Gr.
VI. <i>Semper</i> -Gr.	<i>Semper</i> Feld. (Philippinen)	<i>Eualthion</i> Hb. ♀	<i>Semperina</i>
			V. <i>Ascalaphus</i> -Gr.

⁴⁾ Letzterwähnte Hinterflügelstärkung findet sich auch schon bei der von de Haan, l. c. Tab. III, Fig. 10, abgebildeten noch ungeschwänzten Varietät aus Borneo.

Modelle (Pharmacophagus):		Nachahmer (Papilio s. str.):
V. <i>Latreillei</i> -Gr.	<i>Latreillei</i> Godt. (Nordindien) <i>Dasarada</i> Moore	<i>Bootes</i> Westw. und <i>Janaka</i> Moore ♂ ♀ <i>Rhetenor</i> Westw. ♀ <i>Icarus</i> Westw. VII. <i>Janaka</i> -Gr. V. <i>Protenor</i> -Gr.
IV. <i>Doubledayi</i> -Gr.	<i>Coon</i> F. (Java, Borneo) <i>Doubledayi</i> Wall. (ind. Continent) <i>rhodifer</i> Butl. (Andamanen)	<i>Mennon</i> ♀ <i>Achatiades</i> Esp. ♀ <i>Achates</i> Cr. <i>Mago</i> Atk. ♀ <i>Charicles</i> Hew. VI. <i>Lowii</i> -Gr. V. <i>Ascalaphus</i> -Gr.
III. <i>Aleinous</i> -Gr.	<i>Aleinous</i> Kl. (China, Japan)	<i>Elwesii</i> Leech ♂ ♀ VI. <i>Elwesii</i> -Gr. ¹⁾
II. <i>Jophon</i> -Untergr.	 <i>Polydorus</i> L. (australischer Archipel) <i>Aristolochiac</i> F. mit var. <i>Diphilus</i> Esp. (Indien bis China) <i>Antiphos</i> F. (Philippinen) <i>Polyphontes</i> Boisd. (Celebes)	 <i>Deiphobus</i> L. ♀ <i>Ledebourius</i> Esch. ♀ <i>Alphenor</i> Cr. <i>Nicanor</i> Feld. ♀ <i>Ambrae</i> Boisd. ♀ <i>Adrastus</i> Feld. ♀ <i>Ormenus</i> Guér. ♀ <i>Polydorus</i> V. <i>Ascalaphus</i> -Gr. V. <i>Pammon</i> -Gr. IV. <i>Gambrisius</i> -Gr.
la. <i>Liris</i> -Untergr.	 <i>Liris</i> Godt. (Timor)	<i>Mennon</i> ♀ <i>Alcanor</i> Cr. ♀ <i>Achates</i> Cr. <i>Pammon</i> L. ♀ <i>Polytes</i> L. VI. <i>Lowii</i> -Gr. V. <i>Pammon</i> -Gr.
I. <i>Hector</i> -Gr.	<i>Hector</i> L. (Ceylon, Nordindien)	<i>Theseus</i> L. ♀ <i>Melanides</i> <i>Ledebourius</i> Esch. ♀ <i>Elyros</i> Gray <i>Ledebourius</i> Esch. ♀ <i>Alcindor</i> Oberth. <i>Ascalaphus</i> Boisd. ♀ V. <i>Pammon</i> -Gr. V. <i>Ascalaphus</i> -Gr.
		<i>Ocnomeus</i> Godt. ♀ <i>Theseus</i> var. ♀ <i>Timorensis</i> Stldg. V. <i>Ocnomeus</i> -Gr. V. <i>Pammon</i> -Gr.
		<i>Pammon</i> L. ♀ <i>Romulus</i> L. V. <i>Pammon</i> -Gr.

3. Anpassungen unter den amerikanischen Papilionen.

An den für die Mimiery-Theorie so wichtigen Anpassungen anderer *Papilio*-Gruppen an die Aristolochienfalter nehmen in der neotropischen Region ausser den Rinnenfaltern auch die Segelfalter Theil.

¹⁾ *P. Elwesii* Leech bildet doch besser eine eigene Gruppe, als dass er wie auf p. 53 der *Dometrius*-Gruppe einverleibt wird.

Um zunächst wiederum den aufsteigenden Entwicklungsgang der Aristolochienfalter zu kennzeichnen, so müssen wir die Amerika eigenthümliche *Laertias*-Cohorte als eine Abtheilung ansehen, welche ursprünglicher erscheint als alle indischen Vertreter und welche die Aristolochienfalter den Rinnenfaltern nähern dürfte. In der Cohorte selbst finden wir in der noch mit deutlichen Hinterflügelschwänzen ausgestatteten *Phileor*-Gruppe auch die ursprünglichste Zeichnungsform. Von ihren Arten erwähnen wir nur die als Modelle dienenden, den *Ph. Villiersii* Godt. (Cuba, Florida) und den bis in den südlicheren Theil der Vereinigten Staaten vordringenden *Ph. Phileor* L. Wie bei den übrigen Gruppen dieser Cohorte herrscht auch hier eine metallisch glänzende, dunkelgrüne Grundfarbe mit Resten gelblich-weißer Binden auf der Oberseite vor. Als abgeleitet haben wir die *Polydamus*-Gruppe mit nur noch gezackten Hinterflügeln und endlich die *Protodanus*-Gruppe anzusehen, bei welcher die Hinterflügel vollkommen abgerundet, die Unterbrückung der Flügelbinden noch weiter fortgeschritten und die Männchen zugleich von den Weibchen durch die Färbung des Hinterleibes etc. unterschieden sind.

In der zweiten Cohorte der amerikanischen Aristolochienfalter, welche in gewissen Beziehungen dem zweiten mit der *Hector*-Gruppe beginnenden Gruppencomplex der indisch-australischen Vertreter entspricht, zeigt wiederum einer der nördlichsten Vertreter, *Ph. Gundlachianus* Feld. (Cuba), die ursprünglichste, also reichste Zeichnung. An ihm schliessen sich die Arten der *Phalaecus*-Untergruppe an, welche besonders in der *Ascanius*-Untergruppe durch die scharfe Ausprägung der weissen Mittelbinde und der rothen Randmonde auf dem schwarzen Flügelgrunde, wie schon C. und R. Felder hervorhoben, oberflächlich an die indische *Hector*-Gruppe erinnern können.

Alle weiter abzuleitenden Formen zeigen nun zunächst, ähnlich wie die indischen, aber intensiver fortschreitend, eine gleichmässige Verdunkelung der Vorderflügelbinden. Hierher gehört die *Photinus*-Gruppe, welche auf den blauschillernden Hinterflügeln eine Doppelreihe rother Tüpfel trägt, und die ebenfalls mexicanische *Montezuma*-Gruppe ohne Opalglanz auf den Hinterflügeln, zu der vielleicht auch der durch einen weissen Mittelbindenrest der Hinterflügel ausgezeichnete *Ph. Atopius* Gray gehört.

Diesen Gruppen schliesst sich am nächsten die kleine, rein neotropische, monomorphe *Triopas*-Gruppe an, deren eine seltene Art, *Ph. Hahneli* Stdgr., in beiden Geschlechtern an die gemeine Neotropide *Methona Psidii* L. erinnert.

Von einer der *Gundlachianus*-Gruppe näher stehenden Form dürfen wir den einzigen Vertreter der *Dardanus*-Gruppe ableiten, welcher in beiden Geschlechtern noch einen entwickelten Hinterflügelschwanz trägt. Bei ihm ist schon die Verdunkelung der ursprünglichen Zeichnung bis zum Erlöschen der Marginalmonde auf den Hinterflügeln vorgeschritten. Zugleich wurde durch den grösseren Schuppenreichtum des Männchens die noch bei dem Weibchen durchtretende Vorderflügelbinde unterdrückt und auf der Oberseite dafür als sexueller Schmuck ein prächtvoll grüner Spiegel geschaffen.

An die *Dardanus*-Gruppe schliessen sich die ähnlich gefärbten und sexuell dimorphen, aber vollkommen ungeschwänzten Formen der *Vertumnus*- und *Aeneas*-Gruppe.

Versuchen wir im Anschluss an die auf p. 80 gegebene schematische Entwicklungsskizze die als Modelle dienenden Formen der amerikanischen Aristolochienfalter in eine aufsteigende Reihe zu bringen, so dürfen wir, mit der *Laertias*-Cohorte beginnend, die *Phileor*-Gruppe mit I, die *Polydamus*-Gruppe mit II, die *Protodanus*-Gruppe mit III bezeichnen. Die den indischen Gruppen eher entsprechenden Abtheilungen der *Ascanides*-Cohorte würden mit der *Photinus*-Gruppe (IV) beginnen, welcher sich die *Montezuma*-Gruppe (V)

anschlüsse und durch die *Gundlachianus*-Gruppe (VI) zur *Phalaecus*-Gruppe (VII) und durch die *Dardanus*-Gruppe zur *Vertumnus*-Gruppe (IX) und endlich zur *Aeneas*-Gruppe (X) überführen.

Besprechen wir von den Anpassungsformen an die Aristolochienfalter auch hier zuerst diejenigen, welche sich, wie in der indisch-australischen Fauna, ausschliesslich aus den Arten der Unter-*gattung Papilio* s. str. recrutiren.

Wir können alle amerikanischen Rinnenfalter auf zwei Hauptentwicklungsreihen zurückführen, deren eine mit *Danaus*-artigen, deren andere mit *Machaonides*-artigen Vorfahren beginnt. Schon in der *Danaus*-Gruppe treten uns bei dem bis Nordamerika reichenden *P. Turanus* L. zwei Weibchenrassen entgegen, deren ursprüngliche, im Norden des Verbreitungsgebietes allein auftretende Form der des constant bleibenden Männchens gleicht. Bei der abgeleiteteren südlichen Form des Weibchens, *P. Glaucus* L., ist die gelbe Grundfarbe der Flügel und des Leibes durch eine schwärzliche Deckfarbe, welche vielleicht ursprünglich erst unter dem Einfluss des wärmeren Klimas entstand, verdunkelt⁴⁾ und zugleich secundär auf den Hinterflügeln ein metallischer Blauschimmer entwickelt. Daher erinnert diese düster gefärbte Weibchenform etwas an den stahlblauen *Ph. Phileor* L., und auch die leuchtend rothen Marginalmonde der Hinterflügelunterseite erinnern an die auffälligen Tüpfel des rubenden Modells, mit dessen Verbreitung die der mimetischen Form ziemlich genau zusammenfällt. Diese abweichende Färbung des *P. Glaucus* L. überträgt sich, weiter ausgebildet, bei *P. Troilus* L. auf das männliche Geschlecht: so müssen wir auch diesen Rinnenfalter als unvollkommen ausgebildete Anpassungsform an *Ph. Phileor* L. ansehen.

Reicher und ausgebildeter sind die Anpassungen unter den Rinnenfaltern des neotropischen Gebietes, welche sich enger an die *Danaus*-Gruppe anschliessen⁵⁾, wemgleich auch hier wie in der australischen *Gambrisias*-Gruppe etc. der Aehnlichkeit mit den Modellen noch durch die bedeutendere Grösse der angepassten Formen Abbruch gethan wird.

So erinnert das im Allgemeinen düstere Weibchen des Vertreters der *Asclepias*-Gruppe, welches von Hübn er als *P. Garamas* aufgestellt war, durch den leuchtend blauen Schiller der sonst schwarzen, rothgetüpfelten Hinterflügel deutlich an den ebenfalls mexicanischen *Ph. Pholius* Dbld. Gehen wir hier von der Zeichnung des Männchens als der ursprünglichen Artzeichnung aus, so lässt die abweichende Weibchenform neben den offensbaren Zeichen mimetischer Anpassung auf der Hinterflügeloberseite noch deutliche Reste marginaler Bindentüpfel auf den Vorderflügeln erkennen, welche das stark verdunkelte Männchen nicht mehr besitzt. Somit müssen wir auch hier wie bei den Weibchen der *Gambrisias*-Gruppe die Anpassungsform als Product der Umbildung einer auf die Vorfahren der Art rückgeschlagenen Form ansehen.

In der *Erymanter*-Gruppe, welche sich nach C. und R. Felder vor der *Asclepias*-Gruppe durch die gesügte Subcosta der Vorderflügel auszeichnet, finden wir bei zahlreichen Arten der *Cleotas*-Untergruppe, die sich durch die Reduction des Hinterflügelchwanzes als abgeleitet erweist, eine in den Weibchen,

⁴⁾ Auch in der *Machaon*-Gruppe finden wir eine zuerst bei dem Weibchen (*P. Bairdii* Edw.) beginnende Verdunkelung der schwefelgelben Grundfarbe, welche sich bei den abgeleiteteren Arten auch auf das männliche Geschlecht überträgt (*P. Astrius* F.), ohne sich jedoch zu mimetischer Anpassung zu entwickeln.

⁵⁾ Am rechten Flügel der auf p. 100 (I. Theil) gegebenen Tabelle sind durch ein Vorsehen verschiedene Gruppen ausgeschlossen worden und nachzutragen, so über der *Palamedes*-Gruppe die „*Troilus*-Gruppe“ und neben ihr die „*Asclepias*-Gruppe“, an welche sich in schräg aufsteigender Reihe die „*Erymanter*-Gruppe“ und höher hinauf die „*Zagzeus*-Gruppe“ anschliesst.

besonders der kleineren Arten, stärker ausgebildete Anpassung an Aristolochienfalter der *Polydamus*- und *Protodamas*-Gruppe (*Laertias*-Cohorte).

In der zweiten, sich an die *Machaonides*-Gruppe anschliessenden Cohorte der Rinnenfalter treten uns noch in der *Thoas*-Gruppe nur in beiden Geschlechtern gleichgefärbte und zugleich einen deutlichen Hinterflügelschwanz führende kräftige und fluggewandte Arten entgegen, die sich bis Nordamerika verbreiten. Während in der bis Mexico und Cuba nordwärts reichenden *Mentor*-Gruppe die führende Art selbst in beiden Geschlechtern gleichgefärbt ist, tritt bei einzelnen abgeleiteteren Arten, bei *P. Oebalus* Gray, *P. Thersites* F., *P. Lycophron* Hb., wie in der *Turnus*-Untergruppe eine allmähige steigende Verdunkelung der hellen Grundfarbe des Weibchens ein, ohne jedoch eine mimetische Anpassung an lebende Formen der Aristolochienfalter zu erreichen. Vielleicht ähnelten diese Weibchenformen ausgestorbenen Verbindungsgliedern zwischen der *Laertias*-Cohorte und der *Gaullachianus*-Gruppe. In der durch die stark reducirten Hinterflügelschwänze ausgezeichneten *Polycaon*-Untergruppe tragen dagegen die Männchen noch das gelbliche Kleid der Stammgruppen, während sich bei den Weibchen¹⁾ ein auffallender Dimorphismus entwickelt, der, wie in der *Turnus*-Untergruppe, ursprünglich durch Verdunkelung der hellen Grundfarbe entsteht. Aus dieser abweichenden Färbung gehen nun durch Umbildung die mimetischen Anpassungsformen hervor, welche bei der häufigeren Varietät ♀ *Piranthus* Cr. den metallgrünen Männchen der *Protodamas*-Gruppe (*Ph. Belus* Cr. etc.), in der rein brasilianischen Weibchenform *Androgeos* Cr. dagegen dem Weibchen (*Varus* Koll.) desselben Aristolochienfalters gleichen.

Näher an die *Mentor*-Gruppe schliesst sich die *Torquatus*-Gruppe an, deren Weibchen nur in seltenen Ausnahmefällen bei *P. torquatus* Cr.²⁾ besonders auf den Vorderflügeln noch den Männchen gleicht, während die Hinterflügel bereits in gewissem Grade der Eigenart der Modelle angepasst sind. Bei *P. Torquatus* Esp. ähneln alle mir bekannten Weibchen in Form und Färbung der Flügel überraschend den kleineren Arten der *Agarus*-Gruppe von *Pharmacophagus*, besonders *Ph. Agarus* F. und *Ph. Banichas*. Bei *P. torquatus* Cr. dagegen treten meist Weibchenformen mit stärker verdunkelten Vorderflügeln und rosenrother Binde der Hinterflügel auf. Mit der gesteigerten Anpassung an die Modelle, nämlich an das scheinend häufigere weibliche Geschlecht der *Aeacus*-Gruppe³⁾, verkümmern auch allmähig die Hinterflügelschwänze. Als besonders interessante Anpassungsformen erwähne ich noch die weibliche Varietät *flavus* Oberth. (Para), welche durch die schwärzlichen Vorderflügel und die gelbe Binde der Hinterflügel dem Weibchen von *Ph. Bolivar* Hew. ähnelt, das erweislich viel häufiger ist als das Männchen, und die var. *Orchanius* Bois. (Venezuela) mit weisslichem Vorderflügelspiegel, welche dem Weibchen des *Ph. Vertumnus* Cr. angepasst ist. Entsprechend der in Mexico herrschenden *Photinus*-Gruppe der Aristolochienfalter, hat sich *P. Tolus* Godm. et Salv. im Weibchen diesen Modellen in gewisser Weise angepasst.

Am ältere, der *Thoas*-Gruppe näher stehende Formen schliesst sich die *Caiguanabus*-Gruppe an, deren führende Art im Weibchen dem *Ph. Villiersii* Godt. (Cuba) der *Philenor*-Gruppe ähnelt, während dasselbe Geschlecht bei *P. Pelus* (Westindien) etwas an den *Ph. Gaullachianus* Feld. erinnert. Der als

Vergl. Taf. A
Fig. 67—68.

¹⁾ Nach A. Seitz dürften bei *P. Polycaon* Cr. (im Norden des Verbreitungsgebietes?) noch durchaus männchenfarbige Weibchen vorkommen. (Stett. ent. Zeitung, 1890, p. 395.)

²⁾ Vergl. I. Theil, p. 98, oben.

³⁾ Wie mir Herr Fruchs-Tortor samerzeit mittheilte, ist auch bei *Ph. Prunorum* Bois. in Java das Weibchen viel häufiger als das Männchen.

Vergl. Tat. IX,
Fig. 60, 61.

Weibchen zu *P. Erostratus* Westw. (Guatemala) gehörige *P. Ihetus* Gray passte sich wiederum dem *Ph. Photinus* Westw. an.

Vergl. Tat. IX,
Fig. 63.

Dadurch nun, dass diese vortheilhafte Anpassung sich auch auf das Männchen übertrug, entstanden die in beiden Geschlechtern meist mimetischen Arten der *Pharxaees*-Gruppe, deren ursprüngliche, noch ein Hinterflügelschwänzchen tragende Formen, wie die führende Art aus Mexico, dem *Ph. Photinus* Westw. ähneln, während die abgeleiteteren Formen, wie *P. Pompejus* L., sich den Weibchen der *Aeneas*-Gruppe anpassen. *P. Pompejus* L. gehört jetzt zu den häufigsten Faltern seines Gebietes.¹⁾

Vergl. Tat. X,
Fig. 73.

Ueber den mir nur aus der Abbildung Westwood's bekannten *P. Chönsiades* Westw. (Ecuador) finden wir endlich einen Anschluss an die interessante terminale Rinnenfalterform des *P. Hippason* Cr. (Surinam), der in beiden Geschlechtern den entsprechenden Sexus von *Ph. Anchises* L. etc. gleicht und vollkommen abgerundete Hinterflügel besitzt.

Als noch wichtiger für die Bedeutung einer natürlichen Anordnung der *Papilio*-Gruppen und für die Mimicry-Theorie müssen die bisher kaum als solche erkannten zahlreichen und höher ausgebildeten Anpassungsformen der neotropischen Segelfalter angesehen werden, welche nur in dieser Region sich an die Aristolochienfalter anlehnen.¹⁾

Auch die neotropischen *Cosmodesmus*-Arten zerfallen in zwei Cohorten, deren erste die von Eimer als „eigentliche Segelfalter“ angesehenen Formen mit zahlreichen Querstreifen umfasst. Der einzige Fall eines ausgebildeten Polymorphismus in dieser Gruppe wurde erst neuerdings von Godman und Salvin in ihrer „Biologia centrali-americana“ veröffentlicht und betrifft einen Vertreter der *Arcestilus*-Gruppe, den *C. Xanticles* Bates. Während die eine Weibchenform dem Männchen gleicht, ist die andere, analog der Varietät ♀ *Glaucus* L. des *P. Tarnus* L., secundär so stark umberbraun verdunkelt, dass nur undeutliche Reste der hellen Binden erkennbar sind und eine oberflächliche Aehnlichkeit mit dem *Ph. Phoenor* L. herauskommt.

Vergl. Tat. X,
Fig. 70.

Ueber Formen, in welchen sich diese schützende Färbung auch auf das männliche Geschlecht übertrug und allmählig höher entwickelte, entstanden die mimetischen Gruppen der zweiten Cohorte. Ihre ursprünglichste Form dürfte der Vertreter der *Asius*-(*Astygae*-)Gruppe darstellen, welcher bereits eine gewisse Aehnlichkeit mit der *Aescanius*-Gruppe der Aristolochienfalter besitzt. Höher entwickelte sich die mimetische Anpassung an diese Modelle in der *Harrisianus*-Gruppe, deren grösster Vertreter, *C. Harrisianus* Swains., in beiden Geschlechtern der ebenfalls führenden Art der *Aescanius*-Gruppe gleicht, während der kleinere *C. Igsithous* Hb. dem *Ph. Agaveus* F. und *Ph. Butichus* Hb. angepasst ist. Der durch eine weisse Vorderflügelbinde ausgezeichnete *P. Perthebus* Boisd. und der bronzegrün glänzende *C. Lajus* Rog. erinnern in gewisser Weise an Formen wie *Ph. Perthebus* Boisd. Bei diesen Arten verschwindet auch schon die scharf abgesetzte Fühlerkeule, welche noch die *Asius*-Gruppe den ursprünglicheren Segelfaltern näher brachte, und macht einer ganz allmähigen Verstärkung des Endtheiles Platz, wie sie auch die Aristolochienfalter erkennen lassen. Zugleich verkürzt sich auch der Hinterflügelschwanz und setzt sich die rothe Färbung der Hinterflügelbasis auch auf die Vorderflügel, manchmal bis zur Oberseite, fort.

Vergl. Tat. IX,
Fig. 63.

An die *Harrisianus*-Gruppe schliesst sich die mexicanische *Thymbraeus*-Gruppe mit vollkommen verdunkelten Vorderflügeln an, welche durch Fühler- und Hinterflügelform noch etwas an die *Asius*-Gruppe erinnert. Von ihren Arten ähnelt *C. Thymbraeus* Boisd. dem Weibchen von *Ph. Photinus* Westw., *C. Aconophus* Gray und *C. Pomponius* Hopflr. dem *Ph. Montezuma* Westw.

¹⁾ In der indisch-australischen und äthiopischen Region dienen ihnen nur Danaiden und Aeraeiden als Modelle.

An diese Gruppen schliesst sich die *Xynias*-Gruppe an., deren führende Art im Männchen noch ein ganz dünnes hinfalliges Schwänzchen trägt, während es in der Färbung an dasselbe Geschlecht der innamen *Aeneas*-Gruppe erinnert.

Die *Xynias*-Gruppe bildet zugleich den Uebergang zu den reich entwickelten schwanzlosen Formen: der *Harmodius*-Gruppe. Ihre nach der führenden Art benannte Untergruppe enthält Formen, deren verschiedene Geschlechter den entsprechenden Sexus ihrer Modelle aus der *Aeneas*- oder *Vertumnus*-Gruppe entsprechen. In der *Xenarchus*-Untergruppe dagegen ähneln die abgeleiteteren Formen den häufigeren Arten der *Protodamus*- und *Polydamus*-Gruppe von *Pharmacophagus*. So erinnert *C. Phaon* Luc. an *Ph. Protodamus* Godt., *C. Hyperion* Hb. an *Ph. Polydamus* L. und *C. Choridaemus* Boisd. an *Ph. Crassus*. Auch *C. Pausanias* Hew., der jetzt unstréitig einen Heliconier copirt, dürfte ursprünglich einem Aristolochienfalter, dem Weibchen von *Ph. Eclus* Cr. (*Varus* Koll), geöhnet und sich erst mit zunehmender Seltenheit des Modells dem jetzt so gemeinen *Hel. Clytia* L. angepasst haben.

Näher an die *Harmodius*-Untergruppe schliesst sich auch die *Ariarathes*-Gruppe an, deren Arten noch einen zahmartigen Hinterflügelfortsatz führen und ebenfalls meist den entsprechenden Geschlechtern der *Aeneas*- und *Vertumnus*-Gruppe ähneln. So erinnert *C. Cyanon* Gray an *Ph. Aulicis* L., so *C. Eragoras* Westw. an *Ph. Vertumnus* Cr., *C. Aristagoras* Feld. an *Ph. Cyphotes* Gray. In der *Branchus*-Untergruppe, deren Arten sich durch stärker abgerundete Hinterflügel als abgeleitet erweisen, nehmen die Tüpfel an Kopf und Nacken endlich eine rothe Farbe an, wie sie die Modelle führen. Die Vertreter dieser Gruppe scheinen sehr selten zu sein.

Stellen wir nun wieder die amerikanischen mimetischen Arten nach ihrer Entwicklungshöhe den Modellen gegenüber, so erhalten wir folgende Tabelle:

Pharmacophagus:	Papilio s. str.:	Cosmodesmus:
X - IX. <i>Aeneas</i> - und <i>Vertumnus</i> -Gr.:		
<i>Callicles</i> Bates (Bolivia, Ecuador)	VI. <i>Harmodius</i> -Gr.: <i>Harmodius</i> Dblld. ♂ resp. ♀
<i>Aeneides</i> Esp.	V. <i>Xynias</i> -Gr. ♂ resp. ♀
<i>Aulicis</i> L. (Surinam)	VIII. <i>Hippason</i> -Gr.: <i>Hippason</i> Cr. ♂ resp. ♀	VII. <i>Ariarathes</i> -Gr.: <i>Cyanon</i> Gray ♂ resp. ♀
<i>Aeneas</i> L. etc., ♀ (Central- und Südamerika)	VI. <i>Phaenaretes</i> -Gr.: <i>Pompejus</i> F. ♂ resp. ♀	VII. <i>Ariarathes</i> -Gr.: <i>Eragoras</i> Westw. ♂ resp. ♀
	V. <i>Torquatus</i> -Gr.: <i>Torquatus</i> ♀ <i>Candius</i> Hb. " ♀ <i>Orrhamus</i> Boisd.	
<i>Vertumnus</i> Cr. ♀ (Venezuela)	VIII. <i>Hippason</i> -Gr.: <i>Hippason</i> Cr. ♀	
♀ <i>Dicras</i> Gray	VI. <i>Harmodius</i> -Gr.: <i>Euraleon</i> Hew. ♂ resp. ♀
<i>Erithalion</i> Boisd. (Bogota)	
<i>Bolivar</i> Hew. ♀ (Egga)	V. <i>Torquatus</i> -Gr.: <i>Torquatus</i> ♀ var. <i>harus</i> Oberth.	

Pharmacophagus:	Papilio s. str.:	Cosmodesmus:
VII. <i>Phalaccus</i> -Gr.:		III. <i>Harrisianus</i> -Gr.:
<i>Ascanius</i> Cr. (Brasilien)	<i>Harrisianus</i> Swains. ♂ ♀
<i>Baenichus</i> Hb.	V. <i>Torquatinus</i> -Gr.:	
<i>Agaveus</i> F. (Brasilien)	<i>P. torquatinus</i> ♀ <i>Hectorides</i>	<i>Lysithous</i> Hb. ♂ ♀
VI. <i>Gaundlachianus</i> -Gr.:	IV. <i>Caiquanabus</i> -Gr.:	
<i>Gaundlachianus</i> Feld. (Cuba)	<i>Pelans</i> Westw. ♀	
V. <i>Montezuma</i> -Gr.:		IV. <i>Thymbræus</i> -Gr.:
<i>Montezuma</i> Westw. (Mexico)		<i>Aconophus</i> Gray ♂ ♀
		<i>Pomponius</i> Hopffr. ♂ ♀
	VI. <i>Pharaces</i> -Gr. z. Th.:	IV. <i>Thymbræus</i> -Gr.:
	<i>Pharaces</i> ♂ ♀	<i>Thymbræus</i> Boisd. ♂ ♀
	V. <i>Torquatinus</i> -Gr.:	
IV. <i>Photinus</i> -Gr.:	<i>Tolas</i> Godm. et Saly. ♀	
<i>Photinus</i> Westw. (Mexico)	IV. <i>Caiquanabus</i> -Gr.:	
	<i>Erostratus</i> Westw. ♀	
	<i>Rhetus</i> Gray	
	III. <i>Asclepius</i> -Gr.:	
	<i>Asclepius</i> ♀ <i>Garamus</i> Hb.	
II. Cohorte.		
III. <i>Protodamas</i> -Gr. (Südamerika):	IV. <i>Mentor</i> -Gr.:	
<i>Belus</i> Cr. ♂ resp. ♀	<i>Polycaon</i> Cr. ♀ var. <i>Piranthus</i>	
<i>Crassus</i> F.	Cr. resp. <i>Androgeus</i> Cr.	
<i>Protodamas</i> Godt.	IV. <i>Eurymander</i> -Gr.:	VI. <i>Harmodius</i> -Gr.:
	<i>Chotas</i> -Untergr.:	<i>Choridamas</i> Boisd.
	<i>Bilias</i> Godt.	<i>Phaon</i> Luc.
II. <i>Polydamas</i> -Gr. (Central- und Südamerika):		
<i>Xenodamas</i> Boisd. (Neu-Granada)		VI. <i>Harmodius</i> -Gr.:
<i>Polydamas</i> L.		<i>Therodamas</i> Feld.
I. <i>Philetor</i> -Gr. (Central- und Nordamerika):	IV. <i>Caiquanabus</i> -Gr.:	
<i>Villiersii</i> Godt. (Cuba)	<i>Caiquanabus</i> Poey ♀	
<i>Philetor</i> L. (Central- und Nordamerika)	III. <i>Froilus</i> -Gr.:	II. Cohorte.
	<i>Froilus</i> L. ♂ ♀	<i>Xanticles</i> -Gr.:
	IIa. <i>Daucus</i> -Gr.:	<i>Xanticles</i> var. ♀ <i>Philemora</i>
	<i>Fanus</i> L. ♀ <i>Glaucus</i> L.	(Panama)
I. Cohorte.		I. Cohorte

Vergleichen wir nun die Uebersichtstabellen der indo-australischen und amerikanischen Papilionen, wie wir sie auf p. 87, 88 und p. 93, 94 gegeben haben, mit einander, so finden wir zunächst unter den zwar selbstständig und unabhängig von anderen Formen, aber doch unter verschiedenen Localinflüssen entwickelten Modellen ein in der Hauptsache gemeinsames Entwicklungsprincip: die hellen Binden zuerst der Vorder-, dann der Hinterflügel werden, im Allgemeinen von aussen nach innen, mehr und mehr durch Verdunkelung verdrängt, und zugleich treten meist die Medianschwänze der Hinterflügel bis zur allmähigen Abrundung der letzteren zurück.

Da wir dieselben Grundzüge der Umbildung nun auch bei den Rinnen- und Segelfaltern finden, dürfen wir in ihnen eine für die Artentwicklung der Papilioniden allgemein geltende Entwicklungsrichtung erblicken, welche die Umwandlung der Arten anbahnen hilft und, wie Eimer bereits hervorhob, im Männchen zuerst in Erscheinung tritt. Ob diese Gesetzmässigkeit ihre „inneren Ursachen“ hat oder auf äussere Einflüsse oder die natürliche Auslese zurückzuführen ist, hoffe ich an einem anderen Orte erörtern zu dürfen; jedenfalls lässt sich auch die letzterwähnte Ansicht vertheidigen.

Trotz der allgemein geltenden Grundzüge der Entwicklungsrichtung erreicht nun die Aehnlichkeit unter den Aristolochienfaltern beider Faunengebiete doch keinen so hohen Grad, dass wir Arten der einen in Artengruppen der anderen Region ungezwungen einreihen dürften. So sehen wir, dass auch auf verwandtes Bildungsmaterial doch noch der Einfluss derselben Existenzbedingungen einzuwirken hat, um in engeren Grenzen verwandte Artenverbände zu schaffen.

Dieser Einfluss der physikalisch-chemischen Localbedingungen genügt aber noch nicht, um mimetische Formen zu schaffen, denn die Entstehung der letzteren verlangt zwei sociologische Factoren: das Vorherrschen eines von den Feinden der betreffenden Abtheilung bereits als geschmackswidrig gemiedenen Modells und das Vorhandensein einer selteneren, meist nicht immunen Art, welche im Stande ist, nach bestimmten Richtungen hin wenigstens im weiblichen Geschlecht zu variiren.

Dass wir in den Gruppen der mimetischen Papilionen, welche anscheinend bestimmten Entwicklungsstufen der Aristolochienfalter entsprechen, nun aber keine blossen Parallelstufen der Entwicklung auf Grund „innerer constitutioneller Ursachen“ erblicken dürfen, sondern nur Anpassungserscheinungen vor uns haben, die innerhalb der Gruppe allein von der local beschränkten, in ihrer Existenz bedrohten Art ausgingen, zeigen uns die Uebersichtstabellen. So passten sich z. B. in der indo-australischen Fauna Vertreter der *Ascalaphus*-Gruppe der Rinnenfalter (V) an die *Semperi*-Gruppe (VI), die *Doubledayi*-Gruppe (III) und die *Jophon*-Gruppe (II) der Aristolochienfalter an. So ähneln die Vertreter der südamerikanischen *Ariarathes*-Gruppe der Segelfalter nach ihren einzelnen Arten sowohl Angehörigen der *Laertias*-Cohorte (*Protodamas*- und *Polydamas*-Gruppe, III—II) als den Formen der höchst entwickelten Gruppen der *Ascanides*-Cohorte (*Aeneas*- und *Vertumnus*-Gruppe, X—IX) der Aristolochienfalter.

So passen sich die einzelnen Angehörigen der mimetischen Gruppen Aristolochienfaltern von verschiedener Entwicklungshöhe an, denn als Modell dient stets nur die auch am Verbreitungsort des Nachahmers herrschende und zugleich zur Anpassung geeignetste Art. Weiter verbreitete häufige und zugleich oft die einzigen lokalen Vertreter ihrer Sippe darstellende Aristolochienfalter können daher den verschiedensten Gruppen als Modell dienen. So passen sich an *Ph. Polydorus* L. Angehörige der *Ascalaphus*-, *Pammon*- und *Gambriasis*-Gruppe der Rinnenfalter, an *Ph. Livis* Godt. solche der *Neomans*- und *Pammon*-Gruppe, an *Ph. Polyphontes* solche der *Ascalaphus*- und *Pammon*-Gruppe an.

In Südamerika werden diese Anpassungsverhältnisse dadurch noch complicirter, dass an ihnen

auch die Segelfalter Theil nehmen. So erinnern nicht nur Formen der *Asclepias*-Gruppe, sondern auch solche der *Catantabus*-, *Torquatus*- und *Pharnaces*-Gruppe der Rinnenfalter und der *Thymbraeus*-Gruppe der Segelfalter an den mexicanischen *Ph. Photinus* Westw.

Der Annahme, dass wir in diesen Anpassungen nur Erscheinungen eines immanenten Entwicklungsgesetzes erblicken dürfen, welches mit dem besonderen Einfluss der Localbedingungen verbunden in Wirkung träte, wird weiter der Boden entzogen durch den von uns eingehend geführten Nachweis, dass alle mimetischen Anpassungen zuerst bei den Weibchen, dem für die Erhaltung der Art so viel wichtigeren Geschlecht, auftreten.

Wie wir bei den Rinnen- und Segelfaltern aller Faunengebiete festzustellen vermochten, waren die den Urformen der Nachahmer offenbar näher stehenden Arten der verschiedensten Zweige sämmtlich in beiden Geschlechtern isomorph und gleichen zugleich keinem der Aristolochienfalter. Aus diesem Grundhabitus selbstständig entwickelter Formen heraus konnten nun unter Umständen, welche die Erhaltung der Art gefährdeten und zugleich ihre Umbildung gestatteten, erfolgreiche Anpassungen der Varietäten¹⁾, welche das Überleben der betreffenden Form der Art mehr oder minder garantierten, erst entstehen, nachdem die Modelle nicht nur geschaffen, sondern auch von den Feinden der Gattung als geschmackswidrig erkannt und gemieden und relativ zahlreich waren. Dass aber alle Anpassungen von der für die Arterhaltung wichtigsten Erscheinungsform des Entwicklungszyclus, dem reifen Weibchen, ausgingen, darf als Beweis für das Eingreifen natürlicher Auslese dienen. So trägt, um nur ein Beispiel anzuführen, in der ganzen *Loewii*-Gruppe nur die langgeschwänzte Eulform ♀ *Achatiades* des *P. Menion* L. und die sie vorbereitende noch schwanzlose weibliche Varietät die auffällig gelbe, durch den schwarzen Dorsalstreif unterbrochene Abdominalrückenfarbe, welche auch das Modell, *Ph. Coon* F., auszeichnet.

Als zweiten Einwurf gegen die Auffassung der mimetischen Anpassungen als blosser Analogieerscheinungen führe ich gewisse nicht ererbte, sondern erst von dem Weibchen erworbene auffällig hervortretende Eigentümlichkeiten bestimmter Färbung der Nachahmer an, welche den Besonderheiten der Modelle weder homogen noch homolog sind, sondern sie nur vortäuschen. Jede schützende Anpassung von Seiten der Rhopaloceren, sei es nun die „protective resemblance“ der „Blattschmetterlinge“ (*Kallima*) oder die Mimicry der Nachahmer, entwickelt sich zuerst auf der Unterseite der Flügel, also in der Ruhelage, entsprechend dem in letzterer grösseren Schutzbedürfnisse des Individuums.

So treten auch die blutrothen Basaltüpfel der mimetischen Papilionen, welche die rothen Brustflecken der Aristolochienfalter wiedergeben, zuerst auf der Hinterflügelunterseite auf, um sich dann auf die Vorderflügel zu verbreiten und endlich auf letzteren auch oben vorzutreten und so im Fluge des Nachahmers den bunten Halskragen des Modells vorzutäuschen.²⁾ Diese Stufen der Entwicklung lassen sich unter den indisch-australischen Rinnenaltern besonders in den die *Ascalaphus*-Gruppe bildenden Arten erkennen. So fehlt bei *P. Ascalaphus* Boisd. noch jede Andeutung dieser Basaltüpfel, welche bei *P. Dymphobus* L. schon an der Unterseite beider Geschlechter vorkommen, um bei den Weibchen von *P. Mayo* Atk. endlich auch auf die Oberseite der Vorderflügel durchzutreten. In derselben Gruppe treffen wir bei

¹⁾ Wir müssen annehmen, dass Variation, wie sie unter dem Einfluss des menschlichen Schutzes bei den Hausflüglern entsteht, in der Freiheit bei Götterdung der Artexistenz entstehen und in den Dienst der natürlichen Auslese treten kann. In vielen Fällen gehen dieser Schutzanpassung offenbar (durch Inzucht entstandene?) Rückschlagserscheinungen vorher.

²⁾ Letzterer ist meist roth, selten gelb (*Ph. Coon* F.) oder leuchtend weiss (*Ph. Swainei* Grose-Smith).

dem auf die Philippinen beschränkten *P. Emalthion* Hb. eine in der weiblichen Varietät *Scuperinus* höher ausgebildete, die Binden von *Ph. Scuperi* Feld. durchaus wiedergebende rothe Zeichnung der Unterseite, welche bei vielen Stücken des Weibchens auch oben auftritt und so im Fluge den leuchtend rothen Leib des Modells vortäuschen muss.

In der *Protenor*-Gruppe finden wir in beiden Geschlechtern der führenden Art noch keine Spur einer mimetischen Anpassung; bei *P. Rhetenor* Westw. dagegen mit mimetischem Weibchen (*Icarinus* Westw.) zeigt auch das Männchen eine breit rothe Innenrandsfärbung der Unterseite, welche unvollkommen an den rothen Leib der Aristolochienfalter gemahnt und sicher von dem Weibchen, bei dem sie höher ausgebildet ist, erworben wurde. Der rothe Basaltüpfel auf der Vorderflügeloberseite des Weibchens täuscht den rothen Halskragen des *Ph. Dasaraba* Moore vor, während die scharf an den Rand gerückten hellrosa Säume der Hinterflügel ersteren auf gewisse Entfernung hin derart verdecken, dass er tief ausgezackt erscheint, wie er bei dem Modell es ist.

Eine Cumulation dieser Anpassungen finden wir in der *Jauaka*-Gruppe, in welcher neben der rothen Innenbinde an der Unterseite, welche die Nachahmer kennzeichnet, endlich wie in den Modellen selbst Brust und Abdominalseiten rüthlich behaart sind.

Ähnliche Erscheinungen treten uns auch unter den südamerikanischen Nachahmern entgegen. Unter den Rimenfaltern ist *P. Hippason* Cr. die einzige mir bekannte Art, welche an der Unterseite der Hinterflügel den auffälligen rothen Basalfleck besitzt, welcher die rothe Abdominalbehaarung des Modells vortäuscht. Dagegen treten uns solche Anpassungen desto ausgebildeter unter den Endformen der zweiten Segelfalter-Cohorte entgegen, in denen sie stets auch auf das Männchen ausgedehnt sind. In der *Asias*-Gruppe noch dentlich auf Reste ursprünglicherer Binden zurückführbar und auf die Unterseite beschränkt, tritt diese Rothfärbung in der weiter fortgeschrittenen *Harrisianus*-Gruppe besonders bei den Weibchen, analog den Formen der *Ascalaphus*-Gruppe, auch auf der Oberseite der Vorderflügel vor, entsprechend dem rothen Halsbande der *Agarus*-Gruppe der Aristolochienfalter. Diese Eigenthümlichkeiten sind bei der zweiten Abtheilung der *Hirvanolius*-Gruppe, welche sich den schwanzlosen Gruppen der *Laertias*-Cohorte der Aristolochienfalter anschloss, entsprechend umgebildet; so wird bei einigen Arten sogar der orangerothe Seitenstreif des Hinterleibes, welcher die *Polydamas*-Gruppe auszeichnet, wiederholt.

Bei den Endformen der *Ariarathes*-Gruppe treten endlich wie in der indischen *Jauaka*-Gruppe rothe Tüpfel an Kopf und Brust neben den die Nachahmer charakterisirenden Flügelüpfeln auf.

So sind alle Formen, in welchen sich die mimetische Anpassung auf beide Geschlechter erstreckt, auch durch die Höhe der ersteren als Endformen ihrer Entwicklungsreihe charakterisirt, bei denen die für die Erhaltung der Art vortheilhafte Erwerbung des Weibchens, durch Inzucht begünstigt, auf das Männchen übertragen wurde.

Das natürliche System der Papilionen giebt uns auch Gelegenheit, gegen die von R. Wagner¹⁾ aufgestellte Ansicht einzutreten, dass die Mimicry der nachahmenden Arten von *Papilio* nur darauf beruhe, „dass das Thier nicht auffallen wolle“ und sich deshalb, wie ein Blattschmetterling einem der zahllosen Blätter des Baumes, nur einem der häufigsten Falter seines Gebietes anpasste.

Wie die übrigen als Modelle für Papilionen dienenden Formen, die Danaer, Acracae, Heliconier, dürfen auch alle *Pharmacophagus*-Arten als relativ immun vor den Angriffen der Feinde der Tagfalter

¹⁾ Ich kenne diese Ansicht, welche für gewisse Fälle der Anpassung unter den neotropischen Eryciniden nicht ganz von der Hand zu weisen sein dürfte, nur aus einem Citat bei Sierard, Le Mimétisme (Paris 1888), p. 51.

gelten. Dies spricht sich schon in dem ruhigen, gelassenen Fluge und in der Lebenszähigkeit der Aristolochienfalter aus und dürfte wohl auf die Raupennahrung zurückzuführen sein, die bei allen als Modell dienenden Arten, soviel bekannt, aus Aristolochien besteht¹⁾, einer Pflanze, welche nach J. W. Selater (On the food of gaily-coloured caterpillars; Trans. Ent. Soc. London, 1877) durch „violently purgative and vermifuge properties“ ausgezeichnet ist.

So sind, soweit mir bekannt ist, bei früheren Ständen der Aristolochienfalter bisher noch keine Ichnemoniden beobachtet worden, die sonst gerade in den Raupen der Rinnen- und Segelfalter so häufig sind. Auch haben die meisten *Papilio* s. str.- und *Cosmodesmus*-Raupen (mit Ausnahme vielleicht der *Panope*-Gruppe der ersteren) eine ausgebildete grüne Schutzfärbung und erinnern die jungen Larven der Rinnenfalter sogar oft täuschend an Vogelkoth. Ebenso sind die Imagines im Gegensatz zu den Aristolochienfaltern sehen, suchen sich theilweise im Fluge zu decken und sind leicht verletzbar. Dagegen verhalten sich die in beiden Geschlechtern vollkommen angepassten Arten, wenigstens in der *Panope*-Gruppe, vollkommen wie ihre Modelle. Vielleicht gilt dies auch für die indische *Janaka*, die südamerikanische *Hippason*- und die *Harrisianus*-, *Harmodius*- und *Bauchus*-Gruppe der Segelfalter. Nur bei Formen, welche schon einen hohen Grad der Aehnlichkeit mit den Modellen erreicht haben und sexuell dimorphe Arten nachahmen, tritt endlich ebenfalls ein ausgebildeter Dimorphismus auf. Dieser wurde wohl von den Männchen durch Ausbildung von Contrast- und Schmuckfarben angebahnt, schloss sich aber doch zugleich im Interesse der Arterhaltung der stets seltenen Formen der eigenartigen Umbildung der männlichen Modelle an. Hierher gehören aus der indo-australischen Region Arten der *Panope*-Gruppe, wie *P. paradoxus* Zinck, aus der neotropischen Region die *Hippason*-Gruppe der Rinnen- und die *Harmodius*- und *Bauchus*-Gruppe der Segelfalter.

So darf die zuerst von Cl. W. Bates und A. R. Wallace vertretene Ansicht, dass die wunderbaren Erscheinungen der Mimicry Producte der natürlichen Auslese sind, das natürliche System der Papilionen als eine ihrer wichtigsten Stützen betrachten.

¹⁾ Die von Horsfield und Moore gemachte Angabe, dass die Larve von *Ph. Doubledayi* auf Fagara (Xanthoxylum) lebt, ist vielleicht auf die Verwechslung eines mimetischen *Mameon*-Weibchens mit der *Pharmacophagus*-Art zurückzuführen, zumal die den Aurantiaceen nahe verwandte Familie in Afrika zu den Hauptnahrungspflanzen der Rinnenfalter-Raupen gehört.

Entstehung der Mimicry zwischen nicht immunen und immunen Schmetterlingen.

Der Ausspruch von H. W. Bates, dass das Studium der Schmetterlinge dereinst als einer der wichtigsten Zweige biologischer Forschung geschätzt werden dürfte, wird auch durch die Bedeutung dieser Insectenordnung für die Theorie der Mimicry bestätigt.

Vor Allem ergibt eine vergleichende Zusammenstellung der natürlichen Verbände einerseits derjenigen Artgruppen oder Gattungen, welche wir als in höherem oder geringerem Grade durch Widrigkeit des Geschmackes oder durch Abschreckmittel als vor den Feinden der Ordnung relativ geschützt (immun) ansehen, andererseits derjenigen, welche wir wegen ihrer grösseren Schmachthaftigkeit und fehlender Wehrmittel für den Angriffen ihrer Verfolger besonders ausgesetzt halten müssen, eine, durch Verwandtschaft bedingte, Gesetzmässigkeit.

Um zuerst die als **immun** bezeichneten Formen kurz zu charakterisiren, so sind ihre Raupen meist auffällig und anscheinend nie protectiv gefärbt und leben oft in Gesellschaften. Ganz besonders dürfte die eigenartige Raupennahrung darauf einwirken, dass vorerst die Larve selbst und dann über die Puppe hinaus auch die Imago durch Aufspeicherung gewisser, besonders emetisch wirkender Gifte zu einem widrig schmeckenden, wenn nicht sogar schädlich wirkenden Bissen wurde.

Unter den **Acraeomorphen** giebt es in allen Unterfamilien gewisse Gattungen, deren Larven an Passiflora⁵⁾ leben, einer Schlingpflanze, deren Blüten, Blätter und Wurzeln oft starke narkotische, besonders emetische Eigenschaften besitzen. Hierher gehören von Nymphalinen nach W. Müller L. c. die Arten der neotropischen Gattungen *Colaenis*, *Metanorpha*, *Dione*; ferner indische Arten von *Cethosia*, die auch an Modecca (Passiflor.) vorkommen. Weiter leben an Passifloren alle bekannten Raupen der Heliconinen (*Heliconius* und *Eteides*), die Larve der so vielseitig als Modell benutzten afrikanischen *Acraea* (*Planema*) *gaea* L. und anderer afrikanischer und indischer Acraeen. Ausser diesen erwähnten Acraeomorphen ist mir keine weitere Schmetterlingsart bekannt, deren Raupen sich von Passifloren nährten.

Die neotropischen Acraeen der Untergattung *Actinote* leben nach W. Müller auf Mimia, einer stinkenden und in mehreren kletternden Arten als schweisstreibend und diuretisch wirkend bekannten Composite.

⁵⁾ Für die auf p. 59 behauptete Verwandtschaft der Violaceen mit den Passifloren spricht besonders die Gattung *Tetrathylacium*, welche Bentham und Hooker (Gen. II, 9, n. 14) zu den Violaceen, H. Baillon aber, Nat. Hist. Plants IV, p. 284 zu den den Papayaceen nahe-standenden Samibaceen rechnet.

Die Raupen der **Danainen** fressen in der Untergattung *Anosia* von *Danaus* hauptsächlich die durch purgative Wirkung ihres reichlichen Milchsaftes ausgezeichneten Asclepiadeen. So lebt die von *Dan. Chrysippus* L. an *Gomphocarpus*, *Cecropogia*, *Stapelia*, *Calotropis procera*; die von *D. Plexippus* Cr. an *Calotropis gigantea*; die von *D. crispus* Cr. nach W. Müller an *Asclepias curassavica*. Sonst sind mir keine an Asclepiadeen lebenden Tagfalter-Larven bekannt.

Die Larven von *Euploea*, so die von der gemeinen *Eupl. Linnæi* Moore leben theilweise an *Ficus*-Arten mit reichem Milchsaft, der z. B. bei *F. Daemona* Vahl und *toxicaria* L. stark giftig, bei *F. septica* Forst. emetisch wirkt. Andere Larven (*Eu. mequila* Er.) leben von den ebenfalls giftigen Blüten von *Nerium* (*Apocynaceae*).

Sämmtliche Raupen der **Neotropinen** leben nach W. Müller an Solaneen (*Solanum*, *Brufelsia*), Vertretern einer nach Dr. Lindley¹⁾ allgemein durch stark narkotisch und entzündend wirkenden Blattsaft ausgezeichneten Familie.

Die einzigen als immo geltenden **Pieriden**, afrikanische *Mylothris*- und indische *Delias*-Arten, leben auf *Loranthus*, einer durch adstringirende Eigenschaften der Rinde bekannten Schmarotzerpflanze.²⁾

Die Larven der Untergattung **Pharmacophagus** von *Papilio* leben, soviel bekannt, meist³⁾ wie die der Gattung *Euryades* etc. an Aristolochien, Schlingpflanzen, deren sämmtliche Theile bei der indischen *A. bracteata* nach Dr. Lindley (*Flora medica* 1837, p. 34) „nauseously bitter“ sind. Die ganze Pflanze von *A. grandiflora* Swartz (Jamaica) verbreitet nach Swartz „a powerful narcotic unpleasant smell“ und ihr Genuss wirkt selbst auf Schweine tödtlich. Aehnliches gilt für die brasilianische *A. macronra* Gomez. und andere Arten.

Ueber die Raupennahrung der exotischen immunen **Heteroceren** ist nur wenig bekannt. So leben die Larven der indischen *Nycthemera laticincta* Cr. an *Cacalia sonchifolia* D. C., einer Composite, deren Blattsaft schweisstreibend wirkt; so leben Arten von *Hypsa* an giftigen *Ficus*-Arten.

Bei vielen Danaiden ist die frei hängende **Puppe** auffällig gold- oder silberglänzend (*Danaus*, *Euploea*), bei *Hylesia* (*Pericopid.*) ist die Puppe so exponirt, dass sie auf zehn Schritte weit gesehen werden kann.⁴⁾

Sicher leiden schon die früheren Stadien immuner Schmetterlinge im Allgemeinen weniger von Parasiten als bei anderen Lepidopteren. Dass sie aber nicht immer frei davon sind, beobachtete ich an vereinzelt Puppen von *Dan. Plexippus* Cr. und *Euploea siamensis* Feld., aus denen ich Ichneumonien zog. Ebenso sah ich eine junge Raupe von *Dan. Chrysippus* F. auf ihrer Nahrungspflanze selbst von Ameisen angenommen. Dagegen sind in der That bei einzelnen gemeinen Arten (so dem amerikanischen Aristolochienfalter *Pap. [Ph.] Philenor* L.) noch keine Parasiten bekannt.

¹⁾ Citirt nach H. Bruce, Useful Plants of India 1873, p. 39.

²⁾ Die zu Hunderten von mir in Bangkok mit *Loranthus*, welchen Grote auch als Futterpflanze von *Delias cochuris* Dru. anzieht, aufgezogenen geselligen Larven von *Delias hirta* Cr. ergaben ohne Ausnahme die Falter. — Dahingegen waren die Puppen, die ich an *Anona squamosa* L. sammelte, ohne Ausnahme angestochen. In der Nähe des betreffenden Custard-apple-Baumes befand sich kein *Loranthus*; auch fand ich einzelne *Delias*-Raupen später auf einer *Anona*. So berichtigen meine in Siam gemachten Beobachtungen die Angaben auf p. 27 und 41.

³⁾ Davon macht angeblich der amerikanische *P. [Ph.] Archidamus* (vergl. Theil I, p. 80), dessen Raupe auf *Tropaeolum* leben soll, eine Ausnahme.

⁴⁾ A. Seitz, die Schmetterlingswelt des Monte Corcovado, I, c, p. 265.

In consequenter Ausführung der Darwin'schen These, dass die Färbung der Thiere „useful hurtful or sexual“ sei, lässt auch A. R. Wallace die immunen **Falter** (Heliconier, Danaiden, Acraeiden*) auffallend „warning-colours“ der Flügel tragen, die unten ziemlich wie oben ausgebildet seien. Allerdings ist mir kein immuner Tagfalter mit ausgesprochen protectiv gefärbter Unterseite der Flügel und ebenso kein immuner Nachschmetterling mit ausgebildeter Schutzmusterung auf der Oberseite der Vorderflügel bekannt geworden.

In der That tragen aber nur wenige Gattungen eine entschiedene „Schreckfarbe“, wie sie uns z. B. in dem oben gelb und schwarz gefleckten Erdmolch entgegentritt. Ein ähnlich auffallendes Kleid treffen wir nur in der neotropischen Josien¹⁾-Tracht an. Dagegen erscheinen schon die meist in Gelb, Rostbraun und Schwarz prangenden Flügelfarben der Neotropinen mehr schön als abstossend. Noch weniger kann man den Begriff von „Ekelfarben“ auf die Färbung der Danaer anwenden, obwohl zugegeben werden muss, dass sich z. B. bei *Anasa* ebenfalls oft eine rostbraune Färbung wie in der *Melinaeen*-Gruppe entwickelt hat. Dagegen ist die Färbung der übrigen Formen, wie die der *Amauris*- und *Euploea*-Arten, zwar charakteristisch, aber frei von jeder abstossenden Wirkung. Ebenso ist die Flügelunterseite aller Danaer stets in mattern Tönen als die Oberseite gehalten. Bei vielen Aristolochienfaltern und *Tenaris*- wie bei *Delias*-Arten ist dagegen die Unterseite der Hinterflügel durch leuchtende Contrastfarben etc. am auffälligsten. Zugleich dürfen wir auch zugeben, dass besser geschützte Arten sich in der Färbung freier entwickelten, da ihre Unschmackhaftigkeit sie nicht zu protectiven Schutzanpassungen nöthigte. Das Product dieser freien Umbildung ursprünglicher Zeichnungselemente ist auch oft (*Heliconius*) eine tiefe Schwärzung der Flügel, aus der sich dann auffällige weiss, gelb, rostbraun oder roth gefärbte Bänderreste hervorheben. Daneben sehen wir aber, dass die Weibchen unzweifelhaft immer Gattungen (*Acraea* und *Eurygus*) secundär durchsichtigere Flügel besitzen als die Männchen und endlich treten uns bei den Neotropinen so zahlreiche, selbst als Modelle dienende Formen mit vollkommen gläsernen Flügeln²⁾ als Endproduct der Artentwicklung entgegen, dass wir zu der Ansicht kommen, den hartnäckigsten Feinden gegenüber dürfte „eine Tarnkappe“ vortheilhafter sein als „ein Gorgonenhaupt“.

Bei vielen immunen Schmetterlingen scheint noch ein besonderer abstossender Factor wirksam zu sein.

Von dem Willen des Thieres abhängig und nach Fr. Müller³⁾ besonders im Weibchen ausgebildet sind die am Hinterrande des Abdomens hervorstreckbaren Stinkköbchen, welche er bei den Maracuja-Faltern⁴⁾ (*Heliconius*, *Eueides*, *Dione*, *Colacus*) nachwies. Hierher gehört auch wohl die Beobachtung von A. Seitz⁵⁾, dass der widrige Geruch bei gewissen Stücken des *Heliconius Besckei* mehrere Schritte weit reicht, und seine Erwähnung einzelner geruchführenden Exemplare von *Eueides aliphera*,

¹⁾ Vielleicht könnte eine chemische Analyse hier wie im *Melinaeen*-Kleid der Neotropinen bestimmte bittere Pigmente nachweisen, wie H. Eisig dies für auffallende Färbungen angenommen hat.

²⁾ Nach A. Seitz (Zool. Jahrb., Abth. I, Syst. IV, p. 776) gewährt die Durchsichtigkeit der Flügel im Verein mit der Schwächigkeit der Leiber den *Alphonis* wohl insofern einen Schutz, als es schwer ist, die an sich sehr leicht übergehende Thier im Auge zu behalten, umso mehr, als sich die Thiere gewöhnlich nur an schattigen Plätzen aufhalten.

³⁾ Fr. Müller, Die Stinkdrüsen der weiblichen Maracuja-Falter (Zeitschr. f. wiss. Zool., XXX, 1878, p. 166—169).

⁴⁾ Maracuja ist der brasilianische Name für Passiflora.

⁵⁾ A. Seitz, Lepidopteren-Studien im Auslande (Zool. Jahrb., Abth. I, Syst. IV, p. 777—778).

Weiter erwähne ich als hierher gehörig den in beiden Geschlechtern vorhandenen Widrigkeitsduft afrikanischer *Acræen* (p. 41), die starke, nach L. de Nicéville mehrere Ellen weit bemerkbare Ausdünstung des *P. (Pharm.) Philocæus*, den p. 47 erwähnten Factor des *P. (Ph.) Phlénor*. Auch frisch ausgekrochene *Danaer* haben oft einen unangenehmen Duft, der sich an älteren Stücken nicht immer feststellen liess. Von Heteroceræen führe ich den auffallend widrigen Duft gewisser *Chalcosiiden* (p. 37) und denjenigen der *Eusemien* (p. 28) an.

Manche Heteroceræen setzen noch besondere Schreckmittel gegen ihre Feinde in Anwendung. So stösst die ergriffene *Hyclosia* (Pericopid.) nach A. Seitz¹⁾ „mit einem seltsam quickenden und brodelnden Geräusch zwei gelbe Schaumwülste aus der Nackengegend hervor, die, wie der Kukkusspeichel, bald das Thier vollständig umgeben“. Aehnliches in geringerer Maasse zeigt auch *Decopeia*.²⁾

Andere Saftabsonderungen werden nun besonders in der älteren Literatur auch von vielen Tagfaltern angegeben, so von indischen *Danaern* (p. 21), „wo sie die Haut gelb färben und einen bestimmten Duft hinterlassen“, von afrikanischen *Acræen* (p. 40), wo sie der Hauptträger des Widrigkeitsduftes sind, und von Arten von *Pharmacophagus*. Nach dem von mir in Indien untersuchten Material an *Danaus*, *Euploea*, *Pharmacophagus* bin ich jedoch zu der Ansicht gekommen, die ich schon p. 25 frageweise äusserte, dass es sich nur um das gelbe, stark ölige Blut der Thiere, das bei den Verletzungen hervortritt, nicht um das Secret besonderer Drüsen handelt.

Noch weniger als ihre Larven scheinen von den Angriffen der Insectenfresser die Falter zu leiden. Und doch fordert ihr oft schwankender, taumelnder Flug, ihre meist grosse Schwerfälligkeit, ihre manchmal gewaltige Menge förmlich zu solchen auf, wie dies A. Seitz für die neotropische *Acræa Thalia* anschaulich schildert. Trotzdem sah er nie einen Vogel eine *Acræa* verfolgen und fand nie einzelne Flügel auf dem Boden. Dasselbe wird von Trimen (p. 40) für afrikanische *Acræen* und *Danaer*, von Bates und Belt (p. 58) für die neotropischen Heliconier (im weiteren Sinne) angegeben. Ich selbst fand nur einmal einen *Dan. Plexippus* im Netz der in Siam gemeinen Spinne *Nephila chrysogaster* Walek. und fing einmal eine mir durch ihren übermässig taumelnden Flug auffallende *Eupl. siamensis*, in deren Leib sich eine rothe Arbeiterin („red ant“) von *Formica smaragdula* fest eingebissen hatte. Ebenso wenig gelang es mir, *Danaus*-, *Pharmacophagus*-, *Delias*- und *Euschena*-Arten an meine zahmen jungen Hühner zu verfüttern.

Nur einmal wurde ich Zeuge des Angriffes eines Vogels auf einen *Danaer*. Auf einem Waldwege vor mir zog ein *Danaus septentrionalis* langsamen schlappen Fluges dahin, als plötzlich ein anscheinend junger Angehöriger der Dieruriden, welche besondere Schmetterlingsfeinde sind, sich von seinem als Warte dienenden Zweige gegen den Falter stürzte, ungefähr zwei Fuss vor ihm etwas rüttelte und dann, ohne das Thier anzunehmen, auf seinen Platz zurückkehrte. Auch die siamesischen Sperlinge (*Passer montanus*), die absolut nicht heikel sind, sah ich nie einen der genannten so gemeinen Falter verfolgen. Ebenso wurden sie von gefangen gehaltenen *Calotes mystaceus* Dum. et Bilb. zurückgewiesen. einer Eidechse, die ich sonst manchen Schmetterling (besonders *Janonica*) von den Barleria-Hecken, in

¹⁾ A. Seitz, Die Schmetterlingswelt des Monte Corcovado (Stett. ent. Zeitung 1890, p. 265).

²⁾ Trotzdem beobachtete ich in Siam mehrere Male, dass Fliegenfänger die schwerfälligen kleinen Spinner verzehrten.

denen sie lauerte, nehmen sah. Auch ich sah nie einzelne Flügel der erwähnten immunen Formen am Boden liegen, was bei ihrer grossen Häufigkeit auffällig ist.¹⁾

Eine den immunen Schmetterlingen allgemein zukommende Eigenschaft ist neben der relativ grossen Sorglosigkeit, mit der sie sich fangen lassen, die auffallende *Lebenszähigkeit*, für welche ich auf die Angaben auf p. 20, 40, 47 verweise. In der That kann ein fast zerquetschtes Thier nach einiger Zeit wieder davonfliegen.

Wie alle immunen Tagfalter, fliegen auch die als widrig angesehenen Heteroceren theils freiwillig, theils durch die geringste Störung aufgeschreckt, am Tage herum. Jedenfalls fehlen alle Nachrichten darüber, dass sie jemals in dunkler Nacht gefangen wurden.²⁾ In diesem Fluge im hellen Tageslicht, den die Nachahmer mit den Modellen theilen, liegt eine weitere Stütze für die Berechtigung der Mimicry-Theorie.

Ganz entgegengesetzte Verhältnisse finden wir nun bei den nicht durch Widrigkeit des Geschmacks beschützten und zugleich stärker verfolgten **nicht immunen Gruppen** der Schmetterlinge.

Hierher gehören von *Rhopaloceren* die Mehrzahl der Nymphalinen und der Morphinen, die Brassolinen, Satyrinen, Libytheiden, Eryciniden, Lycaeniden, die meisten Pieriden, die Untergattungen *Papilio* s. str. und *Cosmodesmus* von *Papilio*, sowie endlich die Hesperiden. Weiter rechne ich hierher die Masse der nur ausnahmsweise, besonders im Männchen, am Tage fliegenden Spinner, aller Eulen, aller Spanner (mit Ausnahme der indo-australischen Gattung *Itaxis*³⁾ und wohl der meisten, wenn nicht aller, Microlepidopteren.

So bilden die geniessbaren Schmetterlinge an Zahl der Arten den relativ immunen gegenüber die ungeheuerere Mehrheit.

Ihre Raupen, die nur zum geringsten Theil giftige Pflanzen (besonders Euphorbiaceen, seltener Solanaceen und Ficus) fressen, aber in nur wenigen Fällen (z. B. für Vögel und Eidechsen) geschmackswidrig sind⁴⁾, zeigen, wenn sie nicht durch starre Dornen oder lose Brennhaare geschützt sind, meist eine gelungene Anpassung an ihren Aufenthaltsort, die Rinde (*Catocala*), den verzweigten Ast (*Geometriden*) oder das grüne Blatt, wenn sie es nicht vorziehen, sich in Gehäuse zu verschansen (*Psychiden* etc.) oder tagsüber in der Erde zu verbergen (viele *Noctuiden*). Durch meine bisherigen Beobachtungen in Siam bin ich im Allgemeinen zu der Ansicht gekommen, dass diejenigen Raupen, welche sich am sorgfältigsten verstecken und die vollkommenste Schutzanpassung zeigen, wohl wegen ihrer besonderen Schmachthaftigkeit am meisten von Feinden aufgesucht werden. Denn aus den in Masse eingesammelten Raupen

¹⁾ Nur H. O. Forbes (Wanderungen eines Naturforschers, übers. v. Tenschler) Jena 1886, Bd. II, p. 12, gibt an, mehrmals auf Waldwegen die losen Flügel von *Pap. (Opolith.) Priamus* gefunden zu haben. — Auffällig ist dagegen die Beobachtung Th. Belt's l. c. p. 317, dass eine blüthenbesuchende Spinne besonders erpicht auf die „Heliconier“ war und eine Wespe sie fing, um ihr Nest damit auszustatten. Es wäre vielleicht möglich, dass hier eine Verwechslung der Modelle mit ihren Nachahmern vorläge.

²⁾ Fälle, in denen diese tagfliegenden Heteroceren durch starkes Licht angezogen werden, kommen hier nicht in Betracht. Fing ich doch in Bangkok abends sogar irgendwie aufgeschreckte Libellen an der Lampe.

³⁾ Wahrscheinlich sind auch die europäischen *Abeceus*-Arten in gewissen Grade immun.

⁴⁾ Dahin scheinen aus unserer europäischen Fauna zu gehören nach Jenner Weir *Diloba euclyptus-plata*, *Cucullia eubasi* etc. (Trans. Ent. Soc., London 1869, p. 21), nach A. Seitz auch *Paris brassicae*; (vergl. A. Seitz, Betrachtungen über die Schutzvorrichtungen der Thiere, Zool. Jahrb., Abth. f. Syst., III, p. 85).

eines an Terminalia (Combretaceae) lebenden grossen Sackträgers erzog ich nur Parasiten, aus denen des in zerschlossenen eingerollten Bananenblatttheilen lebenden Hesperiden *Casyapa Thwar.* und den die Farbe ihrer immergrünen Nahrungspflanze Citrus tragenden Rinnentälterraupen (*P. Pannou. Erithonius*) zum grössten Theil Parasiten. In Nordamerika, einem Lande, in dem immune Schmetterlinge nur in wenigen Arten vertreten sind, fand S. Scudder bei seinen Zuchtversuchen soviel Parasiten, dass er glaubt, $\frac{2}{10}$ der Jugendstadien gingen daran zu Grunde.

Aehnlich sind die Puppen, sobald sie exponirt sind (Rhopaloceren), meist ihrer natürlichen Umgebung entsprechend sympathisch gefärbt. In anderen Fällen sind sie durch oft kunstreiche Gespinnste geschützt oder gehen in die Erde.

Dass auch die Falter geniessbar sind, geht aus ihrer oft so wunderbaren Anpassung der Unterseite (die meisten Tagfalter: *Aglia Tau*) oder der Oberseite (*Ageronia* sp. [*Nymphalidae*], Noctuen, viele Spanner) in der Ruhestellung hervor, die für die bei Nacht fliegenden Arten den ganzen Tag über wirken soll und deshalb der Ueberzahl¹⁾ der am Tage auf Bente gehenden Feinde gegenüber besonders wirksam sein muss. Die Vortheile der schützenden Anpassung der Unterseite bei den Tagfaltern beruhen besonders auf dem Aendern der Flugrichtung und dem plötzlichen Einfallen in einen beblätterten Busch, auf den Boden oder an einen Baumstamm. Mit einem Male sehen wir das eben noch vor uns fliegende Thier nicht mehr und wie schwer es hält, es zu finden, weiss Jeder, der einmal *Discophora*-Weibchen, *Kallima* etc. gesammelt hat. Aehnlich versteckt sich auch das Weibchen von *Elymnias audubari* v. *fraterna*, das in der Ruhestellung mehr an ein trockenes Blatt als an sein Modell erinnert und *E. Lais* Cr. Dagegen schmiegen sich nach A. Seitz gewisse neotropische Hesperiden (so *Plesioneura*) und zahlreiche Eryciniden der Unterseite der Blätter an.

Was die Feinde der ausgebildeten Schmetterlinge anbelangt, so hat man neuerdings von verschiedener Seite (Higgins, S. Scudder, W. B. Pryer, A. Seitz²⁾) bestritten, dass die Vögel überhaupt Tagfalter fressen.

Dem gegenüber verweise ich neben dem allgemeinen Ausspruch von A. R. Wallace (Darwinism, p. 272): „the number of birds which capture insects on the wing is much greater in tropical regions than in Europe“, vorerst auf einige specielle Beobachtungen aus der älteren Literatur. So fand der Prinz von Wied³⁾ im Magen eines Burconiden, *Monstes jusca*, „einen grossen Tagschmetterling, welcher zusammengewickelt fast den ganzen Magen anfüllte“; so berichtet E. Pöppig von den nahe verwandten Galbuliden, „dass man in den Urwäldern ohne Schwierigkeit die Stelle erkennen könne, welche ein Glanzvogel zum Lieblingsitze sich erkoren hat, denn die Flügel der grössten und prachtvollsten Schmetterlinge, deren Leib allein gefressen wird, bedecken auf einige Schritte im Umkreise den Boden“. Endlich bildet Audubon in seinem nur auf Grund eigener Skizzen nach der Natur gemalten Prachtwerk auf Taf. 275 einen Kukuk, *Corypeus americanus* L., ab, der einen *Pap. Tarnus* im Schnabel hält und erwähnt (Birds of

¹⁾ Die nächtlichen Feinde der fliegenden Heteroceren recrutiren sich in erster Linie aus den Nachtschwalben (*Caperulididae*), welche auch grössere Arten fangen, in zweiter Reihe aus den Fledermäusen, welche besonders kleinere vorziehen. Zu den nächtlichen Feinden der ruhenden Schmetterlinge gehören besonders die Leconiden und die Geckonen, welche man in den Tropen jeden Abend bei erfolgreichem Fang beobachten kann. Kleinere, so *Hemidactylus*-Arten, setzen, wie ich beobachtete, die Jagd auf ruhende Nachtfalter in halbdunklen Corridoren auch am Tage fort.

²⁾ A. Seitz, Betrachtungen etc. (Zool. Jahrb., Abth. 1, Syst. IV, p. 83–87).

³⁾ Cited nach A. Brehm, Thierleben IV, p. 193–194.

North America IV. p. 259), dass dieser Kukuk „von solchen Insecten als Raupen und Schmetterlingen lebt“. Von neueren Beobachtungen erwähne ich ausser den auf p. 22, 46, 48 und 65 mitgetheilten, die von Mrs. Barber (citirt bei Trimen und Bowker, l. c. I, p. 34), dass capländische Nectarinien ihre Jungen mit *Pyraonis cardui* füttern, die Angabe von E. Hartert¹⁾, der im Kropf von *Merops pusillus*, der nur fliegende Insecten fängt, Schmetterlinge fand, und die Notiz von E. L. Arnold²⁾ über den Fang von *Terias hecabe* (Pierid.) und *Pap. Patmon* L. durch Vögel.

Meine eigenen Beobachtungen über Wegnahme von Schmetterlingen durch Vögel in Siam bestätigen nur die von Anderen gemachten; man sieht recht selten wie ein Tagfalter von einem Vogel genommen wird. Dass es aber vorkommt, beobachtete ich bei *Hesperia thrax*, anderen Hesperiden und Catopsilien, die von Sperlingen niedergestossen und gefressen wurden. Besondere Schmetterlingsfeinde scheinen die Dieruriden zu sein, von denen eine kleinere Art, *Buchana* sp., sich zur Hauptflugzeit der Catopsilien zahlreich auf einer kleinen, bei Bangkok gelegenen Insel aufhielt und von mir beim Fange beobachtet wurde; ebenso sah ich *Dierurus paradiseus* L. einen *Attacus Atlas* L. fangen und verzehren.

Mehr noch als die Vögel dürften als Feinde der Schmetterlinge die Eidechsen anzusehen sein, die nach A. Brehm l. c. VII, p. 161 „genau zwischen den verschiedenen Arten ihrer Nahrungsobjecte unterscheiden, ob dieselben auch sich so ähneln mögen, dass ein unkundiger Mensch sie verwechseln kann.“ Natürlich erfolgen die Angriffe ausschliesslich auf ruhende Schmetterlinge.

An schmetterlingsfeindlichen Arthropoden erwähnt Bates l. c. p. 510 noch die Asiliden, Trimen und L. de Nicéville die Mantiden³⁾, A. Seitz blüthenbesuchende Spinnen, welche die ruhenden Schmetterlinge nehmen, während Libellen nach Bates auf die fliegenden Jagd machen.

Allgemein ist die Lebenszähigkeit der Falter bei den schmackhaften Arten bedeutend geringer als bei den immunen Formen, worüber man Bowker's Bemerkung (p. 43) vergleichen wolle.

Wir können wohl annehmen, dass die als immune Formen bezeichneten Untergattungen, Gattungen und Unterfamilien die jüngsten Ausläufer ihres betreffenden Verbandes sind. So besitzen die Danaomorphen unter den Tagfaltern überhaupt die weitest fortgeschrittene Verkümmernng der Vorderfisse, so dass sie von den englischen Entomologen seit Bates an die Spitze des Systems gestellt wurden. Weiter bilden unter den Acraeomorphen die Heliconier und Acraeinen wohl terminale Seitenzweige eines Stammes, dessen Hauptentwicklung zur Bildung der Nymphalinen führte. Endlich müssen wir die immunen Gattungen der *Argynnis*-Gruppe (Nymphalinen) selbst ebenso als Ausläufer ihrer Gruppe ansehen, wie die Aristolochienfalter⁴⁾ als jüngsten Zweig des *Papilio*-Stammes. So wird es wahrscheinlich, dass die jetzt immunen Gattungen ursprünglich nicht geschmackswidrig waren, sondern es erst wurden, nachdem sie durch Mangel an der sonstigen Nahrung gezwungen oder durch einen Zufall geleitet, allmählig von unschädlichen auf Giftstoffe enthaltende Pflanzen übergegangen waren. So kommt die indische *Acraea Vesta* L. ausser an Passiflora nach Grote gelegentlich an *Thunbergia* vor, einer Angehörigen der zahlreichen nicht immunen Nymphalinen als Nahrungspflanze dienenden Acanthaceen.

¹⁾ E. Hartert, Ornithol. Ergebn. einer Reise in das Niger-Benna-Gebiet (Journ. f. Ornith. 1886, p. 599).

²⁾ E. L. Arnold, On the Indian Hills I, p. 247-248 (citirt).

³⁾ Auch die Mantiden sind im Stande, immune und schmackhafte Arten zu unterscheiden (vergl. p. 26).

⁴⁾ Aristolochien selbst kennt man nach E. Warming (Handbuch d. syst. Botank, Berlin 1890, p. 699) aus der Kriebelformation.

Erst nachdem die geschmackswidrigen Formen von ihren Feinden als solche erkannt und gemieden waren, konnten aus der Unmasse der schmackhaften Schmetterlinge heraus sich die **mimetischen Formen** entwickeln.

Die schmackhaften mimetischen Arten nun gehören so bestimmten Untergattungs-, Gattungs- und Familienverbänden an und haben eine so bestimmte geographische Verbreitung, dass die Gesetzmässigkeit dieser Beziehungen uns ebenfalls als eine der Stützen für die Berechtigung der Mimicry-Theorie dienen darf.

So kommen mimetische Formen unter den **Nymphalinen** vor: in der *Argynnis*-Gruppe bei *Argynnis* (indo-austral. und nearkt. Arten); in der *Melitaeen*-Gruppe bei *Phyciodes* (neotrop. Arten); in der *Diademmen*-Gruppe bei *Hypolimnas* (indo-austral. und afrikan. Arten) und bei *Victorina* (neotrop. Art); in der *Neptis*-Gruppe bei *Neptis* (austral. Art); in der *Limenitis*-Gruppe bei *Pseudaeraea*, *Euphaedra* (afrikan. Arten) und *Adelpha* (neotrop. Arten) und in der neotropischen *Anacae*-Gruppe (*Anaea*, *Prologonius*).

Sämmtliche mimetische **Satyrinen** gehören mit Ausnahme der afrikanischen *Elymnias*-Art (*E. Thegea* L.) dem indo-australischen Gebiet und den Gattungen *Elymnias*, *Zethera* und *Orinoma* an.

Während die mimetischen **Lycaeniden** sich auf das tropische Afrika beschränken, stossen wir auf nachahmende **Eryciniden** nur in dem Eldorado ihrer Entwicklung, in Südamerika. Weiter kommen mimetische **Pieriden** der Gattung *Eronia* in der indo-australischen und afrikanischen Region, solche der Gattung *Pieris* in allen drei tropischen und solche der Gattungen *Dismorphia* (*Leptalis*), *Archonias*, *Pereute* nur in der neotropischen Region vor. Endlich finden sich mimetische **Papilionen** in der Untergattung *Papilio* in allen, ausser der paläarktischen und in der Untergattung *Cosmodesmus* nur in den drei tropischen Regionen.

Die durchaus schmackhalten und zugleich mimetischen Heteroceren dürften sich vielleicht auf einzelne Castniiden und alle Sesiiden¹⁾, einzelne Macroglossen und die Spinner *Artaxa simulans*, die Diophtiden und die p. 73 angeführten Spanner und Tineiden beschränken.

Suchen wir nun das System der Schmetterlinge durch Aufzählung derjenigen Familien und grösseren Gruppenverbände zu ergänzen, in dem wir **weder immune noch mimetische Arten** finden, so erhalten wir unter den Tagfaltern nur die Brassoliden und Hesperiden, unter den Heteroceren die meisten Sphingiden, die meisten Gruppen der *Bombyces*, alle Noctuen, die meisten Spanner und Microlepidopteren.

Die neotropischen Brassoliden nun enthalten anscheinend deshalb keine mimetischen Arten, weil sie hauptsächlich nach Sonnenuntergang und nur selten freiwillig am Tage fliegen. Und die Hesperiden²⁾ sind, wie schon A. Seitz hervorhob, im Besitze eines so hoch ausgebildeten Flugvermögens und so flüchtig, dass es wenigen Feinden gelingt, sie im Fluge zu nehmen; ausserdem sind gerade manche grössere Formen dämmerungsliebend und die meisten Arten wie bei den Eryciniden zu klein, um den Modellen auch hinsichtlich der Grösse in etwas zu gleichen; weiter ist die Variationsfähigkeit bei ihnen

¹⁾ Die Larven beider Familien leben im Holz, wie die der unter den Käfern am meisten verfolgten Cerambyciden.

²⁾ Nach G. G. D. (Zool. Jahrbücher, Abth. f. Systematik I, p. 111 ff.) stellt eine blüthenbesuchende Spinne fast ausschliesslich Hesperiden nach.

sehr beschränkt. Die meisten¹⁾ schmackhaften *Bombigera*, SpHINGIDEN und fast alle *Noctuae*, die meisten Spanner und Microlepidopteren ruhen dagegen tags in möglichst ihrer Schutzmusterung entsprechender Umgebung und fliegen nur nachts, wo keine noch so täuschende Anpassung an widrige Modelle ihnen von Nutzen wäre.

Das blosse Vorhandensein als widrig erkannter und gemiedener Modelle selbst kann nach heutigen Ansichten über die Umbildung der Arten keine gleichgerichtete Anpassung einer anderen Art bewirken²⁾, sondern letztere muss von der variierenden Form selbst ausgehen, durch innere, in die Organisation tief eingreifende physiologische Vorgänge bedingt.

Ueber die besonderen Bedingungen, unter welchen eine mimetische Anpassung entstehen und sich zweckentsprechend ausbilden konnte, geben uns besonders einige „polymorphe“ Arten Aufschluss, bei welchen ausser dem männchenfärbigen noch eine oder mehrere mimetische Weibchenformen bekannt sind.

Das Vorkommen der mimetischen resp. der männchenfärbigen Weibchen neben einander oder sich gegenseitig ausschliessend ist nun meist auf bestimmte Verbreitungsbezirke der Art beschränkt. So sind, um zuerst die *Xyrophalina* zu besprechen, bei *Argynnis Argypus* Sparrn., einer weit von Indien bis Australien verbreiteten Art, bei der australischen Varietät *inconstans* Butlr. und der *var. Casleli* Oberth. (aus Trichonopoly, Südindien) männchenfärbige Weibchen nachgewiesen, welche von den meisten anderen Fundorten unbekannt sind, und beide Endformen werden durch Stücke aus Casmir verbunden. Weiter kommen bei *Hypolimnas Bolina* Cr. männchenfärbige Weibchen nach Dr. Standinger besonders in Cochinchina, Calcutta und den Andamanen vor, fehlen dagegen nach meinen Erfahrungen in Siam (Bangkok) und nach L. de Nicéville (Butt. of Ind. II, p. 124) auch in Indien, wo alle Weibchenformen vom Männchen abweichen und der Form *Jacynthia* Dru. entsprechen.³⁾

Unter den Satyriden kommt die bekannteste Art der Gattung *Elymnias*, *E. undularis* Dru., auf der Insel Singapur und auf Malacca in der *var. discrepans*, auf Borneo in der *var. nigrescens*, auf Timor in der *var. timorensis* nur in männchenfärbigen Weibchen vor, während z. B. alle weiblichen Stücke aus Siam, Vorderindien, Ceylon (*var. Protogenia* Cr.) vom Männchen durchaus verschieden sind.

Weiter kommt von Papilioniden *Pap. Merops* L. in Madagasear nur in der monomorphen geschwänzten Rasse (subsp. *Meriones* Feld.), vor; in Abyssynien bleibt die Art als subsp. *Antimorfi* Oberth. zwar in beiden Geschlechtern geschwänzt, doch treten neben der männchenfärbigen noch zwei in der Färbung und Zeichnung durchaus abweichende Weibchenformen auf, *var. nivicina* und *cuspinæ* Khöhl. In Mittel- und Südafrika endlich kommen wieder männchenfärbige, noch geschwänzte Weibchen vor und sind sämtliche Vertreter dieses Geschlechts, so z. B. die *var. Hippocoon* F., *Dionysos* Westw., *Trophonius* Westw. von dem Männchen so durchaus verschieden, so dass man erst in neuester Zeit, nach den Beobachtungen Trimen's und Wheale's, ihre Artzusammengehörigkeit zugestanden hat.

Ebenso besitzt *Pap. Turanus* L. in den nördlichen Staaten der Union nur männchenfärbige Weibchen. Mit der Verbreitung der Art nach dem Süden treten nach Walsh in Nord-Illinois neben einzelnen

¹⁾ Angenommen sind einige besonders flüchtige Formen, z. B. in Europa *Macroglossus* und *Aglio tau* L.

²⁾ Wie durch photochemische Reflexwirkung von Seiten der Modelle.

³⁾ Vielleicht dürften die von Dr. Standinger (Exot. Schmetterl. S. 137) erwähnten „männchenfärbigen Weibchen“ doch nur zu grossen, besonders während der trockenen Jahreszeit erscheinenden Form der Männchen gehören, wodurch jedenfalls die Untersuchung der Vorderlarsen den entscheidenden Aufschluss geben würde.

gelben fünf- bis sechsmal so viele vom Männchen durchaus abweichende dunkle Weibchenformen auf, und schon in Süd-Illinois scheinen die gelben Formen ausgestorben zu sein. So findet man im Süden des Gebietes nur die dunklere Varietät (v. *Glaucus* L.), welche die ursprünglichere männchenfärbige Weibchenform vollkommen verdrängt hat.

Vielleicht gilt dasselbe für den südlicher auftretenden *P. Polycaon* Cr.

Auch bei einem Segelfalter, *P. (Cosm.) Nauticles* Bates (Guatemala etc.) kommt ausser der ursprünglichen Weibchenform im Süden des Verbreitungsgebietes, in Panama, eine verdunkelte abweichende Varietät desselben Geschlechts, var. *Philonora*, vor.

Forschen wir nun nach den Ursachen, welche diese Abweichungen des Weibchens von der Tracht der Art veranlassten, so dürfen wir wenigstens für *Pap. Merope* L. und *P. Turanus* L. nach den Auseinandersetzungen des I. Theiles dieser Arbeit mit Sicherheit annehmen, dass die heute noch erhaltenen Spuren der Entstehung beider Arten nach dem Punkte ihres Verbreitungsgebietes hinweisen, in dem sie heute noch monomorph sind. Wie *P. Turanus* in Nordamerika, ist auch die madagassische Inselform von *P. Merope*, subsp. *Merionis* Feld., sehr häufig, nach Mabilhe¹⁾ sogar „gemein.“²⁾ Aehnliches gilt, soviel meine Erfahrungen ein Urtheil erlauben, für die Singapurform der *Elymnias undularis* Dru., die ich zahlreich längs der Waldwege dahinfliegen sah. Dasselbe gilt vielleicht für einige der übrigen polymorphen Arten von *Papilio*, so für *P. Pomonon* L. an den Orten, an welchen nur männchenfärbige Weibchen vorkommen. Leider fehlen für die meisten Arten genauere Notizen über diesen wichtigen Punkt.

Mit der Verbreitung des *P. Merope* und des *P. Turanus* nach Süden scheinen sich nun die günstigen Existenzverhältnisse, welche im ursprünglichen Gebiete die monomorphe Art in hoher Individuenzahl erhielten, zu ändern. Wahrscheinlich trug hierzu besonders eine zunehmende Spärlichkeit der sonst als Raupennahrung dienenden Futterpflanze bei, welche die Unterbringung aller Eier seitens des legereifen Weibchens erschwerte und nicht die Ernährung aller Jugendstadien gestattete. Dadurch konnte ein Zustand des Nahrungsmangels eintreten, dessen Resultat nach Düsing im Allgemeinen das Vorwiegen des männlichen Geschlechts ist. Letzteres ist aber untrennbar verbunden mit der relativen Abnahme des weiblichen: so erklärt sich die grössere Seltenheit des weiblichen Geschlechts, wie wir es z. B. bei den Tagfaltern mit wenigen Ausnahmen so häufig ausgesprochen finden.³⁾

Zu solchen ungünstigen Ernährungsverhältnissen kam wahrscheinlich noch ein neuer oekologischer Factor hinzu: die sich mehrenden Angriffe hartnäckiger, zum Theil erst neu auftretender Feinde der Art.

Im Allgemeinen nimmt die Erbitterung des Kampfes um die Existenz schon mit dem Herantreten an die Wendekreise zu und findet ihren Höhepunkt in Thier- und Pflanzenwelt in den Tropen, bedingt hauptsächlich durch die vielseitigere und raffinirtere Entfaltung, wenn oft auch kürzere Dauer der Lebensfähigkeit. So nimmt denn auch vor Allem die Zahl der insectenfressenden Vögel, Eidechsen, Raubinsecten und wahrscheinlich auch diejenige der Schlupfwespen und Raupenfiegen zu.

¹⁾ P. Mabilhe, Hist. des Lepidoptères de Madagascar 1886, p. 8.

²⁾ Merkwürdigerweise habe ich kein der Insel eigenenthümliches Beispiel von Mimicry aus der madagassischen Fauna auffinden können, was ich für einen Beweis für die Entstehung der Mimicry durch sociologische, nicht physikalisch-chemische Lokaleinflüsse halte.

³⁾ Allerdings geben Zimmerzuchten oft ein von den im Freien herrschenden Verhältnissen abweichendes Resultat.

Wahrscheinlich war es auch der fliegende Falter, der unter den Angriffen z. B. der Vögel litt. Ich führe dafür von den erwähnten Arten nach den wenigen vorliegenden Literaturangaben nochmals an, dass *P. Turnus* nach Edwards von einem Kuckuck genommen, *P. Meropé* von einer Tchitrea verfolgt und dass nach A. Arnold *P. Pommon* von Vögeln gefressen wurde. Dass diese Angriffe der Artfeinde sich besonders auf das Weibchen richten werden, ist daraus erklärlich, dass dieses, besonders wenn es nach der Befruchtung mit prall von Eiern erfülltem schweren Hinterleibe die einzelnen für die Raupe geeigneten Futterpflanzen zur Eiablage aufsucht, ebenso durch seinen schwerfälligeren Flug wie als anscheinend fetterer Bissen die Aufmerksamkeit der Vögel erregen muss, deren Angriffen es schwerer als das stets schnellere Männchen entgeht.

So sind nach A. R. Wallace (Darwinism p. 248) in den Prärien, wo das dunkle *Turnus*-Weibchen fliegt, die insectivoren Vögel besonders zahlreich.

Daher wird es erklärlich, dass eine neu eingewanderte Art, ehe sie sich den herrschenden Lokalinflüssen angepasst, durch diese Angriffe und ungünstigen Ernährungsbedingungen in ihrer Individuenzahl so leiden konnte, dass sie dem Aussterben nahe war. Die zunehmende Seltenheit liess es endlich nicht mehr vermeiden, dass Kreuzungen zwischen blutsverwandten Individuen eintreten mussten, durch welche die Zahl der Keime und wahrscheinlich auch der weiblichen Geburten nicht nur vermindert, sondern auch besonders das weibliche Geschlecht in seiner Lebenskräftigkeit krankhaft gestört wurde. In dieser Zwangslage nun begann bei den Arten, welche einer Varietätenbildung überhaupt fähig waren, eine reiche Bildung von Spielarten des Weibchens, die theilweise zuerst auf secundärer Verdunkelung der Flügel¹⁾ beruhten (centralamerikanische Rinnenfalter), welche das Thier unauffälliger machte.

Zu den besonderen Eigenthümlichkeiten des neuen tropischen Aufenthaltsortes tritt nun noch ein oekologischer Factor hinzu, welcher die Erhaltung bestimmter Variationen im Verhältnisse zu den übrigen begünstigte: das Vorhandensein charakteristisch gefärbter, in grossen Mengen auftretender einheimischer tagfliegender Schmetterlinge, welche von den einheimischen Vögeln bereits ihrem Aeusseren nach als widrig schmeckend erkannt und von ihnen gemieden waren. So musste eine Varietät vor den übrigen Formen der immer noch sehr seltenen Art gegen die Angriffe der Falterfeinde relativ mehr gesichert sein, je mehr sie den immunen Arten gleich.

Eine Untersuchung über die äusserlichen Vorgänge, welche die Umwandlung der noch nicht mimetischen in die mimetische Weibchenform bewirkten, wird sich natürlich auf diejenigen Formen am besten stützen, welche noch männchenfärbige Weibchen besitzen.

Um wieder der im descriptiven Theil inne gehaltenen systematischen Anordnung zu folgen, so treffen wir unter den Nymphalinen bei *Argyropis Argyrus* Sparrm. in der am weitesten verbreiteten Form des selteneren Weibchens *Niphe* L. eine unvollkommene Anpassung an den gemeinen mit ihr zusammen vorkommenden *Dau. Chrysippus* L. Bei *var. Niphe* nun treten anscheinend hauptsächlich Rückschlagserscheinungen auf eine schwärzliche mit weisser Subapicalbinde gezielte Vorform auf, wie sie uns in

¹⁾ Wir haben in dieser Schwarzung wohl eine Reaction des krankhaft empfindlichen Organismus auf die pestischen physikalisch-chemischen Einflüsse des kälteren Klimas zu vermuthen.

manchen *Cethosien*-Weibchen¹⁾ vorliegt, doch ist die Verdunkelung wie bei dem Modell auf die Spitze des Vorderflügels beschränkt, besondere Anpassungsmittel aber kaum entwickelt.

Bei der Satyride *Elymnias undularis* Dru. sind die vier weissen Aussenrandtupfel auf den Hinterflügeln der an *Dan. Gemalia* Cr. angepassten weiblichen Varietät *Protopseia* F. als Fortsetzung der noch bei der Gattung *Corades* deutlichen Vorderflügelbinde wohl ebenfalls ein Product des Rückschlages, das in den Dienst der Anpassung getreten ist. Dagegen ist die eigenartige fuchsrothe Farbe der Flügelmitte, welche durch den schwarzen Innenrandsstreif der Vorderflügel getrennt wird, nebst der leuchtend weissen Farbe der Submarginallbinde der Vorderflügel in schwarzem Felde nur als secundäre Färbungsanpassung an die rothbraunen Danaer der Untergattung *Auosia* anzusehen.

In der That sind nun diejenigen Umbildungserscheinungen, welche wir als secundäre Färbungsanpassung bezeichneten, zumal sie meist auf der bei Tagfaltern im Allgemeinen stärker variirenden Oberseite der Flügel auftreten, in viel höherem Grade specieller Anpassung fähig als die relativ beständigeren durch Rückschlag entstandenen Zeichnungselemente.

In Folge der entsprechend wechselnden Färbung der speciellen Modelle passten sich denn auch die Weibchen der verschiedenen Lokalformen von *El. undularis* auf Java nach A. Seitz dem dort häufigen *Dan. Melanippus* Cr., in Burma dem *Dan. Hesperippus* Cr. an. Die Lebensweise der mimetischen Weibchen unterscheidet sich nun dadurch von der der Männchen, dass sie sich weniger an offenen Wegen, als an freien bebuschten Plätzen aufhalten, auf denen zahlreiche *Danaer* fliegen, und sich bei Verfolgung in ein Gebüsch schlagen, in dem die ausgebildete Schutzfärbung der Unterseite sie einem trockenen Blatte gleichen lässt. Ihre Aehnlichkeit im Fluge mit den Modellen ist so täuschend, dass ich sie erst allmählig unter den Danaern herausfinden lernte.

Im März dieses Jahres erbeutete ich am Kau Sabab bei Chantaboon (Siam) auch die zuerst von L. de Nicéville aus Burma erwähnte Varietät des *Undularis*-Weibchens mit weisslich aufgehellten Hinterflügeln, welche wir als v. *Hesperippoides* bezeichnen können. Zugleich beobachtete ich, dass am selben Orte eigenthümlicherweise die sonst, in Siam seltenere var. *Hesperippus* Cr. des *Dan. Gemalia* Cr., die sich ebenfalls durch kreideweiss aufgehellte Hinterflügel auszeichnet, viel häufiger war, als die braunflügelige Form. Ausserdem fiel mir auf, dass die *Undularis*-Weibchen am Kau Sabab im Verhältniss zu den vielen meist paarweise herumspielenden Männchen bedeutend seltener waren, als ich das sonst beobachtete.

Aus den vielen polymorphen *Papilio*-Arten, wegen deren ich auf Theil I, S. 41—51 verweise, greife ich als am leichtesten zugängliche Art den *Pap. Pammon* L. heraus. Wie sich das noch an den heute erhaltenen Formen stufenweise verfolgen lässt, schliessen sich an die kaum vom Männchen abweichenden Varietäten mit nur schwächer verdunkelter Deckfärbung der Flügel andere Formen mit allmählig zunehmender Aufhellung der Hinterflügel an, bei denen die Randmonde der Unterseite orangeroth auch auf die Oberseite „durchtreten.“ Endlich tritt durch weiteren Rückschlag auf den Hinterflügeln noch ein Innenrest der sonst nur bei ursprünglicheren Formen der Rinnenfalter vorkommenden weissen Mittel-

¹⁾ Erwähnen will ich hier, dass das Männchen von *Cethosia Cyana* Dru. eine grossere bis auf die Leibefarbe ausgehellte Aehnlichkeit mit *Dan. Chrysippus* hat, als das abweichende schwarzweissliche Weibchen. Es ist dies der einzige mir bekannte Fall, in dem das Männchen einer übrigens wohl selbst immunen Art einer mit ihm zusammen vorkommenden ebenfalls widrigen Form ähnlicher ist als das Weibchen. Wir dürfen hier natürlich nur an eine selbstständig entwickelte Convergence denken, da die fuchsrothe Färbung für so viele Männchen der *Argynnis*-Gruppe charakteristisch ist.

binde auf und so entsteht die Form *Polytes* L., die zugleich eine Nachahmung von *Ph. aristolochiae* F. darstellt. Als reine Färbungsanpassung haben wir dagegen z. B. die sekundäre Verdunkelung der Hinterflügel bei der var. *Romanus* anzusehen, deren Modell der *Ph. Hector* L. ist, während das Auftreten der hellen Vorderflügelbinde wiederum als in den Dienst der Anpassung tretende Rückschlagerscheinung zu deuten wäre.

Wie die *Elgynius*-Art kommt auch der *P. Pannoni* in Siam nur in der mimetischen bedeutend selteneren Weibchenform var. *Polytes* L. vor, welche sich im Fluge von ihrem Modell, *P. (Pharm.) aristolochiae* var. *Diphilus* Esp., mit dem sie besonders häufig an Leguminosenblüthen (*Caesalpinia pubescens*) zusammen getroffen wird, nur durch die schwarze Leibfarbe und das bei Verfolgung flüchtigerer Beutetiere unterscheiden lässt. Auf Singapur dagegen findet man in ungefährr gleicher Zahl männchenfärbige und Weibchen der *Polytes*-Form, obwohl der Aristolochienfalter fehlt. Es wäre der Mühe werth festzustellen, ob die unstreitig eingewanderte mimetische Form allmählig dort aussterben wird. — In grösseren Höhen des Himalaya, wo der Aristolochienfalter wohl fehlen dürfte, kommt ebenfalls nur die männchenfärbige ursprüngliche Form vor, während die Weibchen in den heissen Thälern derselben Gegend im Kleide des Aristolochienfalters erscheinen, der wahrscheinlich selbst nur selten über 1000 Fuss hinausgeht. Leider fehlen bei dieser Notiz J. H. Hooking's, welche Distant¹⁾ als Beweis, dass die „variation somewhat of a seasonal nature“ ist, mitgetheilt hat, die Angaben über das Modell.

Es wäre nun sehr interessant, die mimetischen und die nicht mimetischen Weibchen darauf hin zu untersuchen, ob erstere nicht vielleicht eine geringere Anzahl von reifen²⁾ Eiern oder von Eikeimen überhaupt enthalten. Die von mir untersuchten *Pannoni*-Weibchen in Bangkok, ebenso die von *Elgynius undulatus* hatten von letzteren stets nur 20–30, so dass schon die geringe Fruchtbarkeit der Art eine grössere Sicherheit des befruchteten Weibchens bedingen muss.

Dass aber in der That die Verbreitung der widrigen Modelle die Anpassung der mimetischen Weibchen bestimmt, indem zugleich Rückschlags- mit Anpassungserscheinungen vereinigt werden können, sehen wir am schönsten bei *P. Merope* L.

Ein Vergleich der auf Taf. I, Fig. 1–3 abgebildeten weiblichen Formen der *subsp. Antiarü* Oberth. zeigt uns eine „bis auf den Tüpfel“ vollkommene Uebereinstimmung der Zeichnung bei beiden so durchaus verschieden gefärbten abweichenden Weibchen (Fig. 2 und 3). Diese Zeichnung unterscheidet sich von der des männchenfärbigen Weibchens (Fig. 1) vor allem durch grössere Regelmässigkeit und erinnert, mehr noch als an die der madagassischen *subsp. Meriones*, von der sich *subsp. Antiarü* durch stärkere distale Aufhellung und Erlöschen der dunklen Bänder entfernt, an den Stammformen der *Merope*-Gr. nahestehende Arten, wie *P. var. Thersander* F., die ursprüngliche, an die monomorphe *Constantinus*-Gruppe erinnernde Weibchenform von *P. Phorcas* F. So nehme ich an, dass Formen wie die abyssinischen var. *marina* Kheil und var. *ruspinus* Kheil entstanden, indem Weibchen von dem Typus der Fig. 1 zuerst nur in der Zeichnung auf die den mimetischen Varietäten gemeinsame Urform der letzteren zurückschlugen und dass die gelbgefärbten Formen unter ihnen im Kampfe um die Existenz wohl ausstarben, während die unter afrikanischer Sonne zuerst wohl weniger auffällig, dann intensiver weiss (var. *Narina*) oder ziegel-

¹⁾ W. L. Distant, Rhopalocera Malayana, London 1882–86, p. 349.

²⁾ In diesem Falle d. h. wenn die Eiablage nur langsam und allmählig vor sich geht, durch die mimetische Anpassung besonders die längere Sicherheit vor Feinden bewirken.

roth (var. *ruspina**) gefärbten Varietäten durch die wenn auch zuerst geringe Aehnlichkeit mit den Modellen (*Amauris Niarcia* und *Danaus Chrysippus*) als in gewissem Grade besser geschützt erhalten blieben.

Bisher kennen wir keine Weibchenformen des *P. Merops* aus Central- oder Südafrika, welche noch den Hinterflügelschwanz führte, der die abessynische Rasse *Antinorii* Oberth. und die madagassische monomorphe Rasse (*Meriones* Feld.) wie die Vorfahren der Gruppe auszeichnete. Der Wegfall dieses die Aehnlichkeit mit den Modellen nur störenden Anhängsels ist aber als wesentlicher Vortheil für die mimetischen mit der Verbreitung nach Süden seltener werdenden Weibchen anzusehen, da er die Aehnlichkeit mit den Danaern bedeutend erhöht. Zudem liegt, wie ich im I. Theil zeigte, in der Abrundung der Hinterflügel ein in dem Entwicklungsgange der Papilionen allgemein ausgesprochenes Umwandlungsprincip und, wenigstens hier, ein allerdings von dem Weibchen gemachter Entwicklungsfortschritt, der als Wirkung natürlicher Auslese erklärbar ist.

Die Formen mit abgerundeten Hinterflügeln zeigen neben geringen Andeutungen eines weiter zurückgreifenden Rückschlages (Marginalmond im 6. Vorderrandsfelde der Vorderflügel), dessen Auftreten ebenfalls für die Vermehrung der Aehnlichkeit mit den Modellen von Nutzen ist, besonders vortheilhafte Anpassungen der Färbung an die charakteristischen Aeusserlichkeiten der Modelle ihres bestimmten Aufenthaltsortes, welche endlich bei den südlichsten Formen die grösstmögliche Aehnlichkeit der var. *Cenea* Stoll mit *Amauris Echeria* Stoll und der var. *Hippocooides* mit der *A. Niarcia* var. *dominivana* Tr. hervorrufen.

Aehnlich passte sich auch das mimetische *Tarucus*-Weibchen, var. *Glaucus* L., welches an und für sich viel seltener als das männchenfärbige Weibchen ist, dem im Süden seines Verbreitungsgebietes häufigen Aristolochienfalter (*Ph. Philetor* L.) besonders durch die secundäre Verdunkelung der ursprünglich vorhandenen, theilweise an der Unterseite noch erkennbaren schwefelgelben Binden und die Entwicklung des Blauschillers auf der Oberseite der Hinterflügel an.

Einen Uebergang von den polymorphen zu denjenigen Arten, welche nur mimetische Weibchen besitzen, bildet der indische *Pap. Castor* Westw. Die von den Molukken bis Indien verbreitete *Severus*-Untergruppe der Rinnenfalter (I, p. 45) enthält kräftige, in beiden Geschlechtern einen starken Hinterflügelschwanz tragende Arten mit tiefschwarzer, meist nur durch einen weissen leuchtenden Spiegel am Vorderrande der hinteren Flügel unterbrochener Färbung. Ueber Formen zwischen *P. Nephelus* Bsd. (Celebes, Borneo etc.) und *P. Chiton* Westw. (Borneo, Siam, Malacca) ging wohl *P. Castor* Westw. (N.-O.-Indien, Siam) hervor, dessen Männchen noch durchaus die Färbung der Stammgruppe besitzt und sich in der Flügelform nur durch die etwas variable zahnartige Reduction des Hinterflügelschwanzes als abgeleitete Art der Untergruppe darstellt.

Bei dem Weibchen (*Pallax* Westw.) dagegen weicht die Flügelform von der des Männchens, welche letztere die der Gruppe ursprünglich zukommende darstellt, vor Allem durch die am Aussenrande statt concav ausgeschnittenen, eher convex zugerundeten Vorderflügel ab; zugleich sind die Hinterflügel kürzer und breiter als bei dem Männchen und im Innenfelde stärker erweitert. Nach J. Wood-Mason²⁾ kommen nun

¹⁾ Die var. *ruspina* erinnert auch zugleich etwas an das charakteristische afrikanische Kleid der *Atis Helice* Cr., deren Nachahmer *Euphyedra Ruspina* Hew. (*Nymphalid.*) von Kheil als Modell für die rothe *Antinorii*-Varietät angesehen wurde, weshalb er letztere „*Ruspina*“ benannte.

²⁾ J. Wood-Mason. On a new species of Papilio from South India with remarks on the species allied thereto (Journ. As. Soc. Bengal, Calcutta Vol. XLIX, Part. II. 1889, p. 114—119) m. 2 Taf.

Weibchenformen mit und solche ohne zahnförmigen Schwanz am 3. Medianast der Hinterflügel vor, von denen ich erstere für ursprünglicher halte. Denn dass die Verbreiterung und die vollkommene Abrundung der Hinterflügel eine von Seiten des Weibchens angebahnte Anpassungserscheinung an die breitflügeligen langsam fliegenden Danaer ist, sehen wir aus der Färbung dieses Geschlechts, die von der des Männchens durchaus abweicht. So tragen die Vorderflügel eine dem Männchen fehlende etwas unregelmässig ausgebildete Randtüpfelreihe und einen einzelnen Tüpfel am Zellende. Auf der Oberseite der Hinterflügel dagegen wird der abgekürzte Spiegel der Männchen durch eine breite, durchgehende gleichmässige Aufhellung des Discus ersetzt; zugleich treten die Marginalmonde der Hinterflügel auch auf der Oberseite hervor, während die Limbalmonde beider Flügelpaare sich erweitern. Dadurch besitzt das Weibchen eine durch die matte Färbung noch verstärkte Aehnlichkeit mit Arten von *Danaus*, bes. *D. (Tirant.) Linniaee* Cr. Müssen wir nun die Färbung und Flügelform als secundäre Anpassungserscheinungen an das Modell ansehen, so lässt sich die Zeichnung wiederum als Product eines Rückschlages auf ursprünglichere Rinnenfalter ansehen, welche noch den Rest einer Zell- und eine durchgehende Randbinde auf den Vorderflügeln trugen.

Viel häufiger sind die Arten, bei welchen, soviel bisher bekannt¹⁾, die männchenfärbigen Weibchen ganz ausfallen und nur noch mimetisch angepasste vorkommen.

Hierher gehören, um nur die wichtigsten Arten zu erwähnen, an Nymphaliden²⁾ *Argynnis Sagana* Dbl. (Ostasien) und *A. Diana* Cr. (südl. vereinigte Staaten); *Hypolimnion Missippos* L. (Asien, Afrika) und zahlreiche Arten derselben Gattung aus der indo-australischen Region; *Euripus Halilhereses* Dbl., ebendaher und *Euphaedra Zampa* Westw. und *Eu. Eleas* Dru. aus Afrika.

An Satyriden gehören hierher zahlreiche, mit einer Ausnahme (*E. Phagea* L. Afrika) indo-australische Arten von *Elgynias*, sowie *Zethenia Pimpla* Er. und *Z. Masa* Feld., welche mehrere mimetische Weibchenformen besitzen und auf die Philippinen und Celebes beschränkt sind.

Unter den Eryciniden sei von den zahlreichen ausschliesslich neotropischen Arten, welche mimetische Weibchenformen besitzen, nur auf die der Gattung *Arctoris* und *Keonidia* hingewiesen.

Unter den Pieriden treffen wir mimetische Weibchenformen bei den meisten Arten von *Eronia* (indo-australische und afrikanische Region) und besonders ausgebildet in der neotropischen Fauna. Die zu letzterer gehörigen Arten sind dadurch besonders interessant, dass in den Gattungen, welchen sie angehören (bes. *Archonias* Hb. und *Pervate* Herr-Schäff.) zwar bisher noch keine polymorphen Formen mit männchenfärbigen und mimetischen Weibchen nachgewiesen wurden, aber doch zahlreiche monomorphe und zugleich ursprüngliche Arten vorkommen, welchen auch die Männchen der im anderen Geschlecht mimetischen Formen gleichen. So bilden diese Gattungen ein fast ebenso günstiges Beweismaterial für die These, dass jede mimetische Anpassung von Seiten der Weibchen ausging, als die Papilionen.

Weitere Beispiele liefern uns die Anpassungen an Danainen, Acraeinen und Heliconinen³⁾ unter den Rinnenfallern. Unter den Vertretern der afrikanischen Region erinnert nur das seltene Weibchen des zur *Oribazus*-Gr. gehörigen *P. disparilis* Bsd. oberflächlich an Euploeen; ebenso gleicht nur das Weib-

¹⁾ Sicherlich werden diese Fälle mit dem Fortschritt unserer Kenntniss der Exoten stark vermindert werden.

²⁾ Wahrscheinlich gehören hierher auch gewisse centralamerikanische Arten von *Phyciodes*.

³⁾ Für die Anpassungen an die Aristolochienfalter verweise ich auf das vorhergehende Capitel.

chen von *P. Cyorta* F. der *Aeraca quae* L. und dasselbe Geschlecht des nahe verwandten *P. echeioides* Tr. der *Amaris echeia* F.

In der auf der Oberseite undeutlich an *Heliconius Melpomene* L. erinnernden abweichenden Weibchenform der var. *Zadachi* Dew. des *Pap. Carzies* Westw. finden wir einen deutlichen Fingerzeig dafür, dass bei dem sich unmittelbar anschliessenden *Pap. caterpinus* Hew. (Ecuador)¹⁾ die Anpassung an den Heliconier, welche bereits auf beide Geschlechter des Rinnenfalters übergieng, ebenfalls vom Weibchen erworben wurde. Dass dies auch bei den Anpassungen der indischen *Cosmodesus*-Arten an Danaiden geschehen sein wird, erschen wir aus der bereits im I. Theil angeführten Thatsache, dass ausschliesslich das Weibchen des *P. (C.) Xenacles* Dbld. durch die lebhaftere Bräunung der Hinterflügel dem *Danaus Tyfius* L. (Sikkim) gleicht und das Weibchen von *P. (C.) Laobocus* de Haan durch die schärfer ausgeprägte Fleckung der *Ideopsis Daos* Bsd. bei weitem ähnlicher ist als das Männchen.

Dass in vielen Fällen die für das Weibchen werthvolle Erwerbung sich allmählig auf das Männchen übertrug, beweist besonders das von Butler angeführte Männchen von *Argyrops Argyrops* Sparrn. aus Formosa mit schon theilweise erkennbarer *Danaus*-Färbung und die von Forbes erwähnten Männchen des *Hypolimnys anomala* Wall. (British Museum): „die fast ebensoviel Blau als die Weibchen haben.“ Auch von dem siamesischen *Hyp. Bolina* L. besitze ich Männchen, welche die breiten weissen Hinterflügelbinden der mimetischen Weibchen bereits führen.

Die weitere Ausbildung und Uebertragung vortheilhafter, mimetischer, theils in Anpassung, theils durch Rückschlag vom Weibchen erworbener Eigenthümlichkeiten der Zeichnung und Flügelform lässt sich besonders schön an den die *Castor*- mit der *Panope*-Gruppe verbindenden Arten der Rinnenfalter verfolgen. So trägt bei *P. Mahadera* Moore (Tenasserim) das Männchen auf den Hinterflügeln innerhalb der Marginalmonde schon eine scharf umschriebene durchgehende Aussenzellbinde, welche derjenigen ursprünglicherer Formen (z. B. der *Capaneus*-Gruppe) homolog ist, dagegen entspricht die Zeichnung der Vorderflügel noch der von *P. Castor* Westw. ♀. Einen weiteren Fortschritt in der Annäherung der männlichen an die schützende mimetische Tracht des Weibchens finden wir bei *P. Mhala* Moore (Burma), bei welchem der bei *Castor* ♀ erwähnte weisse Zellrandtüpfel der Vorderflügel sich auf das Männchen ausdehnt, während das Weibchen durch die erweiterte Aufhellung der Hinterflügel sich an *Castor* ♀ anschliesst.

Eine noch höhere Entwicklungsstufe nimmt *P. Davidarna* Wood-Mason (Südlindien) ein, denn hier trägt endlich auch das Männchen auf den Vorderflügeln die Reihe weisser Randtüpfel, welche wir zuerst bei *Castor* ♀ feststellten. Zugleich stimmen beide Geschlechter auch in der Zeichnung durchaus überein, nur ist die Aufhellung bei dem Weibchen matter und die Tüpfel strohfarben.

So entsteht eine gewisse, bei dem Weibchen stärker ausgebildete Aehnlichkeit mit braunen, weisse Randtüpfel tragenden *Euploea*, wie *Eupl. Core* L.

Wie flüssig noch die Färbung gewisser Arten der *Panope*-Gruppe ist, sehen wir an *P. Panope* L. selbst, bei dem im Westen des Verbreitungsgebietes nur die braune, der *Euploea Core* L. ähnliche Form, im Osten dagegen neben dieser, anscheinend ebenfalls in beiden Geschlechtern, noch weisslich aufgehellte Stücke vorkommen, welche mehr an *Castor* ♀ erinnern und hellgefärbten Danaern der östlich weit verbreiteten *Similis*-Gruppe gleichen.

¹⁾ Durch Versehen ist die diesen Falter behandelnde Stelle in Theil I. p. 91 statt hinter den ersten Absatz dieser Seite, wohin sie gehört, hinter den zweiten gesetzt worden.

Die Vererbung der seitens der Weibchen erworbenen mimetischen Anpassung auf das Männchen findet anscheinend erst in solchen Fällen statt, wo letztere bei dem Weibchen auf beiden Seiten bereits genügend entwickelt ist, um die Feinde der Art zu täuschen. Zuweilen geschieht diese Vererbung derart, dass die mimetische Anpassung zuerst auf der Unterseite eintritt. So trägt das Männchen von *Euphaedra Zampa* Westw. die auf der Oberseite des Weibchens entwickelte *Helis*-Färbung, so führen die Männchen mimetischer *Percebybris*-Arten (*Malenka* Cr., *Lorena* Hew.) die *Lycorca*-Tracht nur auf der Unterseite der Hinterflügel.

Von den zahlreichen in beiden Geschlechtern mimetischen Formen seien hier nur die wichtigsten Vertreter derjenigen Gattungen angeführt, von welchen wir bereits ausschliesslich im weiblichen Geschlecht mimetische Arten besprochen haben.

Hierher gehören an Nymphalinen die mimetischen Arten der rein afrikanischen Untergattung *Euridia*, die ebenfalls afrikanischen *Euphaedra ruspina* Hew. und *Eu. Zaddachi* Dew., einige indische *Euripus*- und neotropische *Phyciodes*-Arten; an *Satyrinen* die zur Untergattung *Aenechania* Hew. gestellten *Zethenia*-Arten und *Z. diademoides* Moore der indo-australischen Region; an Pieriden besonders viele der stärker modifizierten *Dismorphia*-Arten,¹⁾ die Arten der *Tereus*- und *Bellona*-Gruppe von *Archonias* und *Prerele Leucodrosina* Koll., welche sämmtlich in der neotropischen Region leben.

Ebendahn gehören auch an Papilionen, um von den Anpassungen der neotropischen Segelfalter an die Aristolochienfalter abzusehen, die sich an Acraeae und Danainen anschliessenden mimetischen Formen der afrikanischen und indo-australischen Arten der *Zelides*-Cohorte von *Cosmodemus*, soweit sie nicht schon auf voriger Seite erwähnt waren. Weiter gehört hierher von afrikanischen Rinnenfaltern die *Rea*- und *Antimachus*-Gr., von indisch-australischen die *Panope*-Gr. mit *P. Cavaus* Westw. und *P. paradurus* Zinck. etc., endlich der südamerikanischen *P. enterpinus* Hew. und die Arten der neotropischen *Zagreus*-Gruppe.²⁾

So dürfen wir wohl den Schluss ziehen, dass auch bei den von uns als mimetisch angesehenen monomorphen Arten, welche zu anderen als den bisher besprochenen Gattungen gehören, die mimetische Anpassung von Seiten der Weibchen ausging, obwohl es uns nach der jetzigen Höhe der Entwicklung der Arten und dem heutigen Stande unserer Kenntniss nicht möglich ist, diesen Nachweis für alle Formen zu führen.

Hierher gehören vor Allem an Nymphalinen die mimetischen Arten der indischen Gattung *Hestina*, die der afrikanischen Gattung *Pseudacraea*, die nordamerikanischen mimetischen Arten von *Limnitis*, die neotropische *Victorina Shenckels*, gewisse *Adelpha*-, und die ebenfalls neotropischen *Prologonias*-Arten; an Satyrinen die Arten der indischen Gattung *Orianna*. Weiter gehört hierher der grösste Theil der mimetischen Eryciniden, alle mimetischen Lycaoniden, die meisten mimetischen Pieriden der Gattung *Pieris* und *Prioneris* und alle schmackhaften mimetischen Heterocerereen.

Nach vorangegangener Besprechung sind wir auch im Stande anzugeben, ob die mimetische Anpassung zuerst am fliegenden oder ruhenden Thier, auf der Ober- oder der Unter-

¹⁾ Während die Aehnlichkeit der Weibchen mit den Modellen in den abgeleiteten Gruppen dieser Gattung geradezu vollkommen ist, wird die der Männchen hier durch die Entwicklung der ausgebildeten Dufteinrichtung auf der Oberseite des Hinterflügel, in deren Dienst auch die Vorderflügelunterseite tritt, stark beeinträchtigt.

²⁾ Der eigenthümlicher Weise vor dem Zellende ausgehende 3. Radialast der Vorderflügel bei der *Zagreus* Gr. wie der in den Hinterflügelsschwanz hineintretende vorderste Cubitalast des chinesischen *Pap. Ebaesii* lassen sich bei diesen peripherischen Arten wohl als Zeichen einer weitgreifenden Rückschlagbildung auf ursprünglichere Rinnenfalter auffassen, die sich auch im Geäder ausspricht.

seite der Flügel entstand. Im Allgemeinen dürfte die ersterwähnte Annahme Geltung haben. So sehen wir bei den ursprünglicheren Arten von *Elymnias*, der einzigen Gattung mit mimetischen, auf der Unterseite eine ausgebildete Schutzmusterung besitzenden Weibchen, diese mehr oder weniger beibehalten und damit die Gewohnheit verbunden, sich bei Verfolgung ins Laubwerk zu schlagen. Nur bei denjenigen Arten, welche sich an die auf der Unterseite der Hinterflügel so grell gezeichneten Formen von *D. lias* anpassten, musste auch diese Färbung frühzeitig auf der Unterseite entstehen, um die Ähnlichkeit überhaupt hervorrufen zu können. Bei den Euploeen-Nachahmern hingegen lässt sich ihre allmähliche Entwicklung aus der Schutzfärbung noch deutlich verfolgen.

Weiter gleicht das mimetische Weibchen der kleinen neotropischen Pieride *Acemonias Potanica* Butl. nur auf der Oberseite dem Modell *Acraea nox* Bates (*leucomelas* Bates). Auch die Arten der neotropischen Nymphalidengattung *Protogonius* gleichen in beiden Geschlechtern ihren Modellen (*Heliconius cyerale* etc.) ebenfalls nur auf der Oberseite, während die Unterseite die in der Gruppe weit verbreitete Schutzfärbung und Flügelform beibehalten hat, welche das ruhende Thier einem verwelkten noch am Stengel festsitzenden braunen Blatt so täuschend ähnlich erscheinen lässt.

Eine interessante Ausnahme von der eben aufgestellten Regel bilden die afrikanischen Rinnenfalter der *Zenobita*-Gruppe, deren Unterseite bereits in beiden Geschlechtern, am ausgebildetsten allerdings bei der kleinsten und seltensten Art, bei *P. Cyprista* F., an die des ruhenden Weibchens der *Acraea gaea* L. erinnert, wofür man die Abbildungen auf Taf. III, deren Fig. 19 auch für das Männchen gelten kann, vergleichen wolle. Bei dem Weibchen von *P. Cyprista* F. (*Boisduvalianus* Westw.) tritt die für die Art-erhaltung so vortheilhafte Ähnlichkeit mit dem wüthigen Modell endlich auch auf der Oberseite auf und damit auch im Fluge in Wirkung.

Unter den in beiden Geschlechtern mimetischen Arten haben wir neben recht häufigen auch die seltensten Formen der Nachahmer zu verzeichnen. Im Allgemeinen gilt aber der Satz, dass eine Art, je seltener sie ist, auch desto mehr in Flug, Grösse und Zeichnung ihrem Modelle gleicht. Als Beispiele hierfür führe ich den erst einmal bisher gefangenen *Pap. rex* Oberth. die Arten der *Zagreus*-Gruppe und von Segelfaltern den schönen *P. (Cosmod.) uloides* Hew. an. Es wäre von besonderem Interesse, zu erfahren, worauf die auffällende Seltenheit dieser in der Imago so ausserordentlich gut geschätzten Arten beruht. Wahrscheinlich wird es hier die geringe Zahl der Eier des befruchteten Weibchens sein, welche die Seltenheit erklärt.¹⁾

Entwicklung der Mimicry zwischen immunen Schmetterlingen.

Unter den mimetischen Heteroceren finden wir neben den Angehörigen der unbeschützten Sphingiden, Sesien, Castniiden, Dioptiden und Lipariden noch Arten aus anderen Familien, welche wir nach ihrer Verwandtschaft und den vorliegenden Beobachtungen am lebenden Thiere, ebenso wie die Glaucoptiden²⁾ für

¹⁾ Als Beleg für diese Ansicht verweise ich auf das interessante, Seite 5 mitgetheilte Verhältniss der Eizahl mimetischer und nicht mimetischer *Atalanta*. Vielleicht spielt hier die durch die Seltenheit der Nachahmer bedingte Inzucht eine Rolle.

²⁾ Als Modelle der mimetischen *Glaucoptiden* dienen statt der Schmetterlinge neben gewissen Weichkäfern (*Lycidae*) hauptsächlich stechende *Hymenopteren*.

relativ immun ansehen müssen. Dabin gehören die afrikanischen *Melis helcita* Cr. nachahmenden *Agaristiden*, *Phacagarista helcoides* Dew. und *Ensenia Falkesteinii* Dew., dahin zahlreiche indische und eine neotropische *Chalcaside*, dahin Arten der neotropischen *Melaneriden*-Gattung *Saugata* und solche der *Pericopidinen* aus den Gattungen *Pericopsis*, *Esthoma*, *Hyalasia*. Es ist wohl über jeden Zweifel erhaben, dass die Aehnlichkeiten gewisser Arten von indischen Chalcasiden mit Aristolochienfaltern, Euploeen und *Ideopsis*-Arten, die Aehnlichkeit gewisser *Saugata*-Arten mit solchen von *Aeraca* (*Actantia*), die Aehnlichkeit von Pericopidinen mit Neotropinen und Danainen nur als Producte mimetischer Anpassung an diese so vielseitig als Modelle dienenden immunen Tagfalter angesehen werden dürfen.

Dass auch hier die mimetische Anpassung ursprünglich von Seiten der Weibchen ausgeht, zeigen zwei *Pericopsis*-Arten. Bei *P. Amphissa* Cr. ähnelt nur das Weibchen, wie schon Fr. Müller erwähnte, allerdings erst unvollkommen, der gemeinen *Aeraca Alebas* L., ebenso erinnert bei *P. turbida* Hb. nur das weibliche Geschlecht (*var. tricolora* Hb.) an die bunten Männchen der *Verbanus*-Gr. der Aristolochienfalter.

Um die wenigen hierher gehörigen Anpassungen unter den Rhopaloceren der paläotropischen Region zu erwähnen, so ähnelt das äusserst seltene als *Eupl. configurata* Butl. beschriebene Weibchen von *Eupl. Euctemon* Hew. (Mindanao) in der Färbung etwas dem monomorphen auf Celebes häufigen *Danaus Ismae* Cr. und ist wahrscheinlich aus einer primären, an *Eupl. Linnaei* Moore (= *Chaulia* F.) erinnernden, Danaerähnlichen Form hervorgegangen. Weiter erinnert das offenbar secundär viel stärker als das Männchen aufgeschelte Weibchen des den Aristolochienfaltern verwandten *Eurygas Cressida* Cr. an dasselbe Geschlecht der in Australien so gemeinen *Aeraca Andromache* L.

Auf beide Geschlechter ausgedehnt ist die von R. Trimen zuerst als mimetisch angesehene Aehnlichkeit des seltenen *Ananris Phaedon* F. mit der gemeinen *Euploea Euphone* L. (Insel Bourbon etc.)¹⁾

Dies führt uns zu der Schlussfolgerung, dass auch die in der Tracht übereinstimmenden den verschiedensten Gattungen angehörigen Art-Gruppen unter den neotropischen Heliconinen, Danainen und Neotropinen Producte mimetischer Anpassung an bestimmte meist zu ihnen gehörige Formen sind.

Diese Farbenanalogieen zwischen offenbar wenigstens der Unterfamilie (*Neotropinen*) oder der Familie (*Danaomorphen*) nach verwandten, theilweise einen scharf begrenzten Verbreitungsbezirk einnehmenden Arten aus offenbar allgemein immunen Gattungen schienen auch H. W. Bates so verwickelt, dass er, um seine besonders auf die mimetischen *Leptalis*-Arten begründete Mimicrytheorie zu retten, es vorzog, in die Definition der mimetischen Arten aufzunehmen, dass sie zu weit von einander entfernten Familien²⁾ gehören müssten.

Diese Einschränkung wurde bald darauf durch A. R. Wallace's schöne Arbeit über „die Papilioniden der malayischen Region“ umgestossen, in der er unzweifelhafte Anpassungen seitens bestimmter an andere Art-Gruppen innerhalb der Gattung *Papilio* nachwies. In weiterer Ausführung zeigte ich dann im ersten Theile dieser Arbeit, dass in der That in der Gattung *Papilio* drei anscheinend natürliche Untergattungen enthalten sind, deren eine, *Pharnacophagus*, aus in bestimmtem Grade immunen Formen besteht

¹⁾ Hierher gehört auch die auffällende Aehnlichkeit des *Dan. (Elsa) Morganii* How. (Centralafri.) mit *Ananris Eucha* Cr.

²⁾ H. W. Bates, Contributions to an Insect Fauna of the Amazon Valley (Trans. Linn. Soc. XLIII), p. 507.

und Arten der anderen beiden Untergattungen sowie Angehörigen zahlreicher anderer Familien (Nymphalinen, Pieriden, Chalcosiden etc.) als Modell der Anpassung dient.

Uebrigens ist H. W. Bates von seinem Princip, nur Analogien zwischen Arten verschiedener Familien als mimetisch anzusehen, für gewisse Fälle ausserordentlicher Aehnlichkeit zwischen Arten verschiedener Gattungen der Neotropinen schon selbst abgewichen.

So nennt er (l. c. p. 506) die *Napeogones*-Arten „evidently all* Nachahmer von Ithomien und erwähnt l. c., dass *Nap. Ercilla* „very curiously“ die denselben District eigenthümlichen Arten der *Orolina*-Gr. (*J. Aelia*, *Iluissa*, *Priscilla* und *Gonilla*) nachahmt und einzeln in den Schwärmen der Ithomien vorkommt.

In allen von ihm als mimetisch zugelassenen Analogien nimmt Bates stets nun die zur Zeit (seiner Beobachtung!) am Ort häufigere Art als Modell für die Anpassung der anderen an. So erwähnt er p. 526 *Ceratinia Anastasia* (Ego, St. Paulo), als Anpassungsform an die *Melinuca Mucos*, *C. Maanos* als solche an kleine Stücke von *Mechanitis Polygamma* L.; *Napeogones Ibra* (Para) als solche an *Ithomia Gyno* Hbn.; *Nap. Apollia* Hew. als solche an *Ceratinia villata* und *Coena* (Neu-Granada); *Nap. Xanthone* Bates als solche an *Mechanitis Nesaea*, was wir nur billigen können. In einem anderen Falle hält er dagegen eine *Ceratinia*, *C. Niomia* var. *Barü*, für das Modell nicht nur zu *Nap. Gyrinassa*, sondern auch zur selteneren *Melinuca Musias* Hew.

Wie wir zeigen werden, ist aber gerade das gegenseitige Verhältniss der Individuenmenge zweier Arten dauernden Schwankungen unterworfen, da schon ungünstige äussere Einflüsse (Ueberschwemmungen, Futtermangel etc.) oft nur die eine der local concurrirenden Arten momentan oder für längere Dauer geföhrt haben können; während besonders glückliche Existenzverhältnisse (Mangel an Feinden, günstige Kreuzungs- und reichliche Nahrungsverhältnisse) momentan die Häufigkeit einer sonst seltenen Form bewirken. Zudem muss man bedenken, dass gerade unter den Schmetterlingen viele Formen, die im Allgemeinen nur einzeln vorkommen, periodisch und plötzlich in ungeheuren Massen erscheinen können. Da somit das Verhältniss der Individuenmenge zweier local concurrirenden Arten bedeutenden Veränderungen unterworfen sein kann, berechtigt uns die zur Zeit gleichmässige Häufigkeit zweier einander täuschend ähnlicher Arten aus verschiedenen Gattungen der Neotropinen auch nicht, hier von einer Anpassung einer Form an die andere abzusehen, weil beide zur Zeit „all equally flourishing“ (Bates) sind und die ausgebildetste Aehnlichkeit auf „eine ähnliche Anpassung aller an dieselben localen wahrscheinlich unorganischen Bedingungen“ herabzudrücken. Vielmehr werden wir auch diese Fälle auf ihren mimetischen Ursprung hin zu prüfen vorziehen.

Einer Untersuchung über etwaige Gesetzmässigkeiten oder Bedingungen, nach welchen die Entwicklung der Färbung bei den einzelnen Artgruppen der verschiedenen Familien angehörigen Gattungen vor sich zieht, wird vorerst eine solche über das Alter und die genetischen Beziehungen der Gattungen selbst innerhalb der Familie voranzugehen haben. Beginnen wir mit den **Neotropinen**, so erhalten wir auf Grund zweier vereint auftretender Strukturmerkmale, der allmählig gesteigerten, bei dem Männchen stets weiter fortgeschrittenen Rückbildung der Vorderfüsse und Abweichung im Flügelgeäder, folgendes Schema der Entwicklung der einzelnen Gattungen:

		<i>Napocampes</i> sp.:	Phono-Tracht; Orobata-Tracht; Eurymedia-Tracht; Olyras-Tracht; Melinaca-Tracht.
	b. Weibchen mit 4-gliedrigen Vorderfüßen:	<i>Callithonia</i> sp.:	Ircu-Tracht etc.
		<i>Ceratiua</i> sp.:	Phono-Tracht; Melinaca-Tracht.
		<i>Thyridia</i> sp.:	Methona-Tracht; Olyras-Tracht; Ircu-Tracht
II. Männchen mit knopfförmig verkümmerter Tibia und Tarsus der Vorderfüße:		<i>Melanitis</i> sp.:	Melinaca-Tracht.
		<i>Dorcina</i> sp.:	Phono-Tracht; Methona-Tracht; Olyras-Tracht; Melinaca-Tracht
	a. Weibchen mit 5-gliedrigen Vorderfüßen:	<i>Ilhonia</i> sp.:	Phono-Tracht; Orege-Tracht; Orobata-Tracht; Eurymedia-Tracht; Melinaca-Tracht; Booplaudi-Tracht
	b. Flügelgeäder i. beiden Geschlechtern verschieden:	<i>Athesis</i> sp.:	Methona- und
		<i>Eutysis</i> sp.:	Olyras-Tracht
		<i>Methona</i> sp.:	Methona-Tracht;
		<i>Olyras</i> sp.:	Olyras-Tracht.
I. Weibchen mit 5 Tarsalgliedern, Männchen m. entwickelter Tibia und Tarsus an den Vorderfüßen:		<i>Allegis</i> sp.:	{ Harmonia-Tracht;
		<i>Melinaca</i> sp.:	{ Harmonia-Tracht
	a. Flügelgeäder i. beiden Geschlechtern gleich:	<i>Tithorea</i> sp.:	Harmonia-Tracht; Ircu-Tracht; Booplaudi-Tracht.

Nach vorhergehender Tabelle dürfen wir nun unbedingt *Tithorea* Dblld. als diejenige Gattung bezeichnen, welche sich durch Geäder (und Form) der Flügel und durch die ursprünglichere Vorderfüßbildung dem *Dacnatomorphen*-Stamme am meisten nähert. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass uns in dieser Gattung noch Reste der ursprünglicheren Neotropinen erhalten sind, welche schon zur Tertiärzeit die als Inseln hervortretenden Bergzüge Mittel- und Südamerikas bewohnten, lange bevor es noch zur Bildung der grossen brasilianischen Tiefebene gekommen war.

Weiter dürfen wir wohl annehmen, dass die ursprünglichste Tracht der Neotropinen noch dem schwarzen, von weissen Tüpfeln, Längs- und Querbänden durchbrochenen Kleide der meisten übrigen Danaer entsprach und einigermaßen an die Erscheinung der rein australischen Palaeotropinen (*Hamaedryas*) erinnert. Diese ursprünglichste und reichste Zeichnungsform finden wir noch am ersten in der *Bomplandii*-Gr. der Gattung *Tithorea* wieder. Aus ähnlichen Vorläufern gingen auch die beiden anderen Färbungstypen der Gattung hervor, die bei den Neotropinen seltener vertretene mexicanische *Irene*-Tracht und endlich die am meisten bei ihnen dominierende südlichere bunte *Harmomia*-Tracht, welche wir Seite 51 mit dem Namen *Melinaea*-Tracht bezeichnet haben. Jedenfalls ist dieselbe von den heute lebenden Gattungen noch am ersten in der Gattung *Tithorea* selbständig entstanden und mindestens ebensogut für einen charakteristischen Ausdruck der besonderen, rein physikalisch-chemischen Einflüsse des neotropischen Klimas auf eine ursprünglich schwarzweisse Tracht, als für eine allmählig immer auffällender ausgebildete Widrigkeitsfärbung anzusehen, wie A. R. Wallace (l. c. p. 239) es will.

Die sich ihrem Alter nach zunächst an *Tithorea* anschliessenden Gattungen der Gruppe Ib zeigen in den auf gebirgige Gegenden des Nordens beschränkten *Olyras*-Arten Vertreter eines wohl der *Irene*-Tracht näher stehenden Typus. Ähnlich zeigen die Arten von *Methona* Dbl. sämtlich ein anscheinend erst später durch gesteigerte Aufhellung der schwarzweissen Tracht selbständig entstandenes für die brasilianische Region charakteristisches Kleid.

Dagegen dürfte das bunte Kleid der *Melinaea* ursprünglich eine Anpassung an die ebenfalls brasilianische *Harmomia*-Tracht und zu der Zeit, als die einzelnen variablen Formen noch selten waren und sich erst zu Arten differencirten, für die Erhaltung der bestimmten Form von Nutzen gewesen sein. In verhältnissmässig kurzer Zeit jedoch, bis zur Entstehung der Ithomien, blühten die Melinaeen bereits derart auf, dass sie in Färbung und Flügelform modificirt, bald als specielle Modelle mimetischer Anpassung (*Melinaea*-Tracht) dienen konnten. Während wir die Färbung der *Athyris*-Arten ähnlich entstanden denken können, finden wir in den zwei unzweifelhaft jüngeren obwohl zur selben Abtheilung gehörigen Gattungen *Eutresis* und *Athesis* Anpassungen an die bereits ausgebildete *Olyras*- und *Methona*-Tracht.

Auch die Gattung *Ithomia*, welche die ursprünglichere Gruppe der jüngeren Neotropinen (II a) darstellt, dürfte in ihren älteren Arten sich durch mimetische Anpassung der noch seltenen Formen ausgezeichnet haben. So erinnert *I. Salsiana* Feld. (Columbien) an den *Bomplandii*-Typus, so gleichen andere Arten oft auffallend noch heute häufigeren *Melinaea*. Zugleich aber bilden sich in dieser Gattung periphere ihre eigenthümliche Färbungstypen aus, von denen später die *Eurimeda*-, die *Orolina*-, die *Ocyra*- und die vollkommen glasige *Phono*-Tracht vielseitig als Modell mimetischer Anpassung dienen.

In der jüngsten Abtheilung der Neotropinen (II b der Tabelle) treffen wir nun keine selbständig entwickelten Artgruppen mehr, bei welchen sich eine eigenartige Tracht ausbildete; vielmehr treten die einzelnen Gattungsvertreter ausschliesslich in den verschiedenartigsten Trachten der älteren Neotropinen auf.

So finden wir bei *Direcna* die *Melinaea*-, *Olyras*-, *Methona*- und *Phono*-Tracht; bei *Mechanitis* besonders die *Harmomia*- und *Melinaea*-Tracht; bei *Thyridia* die *Olyras*-, *Irene*- und *Methona*-Tracht; bei *Cecatinia* die *Melinaea*- und *Phono*-Tracht; bei *Napeogenes* endlich die *Irene*-, *Olyras*-, *Eurimeda*-, *Orolina*- und *Phono*-Tracht.

Der einzige mir bekannte Hinweis darauf, dass auch unter den Neotropinen die Anpassung an die bestimmten Modelle von Seiten des Weibchens ausging, finden wir bei einem Angehörigen der Gruppe II b, bei *Mechanitis Macrinus* Hew., dessen vom Männchen abweichendes Weibchen (*Isthmia* Bates) an die gemeine *Melinaea Scyllae* Salv. erinnert.

Bei der Masse der Arten hingegen sind, wie bei den peripherischen Gruppen der Rinnen- und Segelfalter und den peripherischen Gattungen der *Nymphalinea* etc., beide Geschlechter schon gleichmässig angepasst und zugleich dabei ausserordentlich formbeständig, denn Varietätenbildung kommt nach Bates l. c. p. 501 nur mehr bei einzelnen Angehörigen jüngerer Gattungen, die zur Zeit ihre häufigsten Vertreter sind, bei *Mechanitis Polyania* L. und *Ceratinia Niunia* Bates, vor.

Wir dürfen nun annehmen, dass die Entwicklung der jüngeren *Neotropinen* (Ib—IIb) besonders in den der Eiszeit vorangehenden Zeiträumen des jüngeren Tertiärs vor sich ging. Dass die gegenseitigen Anpassungen unter den sich bildenden Arten der verschiedenen alten Gattungen durch bestimmte oekologische Factoren geregelt wurde, zeigt unsere Tabelle. So stossen wir bereits in der ältesten Gattung *Tithorea* auf drei selbständig entwickelte Trachten, deren eine, die *Harmonia*-Tracht, nachdem sie von den *Melinaea* aufgenommen war, zur dominirenden unter den *Neotropinen* wurde. Weiter finden wir in keiner der zur Abtheilung I gehörenden Gattungen eine Anpassung an eine der selbständig entwickelten und als Modelle für noch jüngere Formen dienenden *Ithomia*-Gruppen. So dürfen wir denn den Schluss ziehen, dass die älteren in I aufgezählten Gattungen sich auch in Färbung und Zeichnung als die ursprünglichsten Vertreter unter den heut lebenden Neotropinen erweisen. Zugleich waren die in bestimmten Kleidern (*Bouplandia*-, *Arca*-, *Harmonia*-, *Olyras*- und *Melinaea*-Tracht) auftretenden Arten schon von den einheimischen Schmetterlingsfeinden als immun erkannt und verhältnissmässig geschützt. So konnte denn die Entwicklung der Vertreter jüngerer Gattungen, so lange sie noch nicht individuenreich waren, unter dem Schutze der alten aufgenommenen Trachten vor sich gehen und kleinste Einzelheiten der Varietäten, welche die Aehnlichkeit mit älteren Formen erhöhten, als besonders günstig sich erhalten und so den Anpassungsgrad allmählig verstärken.

Blühte die Gattung durch besonders günstige Entwicklungsverhältnisse aber auf, wie dies mit *Ithomia* (Abtheilung IIa) der Fall ist, so konnten auch in freier selbständiger Fortentwicklung der Zeichnung und Färbung, die sich in ihrer steigenden Reduction äusserte, innerhalb derselben eigenbühlich gefärbte Artgruppen (*Eurimelia*-, *Oreana*- und *Oneya*-Gr., endlich die glastügelige *Phono*-Gr.) entstehen, deren Vertreter heute meist sehr individuenreich sind.

In der aus den jüngsten Gattungen der *Neotropinen* bestehenden Abtheilung (IIb) treffen wir denn auch hauptsächlich Anpassungen an die in Ia und IIa erwähnten Abtheilungen. Zugleich konnten sich auch bei ihnen in besonders aufblühenden Gattungen bestimmte Modificationen der *Melinaea*-Tracht unter so günstigen Bedingungen entwickeln, dass sie mit zunehmender Häufigkeit den Arten der unstreitig jüngsten Gattung *Napeogenes* als Modell dienen konnten.

Denn bei *Napeogenes* finden wir neben den Anlehnungen an die jüngsten selbständig ausgebildeten oben erwähnten *Ithomia*-Gruppen auch solche an ältere Gattungsvertreter ihrer eigenen Abtheilung. So gleicht nach Bates C. c. p. 533 die seltene *Napeogenes Cyanassa* Dbld. der gemeinen *Ceratinia Bari*, einer der *C. Niunia* Ib. nahe stehenden Form; so gleicht *Nap. Apulia* Hew. der *Ceratinia Villala* Hew. (Neu-Granada) und *Nap. Xanthone* Bates der *Mechanitis Nesaea* Ib. (Amazonas).

Aus obigen Ausführungen müssen wir uns gegen die Auffassung von Bates (C. c. p. 552) erklären, dass *Ceratinia Bari* Bates als Modell für die ihr ähnliche, aber zur Zeit seltene *Melinaea Musias* Hew. dienen soll und aus unten weiter auseinanderzusetzenden Gründen das umgekehrte Verhältniss für berechtigter halten.

Zugleich führt uns aber die heutige Seltenheit einer ursprünglich als Modell dienenden häufigen Art zu dem Schluss, dass die Entwicklung der Neotropinen ihren Höhepunkt hinter sich

hat. Dafür spricht vor Allem die Entwicklung glasflügeliger Formen in der Gattung *Ithomia* und den jüngeren Vertretern, die keinen Entwicklungsfortschritt mehr gestattet. Weiter lässt sich dafür anführen, dass die Vertreter der jüngsten Gattung *Napeogonus* alle mimetisch, im Verhältnis zu ihren Modellen sehr selten sind und zugleich in ihrer körperlichen Ausbildung offenbar hinter den älteren, z. B. den *Tithorea*- und *Melinara*-Gruppen, zurückgeblieben sind. Weiter spricht dafür, dass die *Tithorea*-Arten nur mehr einen beschränkten Verbreitungsbezirk besitzen und selbst gewisse *Melinara* heute an Orten fehlen, an denen sie früher häufig genug waren, um als Modell für die Anpassung von *Mechanitis*-Arten zu dienen.

Dieser Umstand scheint auch Bates davon abgehalten zu haben, in den Analogien der Arten von *Mechanitis* und *Melinara* eine Anpassung des einen an den anderen Gattungsvertreter zu sehen, da „the species of the two genera do not coincide in any locality of the Amazonas.“ Nun führt Bates zwar selbst l. c. p. 549 aus Nicaragua, Ost-Peru und Bolivia und Neu-Granada je zwei einander analoge Vertreter von *Melinara* *Mechanitis* an, während die entsprechende *Mechanitis*-Art in Neu-Granada, dem oberen Amazonas und Para, die entsprechende *Melinara*-Art dagegen in Pernambuco und Rio de Janeiro fehlt. Wir dürfen diese Ausnahmen von der Regel wohl so erklären, falls auch neuere Beobachtungen sie bestätigen, dass in Neu-Granada, dem oberen Amazonas und Para keine mimetische *Mechanitis*-Art auftrat, während in Pernambuco und Rio de Janeiro die *Melinara* *Ethra* Godt. oder die *Tithorea* *Pseudethra* Btl., welche ursprünglich als Modell für die Anpassung der *Mechanitis*-Art dienten, durch ungünstige Concurrenzverhältnisse ausstarb oder zur Auswanderung gezwungen wurde, als die entsprechende *Mechanitis*-Art bereits häufig geworden war.

Die Aenderungen in den Concurrenzverhältnissen der *Neotropinae* stehen nun anscheinend mit einer gewaltig die Falterwelt Nordamerikas beeinflussenden posttertiären geologischen Erscheinung im Zusammenhang. Mit der Eiszeit, die ihre Gletscher bis zum 39° N.-Br. ausdehnte und auch Sierra Nevada und Rocky Mountains vergletscherte, drang zugleich mit seinen Feinden ein starker Strom nordamerikanischer Einwanderer in das sich allmählig erhebende neotropische Diluvialgebiet ein. Zu diesen Einwanderern dürfen wir wohl die Danaer und die Heliconier, die Acraeae und diejenigen Nymphalinen zählen, deren Raupen Passifloren fressen.

Wahrscheinlich war der Kampf um die Existenz in dieser „älteren Steinzeit“, in der sich wohl auch die Vogelwelt schon reich entwickelt hatte, durch den zeitweisen Mangel an Nahrung für Beute und Verfolger besonders stark.

So passten sich ihm auch diejenigen, ursprünglich wohl ihren indischen Verwandten ähnlich gefärbten Danaer, aus denen sich später die rein neotropischen Gattungen *Lycorca* und *Itana* herausbildeten, derart an, dass sie gewisse bereits ihre Träger vor den Angriffen wenigstens der einheimischen Feinde schützende Trachten älterer *Neotropinae* annahmen, *Lycorca* die *Melinara*- und *Itana* die *Olyras*- resp. *Methona*-Tracht. Einen Beweis dafür sehe ich in der noch heute sich an die Veränderungen der *Melinarae* anschliessenden Variation der *Lycorca*-Arten bestimmter Gebiete des Amazonas.¹⁾

Unter den Heliconiern, einer Unterfamilie der Acraecomorphen, welche nur aus den Gattungen *Heliconius* L. und *Eucides* Hb. besteht, ist uns in *Hel. Charitonius* L., der noch in den südlichen Vereinigten Staaten vorkommenden Art, wohl ein Rest der ursprünglich auf dunklem Grunde mit zahlreichen gelbweissen

¹⁾ Später wurden die individuenreichen *Lycorcen* für die *Zagreus*-Gruppe der Rinnenfalter und manche *Castniae* selbst zum Modell.

Binden geschmückten Stammformen der Gattungsrepräsentanten erhalten. Auf ähnliche Formen lassen sich denn auch vorerst die mimetischen Arten der *Albis*-Gruppe zurückführen, welche die Tracht der *Bouplandii*-Gruppe von *Tithorea* tragen und meist den gebirgigen Gegenden des neotropischen Gebietes angehören. Mit dem weiteren Vordringen gegen die Äquatorialebenen bildeten sich dann die mimetischen Formen der *Sylvaanus*-Gruppe aus, welche besonders Anpassungen an den *Irene*- und *Harmonia*-Typus von *Tithorea* darstellen und endlich entstanden solche an bestimmten *Melinara*, welche noch heute meist häufiger sind als die mimetischen Heliconier.

Diesen bereits zahlreich auf Seite 56—57 angeführten Anpassungen der *Sylvaanus*-Gruppe an *Melinara* seien hier noch die des *Helicon. nuntius* Cr. an *Melinara Maura* L., die des *Helicon. Aurora* Bates (St. Paolo) an *Melinara Lucifer* Bates, die des *Hel. Sylvaanus* Cr. an *Melinara Egeia* Cr. zugefügt. Ähnlich dürfte der jetzt gemeine *Hel. Eucrate* L. ursprünglich eine Anpassungsform an *Mechanitis Lysimnia* L. darstellen, wie der seltene *Hel. Dryalus* Hopffr. (= *Ethra* Bates) eine solche an die häufige *Mechanitis Nesara* Hb. und *Hel. Eucoma* var. eine solche an *Mech. Egea* Bates bildet.

Ähnlich wie bei *Ithomia* treffen wir nun auch unter den *Heliconiina* mehrere jüngere Artgruppen mit auffallend contrastirender Färbung, die so häufig sind, dass sie selteneren Arten der Heliconier-Gattung *Eucides* wie Papilioniden, Pieriden und Nymphaliden als Modell der Anpassung dienen konnten. Hierher gehört besonders die brasilianische *Apsicles*-Gruppe, die *Telesippe*-Gruppe, die *Melpomene*- und die *Erato*-Gruppe.

Ausser diesen jungen Heliconiern haben sich die *Eucides*-Arten noch *Melinara*, *Colacnis Julia*,¹⁾ *Aeraca outas* etc. angepasst, so dass wir sie füglich als den jüngsten Ausläufer der „Heliconier“ im Sinne Bates ansehen dürfen. Als ausschliessliches Modell scheinen ihre Arten nicht zu dienen.²⁾

Nachstehende Tabelle (Seite 124 und 125) wird diese complicirten Analogien zwischen der Tracht der Neotropinen, Danainen, Acraeinen, Heliconier und gewissen Nymphalinen anschaulicher machen.

Noch complicirtere Verhältnisse deuten an, dass die *Heliconiina*-Arten den Kampf um die Concurrenz auch gegen die Aristolochienfalter siegreich durchgeführt haben.

Dafür, dass letztere nicht mehr die Lebensenergie besitzen, deren sie sich unstreitig früher erfreuten, scheint schon die Rückbildung der männlichen Duftvorrichtungen im Analfelde der Hinterflügel bei den indischen und gewissen neotropischen ungeschwänzten Endformen, die zunehmende Seltenheit der ersteren³⁾ und die körperliche Verkümmernng der letzteren (*Aeneas*-Gr.) zu sprechen.

¹⁾ Die als Modell für *Eucides aliphera* Gutt. dienende *Colacnis Julia* L. ist dadurch besonders interessant, dass sie keine „Widrigkeitsfarben“ trägt, sondern eher an ihre Verwandten aus der *Argynnis*-Gruppe erinnert. Trotzdem ist sie nach A. Seitz C. v. so häufig, dass sie „durch ihre ungeheure Individuenzahl der neotropischen Fauna ein ganz bestimmtes Gepräge aufdrückt.“ Dies spricht besonders für meine Behauptung, dass die häufigen immunen Species als solche ihren Feinden bekannt und von ihnen gemieden sind, auch wenn sie keine Ekklaffen tragen.

²⁾ Vielleicht bildet die auffällende *Euc. Olympia* F. der sich eine *Phocides*-Art angepasst hat, davon eine Ausnahme, wenigstens ist mir keine immune Form bekannt, die sich als Modell für die *Eucides*-Art ansprechen liesse, doch könnte dieselbe vielleicht unter tagfliegenden Heteroceren noch angetroffen werden.

³⁾ In Folge dieser zunehmenden Seltenheit der Modelle passten sich auch die Endformen der mimetischen *Melpomene*-Weibchen wieder den geschwänzten heute dominirenden älteren Aristolochienfaltern an, während die nach der Zeichnung und Flugform ursprünglicheren sich an die Aristolochienfalter mit abgerundeten Hinterflügel angelehnt hatten, welche heute sehr selten sind.

9. Jüngste anscheinend allgemein mimetische Formen der <i>Heliconier</i> :		<i>Eucides colyiformis</i> Butl.	<i>Eu. Lampeto</i> Bates <i>Hibocri</i> Mén. <i>Dianasa</i> Hb.	<i>Eucides</i> <i>Edias</i> Hew.
8. Jüngere, selbständig entwickelte, als Modelle dienende Arten von <i>Heliconius</i> :				
7. Mimetische meist noch seltenere Arten von <i>Heliconius</i> :	<i>Atthis</i> -Gr.	<i>H. formosus</i> Bates	<i>Sylvaenus</i> -Gr.	
6. Ursprünglich mimetische <i>Danaiden</i> :			Gattung <i>Lycorca</i> Hb.	<i>Itana Lamira</i> Latr.
5. Jüngste ursprünglich rein mimetische <i>Neotropinen</i> -Gattungen:		<i>Callithomia</i> <i>Hezia</i> Hew. <i>Thyridia</i> <i>Mcrauthio</i> Bates	<i>Napaeogenes</i> <i>Hypsava</i> Stdgr. <i>Ceratinia Dacta</i> Bsd, etc. <i>Mechanitis</i> sp. dir. <i>Dircenna</i> <i>Callipero</i> Bates	<i>Napaeogenes</i> <i>carolsa</i> Feld. <i>Thyridia Aedesia</i> Dbl. <i>Dircenna</i> <i>Klugii</i> Hb. <i>Dircenna Olyras</i> Feld.
4. Jüngere selbständig entwickelte, als Modelle dienende <i>Thomia</i> -Gruppen:				
3. Rein mimetische seltene wenig jüngere <i>Neotropinen</i> :	<i>Thomia</i> <i>Susiana</i> Feld.		<i>Thomia fallax</i> Stdgr. <i>Thomia Virgiana</i> Hew.	<i>Athesis Clearista</i> Dbl. <i>Eutresis Hypercia</i> Dbl.
2. Ursprünglich seltene und mimetische, später aber theilweise als Modelle dienende ältere <i>Neotropinen</i> :			(<i>Athyrus</i> Feld.) <i>Melinara</i> Hb.	
1. Nur als Modelle dienende <i>Neotropinen</i> , <i>Acrainen</i> und <i>Nymphaliden</i> :	Gattung: <i>Tithorea</i> ; (<i>Neotropin.</i>)	<i>Bomplandi</i> -Gr.; (Columb, etc.)	<i>Iren</i> -Gr; (Mexico etc.)	Gattung: <i>Olyras</i> ; (Venezuela etc.)

Eucides
sp. dir.

Eucides
Parana
Mén.

Eucides
aliphara
Godt

Erato-Gr.
etc.

H. Nethereri
Feld.

Bana Hübner Cr.
Phaenarete Dblld.

Thyridia Psidii L.
Thyridia Pytho
Feld.

Thyridia Ino ||
Feld.

Diremna Epilera
Bates

Napocognes
Phaen Feld.

Napocognes
Circata Hew.

Napocognes
Erceilla Bates

Napocognes Illera
Hew.

Napocognes
sp. dir.

Cephalina
sp. dir.

Diremna
sp. dir.

Enriamedia-Gr.
(Amazonas)

Ocolima-Gr.
(Amazonas)

Oncya-Gr.
(Amazonas)

Phano-Gr.
(Columb
etc)

Athesis Acrisione
Hew.

Entasis imitatrix
Stdgr.

Gattung:
Methona:
(Brasilien etc.)

Acracia *Colonia*
fabae L. *Juba* L.
(Acracia.) (Nymphalica.)
(Brasilien) (Brasilien)

Als weiteres Beispiel dafür glaube ich die unverkennbare Anpassung der Weibchenform *Varus*, eines brasilianischen Aristolochienfalters der *Laertes*-Cohorte, des *P. (Ph.) Belus* Cr. an die Heliconier der *Apscades*-Gruppe anführen zu müssen.¹⁾

Wir finden bei diesem Aristolochienfalter einen ausgebildeten Dimorphismus der Geschlechter. Das Männchen ist oben einfach stahlgrün, ohne deutliche Binden erkennen zu lassen, während das Weibchen (*Varus* Koll.) schwärzliche Vorderflügel mit einer schwefelgelben Schrägbinde und metallisch blaue Hinterflügel besitzt.

Wir dürfen nun annehmen, dass wie bei *Ph. Crassus* ursprünglich wohl beide Geschlechter von *Ph. Belus* eine helle Vorderflügelbindenbinde und ausserdem helle Randbindenreste auf den Hinterflügeln trugen und erst das Männchen als die gewöhnlich in der Artumbildung fortschreitende Form die einfarbig stahlgrüne Färbung annahm. Für diese Annahme lassen sich die beiden mimetischen Weibchenformen des Rinnenfalters *P. Polycaon* Cr. (Theil I. Seite 97) anführen, deren seltenere, *Androgas* Cr., an *Ph. Belus* & *Varus*, deren häufigere, *Piranthus* Cr., an das Männchen derselben Aristolochienfalterart erinnert. Zugleich scheint mir aber das heutige Weibchen von *Belus* der einst als Modell dienenden Form nicht mehr zu entsprechen. Die Flügelweite hat abgenommen, und die Form und Färbung besonders der Hinterflügel haben eine Umwandlung durchgemacht, durch welche der Falter einem der jüngsten Heliconier, *Hel. apscades*, ähnlich wird. Nun ist das Weibchen *Varus* Koll. von *P. Belus* z. B. am Amazonas jetzt so selten, dass nach Dr. Hahnel's Beobachtungen erst eines²⁾ auf zweihundert Männchen kommt: so erklärt sich die mimetische Anpassung der seltenen Form an den gemeinen *Heliconier*. Vielleicht tritt das Weibchen von *P. Belus* Cr. in einer anderen Gegend Brasiliens, wo es häufiger ist, auch noch in einer ursprünglicheren mehr an *Pap. Piranthus* & *Androgas* erinnernden Form auf. So erzählte mir Herr Dr. Seitz, es mehrmals gefangen zu haben, während Bates während seines zehnjährigen Aufenthaltes am Amazonas nur einmal ein Stück fliegen sah.

Forschen wir nun nach den Ursachen, welche die Häufigkeit der Heliconier bedingen, so ist wohl vor Allem eine allgemeine Widrigkeit des Geschmackes in Rechnung zu bringen, welche sie wahrscheinlich ihrer besonderen Raupennahrung, den Passifloraen, verdanken. Ausserdem aber sind *Heliconius* und *Eucides* wie *Colacnis*, und *Diome*, wie Fr. Müller l. c. nachwies, vor Neotropinen und Acraeinen noch dadurch bevorzugt, dass sie, besonders im Weibchen ausgebildete, eigenartige Verteidigungsmittel, vorstreckbare Stinkwürste, am Körperende besitzen. Dieser verschiedene Widrigkeitsgrad immuner Formen machte es wohl erklärlich, dass E. Krause³⁾ in den Anpassungen zwischen immunen Tagfaltern der neotropischen Region solche von in geringerem Grade beschützten an stärker widrige erblicken konnte. Wir fanden jedoch, wie erwähnt, bei *Eucides*-Arten auch Anpassungen an Acraeae, denen die Stinkwürste fehlen, und an Heliconier und *Colacnis Julia*, welche nicht mehr beschützt sind als die *Eucides*-Arten und sich von ihnen nur durch grössere Häufigkeit auszeichnen. So dürfte sich auch für diese immunen Tagfalter das von uns ausgesprochene Princip bestätigen, dass stets die seltenere immune Art sich der zahlreicheren anpasst, um in den Schwärmen der letzteren der Verfolgung zu entgehen.

¹⁾ Auch die Anpassung des Weibchens von *Eurygus Crassida* F. an das der australischen *Acraca Andromache* F. dürfte hierher gehören.

²⁾ Dies der Sammlung des Herrn Dr. Staudinger einverleibte Exemplar ist überhaupt das einzige, welches ich gesehen habe.

³⁾ E. Krause (C. Sterne) Werden und Vergehen. 3. Aufl. Seite 752.

In der That wird nun in der neotropischen Region der Vortheil, welchen local concurrirende Arten durch die Aehnlichkeit ihrer Tracht geniessen können, in jeder Weise von einem durch Naturzüchtung entstandenen Geselligkeitstrieb auch vollkommen ausgenutzt. So fliegen nach Bates (l. c. p. 497) nicht allein Individuen einer Art dieser immunen Falter in Schaaren, so halten nicht allein die Verbände nahe verwandter Arten, welche denselben Districte bevölkern, in einer oder mehreren dichten Massen sich zusammen, auch die dasselbe Kleid tragenden Vertreter verschiedener Gattungen vereinigen sich. Daher trifft man nach Bates (l. c. p. 524) *Doreana Elvaca* und *Epäpéro* in Gesellschaft verschiedener ähnlicher *Albomien*, so *Ceratalia Anaslusia* Bates (l. c. p. 526) in Gesellschaft der *Melinaea Maélus*; *Napeogenes Cyriamassa* Dbl. zusammen mit der gemeinen *Ceratalia Barü*; *Nap. Illia* Hew. zusammen mit *Albomia Cyano* Hb.

Weiter schliessen sich diesen Schwärmen der *Neotropica* noch stets die nachahmenden *Heliconias*-Arten der *Atthis*- und *Sylveanas*-Gruppe an und auch *Eucides aliphera* Godt. fliegt nur in Gesellschaft der *Colacis Julia* L. So findet man nach Bates (l. c. p. 550) in Gesellschaft der *Melinaea Eglia* die *Mechanitis Polymania*, *Mel. Mucac*, *Heliconias Sylveanus* und *Nanatus*, alle langsamen Fluges sich mischend.

Es bedingt nun, wie zuerst Fr. Müller und A. R. Wallace hervorhoben, diese Aehnlichkeit ungeniessbarer Arten unter einander auch einen gegenseitigen Vortheil der Theilnehmer, indem dadurch der Typus der immunen Formen bestimmter wird und sich in nur wenigen Formen ausspricht. So werden seine Träger leichter von den Angriffen junger Vögel verschont, die erst Erfahrungen über die verschiedenen Grade der Schmackhaftigkeit ihrer Nahrungsobjecte machen müssen und ihr Urtheil nach dem äusseren Habitus der letzteren bilden werden.

In der That werden nach Fr. Müller auch widrige Falter von Insectenfressern angenommen, wovon ich mich an den mir von dem verehrten Forscher übersandten bei Blumenan gefangenen Exemplaren von *Melinaea* und *Aerona* mit scharfen Biss Spuren am Aussenrande der Vorder- resp. Hinterflügel überzeugen konnte, welche wohl theilweise dem ruhenden Thier beigebracht wurden. Diese Verletzungen sind von den durch Begattungsacte oder Anstreffen an Zweige entstandenen Beschädigung am Analwinkel der Hinter- resp. an der Spitze etc. Vorderflügel, wie man sie besonders häufig bei Nymphalinen beobachtet, durch ihren scharf umschriebenen Umriss durchaus verschieden.

Einwürfe gegen die Mimicry-Theorie.

Da die speciellen Angriffe gegen die von Bates, Wallace und uns vertretene Auffassung der Mimicry als eines für die Arterhaltung vortheilhaften Resultates natürlicher Auslese besonders von Seiten der Lepidopterologen ausgegangen sind, ist auch hier noch der Ort, auf sie zu erwidern.

So behauptete zuerst J. Schilde¹⁾, der die Mimicry etwas volksthümlich als — „Versohlungsprinzip“ bezeichnete, in Uebereinstimmung mit einem, von anderer Seite sogar gegen die Möglichkeit jeder langsamen Umbildung der Arten gemachten Einwande, dass der (nachahmende) Weissling, „wäre er in dem eigenen Kleide nicht compensativ sicher, untergehen würde, lange bevor nur das erste Stäubchen zur Nachäffung der bunten Art²⁾ zielstrebig auf seine weissen Flügel selectirt wäre. Würden doch seine Conso-

¹⁾ J. Schilde, gegen pseudobolevische Transmutationslehre, 1879, Seite 13.

²⁾ Derselbe, antidarwinistische Skizzen (Deutsche entomol. Zeitschr. XXVIII 1884, p. 343).

menten gerade ihm um so interessirter nachstellen müssen, wenn die übrige Fluggenossenschaft für sie ungeniessbar geworden wäre.*

Hätte Schilde seine Behauptungen an einer grösseren Sammlung prüfen können, würde er seinen ersten Einwurf gegen die Möglichkeit einer gradweisen Anpassung zurückgezogen haben, denn, wie wir im descriptiven Theile unserer Arbeit so oft angedeutet haben, kann man noch unter den heute gleichzeitig lebenden Arten die allmähliche Ausbildung der Anpassung in einer Reihenfolge nachweisen, die auch für ihre Entstehung gelten dürfte. Bei den vielgestaltigen Weibchen des Rinnefallers *P. Memnon*, welche noch heute im Kampfe ums Dasein stehen, lässt sich dieser Process der mimetischen Umbildung, wie er innerhalb einer Art stattgefunden hat, besonders gut verfolgen. Die geringe aber doch vorhandene Aehnlichkeit, welche die Zeichnung der Hinterflügelunterseite mit derjenigen der *Priapus*-Gruppe der Aristolochienfalter hat, wurde zuerst gewissen Weibchen, in deren Verbreitungsgebiet der *Ph. Priapus* häufig war, dadurch von Nutzen, dass sie, wie wir dies bei Rückschlagserscheinungen auf den Flügeln so häufig fanden, auch auf der Oberseite der Hinterflügel erschien, während die Vorderflügel sich secundär verdunkelten. So erinnert die ursprüngliche Weibchenform der Inselrasse *Laomedon* Cr. in der That noch etwas an den seltenen *Ph. Priapus* Cr. (Java, Sumatra). Auch in der Continentalrasse lehnte sich das Weibchen ursprünglich an das der Männchenform ähnlichste rein continentale Modell, an den jetzt seltenen *Ph. Astorion* Westw. Hew. an, denn die *var. Esperii* Butl. besitzt noch blauespritzte Hinterflügel wie das Männchen, während die des Modells einen bläulich schwarzen Glanz haben. Auch die übrigen von *P. Memnon* bekannte Weibchenformen sind in gewissem Grade durch ihre mimetische Anpassung geschützt, bis endlich Varietäten wie *var. javanus* und *var. Agnor* Cr. den Uebergang zu den jüngsten mit kräftigem Hinterflügelsschwanz versehenen Endformen von *Achates* und *Achatiades* bilden, welche Arten der *Doubledayi*- oder *Jophon*-Gr. in Färbung und Flügelform gleichen.¹⁾

Weiter ist zu bedenken, dass die Schmetterlinge sicher seit längerer Zeit nur einen Nebenbestandtheil der Insectenfresser-Nahrung bilden und dass neben den mimetischen Arten und den widrigen Modellen immer noch die Hauptmasse auch der Tagfalter (besonders der Pieriden und Nymphalinen) aus schmackhaften Formen bestand, so dass keine besondere Aufmerksamkeit der Schmetterlingsfeinde auf die im Anfange mimetischer Anpassung stehenden Arten nöthig wurde, die zudem ihren Modellen gegenüber äusserst selten waren.

Gegen Schilde's weiteren²⁾ Einwand, „dass auch die Instincte der Verfolger durch Stadien der Erfahrung vererbt werden müssten, die das den Vorfahren einst durch Irrthum widrige Mahl längst als acceptabel lehrten und erkannten“, verweise ich auf die Darlegungen Fr. Müller's, für welche auch die von ihm gefangenen und mir gütigst übersandten Aeraeen und Neotropinen mit deutlichen Biss Spuren an den Flügeln sprechen. Nach Fr. Müller sind es besonders junge Vögel, welche die widrigen Bissen erst durch Erfahrung kennen zu lernen haben. Dass aber selbst junge Vögel allmählig den immunen Falter besser kennen lernen, so dass sie ihn schon aus der Nähe von geniessbaren unterscheiden, ohne ihn anzunehmen, geht aus der an einem jungen *Dicaeans* gemachten Beobachtung (Seite 105) hervor. Schliesslich kümmern sich dann die erwachsenen Vögel um die sie umschwärmenden Danaer, Aeraeen, Neotropinen, Heliconier etc. nicht mehr. Da nun die Schmetterlinge zur Zeit keine Hauptnahrungsobjecte der Vögel

¹⁾ So kommt bei Bangkok, wo das Weibchen von *P. Memnon* viel seltener ist als das überaus flüchtige Männchen, ausser der *var. Achatiades*, als deren Modell hier der etwas kleinere *Ph. aristolochiae var. diphtus* zu gelten hat, noch sehr selten die vorbereitende Varietät *Lycas* vor, obwohl ihr ursprüngliches Modell (*Ph. Zuleucus* Hew.) durchaus fehlt.

²⁾ Schilde, gegen pseudobiosische Transmutationslehren, Seite 11.

mehr bilden, braucht sich der vor den geschmackswidrigen Faltern warnende Trieb als irrelevant auch nicht zu vererben, zumal unter den Schmetterlingen wechshafte Thiere, welche dem Angreifer gefährlich werden können, vollkommen fehlen.

Gegen Schilde's Behauptung,¹⁾ dass dem nachahmenden Weissling sein altbewährtes Kleid nicht nützlicher als ein fremdes Habit werden kann, führe ich einfach die zahlreichen bereits mitgetheilten Beobachtungen über immune Tagfalter an, die alle darin übereinstimmen, dass die letzteren in der That vor den Angriffen der Insectenfresser relativ in hohem Grade gesichert sind. Dass sie in keinem Stadium Feinde haben, ist nicht allgemein wahrscheinlich,²⁾ sicher aber sind sie als Falter in höherem Grade immun als andere Schmetterlinge, so dass schmackhaftere Arten von der Aehnlichkeit mit ihnen einen Vortheil haben müssen.

Dass die Zahl der widrigen Arten aber ewig dieselbe bleibt, wie Schilde behauptet, ist durch unsere Untersuchungen über die Anpassungen zwischen immunen Faltern sehr unwahrscheinlich gemacht.

Gerade bei den immunen Tagfaltern, deren Raupen meist auf eine bestimmte Pflanzengattung als Nahrung angewiesen sind, ist durch die Ausrottung der letzteren (z. B. durch Cultur), ein allmähliges Aussterben der Modelle bedingt, wenn die Art nicht auswandert oder, was unwahrscheinlicher ist, sich einer neuen Nahrungspflanze zuwendet.

Kommen wir noch auf den letzten auch von Dr. Staudinger³⁾ aufgenommenen Einwand Schilde's gegen den Vortheil mimetischer Anpassung, welcher lautet⁴⁾: „die Darwinianer melden übrigens und zwar ohne eine Erklärung dafür zu geben, dass die nachhällenden Formen immer nur sehr selten unter den zahlreichen Individuen der wirklich geniessbaren Arten vorkommen. Nun eine Immunität der nachgeahmten Falter als vorhanden angenommen, so wäre die Erklärung: die Nachhällung hat den naturzugewiesenen Consumenten gegenüber keine Bedeutung, die Mimikry wird erkannt oder mittelst geeigneter Sinne (Geruch)⁵⁾ gar nicht als solche estimirt und die Seltenheit der geniessbaren Nachhäller entsteht durch die den Gegnern derselben aufgenöthigte, besonders intensive Aufsuchung dieser geniessbaren Falter unter den ungeniessbaren.“ Dagegen habe ich nur kurz einzuwenden, dass die aus starker Verfolgung etc. entspringende Seltenheit und daraus drohende Gefahr für die Erhaltung einer Art es allerdings ursprünglich war, welche die Anpassung zuerst des selteneren und daher für die Arterhaltung wichtigeren Weibchens veranlasste, dass aber unter günstigen Lebensbedingungen die mimetische Form besonders bei in beiden Geschlechtern dem Modell angepassten Arten doch relativ häufig, in manchen Fällen sogar häufiger als das Modell werden konnte.

Die Unbeständigkeit der äusseren Existenzbedingungen, welche besonders für die früheren Stände der schmackhaften mimetischen und der als Modell dienenden immunen Arten durchaus verschieden und zugleich unabhängig von einander sind, erlaubt sogar nicht einmal eine dauernd constante Proportion der Individuenmenge beider Arten. So gibt es denn auch mehrere schmackhafte

¹⁾ J. Schilde, antidarwinistische Skizzen C. c. Seite 343.

²⁾ Von *Phara. Phloxos*, Aeraeen, Heliconiden, Neotropinen sind, soviel ich in der Literatur fand, zur Zeit noch keine Feinde der Jugendstadien bekannt.

³⁾ Dr. Staudinger, exot. Schmetterlinge Seite 6.

⁴⁾ J. Schilde, antidarwinistische Skizzen C. c. Seite 344.

⁵⁾ Bekanntlich tritt bei den Vögeln gerade der Geruchssinn gegen den des Gesichts bedeutend zurück. (V. bes. auch die Experimente mit Aasgeiern zeigen.

Nachahmer, deren Aehnlichkeit mit ihrem Modelle allerdings meist keine ausserordentlich ausgebildete¹⁾ ist, welche heute viel häufiger sind als ihre Modelle. Letzteres gilt z. B. für eine mimetische *Pieride* (*Archonius Tereus* Godt.) im Verhältniss zu ihrem Modell, *P. (Phorum) Erithalion* Godt., wie schon Fr. Müller hervorhob, und für einige ebenfalls in beiden Geschlechtern in geringer Weise angepasste Rinnenfalter (*P. Pompijas* F. etc.)

Aehnlich kommen gewisse mimetische Arten der neotropischen *Ergeiniden*-Gattung *Stalacthis*²⁾ Hb., welche entweder die bunte *Melancon*-Tracht oder das Kleid der *Orolina*-Gruppe von *Ithomia* tragen, manchmal an bestimmten Orten in so grossen Mengen vor, dass H. W. Bates selbst die *Stal. Dacali* am oberen Amazonas als Modell für Anpassung gewisser seltener schmackhafter *Piriden* und die bunte *Stal. Calliope* sogar als solches für eine allerdings seltene aber sicher immune *Heliconier*-Form, *Eucides Lampeto* Bates, ansehen konnte.

Weiter kennen wir sogar unzweifelhaft secundär angepasste Formen von Rinnenfalter-Weibchen, so *Pap. Tharsites* F., *Acanus* und *Lographron*, *Pygithous* (Antillen, Cuba), deren Modelle, wenn sie in heutigen Arten überhaupt noch erhalten sind, doch diesen Weibchen nicht mehr gleichen. Dasselbe gilt für Arten der indischen *Polygmaestor*-Gr. Endlich gibt es in beiden Geschlechtern unzweifelhaft mimetische Arten, wie *Pap. (Draegia) Antimachus* Dru. (Theil I, Seite 72), deren Modell, eine Riesenform³⁾ von *Arctia*, hat uns nach den heutigen Arten kaum vorstellen können.⁴⁾

So darf man denn annehmen, dass zu einer bestimmten Zeit der neuesten geologischen Perioden, wahrscheinlich, als die jetzt so reich entwickelte Vogelwelt sich erst differencirte, in Folge heftigeren Kampfes um die Existenz mimetische Anpassungen an widrige Modelle ausgebildeter und verbreiteter waren, denn sicherlich zählen die Schmetterlinge heutzutage nicht mehr zur Hauptnahrung der Insectenfresser, vor Allem nicht der Vögel.

Leichter hinweggehen dürfen wir über die früheren Angriffe W. L. Distant's⁵⁾ auf unsere von ihm als „the romance of Natural History“⁶⁾ bezeichnete Theorie. Vor Allem hat gegenüber der von Distant als „unlucky“ für den Darwinismus bezeichneten Thatsache, dass „it is just those species, which superficially bear the closest resemblance to each other, that differ most in their fundamental structure“, schon A. R. Wallace (vergl. Seite 3) es geradezu als ein charakteristisches Merkmal der mimetischen An-

¹⁾ Dagegen besitzen die seltensten mimetischen schmackhaften Arten, wie *Pap. (Cosua) Ucolides* Hew., von dem schon das Männchen nach Standinger's Verkaufsliste den mehr als vierzigfachen Preis des Modells (*Hestia Leuconoe*) hat, und das dem Modelle noch ablichere Weibchen nur in wenigen Stücken bekannt ist, meist eine fast unibertreffbare Ausbildung dieser Aehnlichkeit.

²⁾ Es wäre sehr erwünscht, dass die Entwicklung der *Stalacthis*-Arten soweit aufgeklärt würde, dass man über die Frage ihrer relativen Widrigkeit oder Schmackhaftigkeit sicher entscheiden kann. Für erstere spricht das schwerfällige Benehmen von *St. Susanna* F., wie A. Seitz es gekennzeichnet hat, und die Häufigkeit dieser eine durchaus eigene und auffällende Tracht führenden Art.

³⁾ Wahrscheinlich waren z. B. die *Erygona*-Formen, an welche sich z. B. *P. Erechthous* Don aus der *Gamborisius*-Gruppe der Rinnenfalter angepasste, grössere Thiere als die heutige *Ea. Cressida*, welcher nur die jüngste Terminalform der Gruppe, der *P. Anaetas* Macleay, in beiden Geschlechtern auch in der Grösse gleicht (vgl. Theil I, Seite 111).

⁴⁾ Das ganz vor Kurzem zuerst beschriebene Weibchen von *P. Antimachus* unterscheidet sich von dem Männchen durch die (wohl mehr zugerundete?) Flügelform.

⁵⁾ Bei Hewitson, Exotic Butterflies Bd. IV, Text zu Diadema III.

⁶⁾ E. Gerhardt, über die Aehnlichkeit einzelner Arten von Schmetterlingen etc. Bull. Soc. Ent. Ital. XV 1883 begnügt sich damit, C. c. 160 die Mimicry als ein „Spiel oder Neckerei der Natur“ zu bezeichnen.

passung im Gegensatze zur natürlichen Verwandtschaft hervorgehoben, „dass die Nachahmung nur eine äusserliche und von aussen sichtbare ist und sich nie auf innere Charaktere erstreckt.“

Der „offensive smell“, den Wallace den Danaern zuschreibt, ist nach Distant aber kein Abschreckungsmittel für die Schmetterlingsfeinde, sondern „a sweet smelling uncton. May not all the imitators of these scented aristocrats be simply favorites of fashion, apeing the dress of their superiors and, since the females take the lead, naturally selecting those of the gayest colours.“

Den Impuls, welchen wir in der Einwirkung natürlicher Auslese während des härtesten Kampfes um die Existenz suchen, findet Distant also in einer Modenarrheit! —

Vom naturwissenschaftlichen Standpunkte ebenso zu verwerfen ist die dem Standpunct J. Froeschammer's¹⁾ sich anschliessende Ansicht O. Thieme's²⁾, dass eine im Thier lebendige gestaltende Umbildungskraft die mimetischen Anpassungen selbstthätig hervorrufen soll.

Schliesslich hätten wir noch auf die mir nur aus dem Citat bei Sicard l. c. bekannt gewordene Deutung der Mimery-Erscheinungen einzugehen, wie sie M. Wagner ausgesprochen hatte. „Wagner erklärt die Mimery durch Localisation, indem das Thier nicht auffallen will.“ Es würden nach ihm also alle mimetischen Anpassungen nur unter den Begriff der „protective ressemblance“ fallen, welche dem Einzelwesen gestattet, sich einem integrierenden Theil der Umgebung unauffällig einzuverleiben, wie die ruhende Kallima dem trockene Blätter tragenden Baum. In der That scheint diese Ansicht, dass nur das seltenere Thier sich dem häufigeren anpasst, welches nicht besonders geschützt zu sein braucht, besonders neuerdings auch unter den beobachtenden Lepidopterologen Vertreter gefunden zu haben.

So erwähnt A. Seitz³⁾, dass ein Angehöriger der zahlreiche mimetische Formen stellenden Nymphalinen-Gattung *Phyciodes* mehreren *Nymphalidina*-Arten (Eryciniden) ähnelt und sich von einigen *Dynamine* (ebenfalls *Nymphalinen*) nur durch den Flug unterscheidet. Weiter weist er l. c. p. 923 darauf hin, dass gerade die Eryciniden-Gattung *Nymphalidina* „häufig vorkommende Tagfalter-Arten wie *Adelpha*, *Pyrgogyra*, *Dynamine* copirt und z. B. *Thysbe irenaca* Cr. „das *Dynamine nylitta*-Weibchen nicht nur auf der Oberseite, sondern auch auf der durchaus davon verschiedenen Unterseite nachahmt.“ A. Seitz bemerkt übrigens selbst in Bezug auf diese Fälle, „dass es ihm dunkel sei, welchen Zweck diese Mimery habe, d. h. gegen wen sie schützen solle.“

Auch uns haben seinerzeit die vielen Färbungsanalogien, welche wir zwischen neotropischen *Nymphalinen* und Vertretern der stets viel kleineren *Eryciniden* meist in beiden Geschlechtern antrafen und die sich bei manchen Arten bis zu wirklich auffallender Aehnlichkeit ausgebildet haben, längere Zeit beschäftigt. Vielleicht sind einige dieser *Nymphalinen* durch bestimmte Raupennahrung in gewissem geringen Grade immun geworden. So nährt sich nach W. Müller die Raupe von *Pyrrhogyra* sp. von einer kletternden *Podlina* (*Sapindaceae*), die von *Cataglyphis* von *Allophylus* (*Sapind.*); die von *Didonis Biblis* Dru., zu der es ebenfalls eine analoge *Eryciniden*-Form gibt, lebt an *Trochia*, die von *Emilia margarita* an *Sebastiania*, die von *Dynamine* an *Dalechampia*, lauter *Euphorbiaceae*. So wäre es denn möglich, aber erst durch weitere Untersuchungen im brasilianischen Urwalde entscheidbar, dass hier ebenfalls Fälle von Mimery, d. h. Anpassung an in gewissem Grade besser geschützte Modelle vorliegen.

¹⁾ J. Froeschammer, die Phantasie als das Grundprincip des Weltprocesses (München, 1877).

²⁾ O. Thieme, Analogien im Habitus etc. (Berliner entomol. Zeitschr. XXVIII, Heft 1), p. 191—202.

³⁾ A. Seitz, Lepidopteren-Studien im Auslande. C. c. p. 906.

Gegen die besondere Widrigkeit der Raupen sprechen allerdings die sorgfältigen Beobachtungen W. Müller's, der für die Raupe von *Didonis Biblis* angibt, dass sie in den letzten Stadien eine Schutzstellung annimmt und nur bei Nacht frisst. Die Raupe von *Dynamis* gleicht nach Demselben „einem mit Drüsenhaaren besetzten Pflanzengebilde“ die von *Catagramma pygmaea* gehört endlich wie die von *Adelpha* und *Eumica* zu den Blattrippenbauern und ist sehr empfindlich gegen ungewöhnliche Einflüsse.

Sicher ist somit, zumal wir keinen Fall eines aus einer schmackhaften Raupe hervorgegangenen immunen Schmetterlings, wohl aber das Gegenteil kennen, der Widrigkeitsgrad dieser Nymphalinen-Falter, wenn überhaupt nachweisbar, sehr gering.

In der That dürften aber vielleicht manche Aehnlichkeiten unter Nymphalinen verschiedener Gruppen auf Anpassungen an Angehörige derselben Familie zurückzuführen sein. So erinnert in der Gattung *Apatura* F., welche unsere „Schillerfalter“ enthält, eine Endform der indischen Vertreter, *A. Parysatis* Westw., in dem nach L. de Nicéville sehr seltenen Weibchen etwas an die gemeine *Ergolis Mariones* Cr. Dagegen ähnelt die nordindische *A. Chreana* Moore besonders im Weibchen auf der Oberseite auffallend der häufigen *Athyma opalina* Koll.

Unter den neotropischen *Apatura* erinnert bei *Ap. Scraphium* Hb. *Paronii* Humb. und *Griseoidis* F. das ebenfalls sehr seltene Weibchen durch die Oberseitenfärbung besonders der Vorderflügel an bestimmte mit ihnen zusammenliegende häufigere Arten von *Athyma* (*Ath. Iphicla* L., *Basilea* Cr., *Erotia* Hew. etc.)

In allen diesen Fällen scheint die als Modelle dienenden Arten nicht nur eine grössere Häufigkeit, sondern auch ein gewisser Grad der Immunität auszuzeichnen. Letzterer dürfte wiederum durch die eigenartige Raupennahrung bedingt sein. Denn die Larven gewisser indischer Arten von *Athyma* — über die Raupe von *Ath. opalina* ist noch nichts bekannt — leben von *Euphorbiaceen* mit adstringierend wirkenden Eigenschaften der Blätter (*Antidesma* [*Stilago*] und *Phyllanthus*). Ebenso leben die Raupen von *Ergolis* auf *Euphorbiaceen* (*Rhizinus* und einer kletternden *Tragia*). Endlich lebt nach W. Müller wenigstens die Raupe von *Adelpha Erotia* Hew. auf einer zu den allgemein adstringierend wirkenden Malpighiaceen gehörigen *Tetrapterys*. Dagegen lebt die Raupe von *Ad. Basilea* nach demselben an *Chalcophyllum* und die von *Ad. Iphicla* an *Bathysa* (Rubiaceen).

Für einen gewissen Grad der Immunität bestimmter Arten dieser *Adelpha*-Gr. spricht auch die zuerst von Dr. Staudinger (Exot. Tagfalter, Seite 261) erwähnte Aehnlichkeit von zwei *Ergolis*-iden (*Nymphidium claberrum* S. u. G. und *Phliasus* Cr.) mit ihnen. Dass dieser Immunitätsgrad aber nur gering sein kann, beweist das Blattrippenbauen der Raupen und die allerdings wenig ausgebildete Anpassung der Endformen, *A. Isis* und *Lara* Hew., an die Tracht des *Heliconius Melponome* L.

Von verschiedener, darunter auch von fachwissenschaftlicher, Seite aus wurde neuerdings noch der Versuch gemacht, die Aehnlichkeit zwischen einem Ort bewohnenden nicht näher verwandten Arten allgemein auf den blossen Einfluss der gleichen „äusseren Verhältnisse“ oder „Lebensbedingungen“ zurückzuführen. Dieser Deutung widerspricht aber, wie bereits A. Seitz hervorhob¹⁾, der Umstand, dass diese Aehnlichkeit sich in vielen Fällen bei der einen Form auf das Weibchen beschränkt, dessen Jugendstadien doch genau unter denselben Verhältnissen aufwachsen wie die des anderen Geschlechts.

Schliesslich haben wir noch auf die Einwürfe von David Symes einzugehen. Wie wir einem kleinen Aufsatz aus der Feder von A. R. Wallace²⁾, welcher Symes Hauptwerk „Modification of Organismus“

¹⁾ A. Seitz, die Schmetterlingswelt des Monte Corcovado (Stett. ent. Ztg.), S. 98.

²⁾ Nature, vol. 15 (1892) p. 31.

bespricht, entnehmen, stellt Symes überhaupt jeden Einfluss der Naturlauslese auf die Mimikry in Abrede und behauptet, dass die (zufällig besonders gefärbten oder gezeichneten) Insecten sich ihre Umgebung suchen, um ihre eigenen Farben damit zu mischen. Symes Angabe, diese ausserordentlichen Aehnlichkeitsfälle beschränkten sich auf die Insecten, wurde schon von Wallace *ibid.* zurückgewiesen. An Schilder'sche Ideen erinnert die Auffassung¹⁾, dass diese „wehrlosen Geschöpfe Verstand genug haben, um zu begreifen dass ihre Sicherheit darin liegt, dass sie Verfolgungen entgehen.“ Jeder aber, der Schmetterlinge einmal beobachtet hat, weiss, wie unendlich gering ihre intellectuellen Fähigkeiten entwickelt sind. Weiter kommt denn Symes in seinem Aufsätze zu dem Schluss, dass wir nur anzunehmen haben, ein Thier finde Sicherheit, indem es sich mit anderen Thieren associire, mit denen es eine gewisse Aehnlichkeit habe, anstatt die Hilfe der Mimikry oder der Naturlauslese anzurufen.

Dieser Einwurf enthält eine ja nie geleugnete Thatsache, die ebenfalls nur zur Begründung unserer Deutung führt, zieht jedoch die Entwicklung der Aehnlichkeit nicht in Betracht, welche eben nur zu lösen ist durch die Annahme einer natürlichen Auslese der den Modellen in verschiedenstem Grade angepassten Variationen, welche in allen nachweisbaren Fällen von dem für die Arterhaltung besonders wichtigen Weibchen ausgingen. Auch das Zusammenleben der schmackhaften mit den Schwärmen der immunen z. B. neotropischen Tagfalter ist nur als eine im Dienste der Arterhaltung stehende Triebabwässerung aufzufassen, die durch günstigen Zufall entstand und als zweckmässig vererbt wurde, da sie bei der geringen intellectuellen Entwicklung gerade der Falter unmöglich als vorbedachte und zweckmässig ausgeführte Handlung angesehen werden darf.

Die biologische Bedeutung der Mimikry im Thierreich.

Die verschiedenen Ziele, zu welchen mimetische Thierformen ihre schützende Verkleidung in meist zweckentsprechender Anwendung triebgemäss ausnützen, laufen zwar allgemein auf den Endzweck der Arterhaltung hinaus, sind aber doch in ihrer Verschiedenheit zugleich der Ausdruck ganz bestimmter Formen des Wettbewerbes unter den local concurrenden Arten.

Den ersten Versuch, diese Anpassungen unter besondere biologische Gesichtspuncte zu bringen, machte E. Krause²⁾, indem er die Mimikry-Erscheinungen in Nachahmungen 1) gemiedener, 2) gefürchteter, 3) auszubeutender Thiere unterschied. So wird Krause's Eintheilung in den ersten zwei Kategorien durch eine schützende Eigenschaft der Modelle, in der dritten durch oekologische Beziehungen zwischen Modell und Nachahmer bestimmt.

In allen diesen Fällen gehören die mimetischen Formen nach Krause relativ wehrloseren Abtheilungen an als ihre Modelle, denn auch für die Nachahmung zwischen immunen Schmetterlingen vermuthet derselbe eine Anpassung minder widriger an stärker widrige Formen, was wir im vorletzten Capitel zu berichtigen suchten. Der dritten Kategorie Krause's wären aber auch die Beispiele mimetischer Anpassung von ausgesprochenen Raubthieren an ihre harmlosere Beute einzureihen.

Eine andere Eintheilung stellte E. B. Poulton auf. Nachdem Derselbe die Färbung der Thiere in kryptische (Schutzfärbung) und sematische (Trotz-, Widrigkeits-, Ekel-Färbung) geschieden, definiert er

¹⁾ D. Symes, Topical Selection and Mimicry *ibid.*

²⁾ C. Sterne (E. Krause), Werden und Vergehen, 3. Aufl. 1886, S. 751—755.

die Mimicry¹⁾ als — „pseudosematische Färbung“²⁾, welche entweder gegen Feinde von Nutzen ist, wie die Anpassungen schmackhafter an geschmackswidrige Falter (pseudoaposematische Färbung) oder (pseudoposematische Färbung) den Fang der Beute resp. die Ausnutzung des Wirthes erleichtert. Hierher rechnet er auch — den beweglichen Fleischlappen des *Lophius piscatorius*!

In gewissem Widerspruch zu dieser Eintheilung steht die dritte Kategorie der Mimicry, die „pseudoallosematische“, Fremdkörper vortäuschende Färbung, in deren typischem Beispiel die Larve einer süd-amerikanischen *Stegaspis*-Art (Membracid.) mit ihrem blattartig dünnen, grün gefärbten Körper und den braunen Beinen eine ihr Blattstück tragende Saiba-Ameise (*Oecodonta*) nachahmen soll.³⁾

Entsprechend dem in den Gegenseitigkeitsbeziehungen der Thierwelt meist scharf ausgesprochenen Gegensatz zwischen Angreifer und Angegriffenem ziehen wir es vor, alle Fälle mimetischer Anpassung in zwei Hauptgruppen zusammenzufassen. Die erste enthält diejenigen mimetischen Formen, welche das fremde Kleid ohne Nachtheil für den rechtmässigen Besitzer nur zum eigenen Schutze gegen die Angriffe seitens besonders erbitterter Feinde ihrer speciellen Blutsverwandten tragen. Die hierher gehörigen Arten sind in der Mehrzahl schmackhaft und wehrlos, in der Minderzahl in gewissem Grade widrig oder durch Vertheidigungsmittel geschützt, dann aber meist selten.

Die zweite Hauptgruppe besteht dann aus denjenigen Anpassungsformen, welchen das entlehene Kleid zur individuellen oder ökonomischen Schädigung des Modelles auf Grund bestehender oekologischer Beziehungen dient. Zu dieser „Verkleidung der Angreifer“ stellen sowohl Anpassungsformen des Raubthieres an ihre schwächere Beute, als solche des schwächeren Schmarotzers an den wehrhafteren, auszunutzenden Wirth ihr Contingent.

Dass zwischen beiden Hauptgruppen auch Uebergänge vorkommen, lehren die Anpassungen gewisser *Toluella*- an die *Bombus*-Arten, bei denen ihre Larven schmarotzen, da sie nicht nur Anpassungen an den anzubeutenden Wirth, sondern zugleich auch solche an den im Weibchen gefürchteten Stachelträger vorstellen.

I. Anpassungen von Seiten der Angegriffenen.

Diese Anpassungen beziehen sich auf Modelle, welche durch besondere, für den Kampf um die Existenz vortheilhafte Eigenschaften, durch Körperhärte, durch Widrigkeit des Geschmackes, durch grössere Wehrhaftigkeit in höherem Maasse geschützt sind, als die sie nachahmenden Arten und sich ausserdem vor letzteren noch meist durch grössere Häufigkeit auszeichnen.

Die Anpassungen an bestimmte häufigere Arten, die sich nach Wallace eines so starken Körperpanzers⁴⁾ erfreuen sollen, dass sie von insectenfressenden Vögeln etc. nicht zernahmt werden können⁵⁾, beschränken sich auf solche an hartschalige *Curculioniden* und — in geringerem Grade — *Anthribiden* von Seiten anderer Insecten. Hierher gehören vor Allem die von K. Semper auf den Philippinen

¹⁾ Citirt nach Ph. Bertkau, Ber. ub. d. Leist. im Geb. d. Entomol. f. 1890 (Berlin 1891), S. 25—26.

²⁾ Dass nicht blos die „Färbung“ allein die Aehnlichkeit mit den Modellen bewirkt, sondern letztere sich auch in der Körperform aussprechen kann, beweisen vor Allem die Glaucoptiden-Gattungen *Pseudosphex* und *Myrmecopsis* (S. 77).

³⁾ Leider ist auch diese Arbeit Ponton's (Proc. Zool. Soc. London 1891, p. 462—464, Pl. XXXVI) mir nur aus Ph. Bertkau's Jahresbericht für 1891, S. 24 bekannt geworden.

⁴⁾ Es ist noch zu untersuchen, ob z. B. die *Pachyphachus*- und *Hellipus*-Arten nicht noch durch besondere Larvennahrung auch geschmackswidrig geworden sind. Dann fielen diese Fälle unter die nächste Kategorie.

⁵⁾ Nach meinen Beobachtungen in Siam bildeten gewisse relativ hartschalige Rüssler (*Tanyticus*), die ganz verschluckt werden, immerhin einen bestimmten Bestandtheil der Vogelernahrung, da ich sie häufig in Excrementen auffand.

entdeckten Anpassungsformen an die endemischen Pachyrhynchinen, so die Gryllide *Scopastus pachygyrchoides* Gerst. (S. 7) und mehrere Cerambyciden (*Dolops*, *Habropia*, *Apophata* S. 16). Auch für einen seltenen australischen Bockkäfer (*Stychnus anguliferoides*) dienen gewisse, in der That stahlharte *Amphelus*-Arten als Modell. Weiter erinnern nach Bates endlich auch in der neotropischen Region verschiedene seltene Bockkäfer an Curculioniden (*Heilipus*, *Crotosomus*) oder Anthribiden (*Ptychoderes*) theilweise selbst in der Art der Bewegung (S. 17).

Viel weiter verbreitet sind die Anpassungen der Angegriffenen an solche Formen, welche wegen widrigen Geschmackes von den Feinden ihrer Verwandten wenig verfolgt oder ganz verschmäht werden.

Hierher gehören neben Anpassungen an immune Käfer besonders solche an geschmackswidrige Schmetterlinge.

Unter den Coleopteren sind es in erster Reihe Angehörige der **Malacodermen** und unter diesen besonders Vertreter der oft in auffälligen Farben prangenden **Lycinen**¹⁾, welche als Modelle der Anpassung für Insecten derselben oder anderer Ordnungen dienen. Wie nun viele nur in geringem Grade angepasste Coleopteren erkennen lassen, ging der vollkommenen *Lycus*-Ähnlichkeit, welche sich ausser in der eigenartigen Form der Fühler, noch in der Rippenbildung und hinteren Verbreiterung der Flügeldecken ausdrückt, eine *lycoide* Färbung voraus, die hauptsächlich bei neotropischen Formen entwickelt und wohl als eine besonders feine Reaction variationsfähiger Formen auf specielle äussere Lokaleinflüsse anzusehen ist, aber erst bei selteneren, sich auch den Structurmerkmalen der Modelle anpassenden Arten durch Naturauslese zur *lycoide* Anpassung führte.

Vergl. Tab. XIII
und XIV.
Fig. 100—109

Zu diesen *Lycus*-Nachahmern stellen in der neotropischen Region neben schmackhaften, weichhäutigen Cleriden (*Chneoa*, *Plonium*, *Platynoptera*, S. 17—18), Oedemeriden (S. 15), weichhäutigeren Curculioniden (*Homalocerus* S. 15), Cerambycinen (*Pteroplatus*) und Lamiinen (*Hemilophus* S. 16) noch manche selbst in gewissem Grade immune Telephorinen (*Chauliognathus*, S. 14) und Hispiden (*Cephalodonta*, S. 17) ihr Contingent. Aehnliche Anpassungen an die australischen *Metriorhynchus*-Arten gehören ebenfalls zarteren Oedemeriden (*Pseudolygus*, S. 15), Cerambycinen (*Eroschema*, S. 16) und Curculioniden (*Rhinidia*, S. 16) an.

Von anderen Ordnungen der Insecten theilnehmen sich an den Anpassungen an Lycinen ausser einer Blattide der Gattung *Paratropa* (S. 7) auch einzelne tagfliegende Heterocerer (S. 73—74) aus den Familien der Aretiden (*Pionta lycoides*) und Glaucoptiden (*Lycomorpha*, *Mintiva*).

Nach den Lycinen dienen unter den Malacodermen besonders gewisse Lampyriden der neotropischen Region als Modelle für mimetische Anpassung seitens einzelner Blattiden (*Phoraspis*, S. 7) und Cerambyciden (S. 17). Letzterwähnte Familie stellt auch ausserdem noch Anpassungsformen an bestimmte Hispiden (*Cephalodonta*), deren Larven an Aristolochien leben (S. 17), sowie an schwammfressende **Erotyliden** und **Endomychiden** der neotropischen Region. Ausserdem dienen Erotyliden derselben Region noch mit ihnen zusammenlebenden Laufkäfern (*Lia*, S. 14), Melasomen (S. 15) und zahlreichen Arten der Chrysomeliden-Gattung *Doryphora* (S. 18) als Modell. Eine andere *Doryphora*-Art (*D. epilauchoides* Stul.) passte sich dagegen der Coccinellide *Epilachna radiata* Er. an, deren Larven auf Solanaceen leben, wie die taglebende Blattide *Cassidodes ligata* Brunn. (Philippinen) dortigen **Coccinellen**.

Vergl. Tab. XV
Fig. 110—111

Vergl. Tab. XV
Fig. 111—115

Neben den erwähnten mimetischen Arten²⁾ treten bei den Melasomen und Chrysomeliden gewisse

¹⁾ An siamesischen Lycinen beobachtete ich das Hervortreten gelber, stinkender Secrettröpfchen an den Körperseiten des ergriffenen Thieres.

²⁾ Aehnlich treffen wir ja auch in der Gattung *Ablipha* Vertretern anderer Gattungen als Modelle dienende Arten in der *Erotia*- und mimetische in der *Iris-Lava*-Gr.

Gattungen auch als Modelle auf; so ist der patagonische Laufkäfer *Agrilus fallaciosus* Chev. eine ausgezeichnete Copie von *Callipoltra* (Melasom.); so passten sich gewisse *Lema*-Arten Vertretern der zur selben Familie gehörigen *Diabrotica*-Arten an.

Unter den Lepidopteren treten, wie wir im descriptiven Theil (S. 19—73) und drei allgemeinen Capiteln (S. 82—125) auseinandersetzen, Anpassungen an bestimmte, wohl grossentheils infolge besonderer Raupennahrung geschmackswidrig gewordene Modelle aus derselben Ordnung nicht nur zwischen Angehörigen verschiedener Familien, sondern sogar innerhalb einer Gattung (*Papilio*, S. 82—98) uns entgegen. Nur ausnahmsweise finden wir Anpassungen an immune Schmetterlinge seitens der Angehörigen anderer Insectenordnungen; so ähnelt die seltene *Corydia nuphialis* Gerst. einer indischen *Eusemia* und die ebenfalls zu den Blattiden gehörige *Paratropa elegans* Burm. der neotropischen *Cissura decorans* Walk. (S. 6—7).

Anpassungen an widrige Insecten anderer, als der erwähnten Ordnungen kommen anscheinend nur vereinzelt vor. So hob A. Giard¹⁾ die Anpassung der zu den europäischen Dipteren gehörigen Stratyomide *Boris collata* Först. an die nach ihm durch unangenehmen Duft beschützte Tenthredinide *Athalia annulata* F. hervor. Weiter erwähnte Bates Anpassungen zweier neotropischen Bockkäfer (*Gymnocerus capaciens* und *doleisimus*) an (wahrscheinlich durch unangenehmen Gestank geschützte) Landwanzen (*Pachyotris Fabricei* und *Scutellaria* sp.).

Unter den Vertebraten ist nur ein einziger Fall wahrscheinlicher mimetischer Anpassung einer viel verfolgten schmackhaften an eine durch Widrigkeit des Geschmackes geschützte Form derselben Klasse bekannt. Derselbe betrifft die Aehnlichkeit des Eichhörnchens *Rhinoscirurus tapaioides* Gray (Java, Sumatra) mit der zu den Insectivoren gehörigen *Tupaia ferruginea* Raffl. Denn die Tupajen besitzen, wie ich mich selbst in Siam überzeuge, ein widrig duftendes Fleisch und werden infolgedessen auch z. B. von den sonst nicht wählerischen Eingeborenen verschmäht.

Besonders interessant sind die Anpassungen mehr oder minder schmackhafter und wehrloser Formen an solche, welche durch stärkere oder besondere Verteidigungsmittel geschützt sind. Hierher gehören als Modelle vorerst solche Arten, welche die Kraft ihrer starken Kiefern zu gefürchteren Raubthieren macht, so unter den Käfern die **Cicindelen**. Vielleicht sind die schützenden Anpassungen seltener Grylliden (*Phylloscirtus*, S. 8),²⁾ oder Locustiden (*Coudylodera*) an die Cicindelen hauptsächlich ein Schutzmittel gegen Angriffe schwächerer Raubinsekten oder gar der Cicindelen selbst. — Zu dieser Kategorie ist wohl auch die Anpassung des seltsamen Grylliden *Stenopelmatus monstruosus* (S. 8) an die Soldatenform der Termiten zu rechnen.

Unter die Anpassungen seltenerer wehrloser Thiere an häufigere, besser bewehrte dürften auch die zuerst von A. R. Wallace hervorgehobenen Anpassungen von Seiten „schwacher und feiger Pirole“ an die angriffslustigen **Tropidorhynchen** (*Philomus*) gehören, in deren sich auch gegen Raubvögel vertheidigenden Schwärmen die ihnen ähnlich gefärbten *Mimeta*-Arten sich bergen (S. 81). Vielleicht gehört auch das „Sperberkleid“ wenigstens des indischen *Hieracoccyx sparveroides* Vig., dessen Anblick alle kleinen Vögel beruhigen soll, unter die Kategorie der schützenden Anpassung.

¹⁾ A. Giard. Sur un Diptere etc. Extr. d. Compt. rend. des séances d. l. Soc. d. Biologie 23 Janv. 1892.

²⁾ Die *Phylloscirtus*-Arten gleichen Vertretern der neotropischen Cicindeliden-Gattung *Odontocheila* und leben wie diese auf Blättern, wofür ihnen nach A. Gerstaecker (Stett. ent. Ztg. 1863, S. 413): „ihre vom Typus abweichenden gekämmten Fussklauen gut zu Statten kommen müssen.“

In viel höherem Grade als die nur durch starke Mundwerkzeuge etc. geschützten dienen diejenigen Formen als Modelle, welche im Besitz **besonderer, mit Giftdrüsen verbundener** Wehr- und zugleich Angriffsmittel sind.

In erster Reihe gehören unter den Insecten die Weibchen der **stechenden Hymenopteren** (Acleuten) hierher.

So passten sich den **Ameisen**, von denen viele Arten empfindlich stechen, vorerst zahlreiche Araneiden aus der Familie der Attiden, der Drassiden und sogar eine Theridiide (*Fornicina*) an (vergl. S. 6 und Nachtrag dazu). Von Insecten gehören hierher die merkwürdige Locustide *Myrmecophana fallax* Brunn. (S. 9), zahlreiche S. 9—10 genauer besprochene Hemipteren und unter den Käfern gewisse Anthiciden (*Fornicosomus*).

Den flügellosen, wegen ihres Stiches besonders gefürchteten Weibchen der **Mutillen** ähneln zahlreiche Clerus-Arten der gemäßigten und tropischen Regionen¹⁾ (S. 18).

An die oft noch nebenbei durch widrigen Gestank geschützten **Mordwespen** (Fossores) erinnern besonders gewisse Locustiden (*Scaphura*) Brasiliens, deren Familiengenossen von jenen Räubern nach Bates ganz besonders eingetragten werden. So dürfte diese Aehnlichkeit mit den speciellen Feinden ihrer Verwandten sie vielleicht besonders vor den Angriffen der Grabwespen schützen.

Eine Reduviide aus Nicaragua, *Spiniger tubicornis* (S. 16), copirt sogar die eigenartigen Bewegungen der *Priocanis*-Art, welcher sie im Habitus ähnelt. Hierher gehört auch neben anderen auf S. 19 erwähnten Boeckkäfern der merkwürdige *Colomborhombus fuscipennis* Pryer (S. 18), der seine Hinterflügel im Sitzen ausgespreizt hält und so den weissen Subapicalfleck zeigt, welcher den auf dem Vorderflügel der Mordwespe (*Mygminia arictus* Sauss.) vorhandenen Fleck wiedergibt.

Nach den interessanten Beobachtungen von A. Seitz²⁾ werden gewisse brasilianische *Pepsis*-Arten³⁾ durch bestimmte grünmetallisch schimmernde *Macrocercus*-Arten (Glaucoptid.) bis auf die Spreizbewegungen der Flügel copirt und die nachschleppenden, seitlich durch Haarkämme in der Ebene verbreiterten Hintersehienen des Schmetterlings erhöhen noch die Aehnlichkeit des fliegenden Thieres mit dem Modell.

Die ebenfalls an Sphegiden erinnernde neotropische Glaucoptide *Pseudosphex hyalinus* Walk. (S. 76) ist ein schönes Beispiel für die allmähige Ausbildung mimetischer Anpassung an die Wespentracht. Wie bei der Ameisen ähnlichen Locustide *Myrmecophana fallax* (S. 9) wird auch bei *Pseudosphex* die schlanke Form des Abdomens des betreffenden Acleuten für das Auge des Feindes dadurch vorgetäuscht, dass die Flanken des breiten Hinterleibes durch kreideweisse Färbung theilweise zugedeckt werden.

Ausser Vertretern der bereits genannten Ordnungen nehmen an der Anpassung an *Pepsis*-Arten auch gewisse neotropische Dipteren, wie die Asilide *Mydas rubidipes* Wied. etc. (S. 77) Theil.

Von Anpassungen an die grossen, mit fürchterlichem Stachel bewaffneten **Scolien** ist neben denjenigen seitens gewisser Raubfliegen (*Dolichopaster*) (S. 78) und einzelner Grabwespen (S. 10) besonders noch die der schönen Sesiide *Scalioptima insignis* Pryer (Borneo, S. 75) hervorzuheben.

¹⁾ Auch in den Bergen Siam's ting ich *Clerus* sp. und *Mutilla*-Weibchen am selben Ort und selben Tage zusammen. Nach L. Imhof (Einführung in d. Stud. der Coleopteren 1856, S. 29) ähnen noch *Carpusoma mutillarum* (Cerambycid.) und *Cyphus Linnaei* (Curcul.) täuschend eine *Mutilla* nach.

²⁾ A. Seitz, die Schmetterlingswelt des Monte Caracado (Stett. ent. Ztg. 1891, S. 262—263).

³⁾ Wie Seitz mit Recht hervorhebt, braucht in solchen Fällen das Modell, wenn es nur hinreichend gekannt und gefürchtet ist, nicht seltener zu sein, als die nachahmende Art, und in der That ist z. B. die *Pepsis*-ähnliche *Macrocercus* Job. L. nach Seitz heute sogar entschieden häufiger als das Modell.

Vergl. Taf. XIV
Fig. 124 125

Viel zahlreicher sind Anpassungen an **Vespiden**, besonders an *Polistes*- und *Polybia*-Arten der neotropischen Region. So erinnern gewisse Kleinzirpen (*Heteronotus*, *Tettigonia*, S. 10) an *Polistes*-Arten, so gewisse Grabwespen (*Georgies*, S. 10) an *Polybia*-Arten. Die neuholländische Cerambyciden-Gattung *Esthesis* gleicht gelb geringelten Vespiden.

Besonders interessant sind die wundervoll ausgebildeten Anpassungen aus zwei Schmetterlingsfamilien. So gleichen gewisse Sesiiden (*Trochilium*) in Europa grossen *Vespa*- in Nordamerika theilweise *Polistes*-Arten (S. 75). Noch höher ausgebildete Anpassungsformen liefern die neotropischen Glaucopiden in den Gattungen *Spherosoma* und *Myrmecopsis* (S. 77). Bei diesen bildet sich nämlich (vergl. Taf. XIII) eine wirkliche „Wespentaille“, eine an der Basis stielartig verschmälerte Hinterleibsform aus, wie sie jene Aculeaten charakterisirt. So wird hier der höchste im Thierreich überhaupt nachgewiesene Grad der Anpassung an die Modelle erreicht.

Weniger häufig und ausgebildet sind mimetische Anpassungen an die **Apiden**.

An die *Bombus*-Arten erinnern unsere Hummelschwärmer (*Maer. bombyliformis* S. 74), und unter den Dipteren einige Asiliden und Syrphiden (S. 78), darunter auch besonders die bei ihnen schmarotzenden *Volucella*-Arten. Während die indische *Lophura Uglas* Bsd. (S. 75) nur unbedeutend gewissen grünbehaarten *Nyctopoda*-Arten ähnelt, mit denen ich sie oft zusammen traf, ahmen dagegen die zu den Sesiiden gehörigen *Melittia*-Arten (S. 75) durch die gelbe und schwarze Zotten tragenden, an die Sammelhosen der Blumenbienen (*Anthophora*) gemahnenden Hinterbeine, die sie im Fluge genau tragen wie die Bienen, durchaus *Anthophora*-Arten nach, denen sie auch nach A. Seitz darin gleichen, dass sie sich „nicht auf die Blüthe niederlassen, sondern davor schwebend erhalten.“

Auch viele **Schlupfwespen** sind im Stande, ziemlich empfindlich zu stechen.¹⁾ So kann man denn auch den einheimischen Boekkäfer *Molochorus salicis* F. (S. 18) als Anpassungsform an Schlupfwespen, wie *Anomalus heros* Wesm., ansehen, denen er in der That recht ähnlich ist.

Die einzigen Wirbelthiere, welche wegen besonderer, mit Giftdrüsen in Verbindung stehender Verteidigungs- und Angriffswaffen als Modelle der Anpassung für wehrlosere Formen gedient haben dürften, scheinen die **Giftschlangen** zu sein.

Ganz vereinzelt steht die wenig ausgebildete Anpassung eines neotropischen Batrachiers (*Ptygmiscus varius*, S. 78) an *Elaps*-Arten da. Häufiger sind dagegen Anpassungen von anscheinend weniger giftigen Schlangen (*Collophis*) an stärker giftige Arten (*Adenophis*) derselben Unterfamilie (Elapinae) oder solche von vollständig harmlosen an unzweifelhaft giftige Vertreter derselben Familie. Besonders zahlreich sind die Färbungsanpassungen an die neotropischen *Elaps*-Arten (Proteroglyph.) von Seiten vollkommen harmloser Schlangen (Aglyph.).

Hier dürfte vielleicht auch als einziges mir bekannt gewordenes Beispiel der mimetischen Anpassung eines im Wasser lebenden Thieres die des zu den Opisthoglyphen gehörenden Homalopsiden *Hipistes hyalinus* Cant. aufzuführen sein, welcher giftigen Seeschlangen sehr ähnlich ist, mit denen er zusammen lebt.

Mimetische Anpassungen seitens der Angreifer.

Verhältnissmässig selten sind diejenigen Fälle mimetischer Anpassung, in welchen letztere, bedingt durch ein oekologisches Verhältniss, das die wichtigsten Interessen der nachahmenden Art, die Ernährung und die Unterbringung der Nachkommenschaft betrifft, dem Angreifer im Kampfe um die Existenz Nutzen bringt.

¹⁾ Nach einem Referat aus der Revue entomolog. soll R. du Buysson neuerdings auch bei acht verschiedenen Arten von Ichneumonem Giftblasen nachgewiesen haben

E. B. Poulton hat diese Fälle neuerdings als „aggressive Mimicry“¹⁾ der „protectiven“ gegenübergestellt, obwohl die Verkleidung selbst stets doch nur als Schutzmittel, nie als Angriffswaffe dient, selbst wenn sie vom Angreifer getragen wird.

Anpassungen der aggressiven an die angegriffene Partei finden sich auch bei Raubthieren nur vereinzelt und anscheinend besonders bei solchen Formen, welche, wenn auch wehrhafter, doch schwerfälliger als ihre Beute sein dürften. So erinnert von den Neuropteren (S. 11) *Bilacus* an die Tipuliden, von denen er lebt, und *Drepanopteryx* an kleine Nachschmetterlinge, *Drepana* etc., von denen er sich nach Brauer l. c. vielleicht nähren dürfte.

Etwas häufiger dürften diejenigen „schmarotzenden“ Formen sein, welche das Kleid der Wirthe tragen, in deren Bau sie ihre Brut unterbringen. So erinnern unter den Hymenopteren *Melobela*-Arten an die Anthophoren, bei denen sie schmarotzen. Ob jedoch die ausgebildete Aehnlichkeit, welche z. B. *Polistomorpha Surinamensis* mit *Polybia testacea* und *Chalvis emarginata* und *punctata* mit *Polyb. Cayennensis* haben, in der That dazu dient, diesen parasitischen Hymenopteren den Zutritt in das Nest der betreffenden *Polybia*-Arten zu ermöglichen, ist erst durch die Beobachtung zu entscheiden.²⁾ Mit grösserer Sicherheit dürfen wir die Anpassung gewisser bei *Bombus*-Arten schmarotzender *Volucellen* hierher rechnen, deren bekannteste Art in zwei Formen vorkommt, von denen die eine (*bombylicus*) durch schwarze, am Hinterleibsende rothe Färbung kleinen Stücken des *B. lapidarius* gleicht, während die andere Form (*planata*) mit gelbem, inmitten schwarzen Brustschilde und gelbbelhaartem, hinten weisslichen Abdomen eher an abgeriebene kleine Formen des *B. muscorum* und *horreorum* erinnert. Es würde von Interesse sein, zu beobachten, ob nun die verschiedenen Weibchenformen zu ihrer Eiablage, bei der ihnen die in der That vorhandene Aehnlichkeit mit den betreffenden *Bombus*-Arten besonders von Nutzen sein soll, auch stets die Nester derjenigen Hummelart aufsuchen, welcher sie selbst gleichen.

Ein Beispiel von schützender Aehnlichkeit einer ihre Eier in fremde Nester legenden Vogelart mit ihrem Wirth dürfte ein indischer Kukul *Sarcinatus lugubris* Horsf. (*Coccyzus dicranoides* Cab.) abgeben, welcher das Kleid der aggressiven Drongos (*Dicrurus*) trägt, in deren Gelege er auch sein Ei unterbringt.

Analogie, Convergenz und Mimicry.

Das Ergebniss der Untersuchungen des I. Theils dieser Arbeit berechtigte uns für die Species der Gattung *Papilio* zu dem Urtheil, dass die äussere Erscheinung einer Art, wie sie sich in Form, Zeichnung und Färbung ausspricht, nicht immer nur die Blutsverwandtschaft innerhalb eines engeren Artenkreises ausdrückt. So dürfen wir der alten systematischen Schule, welche nach A. R. Wallace (Darwinism) l. c. p. 187) in der Färbung nur einen „trivial character eminently instable and untrustworthy in the determination of species“ erblicken zu müssen glaubte, doch insoweit Recht geben, als bei einer Untersuchung über die Blutsverwandtschaft auch nur der Arten einer Gattung einer Vergleichung der äusserlich in Erscheinung tretenden Eigenarten des Habitus die sorgfältige Berücksichtigung aller in den Harttheilen gegebenen Structurmerkmale voranzugehen und allein als Grundlage zu dienen hat.

¹⁾ E. B. Poulton, Volucella as example of aggressive Mimicry (Nature, Vol. 17. 1892] p. 29).

²⁾ Zwei weitere nach A. Gerstäcker zur Mimicry gehörige Fälle einer gewissen Aehnlichkeit zwischen parasitischen Schlupfwespen (*Cryptus argyrolus*) resp. Diekhornfliegen (*Comptosia diabolus*) und ihren Wirthen (*Vespa gallica* resp. *V. germanica*) sind wohl nicht als Anpassungserscheinungen an die Modelle aufzufassen, da vor Allem die Aehnlichkeit zu gering ausgebildet ist, um eine Täuschung hervorrufen zu können.

Die Factoren nun, welche den sog. Habitus, d. h. Form, Zeichnung und Färbung, modifiziren und aus Varietäten Rassen und endlich isolirte Arten bilden, die schliesslich wieder zu Vertretern von Untergattungen etc. sich umbilden können, dürften neben schwerer nachweisbaren Aeusserungen „innerer Bildungsfortschritte“ in erster Reihe auf äussere Einflüsse der besonderen physikalisch-chemischen und oekologischen Existenzbedingungen zurückzuführen sein, welche auf die bestimmte Constitution nach verschiedenen Richtungen hin einwirken.

Scheiden wir vorerst die zahlreich im Thierreich verbreiteten Analogieen des Körperbaues aus, welche sich als bedeutungsvolle und notwendige Anpassung an dieselbe bestimmte Lebensweise zu erkennen geben (Fischform der Wale; Grabfüsse von *Notoryctes*, *Talpa*, *Gryllotalpa*; Flughäute von *Petaurus*, *Galeopithecus*, *Pteromys*, *Draco*), so dürfen wir die offenbar im Allgemeinen für die Lebenserhaltung mehr irrelevanten Aehnlichkeiten im Habitus, wie sie sich z. B. zwischen den Vertretern verschiedener Gattungen, Familien oder Ordnungen zeigen, als zufällige Aehnlichkeit (accidental resemblance) bezeichnen, sobald beide Formen eine durchaus verschiedene Lebensweise führen oder von einander weit entfernten Wohnbezirken angehören. So ähnelt von den zu letzterwähnter Kategorie gehörigen Formen nach W. Buller¹⁾ ein neuseeländischer Kukuk (*Eudynamis*) einem nordamerikanischen Habicht. Solche Aehnlichkeiten sind auch unter den Insecten trotz der Fülle der Formen nur vereinzelt, und zwar besonders bei Coleopteren,²⁾ nachgewiesen worden. Natürlich kommen dieselben desto leichter vor, je näher die beiden in Frage stehenden Arten mit einander verwandt sind. So erinnert unter den Tagfaltern die einzige Vertreterin der indischen Eryciniden-Gattung *Stiboges*, *St. Nymphtidia* Btr., an mehrere Arten der rein neotropischen Gattung *Nymphidium* F.³⁾ Im Allgemeinen wirkt jedoch der längere Einfluss der äusseren physikalisch-chemischen und oekologischen Eigenarten des bestimmten Wohnortes bei den überhaupt einer empfindlichen Reaction fähigen Formen auf die durch „constitutionelle Ursachen“ mehr oder minder bestimmten Entwicklungsanlagen so eigenartig ein, dass der Kenner nach dem Habitus auch einer ihm bis dahin nicht vorgekommenen Art oft ihre Heimath anzugeben weiss. So erwähnt O. Thieme (l. c. p. 192—193) als besonders auffällig die aus Roth und Blau bestehenden „Cubafarben“ verschiedener Cerambyciden (*Trichous*, *Callidium*, *Eburia*, *Erechonius*) und Chrysomeliden (*Cryptoccephalus bicinctus*) und die habituelle Gleichartigkeit der aus Chile stammenden Coleopteren, die sich besonders in der „überwiegenden Neigung zu prismatischer Farbtheilung“ ausspricht und bei Angehörigen ganz verschiedener Familien (Carabiden und Cerambyciden) vorkommt.

Gesellt sich zu der Gemeinsamkeit des Aufenthaltsortes mit einander nicht näher verwandter Formen noch eine Gleichartigkeit der Anpassung an dieselbe bestimmte Lebensweise, so entsteht, besonders zwischen den Bewohnern eigenartiger oder isolirter Lokalitäten, oft jene bei den Insecten besonders entwickelte relative Aehnlichkeit des Habitus, welche wir als Erscheinung der Convergenz bezeichnen.

¹⁾ Citirt bei Fr. E. Beddard, some recent observations upon Mimicry (Nat. Science I, 1892, p. 13).

²⁾ Vgl. darüber J. O. Westwood, Illustr. of Relationships etc. (Trans. Linn. Soc. 1837, p. 409) und A. Gerstäcker l. c. (Stett. entomol. Zeitung XXV, 1863).

³⁾ Die weiteren, soviel mir bekannt, in der lepidopterologischen Literatur angeführten Fälle zufälliger Aehnlichkeit beschränken sich auf A. Gerhard's Zusammenstellung (Boll. Soc. Ent. Ital. XV 1883, p. 158) zweier einander kaum ähnlicher Vertreter verschiedener Familien, des *Satyrus brahminus* (Himalaya) und des *Papilio Cynorta* F. (Afrika) und auf die Angabe Dr. Standinger's (Exot. Schmetterl. S. 92), dass die brasilianische *Phyciades leucodesma* Feld. „oben ziemlich stark an die ebenfalls zu den Nymphalinen gehörige *Neptis livideli* aus Madagascar erinnern und dadurch gewissermassen eine Widerlegung der Mimicry-Theorie bilden.“ In der That ist diese Aehnlichkeit auf der Oberseite aber nur ganz oberflächlich und findet sich auch bei verwandten, anscheinend ebenfalls das ursprüngliche Nymphalinen-Kleid tragenden, amerikanischen *Phyciades*-Arten, wie bei *Ph. Ofello* Hew. etc.

Beispielsweise zeigen nach O. Thieme l. c. die Laufkäfer der Canaren „eine Neigung zur Rundung und Verbreiterung; namentlich mögen sie das Halsschild häufig erweitern.“

Von den übrigen Familien der Coleopteren treten uns auffällige Aehnlichkeiten zwischen Angehörigen anderer oder derselben Untertamilie bei verschiedenen Gattungsvertretern der Lamellicornien¹⁾ der Cerambyciden²⁾ und der Curculioniden³⁾ entgegen.

Auch bei den doch sehr variationsfähigen Lepidopteren sind solche Convergencescheinungen zwischen denselben District bewohnenden Vertretern verschiedener Gattungen verhältnissmässig selten. Als besonders charakteristisch erwähnen wir die Aehnlichkeit zwischen einzelnen neotropischen Nymphalinen aus den Gattungen *Catagramma*, *Callithea* und *Agrias*.

Seltener sind solche bestimmt ausgebildete Aehnlichkeiten, welche wir nicht als Ausdruck mimetischer Anpassung anzusehen brauchen, sondern noch durch Convergenz erklären können, zwischen Vertretern verschiedener Familien. So erinnert der seltene einheimische Spanner *Phosoria diversata* (S. 21) an die häufigen *Brophos*-Arten. Ein noch interessanteres Beispiel der Convergenz zwischen Angehörigen zweier Familien liefert uns die abenteuerliche Laufkäfergattung *Mormolyce* Hagend., welche nicht nur allein im Vaterlande (Java), sondern auch nur am bestimmten Aufenthaltsort der viel kleineren pilzfressenden Endomychiden-Gattung *Eumorphus* Web. entstehen konnte, den auch ihre wohl carnivore Larve theilt.

Vielleicht gehört auch die von K. M. Heller hervorgehobene Aehnlichkeit zwischen der madagassischen Cicindele *Perideria fulvipes* Dej. und dem mit ihr zusammen vorkommenden Pompiliden *Pogonius venustissimus* Sauss. hierher, welche sich allerdings nur in der Färbung der Vorderflügel ausspricht, die bei beiden in chromgelbem Grunde zwei schwarze Querbänder und bei der Mordwespe noch eine solche Spitze führen. Heller rechnet diese Aehnlichkeit unter die Fälle der „aggressiven Mimicry,“ da er die Cicindele als „den nachgeahmten Theil“ ansieht, dem die Mordwespe sich anpasste, um sich ihm desto leichter annähern zu können. Gegen diese Ansicht spricht aber schon das in der Gattung *Pogonius* allgemeine⁴⁾ Vorkommen zweier schwarzer Flügelbänder auf wasserhellem Grunde. Ausserdem gehört denn doch mehr dazu als die ähnliche Färbung der den Körper durchaus nicht deckenartig umschliessenden Vorderflügel, um eine Grabwespe als Cicindele erscheinen zu lassen.

Schliesslich könnte diese Anpassung nur dann von Nutzen sein, wenn die Mordwespe hauptsächlich diese Cicindelen für ihre Brut einschleppte.⁵⁾ Viel näher hätte die Deutung gelegen, dass die Cicindele sich der stechenden Hymenoptere angepasst, um im Kleide der letzteren sicherer zu sein.⁶⁾

Von den Erscheinungen der Convergenz zu denen der echten Mimicry führen besonders solche Formen über, welche Vertretern anderer offenbar in höherem Grade als sie selbst geschützter Familien, mit denen sie zusammen auch die gleiche Lebensweise führen, in beiden Geschlechtern zwar in gewissem Grade ähnlich, aber doch noch nicht derart angepasst sind, dass sie einen Vertreter der anderen Familie

¹⁾ Nach O. Thieme l. c. p. 193 stimmen z. B. das coprophage *Pachysoma Aesculapius* Ol. mit dem Dynastiden *Syrichthus verus* Burm. (Capland) in „merkwürdigster Weise in der ganzen Erscheinung überein.“

²⁾ Hierher gehört auch die Aehnlichkeit zwischen *Nemophas Graji* und *Agria fasciata*, welche ihr Entdecker, A. R. Wallace, als mimetische Anpassung seitens der selteneren Art ansah.

³⁾ Mehrere Beispiele aus der neotropischen und madagassischen Fauna finden sich bei K. M. Heller, ein bemerkenswerther Fall von Mimicry (Entomol. Nachr. XVIII, 1892, S. 183—185).

⁴⁾ J. Lennis, Synopsis d. Thierreichs, 3. Aufl., bearb. v. H. Ludwig, II. S. 634.

⁵⁾ Nach der Nahrung unserer einheimischen *Pogonius*-Larven zu schliessen, die besonders aus einheimischen Spinnern besteht, dürfte das wenig wahrscheinlich sein.

⁶⁾ So besteht auch eine gewisse Aehnlichkeit zwischen indischen Collyrinen und Sphexiden, ist aber zu unbedeutend, um als Anpassung an letztere angesehen werden zu dürfen.

vortäuschen könnten. Hierher gehören die Aehnlichkeiten zwischen gewissen afrikanischen eine mehr nächtliche Lebensweise führenden und zwischen taglebenden neotropischen Carabiden mit zur selben Zeit sich herumtreibenden Melasomen (S. 13). Dahin gehört auch die Aehnlichkeit der Laufkäfer-Gattung *Physodera* Esch. (Java) mit Arten der Eodornychiden-Gattung *Eucymon* Gerst., dahin endlich die der lycoid gefärbten Formen¹⁾ mit den Lyciden selbst.

Die Untersuchungen an den Papilio-Arten machen es nun wahrscheinlich, dass sich bei solchen in beiden Geschlechtern unbedeutend an gewisse Modelle erinnernden Formen die Aehnlichkeit zu einer gelungenen Anpassung dadurch steigern konnte, dass von den bei Nothlage der Art variirenden Weibchen in Folge natürlicher Anlese die dem Modell besser angepassten erhalten blieben und diese Erwerbung allmählig auf das Männchen vererbten. Denn bei allen in beiden Geschlechtern mimetischen Arten ist die Aehnlichkeit des Weibchens mit dem Modell bedeutender als die des Männchens.

Diese allmähliche Ausbildung eines secundären Dimorphismus der Weibchen zur Mimicry geschieht oft derart, dass zuerst nur der allgemeine Typus immuner Familien²⁾ nachgeahmt wird. So erinnert das Weibchen der neotropischen Erycinide *Aricoris Crpha* F. (S. 63) nur im Allgemeinen an die Tracht kleiner Neotropinen des Melinaea-Typus oder Aeraea-Arten (Thalia-Gr)

Hierher gehört auch der einzige mir bekannte Fall einer Anpassung von Seiten der Morphinen. Denn bei einer kleinen Art der brasilianischen Gattung *Morpho*, bei *M. Aegy* Hb., ähnelt von den drei bei Dr. Staudinger (l. c. p. 206) erwähnten Varietäten des Weibchens die am meisten vom blaüflügeligen Männchen abweichende l. c. auf Taf. 67 abgebildete Weibchenform aus Rio auf der Unterseite der Flügel noch den die ursprüngliche Artzeichnung tragenden Weibchen anderer durch ursprünglichere Zeichnung dieses Geschlechts in gewissem Grade dimorpher *Morpho*-Arten. Auf der Oberseite dagegen erinnert sie in gewissem Grade besonders durch die Färbung mehr an Formen von *Lycorva* Hb., als an die viel kleinere *Aeraca Thalia* L.

Den nächsten Grad der mimetischen Anpassung erreichen nun diejenigen secundär dimorphen Weibchen, welche sich wenigstens einer bestimmten Art von immunen Faltern anpassen, aber erst einen so geringen Aehnlichkeitsgrad mit letzteren repräsentiren, dass wir Bedenken trugen, sie im descriptiven Theil als mimetische Formen anzuführen. Hierher gehört z. B. die von dem constanten Männchen am meisten abweichende Weibchenform der afrikanischen Nymphaline *Cynothoe Theodora* Hew., die etwas an *Amavris Nivius* L. erinnert.

Durch die bestimmte Anpassung an die gleichen Modelle treten zwischen den mimetischen Formen eines durch die Verbreitung der immunen Arten bestimmten Gebietes zahlreiche Analogien des Habitus auf, welche, obwohl meist auf verschiedenen Wegen entwickelt, doch demselben Ziele dienen: dem Schutze der Art, besonders im Weibchen, durch möglichst gesteigerte Anpassung an die Tracht bestimmter Modelle. Nachfolgende Tabellen stellen die wichtigsten dieser analogen Formen unter den Schmetterlingen zusammen, insbesondere, insoweit sie die auf den Tafeln V—XII abgebildeten Beispiele zu ergänzen vermögen.³⁾

¹⁾ Hierher gehört auch die neotropische Chrysomeliden-Gattung *Schematiza* Blanch.

²⁾ Hierauf wies schon G. Scudder in seinem grossen Werk über die „Butterflies of Eastern United States“ hin.

³⁾ Die einzige uns während des Druckes dieser Arbeit bekannt gewordene weitere mimetische Form aus der äthiopischen Region ist *Danaus (Tirantula) Morganii* Hour., für die der Autor die Gattung *Elso* errichtet hat, eine mittelafrikanische Art, welche in beiden Geschlechtern — bisher ist erst das Männchen bekannt — den *Amavris*-Arten, wie *A. Egiaca* Cr., gleichen wird. Vergl. E. Honratb. neue Rhopaloceren. Berl. Entomol. Zeitschr. Bd. XXXVI. 1891, Heft 2, S. 436—437, Taf. XV, Fig. 5).

Vergleichen wir nun noch die verschiedenen Formen des Thierreiches, die wir als Modelle und Nachahmer kennen gelernt haben, auf den Grad ihrer Blutsverwandtschaft hin, so finden wir nur unter den Schmetterlingen und nur in der einzigen Gattung *Papilio* beide in einem Genus vereinigt, wenn auch verschiedenen Untergattungen angehörig.

Dagegen kommen Anpassungen an Vertreter anderer Gattungen derselben Unterfamilie ausser bei Lepidopteren zwischen Danainen (S. 116) und den Neotropinen (S. 117—123) noch bei Heliconiern (*Eucides* S. 57) und Nymphalinen (*Victorina* S. 62, *Apatura*, *Athyma* S. 130) vor und finden sich endlich bei den Reptilien in der Unterfamilie der proteroglyphen Elapinen.¹⁾

Häufiger sind schon Anpassungen an Vertreter verschiedener Unterfamilien. So erinnern unter den Hymenopteren gewisse Melectinen an *Anthophora*-Arten (S. 11), unter den Coleopteren einzelne seltene Lampyrinen und Telephorinen (p. 14) an Lycinen. Unter den Lepidopteren haben sich gewisse Pieriden der Gattungen *Prioneris* (S. 36), *Pieris*, *Eronia* (S. 41) an *Delias*- resp. *Mylothris*-Arten angepasst wie die Danaer der Gattungen *Lycarea* und *Itana* den Neotropinen. Von Nymphalinen ähneln Vertreter der Gattung *Pseudaricia* (S. 43) und *Phyciodes* (S. 62) Vertretern von *Acracinen*, während andere Arten von *Phyciodes*, wie solche von *Adelpha* und *Apatura*, sich den Heliconiern anpassen.

Hierher gehören auch die S. 79—80 erwähnten Anpassungen von Vertretern der Opisthoglyphen oder Aglyphen an die Unterabtheilung der proteroglyphen Elapinen.²⁾

Die Zahl derjenigen mimetischen Arten, deren Modelle zu einer ganz verschiedenen Familie derselben Ordnung gehören, übersteigt diejenige aller anderen Abtheilungen bedeutend. Unter den Hymenopteren haben sich Grabwespen (S. 11) Arten von Vespiden und Scoliden, Chalcididen solchen von Vespiden (*Polobia*, *Eumenes*) angepasst. Unter den Coleopteren erinnern gewisse Carabiden (*Agrius* S. 13) an Melasomen, andere (*Lia* S. 14) an Erotyliden, seltene Melasomen (S. 15) an Erotyliden, gewisse Cleriden (S. 15), Oedemeriden (S. 15), Curculioniden (S. 13) zahlreiche Cerambyciden (S. 16) und einzelne Hispiden (S. 17) an Lycinen. Während wieder andere Cerambyciden bestimmten Curculioniden (S. 16 u. 17), Hispiden, Erotyliden (S. 17) oder Endomychiden (s. Nachtr. z. S. 17) ähneln, sind gewisse Chrysomeliden der Gattung *Doryphora* Erotyliden und Coccinelliden angepasst.

Unter den Lepidopteren erinnern von Nymphalinen gewisse *Argynnis*-Weibchen wie *Lincolitis*-Arten (S. 47) an Danainen (S. 29) und *Pharmacophagus*-Arten. Auch *Hypolimnias*- (S. 30 u. 42), *Euradia*- (S. 42), *Hestina*- (S. 31), *Euripus*-Arten (S. 32) passten sich an Danainen an, wie eine *Nephis*-Art (S. 32) an die Palaeotropinen. Dagegen ähneln zahlreiche *Phyciodes*- (S. 62) und die *Protogonius*-Arten (S. 63) wie solche aus den Heliconier-Gattungen *Eucides* und *Heliconius*, bestimmten Formen der Neotropinen. Bei der Gattung *Euphaedra* (S. 44) kommen endlich auch Anpassungen an Heterocerer der Gattungen *Metis* und *Easenia* vor. Auch bei den Satyriden bilden die Danainen die hauptsächlichen Modelle für Arten von *Elgynias* (S. 32—34), *Zethenia* (S. 34) und *Orinoma* (S. 35), während andere Species von *Elgynias* sich *Acracinen* (S. 44), der Pieriden-Gattung *Delias* (S. 34) oder, wie auch gewisse *Hypolimnias*-Arten (S. 31) der Morphinen-Gattung *Tenaris* anpassen.

Von den Lycaeniden passten sich einzelne Arten den *Acracinen* und der Gattung *Metis* (S. 44), von den Eryciniden (S. 64) solche den Josinen (Heteroc.), *Acracinen* und Neotropinen an.

¹⁾ Um diesen Mimicry-Fall sicher zu stellen, bedarf es noch genauerer Untersuchungen über die grössere Hautigkeit und vor Allem den behaupteten höheren Grad der Gefährlichkeit der *Adoniophis*- gegenüber den *Calliphis*-Arten.

²⁾ G. A. Boulenger zieht diese drei Unterabtheilungen zur Ophidier-Familie der Colubriden zusammen, denen er auch die Hydrophinen beigesellt (Fauna of Brit. Ind. Reptil. and. Amphib. 1890).

I. Indo-austra-

Modelle:	(Nicht	Mimetische
(Immun)	immun)	immun)
Danainae:	Nymphalinae:	Satyrinae:
<i>Ideopsis Daos</i> Bsd.		<i>Elymnias Künstleri</i> , Honr. ♀
<i>Danaus</i> : subg. <i>Redenia</i> Moore (<i>Aglea</i> Cr., <i>similis</i> L.)	<i>Hestina persimilis</i> Westw.	<i>Elymnias Lais</i> Cr.
<i>Danaus Tyfius</i> L.	<i>Hestina nana</i> Dbld. hes.	
<i>Euploea Core</i> L. und ähnliche Arten.	<i>Hypolimnas Bolina</i> L. <i>Jacintha</i> Dru.; <i>Penthema Bigiani</i> Wood-Mas.	<i>Zethenia diademoides</i> Moore.
<i>Euploea</i> <i>Rhadamanthus</i> F. resp. ♀	<i>Euripus Halitherses</i> Dbld. var. <i>Isa</i> Moore (♂ ♀) ¹⁾ " " <i>Rhadamanthus</i> (♂ ♀)	
<i>Euploea</i> <i>Linavi</i> Moore resp. .	<i>Eurip. Halitherses</i> <i>nyctelius</i> Dbld. } ♂ ♀ <i>cinnamomeus</i> W.-M. } ♂ ♀ <i>Hypolimnas automata</i> Wall. ♂ ♀	<i>Elymnias leucocyma</i> Godt ♂ ♂ ♀; ♀ ♀ ♀.
Morphinae:		
<i>Tenaris bioculatus</i> Guér.	<i>Hypolimnas Deois</i> Hew. ♀	<i>Elymnias Agondas</i> Bsd. ♀
Papilionidae:		
<i>Papilio (Pharmacoph.)</i> <i>Dasarata</i> Moore.		
<i>Pap. (Pharm.) Astorion</i> Westw.		

¹⁾ Das Zeichen ♂ soll die Aehnlichkeit mit dem betreffenden Geschlecht des Modells ausdrücken.

lische Region.

Formen

	(Nicht immun)		(Immun)
Pieridae:		Papilionidae:	Chalcosiidae:
		<i>subq. Cosmodesmus; subq. Papilio str.</i>	
		<i>Laodocus de Haan.</i>	<i>Epygys pierioides</i> Herr-Schäff.
<i>Eronia Valeria</i> Cr. ♀	<i>Macareus</i> Feld.	<i>epygides</i> L. <i>dissimilis</i> L.	<i>Chalcosia papilionaris</i> Dru.
	<i>Xenocles</i> Dblld. ♀	<i>Agrestor</i> Gray.	
		<i>Davidarum</i> Wood-Mas. <i>Panope</i> L.	
		<i>Ceanus</i> Westw.	<i>Mimnaploca</i> <i>Rhadomantre</i> F.
		<i>Paradocus</i> Zinck. ♂ ♀ ♂; ♀ ♀	<i>Cyclosia Midamus</i> L. ♂ ♀ ♂; ♀ ♀
		<i>Tydeus</i> Feld.	
		<i>Phleonor</i> Westw. ♂ ♀ varius.	<i>Epicopeia Polyhora</i> Westw.
		<i>Mennon</i> L. <i>Esperi</i> Btlr.	<i>Epicopeia Phleonor</i> Westw.

II. Neotropische

Primäre Modelle:	Mimetische Formen und theilweise secundäre Modelle:		Rein
(Immun:)	(Unimmun:)		(Nicht
Heliconiinae:	Neotropinae:	Danaïnae:	Heliconiinae: Nymphalinae:
<i>Heliconius</i> <i>Melpomene</i> L.			<i>Adelpha Lara</i> Hew. u. <i>Iris</i> Dru.; <i>Apatura cecenia</i> .
<i>Heliconius Erato</i> L.			<i>Eucides</i> <i>Thales</i> Cr. <i>Phyciodes</i> <i>Perilla</i> Hew.
Acracinae:			
<i>Acraca Thalia</i> L.			<i>Eucides</i> <i>Parana</i> Mén.
Neotropinae:			
<i>Thomia</i> : <i>Herdia</i> (<i>Orotina</i> -Gr.):	<i>Napeogenes Carina</i> Hew.		<i>Vilo</i> <i>stalachthodes</i> Bates
	<i>Eutresis imitatrix</i> Stdgr. <i>Athesis Acrasiaca</i> Hew. <i>Thyridia Pytho</i> Feld. " <i>lino</i> " " <i>Psidü</i> L.	<i>Hana Hion</i> Cr. " <i>Phenacete</i> Dbld.	
<i>Methona</i> sp.:	<i>Napeogenes excelsa</i> Feld. <i>Thyridia Ardesia</i> Dbld. <i>Athesis Clearista</i> Dbld. <i>Eutresis Hypericü</i> Dbld.	<i>Hana Lamira</i> Latr.	<i>Eucides</i> <i>Edias</i> Hew. <i>Phyciodes</i> <i>prisco</i> Hopffr.
<i>Olyras</i> sp.:			
Tithorea:			
<i>Irene</i> -Gr.:	<i>Napeogenes Perilla</i> Hew. <i>Callithomia Herzia</i> Hew. <i>Thyridia Melantho</i> Bates.		<i>Eucides</i> <i>calajiformis</i> Btlr. <i>Phyciodes</i> <i>nigripennis</i> Salv.
	<i>Napeog. Iquitensis</i> Stdgr. " <i>Pyrrho</i> Druce <i>Ceratinia</i> : <i>Ninonia</i> -Gr. <i>Melanitis</i> sp. sp. <i>Athyrta</i> " " <i>Melinara</i> " "	<i>Lycorca</i> sp. sp.	<i>Eucides Hübnert</i> Mén. <i>Eucides Dionasa</i> Hb. <i>Eucides Lampeto</i> Bates <i>Heliconias</i> : <i>Sylvaenus</i> -Gr.
<i>Harmonia</i> -Gr.:			<i>Phyciodes</i> <i>Melanitis</i> G. & S. <i>Phyciodes</i> <i>Drypetis</i> G. & S.
<i>Bomplandü</i> -Gr.	<i>Thomia Sasiana</i> Feld.		<i>Heliconias</i> : <i>Athlas</i> -Gr.

Region.

mimetische Formen:

immun:		Castniidae:		Immun:	Nicht immun:
Erycinidae:	Pieridae:	Papilionidae ex. p.		Pericopidae:	Dioptidae:
	<i>Archonias Teuthonias</i> Hew.; <i>Percebe Charops</i> L. etc.	<i>Papilio</i> s. str. <i>Pap. caterpinus</i> Salv.		<i>Pericopis Phoebe</i> Stdgr.	
	<i>Archonias Bellona</i> Cr.				
<i>Esthemopsis Cilina</i> Stdgr.	<i>Dismorphia Melia</i> Godt.		<i>Castnia aceracoides</i> Bsd.	<i>Pericopis Amphissa</i> Hb.	
<i>Stalacthitis Phaedusa</i> Hb.; <i>Ithoneis minima</i> etc. Bates etc.	<i>Dismorphia Thonae</i> var. <i>Lysimac</i> Bates				<i>Dioplis Cyano</i> Hb. <i>Dioplis Balesii</i> Druce
	<i>Dismorphia Oeise</i> Bates		<i>Castnia Linus</i> Cr.	<i>Hyalasia heliconioides</i> Feld.	
	<i>Dismorphia Cordillera</i> Feld.				
	<i>Dismorph. Deiane</i> Hew. <i>Archonias dimorphites</i> Bth. <i>Archonias nigrescens</i> G. & S.		<i>Castnia Salvia</i> G. & S.	<i>Pericopis Ithonia</i> Feld.	
	<i>Perithybris</i> .. <i>lucina</i> Hew. .. <i>malenka</i> F.		<i>Castnia simubans</i> Bsd. <i>Castnia Cratina</i> Westw.	<i>Pericopis histrio</i> Feld.	
<i>Stalacthitis Calliope</i> L.	<i>Dismorphia</i> .. <i>Aslymne</i> Cr. .. <i>Arsinoe</i> Feld. <i>Archonias Eurytele</i> Hew.	<i>Papilio</i> s. str.: <i>Zagrens</i> -Gr.	<i>Castnia Escudaria</i> Westw. <i>Castnia Zagrea</i> Feld.	<i>Pericopis Hestas</i> Feld.	<i>Dioplis Hazara</i> Bth.

Unter den Pieriden alimen mehrere *Evania*-Weibchen (S. 35) Danaer nach, während Arten von *Dismorphia* (S. 65) sich an Aeraeen und Neotropinen, solche von *Archonius* an Aeraeen, *Heliconius*- und *Pharmacophagus*-Arten, solche von *Percate* an Heliconier und endlich *Percyphis*-Arten (S. 68) an Neotropinen anschlossen. Unter den Papilioniden bilden die Rinnefalter (S. 37, 45, 69) und *Cosmodesmus*-Arten (S. 36 u. 45) zahlreiche Anpassungsformen an Danainen und Aeraeinen, während tagsfliegende Chalcosiiden sich in *Chalcosis* und *Mimoplocia* an Danainen, in *Erosania* und *Elerasia* an Agaristiden (S. 38), in *Gingla* an Josien (S. 72) und in *Caucerkes* (S. 38) an die Spannergattung *Hazis* anlehnen. Den mimetischen Castrienen dienen als Modelle Arten der Danainen, Neotropinen und Aeraeinen, den mimetischen Pericopinen ausser Vertretern der letzterwähnten zwei Familien noch gewisse Aristolochienfalter (*Aeneas*-Gr. von *Pharmacophagus*). Endlich passten sich gewisse Melameriden (S. 72) Arten von Aeraeinen, gewisse Diptiden und Spanner Neotropinen an.

Aus der Abtheilung der Dipteren dürfen wir die Anpassung von wehrlosen Xylophagiden an räuberische Asiliden (S. 77) hierherrechnen.

Unter den Wirbeltieren gehört hierher die Anpassung aglypher Ophidier an Vertreter der Viperiden (S. 80) sowie die Anpassung gewisser Cuenkiden an Vertreter der Dieruriden oder etwa Falconiden (S. 81) und die gewisser Orioliden (Mimeta) an Meliphagiden (*Tropidochyphalus*).

Ist auch die Zahl derjenigen mimetischen Formen, die sich Modellen aus einer anderen Ordnung angepasst haben, etwas geringer als diejenige der zur vorigen Kategorie gehörigen Fälle, so erreicht doch hier der Ausbildungsgrad der Aehnlichkeit die höchste Stufe im Thierreich. Ausserdem entwickelt sich hier innerhalb einer Familie meist die grösste überhaupt vorkommende Mannigfaltigkeit der Anpassungsformen.

So erinnern unter den Orthopteren in der Familie der Blattiden gewisse mimetische Arten von *Corydia* an Agaristiden (S. 6), von *Cassidodes* an Coccinelliden, von *Paratocopa* an *Cissura* und Lycinen, von *Phoraspis* an Lampyrinen (S. 7). Ebenso erinnern bei den Grylliden mimetische Arten von *Stenopelmatus* an die Soldaten der Termiten (S. 8), von *Scopastus* an *Pachyglaphicus* (S. 7). Während unter den Locustiden die Gattung *Caulyglotera* wie das Grylliden-Genus *Phylloscyrtus* bestimmten Cicindelen ähnelt (S. 8), haben sich andere abweichende Formen, so *Scaphura* (S. 8) Mordwespen angepasst, wie das auch eine Reduviide (*Spiniger* S. 10) that. Andere Locustiden (*Myraecophana* S. 9) passten sich wie die zahlreichen mimetischen Coreiden und Capsiden unter den Hemipteren, und einzelne Coleopteren (*Anthicus*) dem Ameisentypus an, während gewisse Homopteren sich Vespiden als Modell nehmen (S. 10). Hierher gehört auch die Aehnlichkeit der Neuropteren-Gattung *Bittacus* mit Tipuliden und die von *Drepanopteryx* mit kleinen Bombyciden. Weiter erinnern unter den Coleopteren *Cherus*-Arten und gewisse Cerambyciden an Mutillen, andere Boekkäfer an Ichneumoniden, Vespiden und Sphegiden. Auch einzelne heterocere Lepidopteren ähneln der Malacodermen-Gruppe der Lycinen, so Arten von *Pionia* und Glaucopiden (*Lycromorpha*, *Mimica*; S. 73–74). Häufiger sind dagegen wiederum Anpassungen von Seiten der Schmetterlinge an aculeate Hymenopteren. So erinnern von Spingiden gewisse einheimische *Macroglossa*-Arten an *Bombus*-Arten, von Sesiden die grossen Trochilien an Vespiden (S. 75); und vereinzelte Formen (*Scolio-mina*, S. 75) an Scolien oder (*Melittia* S. 75) Anthophoriden. Die höchst ausgebildeten Anpassungsformen der Glaucopiden endlich beziehen sich in Arten von *Myraecopsis* und *Sphacsonoma* (S. 47) wieder auf Vespiden. Schliesslich finden wir unter den Dipteren zahlreiche meist wenig ausgebildete Aehnlichkeiten mit stechenden Hymenopteren. So erinnern gewisse Asiliden und Syrphiden an Sphegiden, Scoliden oder Apiden (S. 78).

Endlich gehört hierher noch die Anpassung eines Vertreters der Nagethiere (*Rhinascurus topaoides*) an einen solchen der Insektivoren (*Papilio*) (S. 81).

Anpassungen an Vertreter einer anderen Klasse des Thierreichs beschränken ¹⁾ sich auf diejenigen an Ameisen seitens gewisser Araeneiden (Attiden, Drassiden, Theridiiden) und die wenig vollkommene Aehnlichkeit des Batrachiers *Phrynosoma carolin* mit einer zusammengerollten Elapine.

Vergleichen wir nun schliesslich die sechs unterschiedenen Verwandtschaftskategorien auf ihre geographische Verbreitung hin, so finden wir zunächst, dass von den Anpassungen der beiden Untergattungen von *Papilio* an *Phaenocarpa* die von *Papilio* s. str. über die nearktische, indo-australische und neotropische Region verbreitet sind, während die von *Cosmodemus*-Arten nur in der letztgenannten auftreten.

Anpassungen an Angehörige derselben Unterfamilie treten in jeder tropischen Region auf, fehlen dagegen wie die Formen voriger Kategorien in der gemässigten Zone.

Dagegen ist unter den Anpassungen zwischen Angehörigen derselben Familie ein Fall (*Melicta* S. 11) auch in der paläarktischen, die Mehrzahl dagegen wieder in den tropischen Regionen, besonders der neotropischen, entwickelt.

Zu den Anpassungen an Angehörige einer verschiedenen Familie kann man aus der paläarktischen Region höchstens die wenig ausgebildete Anpassung einer Grabwespe (*Stizus* S. 11) an Scollen rechnen, während im südlichen Gebiet der nearktischen Region schon drei Fälle mimetischer Anpassung zwischen Lepidopteren (S. 47—48) auftreten.

Gegenüber der äthiopischen Region besitzt die indo-australische eine bedeutend grössere Anzahl hierher gehöriger Mimicryfälle, was sich für beiden Regionen gemeinsame Gattungen (*Hypolimnias*, *Elymnias*) schon aus der verschiedenen Artenzahl erklären lässt. Der äthiopischen Region ausschliesslich eigenthümlich sind dagegen Anpassungen der kosmopolitischen Lycaeniden an Vertreter anderer Familien.

Die höchste Ausbildung erlangen Anpassungen an Vertreter anderer Familien wieder in der neotropischen Fauna; besonders traten in letzterer die Anpassungen zwischen immunen Formen relativ häufig auf, die doch in den paläotropischen Regionen nur vereinzelt vorkommen. Und zwar finden wir sie nicht nur bei den Lepidopteren (Anpassungen von Heliconiden an Neotropinen etc.), sondern auch bei den Coleopteren in den Nachahmungen von Erotyliden durch Melasomen und von Lycinen durch Hispiden.

Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Kategorien sind die Anpassungen an Angehörige einer anderen Ordnung wenigstens bei den Insekten insofern weiter verbreitet, als ihre Modelle zu den aculeaten Hymenopteren gehören. Doch sind die Anpassungen an letztere von Seiten der Homopteren auf die neotropische Region beschränkt, wie die Anpassungen seitens der Vertreter anderer Ordnungen (Orthopteren, Lepidopteren) an die Malacodermen. Zugleich treten uns in derselben Region diejenigen mimetischen Formen entgegen, welche den höchsten Grad der Anpassung überhaupt erreicht haben: *Mynaeopsis* und *Sphaerosoma* (S. 77).

Sind von den Anpassungen an Vertreter verschiedener Classen des Thierreichs diejenigen der Araneinen (Attid., Drassid., Theridiid.) wohl über die ganze Erde verbreitet, so ist doch das einzige Beispiel dafür, dass solche auch unter den Wirbelthieren sich anbahnen könnten, die Aehnlichkeit von *Phrynosoma carolin* mit *Elaps*, wieder der neotropischen Region eigenthümlich.

¹⁾ Die Aehnlichkeit zwischen der Sporocyste von *Dicranum microstomum* und der Larve der Blüthenzattung *Eristalis* ist unter Anderem nicht gross genug, um als durch Mimicry entstanden gedeutet werden zu müssen. (Vgl. auch J. Thallwitz, Ueber Mimicry. Ges. Isis in Dresden 1890 Abh. 3, 5, 12) geschehen ist.

So dürfen wir daraus schliessen, dass in letzterer nicht nur die üppigste Gestaltungskraft der Natur in Erscheinung tritt, sondern zugleich auch der raffinierteste Kampf um die Existenz herrscht, den die heutige Lebewelt überhaupt noch führt.¹⁾

Die Mimicry eine Form der schützenden Anpassung an die Umgebung.

In seinem Darwinism (1889, p. 239) definiert A. R. Wallace die Mimicry als eine „form of protective resemblance, in which one species so closely resembles an other in external form and colouring, as to be mistaken for it, although the two may not be really allied and often belong to distinct families or orders One creature seems disguised in order to be made like another; hence the term 'mimic' and 'mimicry', which imply no voluntary action on the part of the imitator.“

Unsere vorhergehenden Ausführungen geben uns das Recht, diese Definition noch genauer zu fassen. So gehören nur in einem Ausnahmefall (*Papilio* s. l.) Modelle (subg. *Phornamecophagus*) und Nachahmer (subg. *Papilio* s. str. und *Cosmodemus*) einer Gattung, wenn auch biologisch und morphologisch verschiedenen Untergattungen an. Weiter gelang es uns, den Nachweis zu führen, dass die mimetische Anpassung, wenn sie sich nicht auf beide Geschlechter ausdehnte, sich stets auf das Weibchen beschränkte. Endlich zeigten wir, dass solche Anpassung nur unter bestimmten oekologischen Bedingungen und stets zuerst beim Weibchen eintrat.

Daher dürfen wir denn die Mimicry bezeichnen als „eine für die Arterhaltung vortheilhafte Anpassung des Habitus seitens des Weibchens oder secundär beider Geschlechter einer ihrerzeit gefährdeten Species an eine häufigere, meist²⁾ ausserdem noch besser geschützte Art desselben Gebietes aus anderer Untergattung, Gattung, Familie, Ordnung oder Klasse.“

So beschränken sich nach unserer Definition die Erscheinungen der Mimicry oder „schützenden Verkleidung“ (protective disguise) auf ausgebildete Aehnlichkeiten zwischen meist³⁾ geschlechtsreifen, nicht näher miteinander verwandten Vertretern eines organischen Reiches, die sich als Product der Anpassung des einen an den anderen nachweisen lassen.

Für die etwa anzunehmenden Fälle mimetischer Anpassung zwischen Vertretern des Pflanzenreiches dürfte sich die Aehnlichkeit aus Analogieen in Form und Farbe der Blüthe, welche die Fremdbestäubung durch Insekten etc. erleichterten, beschränken; bei den zum Thierreich gehörigen Mimicryfällen aber hat sie sich auf den ganzen Körper in seinen Lebensäusserungen aus-

¹⁾ Gegen den Einfluss der blossen Isolirung auf Mimicrybildung spricht der Umstand, dass mir aus Madagascar ausser den weit verbreiteten Anpassungen von Araneiden an Ameisen keine besonderen unzweifelhaft mimetischen Arten bekannt geworden sind. Sicher finden sich keine solche unter den Schmetterlingen, die doch sonst am meisten zu denselben beitragen.

²⁾ Ausgenommen sind die Anpassungen seitens räuberischer Neuropteren (S. 11) an ihre wehrlosen Beutethiere.

³⁾ Die einzige Ausnahme von dieser Regel dürfte die Aehnlichkeit gewisser, in Folge unentwickelter Flügel zugleich schützloserer Jugendzustände anamorpher (hemimetaboler) Insecten mit Arbeiterameisen sein, wie wir sie S. 9 für die Hemiptere *Alphus calcaratus* hervorhoben. Auch in Siam schlopfte ich im October 1892 mehrere junge Mantiden, welche, wie in der Grösse so auch in der schwarzen resp. rostgelben Färbung, durchaus den Ameisen gleichen, mit denen ich sie zusammenting. Leider machte eine spätere Ueberschwemmung des Fundortes das Suchen nach den Imagines erfolglos.

zudehnen.¹⁾ In der That wirkt die Aehnlichkeit hier nicht blos in der Ruhe und bei langsamen Kriechbewegungen, sondern in vielen Fällen sogar besonders (Schmetterlinge) auch im Fluge, zumal, soviel bekannt, alle Nachahmer wie ihre Modelle ein Tagesleben führen²⁾, dessen grössere oder geringere Freiheit und Bestimmtheit allerdings durch die vererbten Lebensgewohnheiten der Vorfahren in gewissem Grade beeinflusst wird. So fliegen denn mimetische Heterocerer oft nicht so häufig und weit herum wie mimetische Tagfalter.

In den ausgebildetsten Fällen der Anpassung führen die Nachahmer auch die Bewegungen, welche das Modell charakterisiren, bis in Einzelheiten aus (vergl. die Beobachtungen über *Spünger* (S. 10) und *Eurypus Halitherses* (S. 32.)

Im Gegensatze zur Mimicry characterisirt sich die „schützende Aehnlichkeit“ (protective resemblance) vor Allem dadurch, dass ihre Modelle nur mehr in Form, Zeichnung und Färbung nachgeahmt werden, da sie selbst keiner Eigenbewegung fähig sind. Hierher gehören aus dem Thierreich besonders Secretionsproducte (abgestossene Häute, Koth) und aus dem Pflanzenreich sowohl lebende als abgestorbene Objecte (Blüthen, Früchte, Blätter, Aeste, Dornen). Somit tritt die „schützende Aehnlichkeit“ mit diesen Objecten auch nur so lange in Wirkung, als ihr Träger keine Bewegungen ausführt.

Als Grenzfall, der von der „schützenden Aehnlichkeit“ zur „Mimicry“ überführt, darf man das interessante S. 78 angeführte Beispiel der Anpassung des Batrachiers *Phryganiscus varius* Stann. an eine zusammengerollte *Elops* ansehen, denn, wie die feine Beobachtung Herrn Prof. Böttger's hervorhebt, tritt diese Aehnlichkeit besonders bei zwei im Begattungsakte befindlichen Individuen hervor, also bei einer besonders für die Arterhaltung wichtigen Handlung, die wohl auch mit gewissen langsamen die Aehnlichkeit kaum störenden Bewegungen verbunden sein dürfte.

Ein anderer anscheinender Grenzfall gehört dagegen sicher in die Kategorie der „schützenden Aehnlichkeit“. Derselbe betrifft eine merkwürdige neotropische Buckelzirpe, *Spilia (Oeda) inflata* F., deren Nackenschild von blasigen Hohlräumen durchzogen ist und den winzigen Körper von oben vollkommen verdeckt. So gleicht das auf einem Blatte oder an einem Zweige meist ruhig sitzende Thier durchaus der leeren Puppenhülle eines bereits ausgeschlüpften Tagfalters.

Vergl. Taf. III, Fig. 112, 113.

Eine auffallende Aehnlichkeit mit trockenem Raupenkoth beobachtete ich besonders an kleinen siamesischen Cryptocephaliden. Dagegen erinnert Forbes' merkwürdige Krabbenspinne (*Thomisus [Ornithoscatoides] decipiens*), welche ich in einer Form auch in Siam auf der Oberfläche eines Blattes sitzend fand, durch die feinen Farbenabtönungen des zarthäutigen Abdomens derart an frischen gallertigen Vogelkoth, dass ich zögerte, sie als Spinne einzufangen, obwohl ich längst auf sie zu achten beschlossen hatte.

Den höchsten Grad der schützenden Aehnlichkeit mit Objecten des Pflanzenreiches treffen wir in den weit verbreiteten Anpassungen an trockene Blätter dicotyledoner Bäume an, die entweder noch mit ihrem Stiel am Zweige sitzen (*Nymphalinen: Kallima*³⁾) und *Siderone*⁴⁾) oder schon am

¹⁾ Daher muss ich die „Mimicry“ von Schlangen durch Raupen (H. W. Bates, A. Seitz) und die eines Baulthierkopfes durch den Falter von *Saurinthus ocellatus* (A. Seitz) aus dem Gebiete meiner Arbeit ausschliessen. Immerhin kommen hier ja Schreckzeichen vorliegen. So bestimmte ein König von Anam schon ca. 2000 Jahre v. Chr., dass die Bote seiner Unterthanen vorn zwei grosse Augen tragen sollten, um die Meerungeheuer abzuschrecken (La Cochinchine française 1878, Paris p. 232). Auch glauben, wie mich mein chinesischer Koch belehrt, seine Landsleute noch heute an die Wunderkraft der von ihren Dschunken immer noch geführten Auszeichnung.

²⁾ Nach Lemnis-Ludwig, Synopsis II p. 304 heisst die einheimische *Bombocia hylaeiformis* Lasp. „im Gegensatz zu den übrigen Sesüen bei Nacht.“

³⁾ Vergl. die Abbildung bei A. R. Wallace, The Malayan Archipel, Lond. 1883, p. 31.

⁴⁾ Vergl. E. Krause (C. Sterne), Werden und Vergehen, 3. Aufl. Taf. XXIV.

Boden liegen (Locustiden: *Pterochroza*).¹⁾ Auch dürften die geradezu ausserordentlich vielseitigen Variationen bei *Kalliana*-Arten etc. nicht allein darthun, dass diese so vollendeten Anpassungen an das verwelkte, oft mit Rostpilzen besetzte oder von Minirräupchen angefressene Blatt die höchsten Resultate der Anpassung an Blätter sind, sondern auch dafür sprechen, dass sie die jüngsten Formen derselben darstellen und noch heute unter dem Einfluss der Naturlause stehen, welche das weniger Passende allmählig ausmerzen wird.

Viel seltener als Anpassungen an Blätter sind solche von Seiten ausschliesslich räuberischer Insekten an auffallende, wegen ihres Nectars von Insekten aufgesuchte Blüthen, wie sie die von A. R. Wallace (Darwinism. I. c. p. 210) erwähnte flügellose (? weibliche) rosenrothe indische Mantide (*Hymenopus bicarinis* Stoll) zeigt, welche bis ins Einzelne einer Orchideenblüthe gleicht. Denn ihre Hinterbeine sind wie die inneren Perianthblätter verbreitert, während der Hinterleib das Labellum, Nacken und Vorderbeine die äusseren Perianthblätter und die Columella der Blüthe darstellen. So erwartet das Thier unbeweglich die Annäherung der Bienen (*Andrena* etc.), welche die vermeintliche Orchideenblüthe besuchen, während die oben erwähnte Spinne auf den Besuch der Bläulinge (Lycaniden) lauert, welche gern frischen Vogelkoth besaugen.

Wie die Raupen vieler Spanner an stehen gebliebene Strünke abgefressener Blätter oder dürre Reiserstückerchen, erinnern auch viele Phasmiden (besonders im weiblichen Geschlecht) und Jugendstadien an nackte am Aste befindliche oder an zu Boden gefallene, mit Lebermoosen bewachsene (so *Ceraxylon laevigatus*) Zweigstücke. Auch viele einheimische Nachtschmetterlinge, vor Allem *Calocampa exoleta*, *Xylena tilbovylea*, *Phalera haecphala*, erinnern an abgebrochene Stückerchen modernden Holzes oder eines weissfaulen Aestchens, wie die Notodontiden nach E. M. Wasiliew „alle Holz in den verschiedenen Stadien des Fäulnisprozesses“ nachahmen.²⁾

Hierher gehört auch die durch F. Sikora und C. A. Dohrn³⁾ allgemein bekannt gewordene Anpassung des madagassischen Anthribiden *Lithinus nigrocrisatus* Coq. an verschiedene weisse, grünliche und gelbliche Färbungsvarietäten einer Flechte (*Garmelia erinda* Ach.) und die anderen *Lithinus*-Arten an Waldmoose.

Viel häufiger noch sind Anpassungen an frische grüne Blätter. Dass sich solche ebenfalls besonders bei den Weibchen ausgebildeten, beweist dies Geschlecht unseres Citronenfalters (*Rhodocera chammii*), welches in gewissen Gegenden vom Volk als „Lindenblatt“ unterschieden wird. Aehnlich bildete sich die ausgesprochene Anpassung der Vorderflügelform und ihres Rippenverlaufes an zwei in der Längskante sich berührende frischgrüne Dicotyledonen-Blätter bei vielen besonders tropischen Locustiden höher und sicher auch früher im Weibchen aus. Den höchsten Grad dieser Anpassung finden wir bei den Weibchen der Phasmiden-Gattung *Phyllium*, deren geschlossene Vorderflügel in der Horizontalen ausgebreitet, zusammen ein grosses fiedernerviges Blatt vorstellen, wie es bei Lauraceen etc. vorkommt.

Ausgebildete Fälle schützender Aehnlichkeit dürften auch bei Meerthieren ausgebildeter sein, als die Literatur angibt. So scheint der in Purpurroth prangende abentheuerlich geförmte Lophobranchier *Phyllapteryx cyrus* eine Anpassungsform an die fluthenden feingelappten Florideen darzustellen, zwischen denen er sich aufhalten dürfte.

Dass übrigens selbst Formen von geringerer Ausbildung der schützenden Aehnlichkeit die Ausübung des ererbten Schutztriebes mit einem gewissen Grade des Bewusstseins vom Acte selbst verbinden

¹⁾ Vergl. die Abbildungen bei C. Brunner v. Wattenwyl, (Verh. zool. bot. Ges. 1883, Taf. XV).

²⁾ Vergl. Ph. Bertkau's Jahresber. üb. d. Leistungen d. Entomol. f. 1890 (1891) S. 133.

³⁾ Stettin, Entomol. Zeitung 1890 S. 198 und 1891 S. 249.

müssen, lehrt die schöne Beobachtung von A. Seitz¹⁾, dass eine indische Nymphaline (*Procis Iphito*) im hellen Sonnenschein, auf grünem Laube mit ausgebreiteten Flügeln sitzend, sich sehr scheu zeigte, dagegen bei Verdunkelung des Himmels durch Wolken oder plötzlichen Regen seine Ruhestellung einnahm, die Fühler zwischen die geschlossene Flügel verborgen, die Hinterflügelsspitzen -- den scheinbaren Blattstiel -- auf einen Zweig gestützt. „In dieser Stellung lässt sich das Thier ruhig ankommen, erst ein Schlag auf dem Ast, auf dem es sitzt, bringt es zum Wegfliegen.“

Eine geringere Ausbildung der schützenden Anpassung des Individuums an unbewegliche Gegenstände der nächsten natürlichen Umgebung finden wir bei den weitverbreiteten Erscheinungen der Schutzfärbung (protective colouring). Hier tritt im Gegensatz zu den in die Kategorie „der schützenden Aehnlichkeit“ gehörigen Fällen, keine Anpassung an Produkte des Thierreiches mehr auf, während die Anpassungen an Gegenstände des Pflanzenreiches sich weniger an die einzelnen scharf umschriebenen Objekte, als besonders an das grüne Laubwerk des Baumes im Ganzen und die Rinde grösserer Stämme anlehnen. Endlich finden sich auch Anpassungen an die verschiedenen Erscheinungsformen des Bodens selbst.

Uebergänge zwischen den Fällen dieser aus der vorhergehenden Kategorie bilden besonders gewisse Anpassungen an grünes und welkes Laub, welche andeuten, dass die „schützende Aehnlichkeit“ als eine blosse höhere Entwicklungsstufe der schützenden Färbung aufzufassen ist.

Bei den zur Schutzfärbung gehörigen Fällen ist es nun die mit der Färbung zu einheitlicher Wirkung verbundene Zeichnung oder erstere allein, welche das Thier in seiner durch ererbten Trieb mehr oder minder entsprechend gewählten Umgebung aufgehen lässt und dadurch, so lange es sich ruhig verhält, vor der Entdeckung verhältnissmässig sichert. Dies allgemein verbreitete Bedürfniss grösseren Schutzes zur Zeit der Ruhe lässt es begreiflich erscheinen, dass die physiologisch-oekologischen Bedingungen für die Ausbildung schützender Färbung ungleich einfacher sein mussten als bei den bisher besprochenen Anpassungsformen.

Ein besonders interessantes Beispiel dafür dürfte von Schmetterlingen der afrikanische Rinnenfalter *P. Nireus* L. abgeben, dessen Weibchen noch die unauffällige, an mit modernem Laub bedeckten Boden erinnernde Unterseite der Flügel trägt, wie die Grundformen seiner Gruppe in beiden Geschlechtern, während das Männchen auf dunklem Grunde leuchtend hervortretende silberweisse Hinterflügelhäufel führt. Daraus erhellt, dass hier weder Rückschlags- noch besondere Anpassungserscheinungen vorliegen, sondern dass das Weibchen infolge grösseren Schutzbedürfnisses bei der Eiablage die unentwickelte ursprüngliche Schutzfärbung der Flügelunterseite als vortheilhaft einfach beibehielt, während das häufigere Männchen seine sexuellen Schmuckfarben entwickelte, ohne dass das Weibchen sie übernahm.

Wahrscheinlich gelten diese Schlüsse auch für diejenigen dimorphen Vögel, deren Weibchen eine mehr oder minder ausgebildete Schutzfärbung besitzen, die sie hauptsächlich während des Brutaktes in dem aus trockenen Pflanzentheilen bestehenden Neste weniger auffallen lässt. Anscheinend setzen sich dieselben nur aus Formen zusammen, deren Weibchen am Boden oder in freien Nestern auf Bäumen etc. brüten. So sind es, wie A. R. Wallace zuerst betonte, besonders Höhlenbrüter (Psittacid, Alcedinid., Meropid., Coraciid., Bucerotid.), bei denen auch die Weibchen so auffällig bunte Farben tragen wie die Männchen.

Gewisse Variationen einzelner dimorpher südamerikanischer Schmuckfinken (Tanagerin.) sprechen nun dafür, dass, wie bei *Pap. Nireus* das unscheinbare Kleid des Weibchens dem ursprünglichen Kleide der Art entspricht und auch von den Männchen ursprünglich, d. h. vor der Entwicklung ihrer sexuellen

¹⁾ A. Seitz, Lepidopt., Studien etc. (Zool. Jahrb., Abth. f. Syst., IV, S. 908).

und zugleich spezifischen Auszeichnungen getragen wurde. So verliert bei *Pygmya rubra*¹⁾ das Männchen sein scharlach-rothes Hochzeitskleid nach der Paarung, um dann zunächst ein Uebergangskleid anzulegen und endlich wieder in dem oben zeisiggrünen, unten gelben Gewande des Weibchens zu erscheinen, welches bereits die Jungen tragen.

Aehnliches gilt für die derselben Unterfamilie angehörige *Euphonia violacea*, deren Männchen sein an Stirn und Unterseite dottergelbes, oben stahlblau und erzgrün schillerndes Prachtgewand ebenfalls nur zur Paarung anlegt.

Auch bei den meisten Enten und Sägern (*Meryps*) der gemässigten Zone entspricht das nach der Paarung angelegte „Sommerkleid“ des Männchens dem sich gleich bleibenden Kleide des Weibchens.

Bei weiterer Fixirung der Schmuckfarben des Männchens treten letztere endlich bei diesem Geschlecht besonders in den Tropen dauernd auf. So erinnert bei *Colinga cineta* mit ultramarinblauen kleinfedrigem Gefieder des Männchens nur mehr der junge Vertreter dieses Geschlechts an das ein grossfederiges, vorherrschend braungefärbtes Gefieder tragende Weibchen.²⁾

Daher dürfen wir in diesen Fällen die Beibehaltung des ursprünglichen, auch bei den Nestjungen auftretenden Artkleides seitens des Weibchen als einen Entwicklungsstillstand bezeichnen, welcher als für die Arterhaltung vorthellhaft, durch Naturauslese befestigt wurde.³⁾

Wie nützlich diese Beibehaltung des ursprünglichen Artkleides sein kann, zeigt z. B. das Weibchen der Eidergans (*Somateria mollissima*), welches in seiner rothbraunen, an Kopf und Hals mit braunen Längsflecken, auf den Oberflügeln mit halbmondförmigen Querflecken gezeichneten Färbung eine so vollkommene Uebereinstimmung mit dem Boden besitzt, dass es nach A. Brehm (l. c. p. 499) „dem Ungeübten wirklich schwer wird, die brütende Alte zu entdecken“. Aehnliches dürfte auch für die von den Männchen abweichenden Weibchen der meisten Phasianiden und der grossen Waldhühner (*Tetrao*) gelten, welche ebenfalls am Boden brüten.

Bei anderen ursprünglicheren, dauernd am Boden lebenden Hühnern ist diese schützende Färbung auch bei dem Männchen erhalten. Daher verbirgt sich das von Raubvögeln verfolgte Felsenhuhn (*Tetrao gallus*) des Caucasus zwischen Steintrümmern, denen es in der Färbung ähnelt; daher duckt sich das südamerikanische Steisshuhn (*Crypturus*) bei harter Verfolgung auf den Boden der einförmigen Ebene nieder.

In beiden Geschlechtern kommt eine höher ausgebildete, aus verschiedenen Tönen von Braun oder Grau und feinen quer zur Längsachse der Deckfedern verlaufenden Zeichnungen zusammengesetzte Schutzfärbung besonders bei tagsüber ruhenden Vögeln vor. So schliesst sich das feingezzeichnete Gefieder der meisten Eulenvögel der Färbung des Bodens, des Astes oder des Gesteines an, auf dem das Thier seinen Tagschlaf hält. Auch die Nachtschwalben (*Caprimulgid.*), deren Weibchen meist auf dem nackten Boden brüten, besitzen eine ausserordentlich feine und zierliche Zeichnung, während die Färbung nach A. Brehm (l. c. Vögel I, S. 343) bei den waldbewohnenden Arten rindenartig, bei den in Wüsten und Steppen lebenden dagegen sandfarbig ist. Weiter gleicht die Tracht der Schnepfen (*Scalopus*) der Umgebung des tagsüber meist auf dem Boden ruhenden Vogels, der nach A. Brehm (l. c. III, S. 287) auch „genau weiss, welche vortrefflichen Schutz ihm das boden- oder rindenfarbige Kleid gewährt und es meisterhaft versteht, beim Niederfallen stets eine Stelle auszuwählen, welche ihm verbirgt“.

¹⁾ Vergl. A. Brehm, Thierleben 3. Aufl. Vögel II, S. 369—371.

²⁾ Vergl. A. Brehm l. c., 3. Aufl. Vögel II, S. 604—605.

³⁾ Darum lassen sich die „hahnenfedrigen Hennen“ durchaus nicht z. B. mit den männchenfarbigen Weibchen der polymorphen Rinnenfalter, wie *Pop. Myrope* (Theil I, S. 68) und *Pop. Pammon* (Theil I, S. 48) vergleichen, denn erstere treten erst dann in das Männchenkleid, wenn ihre normalen Geschlechtfunktionen durch hohes Alter etc. inhibirt sind.


Im Gegensatz zu der meist nur bei bestimmten stärker verfolgten Formen des Tierreiches allgemeiner ausgebildeten „schützenden Aehnlichkeit“ ist die „schützende Färbung“ bei Angreifern und Angegriffenen fast gleich verbreitet. So tragen nicht blos Eidechsen, Flughühner und Antilopen, sondern auch der Karakal und der Löwe das isabellfarbene Wüstenkleid. Und im eisigen Norden sind nicht nur das Schneehuhn und der Schneehase, sondern auch Hermelin und Eisfuchs im Winter, zur Zeit des grössten Nahrungsmangels und erbittertsten Kampfes um die Existenz, weiss wie der Schnee, der den Boden deckt, während in den höchsten Breiten mit ihren starrenden Eiswällen der Polarhase und der Eisbär dauernd das weisse Kleid tragen, welches auch die alten Jagdfalken (*Falco arcticus*) und Schneeeulen anlegen.

Als niedrigste Form der schützenden Anpassung an die Verhältnisse der Umgebung haben wir die „schützende Maskirung“ (protective masking) anzusehen, bei welcher das Thier nicht seinen Körper selbst der Umgebung anpasst, sondern dies durch bestimmte auf die freie, den Blicken der Feinde ausgesetzte, Rückenfläche befestigte Fremdkörper zu erreichen sucht. Wie die Larve der Neuropteren-Gattung *Chrysopa*, haben auch bestimmte Brachyuren diesem Zwecke angepasste Angelhaare, mit denen sie den schützenden Fremdkörper über sich befestigen. Dass aber diese besonderen Einrichtungen aus noch einfacheren Verhältnissen hervorgingen, zeigt eine Wollkrabbe (*Dromia vulgaris*), welche nach O. Schmidt (Thierleben I. c. X, S. 15) mit ihren Rückenfüssen meist einen Schwamm (*Sarcobragus* oder *Suberites*) über sich hält, der sich mit seiner Unterfläche eng an den Rückenschild anschmiegt. Aehnlich beobachtete ich in Siam verschiedene Reduviiden-Larven, die sich mit trockenen Blattstücken oder sogar mit einem Haufen todter Ameisen bedeckt hatten, mit denen sie langsam an den Stämmen der Bäume herumkrochen.

Wahrscheinlich entwickelten sich alle diese verschiedenen Anpassungen an die bewegliche oder unbewegte, lebende oder tote Umgebung besonders in Zeiten harten Existenzkampfes im Interesse der Arterhaltung aus zweckentsprechenden Zufälligkeiten, deren Fortbildung und Weiterentwicklung durch Naturauslese gesteigert und durch Vererbung befestigt wurde.

Unter solchen Umständen erscheint, um diese Untersuchungen mit einem schönen Worte Fr. Brauer's¹⁾ zu beschliessen, „der gesetzmässige Ausgleich des Kampfes ums Dasein vollendet, die Formen halten sich im Gleichgewicht, die (unter gleichen Verhältnissen) lebenden Arten erhalten sich.“

¹⁾ Fr. Brauer, systematisch-zool. Studien (Sitzb. kais. Ak. Wiss. XC1, 1885, S. 389).



Nachträge und Berichtigungen

zu

Theil I:

(Entwurf eines natürlichen Systems der Papilioniden.)

Seite 2, Zeile 21 v. o. ist hinzuzufügen: Auch die Raupe von *Scricinus* lebt auf Aristolochien.

„ 7, „ 10 v. o. ist zu streichen: „der Nachweis geführt, dass“

„ 7, „ 22 v. o. ist hinzuzufügen: In einem während des Druckes dieser Arbeit erschienenen Aufsätze „zur Phylogenie und Ontogenie des Flügelgeäders der Schmetterlinge“ (Zeitschr. f. wiss. Zool. LIII. 4. Heft 1892, S. 606) behauptet A. Spuler, dass die von mir als „3. Cubitalast“ gedeutete Vorderflügelrippe der Papilioniden einem besonderen, von ihm als V bezeichneten Hauptstamme angehört. Leider hat der Herr Verfasser dazu den entwicklungsgeschichtlichen, seinerzeit von Fr. Brauer und J. Redtenbacher als durchaus für die Lösung solcher morphologischen Fragen notwendig geforderten Nachweis nicht geliefert. Dagegen darf ich für meine Deutung hervorheben, dass der 3. Cubitalast (V. Spuler's) an den jüngeren Puppenstadien sich deutlich als hinter der Basis der Cubitaltrachee (VII) entspringender, also zu ihr gehöriger Ast nicht bloß bei *Papilio*, sondern auch bei *Cosmops thais* erkennen lässt. Erst auf den späteren, auch von Herrn Spuler untersuchten Stadien erscheint er durch die Schrumpfung des Basalthelmes als eher selbständiger Zweig. — Die Bemerkungen des Herrn Autors auf S. 613 zeigen, dass er das bereits 1891 ausgegebene erste Heft vorliegender Arbeit noch nicht eingesehen hatte.

Seite 15, Zeile 25 v. o. ist zu streichen „süd-“.

„ 16 ist am Schluss nachzutragen: In seinem, während des Druckes vorliegender Arbeit eingereichten und Ende Oktober 1892 ausgegebenen Beitrag „zur Stammesgeschichte der Papilioniden“ (Zool. Jahrbücher, Abt. f. Syst. etc. Bd. VI, Heft 4, S. 465—498 m. 2 Taf.) gründet auch A. Spuler seinen „Stammbaum der Papilioniden“ hauptsächlich auf die Zeichnung. Nach ihm gehen dieselben aus mit den Picriden gemeinsamen Urformen polyphyletisch hervor, indem sich zunächst die dem Stamme am nächsten stehende Gattung *Thais* und weiter die Parnassier (mit *Lithodorjia*) entwickelten. Gemeinsam mit der von uns zur *Thais*-Gruppe gerechneten Gattung *Scricinus* ging dann zuerst der *Euphrates*-Zweig der Papilionen hervor, der alle unsere *Cosmodesmus*-Arten mit Ausnahme der mimetischen enthält. Dem Stamme noch näher steht auch nach A. Spuler der *Marathon*-Zweig, der sich aus den Grundformen unserer Rinneflügel (*Papilio* s. str.), der *Alexander*-, *Tarucus*-, *Thais*-, *Glyon*-

und *Demoleus*-Gr. zusammensetzt. Spuler's „Randaugen Zweig“ enthält ausser gewissen Rinnenfalter-Gruppen (*Erechthias*-, *Ulysses*-, *Oribazus*-, *Capaneus*-, *Panaon*-Gr.) noch den von uns zu *Pharmacophagus* gerechneten *P. (Ph.) Coon* und — *Eurgens cressida*! Noch gemischtere Gesellschaft vereinigt sich im „*Thyabracus*-Zweig“, der alle Aristolochienfalter (mit Ausnahme des *Ph. Coon*), die erstere nachahmenden neotropischen Segelfalter (*Thyabracus*-Gr. etc.), die *Momon*-Gr. der Rinnenfalter mit *P. Eudithion* und endlich die von uns theils zu den Rinnen- (*Papilio* s. str.), theils zu den Segelfaltern (*Cosmodemus*) gerechneten Danaiden-Nachahmer enthält. So weichen Herrn Spuler's Resultate von den unseren so prinzipiell ab, dass ein näheres Eingehen auf alle Differenzen zu weit führen würde. Zu bedauern ist jedenfalls, dass Herr Spuler die wichtigen Arbeiten von A. R. Wallace, C. und R. Felder und E. Schatz nicht berücksichtigte, mehrere Genera (*Triopalpus*, *Leptocircus*, *Eurgales*, *Armadia*) nicht in den Kreis seiner Untersuchung ziehen durfte und schliesslich innerhalb der Gattung *Papilio* die Hinterflügelbinden und -Tüpfel nach ihrer übereinstimmenden Färbung homologisiert, statt die wichtigeren Lagerungsverhältnisse entscheiden zu lassen.

Seite 19, Zeile 12 ist hinzuzufügen: Im Ahal-Tekke-Gebiet entdeckte Christoph Mém. s. l. Lépidopt. etc. I, p. 41) eine var. *orientalis* des *P. Alconor*, die wir wegen des ausgebildeteren Submarginalbandes der Hinterflügel mit A. Seitz (Stett. ent. Zeitg. 1891, S. 56) für die ursprünglichere Form der Art ansehen.

Seite 22, Zeile 9 v. o. ist zu streichen: „weiter“.

„ 23, „ 10 von unten lies: *Pharmacophagus* statt „*Pharmacoptus*“.

„ 26, „ 20 v. o. ist hinzuzufügen: Nach J. Wood-Mason (Ann. Mag. Nat. Hist. 1882, p. 195) sind *P. Rarana* Moore und *Mineus* Gray von *P. Philoxenus* Gray verschiedene Arten, während *P. Polyuctes* Dbl. nur eine Varietät des letzteren vorstellen dürfte.

Seite 27, Zeile 14 v. o. lies: Tarsenglieder statt „Torsenglieder“.

„ 28, „ 27 v. o. lies: *Semper* statt „*Peuper*“.

„ 29, Fussnote lies: *Pharmacophagus* statt „*Pharmacoptus*“.

„ 37, Zeile 9 v. u. setze: *Leuconor* Fr. statt „*Idea* Cl.“

„ 46, „ 7 v. u. setze: XXXVII statt „XXVII“.

Fussnote, Zeile 2 v. o. setze: *Semper*'schen statt „*Felder*'schen“.

Seite 48, Zeile 7 v. o. setze: *ugla* Cr. statt „*similis* L.“

Seite 51, Zeile 2 v. o. ist hinzuzufügen: Nach Dr. Staudinger (Exot. Schmetterl. S. 7) kommt, wiewgleich viel seltener als die mimetische, bei *P. Nirator* Feld. auch eine münchenerfärbige Weibchenform vor.

Seite 52, Zeile 2 v. u. setze: *Polyuctes* Dbl. statt „*Dasypala* Moore“.

„ 57, „ 11 v. unten lies: abgebildetes statt „abgebildeter“.

„ 57, „ 8 v. unten setze: entstanden statt „anzusehen“.

„ 58, „ 13 v. o. ist hinzuzufügen: Neuerdings hat Heylants von der var. *Archates* Cr. ein männliches Exemplar aus Java angezeigt (Tijdschr. v. Entomol. XXXIV, Verst. p. XXVIII und CXV).

„ 58 seitlich der 14. Zeile v. o. ist am Rande hinzuzufügen: *Polymnestor*-Gr.

„ 58 seitlich der 12. Z. v. u. ist am Rande hinzuzufügen: vgl. Taf. VI, Fig. 41.

„ 58, 12. Zeile v. u. lies: *Lampsacus* statt „*Pampsacus*“.

„ 59 hinter Zeile 2 v. o. ist hinzuzufügen: (Nach E. Baillon (Nat. Hist. of. Plants II, p. 437) ist *Schifera* synonym mit *Tetranthera*).

„ 70, Zeile 16 v. o. lies: *Echeria* statt „*Escheria*“.

Seite 70, Zeile 10 v. u. ist hinzuzufügen: Vielleicht ist diese auffällige Färbung aber auf eine Anpassung an eine Pieride der anscheinend immunen Gattung *Mylothris*, so vielleicht an das Weibchen der von Dr. Staudinger l. c. S. 29 zu *Tachyris* gerechneten *Myl. Trimenia* Btlr., zurückzuführen.

Seite 71, Zeile 15 v. o. lies: *Echeria* statt „*Escheria*“.

„ 73, „ 15 v. o. setze: Papilionen statt „Tagfalter“.

„ 76, „ 13 v. u. ist hinter „sie“ — auch etwas — einzufügen.

„ 78, „ 3 v. o. lies: Hinterflügel statt „Hintergliedern“.

„ 79 „ 10 v. u. setze: Binden statt „Spiegel“.

„ 79 „ 3 v. u. setze: *confusa* statt „*Psidi*“.

„ 80 ist vor: Amerikanische Segelfalter“ einzuschalten: 2.

„ 81 letzte Zeile setze: dieselbe statt „dasselbe“.

„ 85, Zeile 13 am Rande setze: *Astygus*-Gr. statt „*Asias*-Gr“.

„ 94 ist der von Zeile 8—5 v. u. reichende Satz hinter den obersten Absatz zu stellen.

„ 94 Zeile 17 v. o. lies: *Pharmacs*-Gr. statt „*Pharmacs*-Gr“.

„ 100 ist die Gruppentabelle links folgendermassen zu ergänzen:

Cuzicus-Untergr.; *Zagreus*-Gr.;

Eurymander-Gr.;

Troilus-Gr.;

Asclepius-Gr.;

Palamedes-Gr.;

Danaus-Gr.

Seite 102, Zeile 21 v. o. setze: 9—10 statt „8—9“.

„ 104, „ 8 v. o. setze: besonders statt „nur“.

„ 106, „ 9 v. u. setze: Submarginalband statt „Inframarginalband“.

„ 109, „ 17 v. o. lies: *Pazilo* statt „*Pazili*“.

„ 111, „ 3 v. u. ist nach „*Lühdorfia*“ einzuschalten: „der *Thais*-Gruppe statt“.

„ 112 „ 12 v. u. setze: Mittelzelle statt „Mittelbinde“.

Nachträge und Berichtigungen

ZU

Theil II:

(Untersuchungen über die Mimicry.)

Seite 4, Zeile 7 v. o. lies: Just statt „Cust.“

„ 6 „ 2 v. o. ist hinzuzufügen: Nach dem in Fussnote 1 erwähnten Aufsätze Ph. Bertkau's „über Ameisenähnlichkeit bei Spinnen“ erinnert unter den europäischen Attiden *Salticus formicarius* an *Formica rufa* auch darin, dass er beim Gehen die Vorderbeine gewöhnlich rechtwinklig gekrümmt trägt und mit ihnen gleich den Antennen tastende Bewegungen ausführt; „er scheint alsdann nur sechs Füße zu haben“, wie bereits de Geer bemerkte. Weiter ähnelt *Leptorchestes hiavulus* auch in dem matten Seidenglanz einem *Lasius fuscus*, „zum Verwechseln.“

Unter den **Drassiden** haben nach Bertkau sämtliche Arten von *Micaria* das Aussehen von Ameisen. So gleicht *M. fulgens* einem *Camponotus*, *M. pulicaria* und *M. scutica* einem grösseren *Lasius*, *M. albostrigata* einem *Lasius fuscus*, *M. splendidissima* einem *Tetramorium caespitum*.

Selbst bei **Theridiiden** kommt in *Formicina mutinensis* Can. eine ausgezeichnete ameisenähnliche Form vor.

Seite 6 ist hinter der Fussnote 2 hinzuzufügen: Uebrigens bezeichnet H. W. Bates selbst die Aehnlichkeit des Schwärmers *Macroglossa Titon* mit dem Kolibri als eine nur oberflächliche und urtheilte dahin, dass diese „Analogie“ wahrscheinlich das Product der Aehnlichkeit ihrer Lebensweise sei „there being no indication of the one having adapted its outwards appearance with reference to the other“ (the Naturalist on the River Amazonas, chapt. V). -- Nach de Saussure's Beobachtungen (vergl. Brehm's Thierleben, 2. Aufl. 1878, IV, S. 434) ist diese Aehnlichkeit mit dem Kolibri für den Schmetterling zugleich sehr nachtheilig, denn die Kolibris „liefern den Schwärmern förmliche Kämpfe, verfolgen sie von Blume zu Blume, von Zweig zu Zweig und stossen so lange auf sie los, bis sie dieselben vertreiben.“

Seite 7, Zeile 5 u. 6 v. o. lies: Serv. statt „Sew.“

„ 10, Zeile 6 v. o. ist hinzuzufügen: Ein besonders auffälliges Beispiel der Ameisenähnlichkeit von Pyrrhocoriden bildet Gerstäcker von *Myrmoplasta mira* n. g. et sp. ab (Jahrb. Hamb. Wissensch. Anstalten IX, 2. 1892 Ostafrikanische Hemiptera p. 9). Ein einzelnes von Stuhlmann in Ost-Afrika gesammeltes Exemplar „wurde zusammen mit *Polyrhachis gagates* Smith, welcher die Wanze in täuschender Weise ähnlich sieht, und mit *Ponera tarsata* Fab. als ‚Ameise‘ eingesendet. Der Ameisen-Habitus ist an dieser Art durch den kurzen, kugligen, gegen den Thorax tief abgeschmürten Hinterleib in gleich prägnanter Weise wie bei der Capsinen-Gattung *Myrmecoris Gorskii* und noch ungleich schärfer als an der gleichfalls aus dem tropischen Ost-Afrika stammenden Locustine: *Myrmecoplaua fulva* Brunner ausgeprägt.“ (Anm. d. Herausg.).

- Seite 11, Zeile 6 v. o. ist zu streichen: „und *Coelocoryps*“, da nach P. Marchal (Revue scientifique T. 45, p. 199—204) die Gattung *Coelocoryps* aus *Megachile* selbst hervorgegangen sein dürfte, bei der sie jetzt schmarozt, wie *Psilopyrus* aus *Bombus* entstand.
- „ 11, Zeile 3 v. u. setze: von Seiten der Käfer statt: „unter den Käfern“.
- „ 17 hinter Zeile 22 v. o. ist hinzuzufügen: Als eine ausgezeichnete Anpassungsform an die Endomychiden-Gattung *Corgonomatus* Chev. sei noch der brasilianische *Cybelopeplus Batesii* erwähnt, dessen Fühler durch die Vergrößerung einer mittleren knopfförmigen Auftreibung und die Verfeinerung des Endtheiles durchaus die keulenförmigen Antennen des Pilzfressers vortäuschen.
- „ 18 hinter Zeile 9 v. o. ist hinzuzufügen: Neuerdings machte noch Ch. J. Gahan (Trans. Ent. Soc. Lond. 1891, p. 367—374) auf zahlreiche mimetische Anpassungen von Arten von *Lema* an solche von *Diabrotica* (Galerucid) aufmerksam: Letztere sind nach ihm deshalb als Modelle anzusehen, weil sie durch ein gelbes Secret geschützt sind, das sie aus „Mund und Kniegelenken“ hervortreten lassen. — Nach demselben ahmen andere *Lema*-Arten (so *monstrosa*) auch Hispiden nach.
- „ 18, Zeile 4 v. u. setze: heteromere Käfer statt „Bock.“
- „ 18, „ 5 v. u. lies: *fasciaticipennis* statt „*fasciaticipennis*“.
- „ 18, „ 14 v. u. lies: *Molorechus* statt „*Molorechus*“.
- „ 19 hinter Zeile 2 v. o. ist hinzuzufügen: Weiter erinnert der neotropische *Odontocerus odyceroides* Bates mit gelb gebändertem und an der Basis eingeschnürtem Abdomen derart an *Odycerus*-Arten, dass Bates Bedenken trug, ihn mit den Fingern aus dem Netz zu nehmen.
- „ 19, Zeile 11 v. o. lies: *Molorechus* statt „*Molorechus*“.
- „ „ 18 „ „ „ *hemipterus* statt „*hemipterus*“.
- „ 25 „ 21 „ „ ist hinzuzufügen: Die Raupe von *Dan. reptonicus* Feld. lebt nach Moore (Lep. Ceylon p. 8) an *Cryptolepis* (Aselepiad); die von *D. Linniae* Cr. an *Aselepias* sp., die Larven von *Eupl. Core* L. und *asela* Moore leben an *Nerium*.
- „ 26, Zeile 4 und 2 v. u. ist zu setzen: *Delias* statt „*Pelias*“.
- „ „ letzte Zeile ist zu setzen: *D.* statt „*P.*“
- „ „ ist als Fussnote ²⁾ zu setzen: Vergleiche dagegen die Fussnote ²⁾ auf S. 100. — Die Fussnote ³⁾ von S. 26 selbst gehört auf die folgende Seite in die 4. Zeile v. o. zu E. Hartert.
- „ 27, 1. Zeile ist zu streichen: „über die Futterpflanzen (Crutiferen) habe ich keine Notiz gefunden“ und dafür zu setzen: Die Futterpflanze besteht nach einer Angabe (Grote's aus *Loranthus*, wie bei der afrikanischen Untergattung derselben Familie *Mylothris*.
- „ 31, Zeile 22 v. o. ist hinzuzufügen: Dagegen erinnert die ebenso grosse dunkle *P. Binghami* Wood-Mas. (Burma) etwas an braune Euploeen, wie *Ea. Core* L. etc.
- „ 31 ist die Fussnote zu streichen.
- „ 32, Zeile 3 v. o. ist zu streichen: „mit Ausnahme einer indischen Form, *E. consimilis* Nic., welche dem Männchen sehr ähnlich, aber grösser und breiter ist.“
- „ 32, Zeile 5 v. o. lies: *Habartus* statt „*Habartus*“.
- „ „ 10 v. o. ist hinzuzufügen: oder im Ganzen mehr an *Eupl. Linnæi* Moore ; — Eine weitere von L. de Nicéville (Butt. of India II, 1886, p. 20) beschriebene Varietät des Weibchens, var. *Alcathoides* aus Ober-Tenasserim, ähnelt der mit ihr zusammen vorkommenden *Eupl. Alcathoi* Godt.
- „ 32, Zeile 21 v. o. lies: *Linnæe* statt „*Linnæe*“.
- „ „ 22 v. o. ist hinzuzufügen: Hingegen erinnert bei dem abweichend gefärbten *Euripus*

consimilis Westw. besonders das mehr schneeweisse oder (var. *meridionalis* Wood-Mas.) strahlgelbe Weibchen dadurch, dass das Carminroth der Hinterflügel auf die Basalportion der Unterseite beschränkt ist, nach L. de Nicéville (l. c. II, p. 18) an gewisse *Delias*-Arten.

- Seite 33, Zeile 8 v. o. ist hinter „Protogenia Cr.“ hinzuzufügen: wie das von *E. caudata* Btlr. (Südindien).
- „ 33, Zeile 18 v. o. ist zu streichen: „während die meisten“ und dafür zu setzen: „so ähnelt diese auch in Siam vorkommende Art in beiden Geschlechtern den grünlichen Danaern, wie der *Similis*-Gr. und *D. Linniae* Cr., während abweichende, vielleicht zu *E. Timandra* Wall. (Tenasserim) gehörige
- „ 34, Zeile 2 v. o. ist hinzuzufügen: Weiter erinnert nach L. de Nicéville *El. nimus* W.-M. und de Nic. (Nicobaren) an die dortige *Euploca Cannaia* Moore.
- „ 35, Zeile 16 v. o. lies: im statt „ein“;
- „ „ „ 17 „ „ ist hinzuzufügen: Die kleinere *Z. diademoides* Moore (Tenasserim) erinnert dagegen in beiden Geschlechtern an die braune *Eupl. Core* L.
- „ 36, Zeile 2 v. u. ist hinzuzufügen: Wie das Weibchen von *P. Bhettuar* (= *Icarus* Westw.) dem *Phaen. Dasanala* Moore, ähnelt nach J. Wood-Mason (Ann. Nat. Hist. 1882, p. 103—105) in beiden Geschlechtern *Pap. Janaka* Moore (Sikkim, Nepal) dem *Phaen. Minerva* Gray und *Pap. Bates* Westw. und *sikkimensis* Wood-Mason dem *Phaen. Polyeches* Gray.
- „ 37, Zeile 6 v. o. setze: der *Eupl. Core* L. statt „demselben *Danaus*“;
- „ „ „ 7 „ „ „ *Aglea* statt „*Melissa*“;
- „ 41, Zeile 13 v. o. ist zu streichen: „nicht grade für die Widrigkeit der Imago anzuführen wäre“ und dafür zu setzen: dieselbe ist wie bei den vielfach als Modell auftretenden indischen *Delias*-Arten.
- „ 41, Zeile 19 v. o. ist hinzuzufügen: Vielleicht ist auch die auffällige Färbung der var. *Dionysos* Dbl. des Weibchens von *Pap. Merope* L. als Anpassung an bestimmte gemeine *Mylothris*-Formen anzusehen.
- „ 41, Zeile 6 v. u. ist zu setzen: Nyctemeriden statt „Lithosiiden“;
- „ „ „ 3 „ „ ist zu streichen: „der Agaristiden, die *Phacagorista Helcithoides* Dew. und die *Eusmia Falkensteini* Dew.“ und dafür zu setzen: „anderer Gattungen, die Nyctemeride *Phacagorista Helcithoides* Dew. und die Agaristide *Eusmia Falkensteini* Dew.“
- „ 41, letzte Zeile setze: den beiden anderen Formen statt: „den Agaristiden“;
- „ 51 „ „ „ „ *confusa* Btlr. statt „*Psidi* L.“
- „ 53, Zeile 3 v. o. ist zwischen „variiren sehr“ einzuschalten: manchmal.
- „ „ „ 17 „ „ „ „ „ *Th. Pytho*“ einzuschalten: *Psidi* L.
- „ 57 „ „ 5 v. u. lies: *aliphera* statt „*alistera*“;
- „ 61 „ „ 7 v. o. „ *Euryades* statt „*Euryodes*“;
- „ 63 „ „ 4 v. u. ist hinzuzufügen: Das Weibchen von *Esthemopsis Cilina* Stdgr. (St. Juan) erinnert dagegen etwas an abgetlogene Stücke von *Acraca Thalia* L.
- „ 64, Zeile 24 v. o. setze: *Phaloe* Stdgr. statt „*lucata* Guér.“
- „ 66 „ „ 13 „ „ lies: *confusa* statt „*confusa*“.
- „ 67 „ „ 8 v. u. „ *Teuthamis* statt „*Teuthamis*“;
- „ 68 „ „ 8 v. o. setze: *Archonias Teuthamis* statt „*Prente Teuthamis*“;
- „ 71 „ „ 9 v. u. lies: *serialis* statt „*erialis*“;
- „ 72 „ „ 15 v. o. setze: *Thyridia* statt „*Methona*“.

Vorliegende Arbeiten sind trotz ihrer verschiedenen Bezeichnung inhaltlich miteinander verbunden, denn der „Versuch eines natürlichen Systems der Papilioniden“ bildete die nothwendige Grundlage für die Erörterung einiger der wichtigsten Fragen aus dem Gebiete der zweiten Arbeit über Mimicry.

Erst nach mehrjährigen, oft unterbrochenen Studien, welche ich besonders im Berliner kgl. zoologischen Museum durch die Güte des Herrn Geheimrath Prof. Dr. Möbius und in der grossartigen Schmetterlings-Sammlung des Herrn Dr. O. Staudinger in Blasewitz bei Dresden anstellen durfte, gelang es mir, des gewaltigen Materiales einigermaassen Herr zu werden. Auch wurde es mir nur durch das Wohlwollen meines früheren Chefs, des Herrn Prof. C. Chun, damals in Königsberg, möglich, an der endlichen Abfassung des Manuscripts ungestört arbeiten zu dürfen. So hatte ich denn die Arbeit fast vollendet, als ich an das K. siamesische Museum in Bangkok einen Ruf erhielt, zu dessen Hauptbedingungen baldige Abreise gehörte. Dadurch wurde ich gezwungen, die zweite Arbeit theilweise während der anstrengenden Seefahrt auszuarbeiten. Muss ich schon für den in Königsberg niedergeschriebenen, die Arachniden und Insecten behandelnden Theil der Mimicry-Studien wegen der beschränkten Verhältnisse von Bibliothek und Sammlungen um gütige Nachsicht bitten, so gilt dies in noch höherem Grade für die übrigen Capitel, welche ich erst unterwegs und hier, in Bangkok, von Literatur vollkommen entblösst, niederschreiben konnte. Dagegen ist es mir eine angenehme Pflicht, denjenigen Herren, welche mich durch das oft überaus werthvolle Material ihrer Sammlungen unterstützten, das ich durch die Liberalität des Herrn Verlegers Carl Fisher von berufener Künstlerhand darstellen lassen durfte, meinen verbindlichen Dank für ihre gütige Unterstützung zu sagen, so besonders Herrn Dr. O. Staudinger in Blasewitz, Herrn E. G. Honrath in Berlin und Herrn Prof. Nap. Kheil in Prag. Ebenso fühle ich mich Herrn Prof. Chun zu aufrichtiger Dankbarkeit für die Güte verpflichtet, mit welcher er die Correcturen der Mimicry-Arbeit für mich übernommen hat.

Bangkok, den 1. Juli 1891.

Der Verfasser.


Inhalt.

	Seite
Einleitung	1
Grundformen der Zeichnung	11
Eintheilungsprincipien der <i>Papilio</i> -Arten	15
Paläarktische Papilionen	17
Indo-australische Papilionen	21
a. Aristolochienfalter	22
b. Segelfalter	30
c. Rinnenfalter	38
Afrikanische Papilionen	59
a. Aristolochienfalter	59
b. Segelfalter	61
c. Rinnenfalter	65
Amerikanische Papilionen	74
a. Aristolochienfalter	74
b. Segelfalter	80
c. Rinnenfalter	88
Zusammenfassung der Resultate aus der Zeichnung der Papilionen	100
Die Gattung <i>Triopalpus</i> Hope	102
- - <i>Leptocircus</i> Swains.	103
- - <i>Euryades</i> Feld.	104
- - <i>Eurygus</i> Boisd.	105
- - <i>Sericinus</i> Westw.	106
- - <i>Armandia</i> Blanch.	107
- - <i>Thais</i> L.	108
- - <i>Luchdorgia</i> Crüg.	109
- - <i>Doritis</i> F.	110
- - <i>Hypermustra</i> Mén.	110
- - <i>Parmassius</i> Latr.	111
Zusammenfassung	112
Systematische Uebersichten	114
1. Uebersicht der Gattungen der Papilioniden	114
2. Die Untergattungen von <i>Papilio</i> und C. und B. Felder's Sectionen	114
Nachträge	121

Tafel 4.


Die Weibchen von *Papilio Merope* Cr.

- Fig. 1. *Pap. Merope* Cr. ♀ subsp. *Antiochii* Oberthur. Gewöhnliche Weibchenform aus Abessinien, dem Männchen gleich und häufig.
- 2. id. v. *Niarina* Kheil. ♀; erste mimetische Weibchenform aus Abessinien; sehr selten.
 - 3. id. v. *Raspinae* Kheil. ♀; zweite mimetische Weibchenform aus Abessinien; sehr selten.
 - 4. *Pap. Merope* Cr. ♀ subsp. *Tiballus* Kirby v. *Cenea* Stoll. Cap.
 - 5. id. v. *Trophonius* Westw. ♀. Cap.
 - 6. id. subsp. *Brutus* Fb. ♀ v. *Hippocoon* Fb. Accra.



Tafel II.

- Fig. 7. *Papilio Merope* Cr. ♀ subsp. *Tiballas* Kirby v. *Cenca* Stoll. Cap. Copie nach Trimen (Trans. Linn. Soc. 1868).
- 8. id. v. *Hippocoonides*. ♀. Cap.
 - 9. *Papilio Echerioides* Trimen. ♀. Cap.
 - 10. id. ♂. Cap.
 - 11. *Hypolimnas Mimus* Trimen. ♀. (Nymphalin.) Cap. Copie nach Trimen l. c.
 - 12. *Amauris Echeria* Stoll. ♀. (Danain.) Cap. Modell zu Fig. 4, 7, 9 und 11.
 - 13. *Hypolimnas Anthedon* Dblld. ♀. (Nymphalin.) Accra.
 - 14. *Amauris Niarias* L. ♀. (Danain.) Accra. Modell zu Fig. 2 und 6, und in einer Varietät *Dominicanus* Tr. zu Fig. 8.



Nach der Natur gezeichnet u. in Farben gedruckt v. Theodor Preissler in Leipzig

Vertrieben durch die Pflanzl. Haase, d.

7. Pap. Merope Cr. ♀ subsp. Tibullus Kirby v. Cenea Stoll Cap. 8. Id v. Hippocoonides ♀ Cap. 9. Pap. Echerides Trimen ♀ 10. Id v. Cap.
 11. Diadema Mima Trimen ♀ Cap. 12. Amauris Echeria Stoll ♀ Cap. 13. Diadema Anthedon Dbl ♀ Akkra
 14. Amauris Niavius L. ♀ Akkra

Tafel III.

- Fig. 15. *Pseudacraea Hirce* Dry. ♀. (Nymphalid.) Westafrika.
16. *Elymnias Phryga* Fb. ♀. (Satyrin.) Westafrika.
17. *Acraea Gea* Fb. ♀ (Acraein.), fliegend. Westafrika. Modell zu Fig. 15 und 20.
18. id. sitzend. Modell zu Fig. 15, 19 und 20.
19. *Papilio Cyorta* Fb. ♀ (*Boisduvalianus* Westw.), sitzend, von Fig. 18 durch die Vorderfüsse unterschieden. Westafrika.
20. id. ♀, fliegend.
21. id. ♂.
22. *Pseudacraea Poggei* Dew. ♀. (Nymphalid.) Westafrika.
23. *Danaus Chrysippus* L. ♀. (Danain.) Westafrika. Modell zu Fig. 3, 5 und 22.




Nach der Natur gezeichnet u. in Farbe gedruckt. Die Größe vergrößert.

15 Panopaea birce Dry₂ W. & M. 16 Elymnias phlegon Fb₂ W. & M. 17 Acraca gea Fb₂ W. & M. 18 id. 19 Pap. cynorta Fb. Borsduvianus Westw₂ W. & M.
21 id. 22 Panopaea poggei Desw₂ W. & M. 23 Danaus chrysipus L. W. & M.

Tafel IV.


- Fig. 24. *Hypolimnus Dubius* Beauv. ♀. (Nymphalid.) Accra.
• 25. *Amauris Egiatra* Cr. ♀. (Danain.) Accra. Modell zu Fig. 24.
• 26. *Acraca Egina* Cr. ♀. (Acracid.) Sierra Leone. Modell zu Fig. 27 und 28.
• 27. *Papilio Ridlegaus* White. ♀. (Pap.) Sierra Leone.
• 28. *Pseudacraea Boisduvalii* Dbl. ♀. (Nymphalid.) Westafrika.
• 29. *Eusemia Falkensteini* Dew. (Agaristid.) Westafrika.
• 30. *Liptena sanguinea* Ploetz. (*Anecke* Dew.) (Lycaenid.) Westafrika.
• 31. *Euphaedra Ruspina* Hew. ♀. (Nymphalid.) Westafrika.
• 32. *Alcis Helcila* Cr. ♀. (Lithosiid.) Westafrika. Modell zu Fig. 29—31.



24 *Hypolimnas Dubius* Beauv ♀ Akkra 25 *Amanris Egleia* Cr ♀ Akkra 26 *Acraea Egna* Cr ♀ Sierra Leona 27 *Pap. Ridleyanus* White Sierra Leona
 28 *Panopaea Boisduvali* Dbl ♀ 29 *Eusemia Falkensteini* Dew Afr 30 *Liptena sanguinea* Dbl Afr 31 *Euphaedra Ruspina* Hew ♀ W Afr
 32 *Metis Heleta* Cr ♀ W Afr

Tafel V.

- Fig. 33. *Papilio Rhetenor* Westw. ♀ (*Icarius* Westw.). Sikkim.
- 34. id. ♂.
- 35. *Papilio* (*Pharm.*) *Dasarada* Moore. ♀. Sikkim. Modell zu Fig. 33.
- 36. " *Janaka* Moore. ♀. Sikkim.
- 37. " (*Pharm.*) *Philoreus* Bois-d. ♀. Sikkim. Modell zu Fig. 36.



33 Pap. Rhetenor Wstw. — 6150. 34 id. — 55. 35 Pap. Dasarada Moore. — 58km. 36 Pap. Janaca Moore. — 56km.
37 Pap. Phloxenus Ed. — 0160.


Tafel VI.

- Fig. 38. *Papilio Mayo* Atk. ♀ (*Charicles* Hew.). Andamanen.
.. 39. id. ♂.
.. 40. *Papilio (Pharm.) Rhodifer* Butl. ♀. Andamanen. Modell zu Fig. 38.
.. 41. .. *Lampsacus* Boisd. ♀. Java.
.. 42. .. *Priapus* Boisd. ♀. Java. Modell zu Fig. 41.


40



38




39



41




42



38 Pap. Mayo Atl. (Charley New) Antanan. 39 id. 40 Pap. Rhodifer Bull. Antanan. 41 Pap. Lampisius Bil. Java
42 Pap. Prapus Bil. Java

Tafel VII.


- Fig. 43. *Papilio (Casmodesm.) Delessertii* de Haan. ♀. Sumatra.
.. 44. *Ideopsis Daos* Boisd. ♀. (Danain.) Sumatra. Modell zu Fig. 43.
.. 45. *Zethenia Hestioides* Fld. ♀. (Satyrin.) Philippinen. Nachahmer von *Ideopsis glaphyra* Feld.
.. 46. *Danaus Faltus* L. ♀. (Danain.) Sikkim. Modell zu Fig. 47.
.. 47. *Papilio Agrstor* Gray. ♀. (Pap.) Sikkim.
.. 48. *Euripus Halitherses* F. ♂. (Nymphalin.) Malacca.
.. 49. id. ♀ (*Isa* Moore). Malacca. Nachahmer von *Euphrosyne Rhodamanthus* F. ♀.
.. 50. *Euripus Halitherses*. ♀ v. *Rhodamanthinus*. Malacca. (Perak.)
.. 51. *Euphrosyne Rhodamanthus* Fb. ♂. (Danain.) Malacca. Modell zu Fig. 50 und 53.




43. Pap. Delesserti de Haan ♀ Sumatra. 44. Ideopsis Daos Ed. ♀ Sumatra. 45. Zethenia bestoides Fld. ♀ Philippinen. 46. Danaus Tytus L. ♀ Sikkim. 47. Pap. Agestor Gray ♀ Sikkim. 48. Eurypus Halitherses F. ♀ Malacca. 49. id. ♀ (Csa Moore). 50. Euryp. Halitherses, euphroides v. Pierferae Fld. Malacca. 51. Euploea Rhodamanthus, Fl. ♀ Malacca.

Tafel VIII.

- Fig. 52. *Euryptus Halitherses* Godart. ♀ (*Nyctelius* Dblld.). (Nymphalin.) Nordindien. Nachahmer von *Euploea Godartii* Luc.
- .. 53. *Papilio Ceanus* Dblld. ♂. Borneo. Nachahmer von *Euploea Rhadamanthus* F., Fig. 51.
- .. 54. .. *Paradocus* Westw. v. *Zanous* Butl. ♂.
- .. 55. id. ♀. Malacca.
- .. 56. *Hypolimnus anomalus* Wall. ♀. (Nymphalin.) Malacca.
- .. 57. id. ♂. Malacca.
- .. 58. *Euploea Limotei* Moore. ♂ (*Midamus* L.). (Danain.) Malacca. Modell zu Fig. 54 und 56.
- .. 59. id. ♀. Malacca. Modell zu Fig. 55.




52




53



54




55




56



58




57



59

Tafel IX.


- Fig. 60. *Papilio Erostratus* Westw. ♂. Mexico.
.. 61. id. ♀ (*Rhetus* Gray). Mexico.
.. 62. *Papilio* (*Pharm.*) *Photinus* Dblld. ♀. Mexico. Modell zu Fig. 61, 63 und 64.
.. 63. .. *Pharnaex* Dblld. ♀. Mexico.
.. 64. .. (*Cosmodesm.*) *Phymbraeus* Boisd. ♀. Mexico.
.. 65. .. (*Pharm.*) *Arncides* Esp. v. *Eurybates* Gray. ♂. Bolivia. Modell zu Fig. 66.
.. 66. .. (*Cosmodesm.*) *Xymias* Hew. ♂. Bolivia.



60. Pap. Erosistratus Wstw. ? Mexico. 61. Id. (Rhetus Gray) Mexico. 62. Pap. Photinus Ddld. ? Mexico. 63. Pap. Pharnaces Ddld. ? Mexico. 64. Pap. Thymbracus Bd. ? Mexico. 65. Pap. Aeneides Esp. & Eurybates Gray. ? Bolivia. 66. Pap. Xyntias Hlew. ? Bolivia.

Tafel X.

- Fig. 67. *Papilio Torquatinus* Esp. ♂. Brasilien.
.. 68. id. ♀ (*Hectorides* Esp.).
.. 69. *Papilio (Pharm.) Bunichus* Hb. ♀. Brasilien. Modell zu Fig. 68 und 70.
.. 70. .. (*Cosmodesm*) *Lysithous* Hb. ♀. Brasilien.
.. 71. *Cyanon* Gray. ♀. Para.
.. 72. .. (*Pharm*) *Anchises* L. ♀ v. *Parsodes* Gray. Para. Modell zu Fig. 71.
.. 73. .. *Hippuson* Cr. ♀. Para.
.. 74. .. (*Pharm.*) *Vertumnus* Cr. v. *Diceros* Gray. ♀. Para. Modell zu Fig. 73.




67. Pap. Torquatus Esp. $\frac{1}{2}$ Brasil. 68. id. $\frac{1}{2}$ (Electorides Esp.) 69. Pap. Burchus Hb. $\frac{1}{2}$ Brasil. 70. Pap. Lystichus Hb. $\frac{1}{2}$ Brasil.
 71. Pap. Cyamou Gray. $\frac{1}{2}$ Para. 72. Pap. Anchises L. $\frac{1}{2}$ v. Parsodes Gray. Para. 73. Pap. Hippason Cr. $\frac{1}{2}$ Para.
 74. Pap. Vertumnus Cr. v. Dicerus Gray. $\frac{1}{2}$ Para.

Xava (Pap. Nator) is retained in the Earle collection (1890-1891).

Types of *Torquatus* in the collection of the author.

Tafel XI.


- Fig. 75. *Castaia linus* Cr. var. *heliconoides* Herr-Schäff. (Castniid.) Brasilien.
 .. 76. *Hyalasia heliconoides* Feld. (Pericopid.) Brasilien.
 .. 77. *Itana Hione* Cr. (Danaid.) Brasilien.
 .. 78. *Thyridia* (nicht *Methona!*) *psidii* L. ♀. (Neotropid.) Brasilien. Fig. 75, 76, 77, 78 und 79 führen die *Methona*-Tracht.
 .. 79. *Disamorphia Orise* Bsd. (Pierid.) Brasilien.
 .. 80. *Heliconius Melponome* L. (Heliconin.) Peru etc. Modell zu Fig. 82, 83.
 .. 81. *Archonias teuthanis* Hew. (Pierid.) Peru.
 .. 82. " " " " " "
 .. 83. *Papilio caterpius* Hew. (Papilionid.) Ecuador.



75. *Castnia Linus* Crv. *Heliconoides* Plb. Brasil. 76. *Hyceus Heliconoides* Swains. Brasil. 77. *Huna Hione* Cr. Brasil. 78. *Methona confusa* Butl. Brasil. 79. *Dismorphia Orise* Boisid. ♀. Guana. 80. *Heliconus Melpomene* L. ♀. Peru etc. 81. *Enterpe Teuthamis* Hew. ♂. Peru. 82. id. ♀. 83. *Pap. Enterpinus* Hew. ♂. Peru.

Tafel XII.





- Fig. 84. *Pericopsis ithomia* Feld. (Pericopid.) Centralamerika.
.. 85. *Castnia simulans* Bsd. (Castniid.) Brasilien.
.. 86. *Perchybis pyrcha* F. ? (Pierid.) Brasilien.
.. 87. " " " " " " " " Ober- und Unterseite dargestellt.
.. 88. *Pericopsis histrio* Feld. (Pericopid.) Centralamerika, Brasilien.
.. 89. *Lycorca Ceres* Cr. (Danaid.) Brasilien. Fig. 85, 86, 88 und 89 führen die *Melinaceu*-Tracht, Fig. 84 die *Ircu*-Tracht von *Tithorea*.
.. 90. *Castnia aceroides* Bsd. (Castniid.) Brasilien.
.. 91. *Dismorphia Melia* L. *aceroides*. (Pierid.) Brasilien.
.. 92. " " " " " " " "
.. 93. *Acraca Thalia* L. ? (Acracin.) Brasilien. Modell zu Fig. 90 und 91.



84 *Pericopsis Titorea* Fld Brasil 85 *Castnia simulans* Boisdu Brasil 86 *Perrhybris Pyrrha* F., Brasil 87 id. 88 *Pericopsis histrio* Fld Brasil 89 *Lycorea Ceres* Cr Brasil 90 *Castnia Aeraeoides* Boisdu Brasil 91 *Dismorphia Melia* Cr (*Aeraeoides* How.) Brasil 92 id. 93 *Araea Thalia* L. Brasil

Tafel XIII.

- Fig. 94. *Sphecosoma testaceum* Saly. u. Godm. (Glaucopterid.) Central-Amerika.
.. 95. *Polybia brasiliensis* Sauss. ♂. (Vespid.) Central-Amerika etc. Modell zu Fig. 94.
.. 96. *Sphecosoma fasciolatum* Saly. u. Godm. (Glaucopterid.) Central-Amerika.
.. 97. *Polybia fasciata* Lep. ♀. (Vespid.) Central-Amerika etc. Modell zu Fig. 96.
.. 98. *Myrmecopsis crabronis* Herr-Schäff. (Glaucopterid.) Central-Amerika.
.. 99. *Polybia angulata* F. ♀. (Vespid.) Central-Amerika etc. Modell für Fig. 98.
.. 100. *Lycomorpha pholas* Dru. (Glaucopterid.) Brasilien. *Lyceus*-Nachahmer.
.. 101. *Poncia lycoides* Saly. u. Godm. (Aretidae.) Central-Amerika. *Lyceus*-Nachahmer.
.. 102. *Hemilophus togatus* Kl. ♂. (Cerambycid.) Brasilien.
.. 103. *Calopteron fastidiosum* Dej. (Lycin.) Brasilien. Modell zu Fig. 102.
.. 104. *Pteroplatys radiatus* Mus. Berl. (Cerambycid.) Brasilien. *Lyceus*-Nachahmer.
.. 105. *Platium Spinolae* St. (Clerid.) Central-Amerika.
.. 106. *Dictyoptera erania* Er. (Lycin.) Central-Amerika. Modell für Fig. 105.
.. 112 und 113. *Saillia (Oda) inflata* F. (Membracid.) Brasilien, von der Seite und von oben gesehen, die leere Puppenhülle eines Tagfalters vortäuschend. (Die Figuren sind irrtümlicherweise mit „? *Leda*“ statt *Oda* bezeichnet.)




113



Tafel XIV.

- Fig. 107. *Eroschema Puerri* Pascoe. (Cerambycid.) Vandiemensland.
 „ 108. *Metricorhynchus (Porrastoma) erythropterus* Er. (Lycin.) N.-S.-Wales etc. Modell zu Fig. 107 und 109.
 „ 109. *Pseudolyceus haemopterus* Er. (Oedemerid.) Vandiemensland.
 „ 110. *Priotelus 20-punctatus* F. (Erotylid.) Brasilien. Modell zu Fig. 111.
 „ 111. *Lia scripta* Cast. (Carabid.) Brasilien.
 „ 114. *Epilachna radiata* Er. (Coccinellid.) Columbien. Modell zu Fig. 115.
 „ 115. *Doryphora epilachnoides* Stål. (Chrysomelid.) Columbien.
 „ 116. *Agrius fallaciosus* Chev. (Carabid.) Patagonien.
 „ 117. *Calligrapha* sp. aff. *multicosta* Guér. (Melasom.) Chile etc. Modell zu Fig. 116.
 „ 118. *Erotylus annulatus* Lac. (Erotylid.) Brasilien. Modell zu Fig. 119.
 „ 119. *Spheniscus erotylodes* Kby. (Melasom.) Brasilien.
 „ 120. *Cephalodonta spinipes* Baly. (Hispid.) Pará. Modell zu Fig. 121.
 „ 121. *Ctenodes minutus* Klug. (Cerambycid.) Pará. In der Wiedergabe misslungen!
 „ 122. *Erotylus histrio* L. (Erotylid.) Brasilien. Modell zu Fig. 123.
 „ 123. *Puccilopeplus corallifer* St. (Cerambycid.) Brasilien.
 „ 124. *Esthesis ferrugineus* Bsd. (Cerambycid.) Anstralien.
 „ 125. „ *variagatus* F. „ „ sitzend dargestellt, um die Wespenähnlichkeit des Hinterleibes zu zeigen.



107 *Eroschena* *Roven* Pascoe; *Zanobium* *lehal*. 108 *Metrodichodus* (*Porrastoma*) *erythropterus* Er. *S* *swal*. 109 *Pseudolycus* *haemipterus* Er. *S* *swal*. 110 *Probolus* *punctatus* F. *basal*. 111 *Lia* *scripta* Cast. *basal*. 114 *Epilachna* *radiata* Er. *colomb*. 115 *Bomphora* *epilachnoides*, *S* *lat* *colomb*. 116 *Agrius* *hillebrandi* Chev. *chile*. 117 *Calvathia* *aff* *multicosta* Guer. *chile*. 118 *Erotylus* *annulatus* Lac. *basal*. 119 *Spilenscus* *epitylodes*, Kirby. *basal*. 120 *Cephalodonta* *spumipes* *Baly* *basal*. 121 *Genodes* *annulatus* Klug. *basal*. 122 *Erotylus* *histrion* L. *basal*. 123 *Psechlophus* *rotallifer* *S* *basal*. 124 *Hestesis* *ferrugineus*, *Bd* *argens*. 125 *Hestesis* *variegatus* F. *argens*.

BIBLIOTHECA ZOOLOGICA.

Original-Abhandlungen
aus
dem Gesamtgebiete der Zoologie.

Herausgegeben

von

Dr. Rud. Leuckart
in Leipzig

und

Dr. Carl Chun
in Königsberg.

Heft VIII. 2. Lieferung.

Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen eines natürlichen Systems der Papilioniden
von **Dr. Erich Haase** in Bongkok.



141264

CASSEL.

Verlag von Theodor Fischer.

1891.

BIBLIOTHECA ZOOLOGICA.

Original-Abhandlungen

aus

dem Gesamtgebiete der Zoologie.

Herausgegeben

von

Dr. Rud. Leuckart
in Leipzig

und

Dr. Carl Chun
in Königsberg.

Heft VIII. III. Lieferung.

Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen eines natürlichen Systems der Papilioniden
von **Dr. Erich Haase** in Bongkok.



CASSEL.

Verlag von Theodor Fischer.

1891.

BIBLIOTHECA ZOOLOGICA.

Original-Abhandlungen

aus

dem Gesamtgebiete der Zoologie.

Herausgegeben

von

Dr. Rud. Leuckart
in Leipzig

und

Dr. Carl Chun
in Königsberg.

Heft VIII. 4. Lieferung.


Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlageneines natürlichen Systems der Papilioniden
von **Dr. Erich Haase** in Bangkok.



CASSEL.

Verlag von Theodor Fischer.

1891.



BIBLIOTHECA ZOOLOGICA.

Original-Abhandlungen

aus

dem Gesamtgebiete der Zoologie.

Herausgegeben

von

Dr. Rud. Leuckart
in Leipzig

und

Dr. Carl Chun
in Königsberg.

Heft VIII. 1. Lieferung.

Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen eines natürlichen Systems der Papilioniden
von **Dr. Erich Haase** in Bangkok.



142237

CASSEL.

Verlag von Theodor Fischer.

1891.

Bibliotheka Zoologica.

Herausgegeben

von

Dr. Rud. Leuckart
in Leipzig

und

Dr. Carl Blüthgen
in Bonn.

Heft 8 1883

142683

Grossel.

Verlag von Fischer'scher Buchhandlung.

Bibliotheka Zoologica.

Herausgegeben

von
Dr. Rud. Leuckart
in Leipzig

und

Dr. Carl Cohn
in Breslau.

Heft 6 Bdg. 7

Cassel,

Verlag von Theodor Fischer.

Bibliotheka Zoologica.

Herausgegeben

Dr. Rud. Leuckart
in Leipzig

von
und

Dr. Carl Gkun
in Breslau.

Heft

Lfg.

143023

Cassel,

Verlag von Theodor Fischer.

Bibliotheka Zoologica.

Herausgegeben

von

Dr. Rud. Leuckart
in Leipzig

und


Dr. Carl Chun
in Breslau.

Heft 8 Lfg. 9

Haare II

Boj. 10 - 13

Tafel 11 & 12



Gessel,

Verlag von Theodor Fischer.

Bibliotheka Zoologica.

Herausgegeben

Dr. Rud. Leuckart
in Leipzig

von
und

Dr. Carl Glimm
in Breslau.

Heft Bdg.

Cassel,

Verlag von Theodor Fischer.

1-35

MECA ZOOLOGICA.

Original-Abhandlungen

aus

dem Gesamtgebiete der Zoologie.

Herausgegeben

von

Dr. Rud. Leuckart
in Leipzig

und

Dr. Carl Chun
in Breslau.

Heft


VII


170802


Stuttgart.

Verlag von Erwin Nägele.









MITHUNIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00722 8398